SCD Lyon 1

253262/10

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

253.262 | 10 Réserve

SCD Lyon 1

Epilepsies symptomatiques

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
SECTION SANTÉ
- LYON 1 -

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Pupat Salle 4e Lit N° 36 F°

Prénoms Sylvie

Age 38 ans

Profession Ménagère

Né à

Demeurant à

Entré le 22 Janv 84

Sorti le 1er Fév 84

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Pointe pleurétique c. gauche

Crises d'Epilepsie

Chef du service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Père âgé de 80 ans — Mère morte à 40 ans d'affection

12 jeunes enfants. 8 sont vivants, deux seuls d'affection de poitrine

à 20 ans et à 30 —

Pas d'affection antécédente à signaler. La dernière couche

date de 4 ans — L'année suivante, elle fut prise de

vertiges très abondants se répétant presque tous les jours

pendant 10 à 15 jours 2 ou 3 fois par mois, et cela depuis

4 ans. Depuis deux ans, elle éprouve de temps en temps

petits accès durant 15 jours en moyenne — Elle en est

affaiblie et pense bien à ce qu'elle ne s'en délivrera

elle — D'ailleurs toujours les vertiges très abondants — durant ces jours —

Dep Il y a deux mois elle fut prise de douleurs en

l'hypochondre. Elle habite un rez de chaussée. Dans cette

pièce très humide — La douleur ne fut pas grande mais augmenta

ainsi que l'oppression — Elle ne cracha pas de sang. Elle

fut à gauche un point de côté qui a persisté intense

Le premier accouchement a eu lieu à l'âge de 12 ans — Depuis il a compté 30 crises — Réglée à 16 ans — Depuis 2 mois les vues se succèdent de plus en plus fréquentes — Dans une de ces dernières elle est tombée sur le parquet — elle a perdu connaissance — Dans une autre elle est tombée sur le feu — elle s'est fait une entaille au front —

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

Un point d'empêcher la respiration —

L'oppression en même temps qu'elle augmente. Elle ne peut rester bien que la tête élevée —

L'expectoration abondante verte et légère Pas de sang —

Le bras gauche gonflé surtout la main —

On constate un peu de matité à la base gauche — La sensibilité est normale dans le reste de la poitrine —

L'auscultation donne quand on fait tousser un peu de râles muqueux à petites bulles aux deux temps de la respiration, mais à gauche — tout en arrière au niveau de l'épine de l'omoplate il existe un souffle un peu intense avec altération de timbre — en cet endroit exagération de la respiration —

Les battements du cœur sont assez irréguliers — pas de souffle —

A droite, il existe un souffle — au niveau de deux espaces intercostaux au dessous de l'épine de l'omoplate jusqu'à la base du poumon —

Examen des reins rien d'anormal —

A droite

Pas d'albumine au cœur

L'expectoration a été avec beaucoup d'efforts. Le souffle paraît avoir diminué d'intensité mais s'est étendu et se rapproche de la ligne médiane

Battements du cœur. Pulsations à la carotide et à la radiale 84 —

Aucune irrégularité au cœur —

Rien dans les urines qu'on en ait analysé, on les avait pris antérieurement. La gêne de la respiration a diminué. Perte de connaissance. Devant 98. Secondes. Ensuite elle est plus calme, éprouve un sentiment de suffocation, mais pas de convulsions. Pouls. Urines ainsi qu'elle avait pris de l'eau, on a constaté que la quantité était très petite, mais les battements du cœur n'offrent rien de particulier. Par le contact on sent très peu, même rien. Nombre des pulsations au carotide un peu [illegible] à droite. Dit que c'est au niveau de la partie inférieure du cœur.

Examen de la poitrine en arrière, elle mais de connaissance généralisée, depuis qu'elle est morte elle ne respire plus.

24 janv. 87 -

à 2 heures de l'après-midi

Chaque crise provoque un nouvel appel à l'aide de plus en plus énergique

Depuis qu'elle prend du Bromure, elle est moins oppressée.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Cordy Salle Ste Jeanne Lit N° 7 F°

Prénoms Antoine

Age 1 j ans

Profession Manœuvre

Né à St Bonnet en Jarez

Demeurant à

Entré le 8 Janv 89

Sorti le 28 Janv 89

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

Convulsion à son tremblement de la vingt-trois

Chef du service M.

OBSERVATION CLINIQUE

Elève interne M.

Père mort de Pneumonie Ses Frères
Mère bien portante. 7 frères et 1 sœur en bonne santé. 2
sœurs mortes en bas âge.
Croûtes sur le cheveux. Gland sous le con sous
l'oreille droite
Rien à signaler - Rien d'anormal.
Il y a 6 mois sans cause appréciable le malade
ressentit brusquement sous l'oreil droite étrange sur
la nuque et le cou droit. Il en résultait tête
qui lui entraînait la nuque - Sans 2 secondes après
il tombait sans connaissance - Il eut une crise
convulsive de 2 ou 3 minutes avec contractions
brusques du côté droit du cou et de la jambe
sur fer. Il revint à la conscience et y eut le terrain
par un vomissement

Imp. Nationale et Cie - Lyon

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

Depuis cette époque ce crises se renouvellent à des intervalles irréguliers le malade en a ½ par mois les jours 2 ou 3, jamais de suite 1 ou 2 ou 3 semaines sans en avoir.

Dans aucune de ces crises la chute n'a été accompagnée le malade se met Assis en tombant. Il n'a jamais eu de début de cri.

Il ne s'est jamais mordu la langue, n'a jamais eu d'émission involontaire d'urine.

Après la crise n'est pas complète. Il reste abattu, douleurs dans les membres & les bras. Il reste 2 ou 3 jours sans pouvoir travailler.

Après la perte de connaissance fait défaut. La crise a peu complètement, le malade est incapable de parler mais il entend et y a un tic.

Son état général est très excellent. L'appétit est normal. Les digestions sont bien. Le sommeil est conservé. Aucun trouble de l'intelligence ni de la mémoire.

A l'âge de 7 ans le malade est tombé d'un Wagon qui lui passa sur la jambe droite. Il garda de cet accident une cicatrice qui s'étend sur la crête du tibia dans le 2/3 de son étendue & qui est adhérente à l'os. Légère claudication.

Rien du côté du membre supérieur droit

Rien du côté de la conformation du crâne.

Aucun trouble de la vue. Les pupilles sont égales. Pas de nystagmus. Il y a 10 mm plus de pesanteur. Chaleur de la

Rien à l'auscultation du cœur ni des poumons.

Le pouls est à 98. La face est légèrement tirée du côté droit.

Le 20 août

Epilepsies essentielles

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1re Jeanne N° 18

Nom Jean Louis Erhard
né à Volgesheim (h.-Rhin)
demeurant à
profession ajusteur
âge 25
tempérament
constitution
entré le 25 avril 79
sorti le 28 avril 79.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie.
Autopsie : aucune lésion appréciable

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

n'a jamais eu de crises épileptiq. antérieures

Le malade est apporté dans le coma — La personne qui l'accompagne prétend que depuis 8 jours il est dans cet état il ne parle pas et ne semble pas voir — c'est brusquement qu'il a été pris de ces phénomènes —

Le malade est couché sur le côté gauche — En le découvrant il se retourne sur le côté droit et dans ce mouvement l'on constate qu'il se sert très bien des 4 membres —
aucune m. inf. l'on trouve une flaccidité relative, c.à.d. qu'elle est interrompue par des résistances momentanées — les réflexes sont égaux des 2 côtés, mais un peu diminués par des trépidations — pas d'œdème —

aucune m. sup. les mouvements sont aussi conservés des 2 côtés — ils sont étagnes mais résistant par instants — pas d'œdème — pas de piqûres sont perçues des 2 côtés

à la face pas de trouble paralysie appréciable mais déviation conjuguée des yeux à dr. — le malade garde d'ordinaire les paupières demi-fermées

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Et les globes oculaires sont toujours déviés à dr. — ils ont en outre un mouvement assez rapide de nystagmus très-marqué les extrémités s'impatientent beaucoup — ce qui fait de mouvements brusques et saccadés à reproduire — l'observation constant qu'on l'examine il prend une teinte épileptiforme	
27 avril	26 avril aujourd'hui le matin grande crise — Depuis hier soir — mouvements de la langue — miction considérable involontaire — les yeux sont déviés à droite nystagmus — il est peu de contractions toniques répétées. Dans tous les membres ; pendant que ces contractions ont lieu les globes oculaires qui étaient déviés à droite reviennent à la ligne médiane et passent même un peu à gauche — en outre les pupilles qui étaient resserrées à dilatent — quand les contractions cessent, les pupilles se resserrent et les yeux reviennent à droite —	
	à l'état calme et à l'état de contraction la pupille gauche est toujours plus dilatée que l'autre —	
	la déviation des yeux à gauche pendant la crise n'est pas constante : les yeux restent généralement déviés à dr. — cependant la plupart du temps ils reviennent à g. —	
	en notre présence après la série des petites crises il survint une grande crise épileptique — on constatait pour les mouvements de la main droite les mêmes phénomènes qu'à l'état normal — les membres du côté droit sont généralement plus forts que ceux du côté gauche — les yeux reviennent en haut et un peu à droite — cyanose extrême —	
	examen ophthalmoscopique au normal (Dor) —	
	il a pris à 8 grammes environ jusque à son rétablissement complet —	
27 avril	n'a présenté de crises depuis le rétablissement — droite — sans anesthésie complète, grande tranquillité. Semi-fermés et ouvrant les yeux qui oscillent entre la ligne médiane et le côté gauche grandes contractions fréquentes —	
	quand il se réveille et ouvre les yeux, les pupilles alors resserrées se dilatent ayant les yeux fermés, on les soulève on trouve les yeux resserrés mais si à ce moment on approche une lumière, on les voit se dilater	

Lyon. — Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
Soir.	Hier soir le malade a eu une crise épileptique très forte qui a exigé l'application d'une camisole de force ; depuis cette crise il en a eu toute la nuit une série (moins forte que la 1re) — ce matin il est plongé dans le coma — urinations fréquentes — Quand on cherche à le faire boire, il prend des cris — ce matin dans le repos les yeux sont sur la ligne médiane ou bien à dr. Pas au bt. Sup. 6	
29	Hier soir grandes crises épileptiques — Le pouls est devenu fréquent — L'état psychique par la lumière Hauteur complète du m. s. dr. — résistance du biceps g. résolution des membres. — Trait tiré — Ventre affaissé en bateau — Sensibilité générale abolie très accusée — Les yeux sont sur la ligne médiane et regardent en face — Ne répond pas aux interrogations : mais en insistant il prononce le prénom — Ouvre les yeux — Se tenu à autre pousse un gémissement inarticulé P = 132 R = 32	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

on approche une lumière, on le voit se dilater

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1e Clinique N° 19

Nom Jean Esprit
né à Moulins (Allier)
demeurant à Lyon
profession Fondeur
âge 51 ans
tempérament
constitution
entré le 5 Juin 1871 —
sorti le mort le 9 Juin —

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Le seul renseignement que nous puissions fournir sur ce malade est qu'il est tombé dans le coma depuis le 5 Juin. —

= Au moment de son entrée le malade tombe dans le delirium tremens et la face hébétée les yeux hagards et injectés contractés la bouche et les dents serrées — Il agite les bras d'une manière violente mais surtout le droit =

6 = Dans la nuit le malade a plusieurs accès de vomissements pendant la visite = Le malade commence par pleurer et gémir violemment il agite les bras et les jambes

Lyon. Imp. veuve Bonnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	droit pour les deux membres tout agités de mouvements désordonnés analogues à ceux de l'épilepsie : pendant la crise qui dure une minute environ les membres gauches restent immobiles et contracturés — La marche de la face gauche paraissant beaucoup moins prononcé à gauche — La Crise finit toujours d'abord par le côté droit qui redevient immédiatement après l'état normal de sensibilité et de mouvement pendant que l'autre côté est encore le siège de quelques mouvements et ne reprend que plus lentement sa sensibilité — Les mouvements de la tête et des yeux sont forcés : dans la journée du 6 Février nous avons pu prendre toutes les 1/2 heures —	Lait Jaune et [illegible] de 05 [illegible] Potion — Bromure potassium 4gr —
7.	Depuis hier la malade a eu à des moments différents de la matinée et dans la nuit des mouvements convulsifs de la mâchoire et dans le membre supérieur droit : il [illegible] à gauche — Le Bras droit est resté à gauche le jour dans le repos plus que la jambe — Jusqu'à [illegible] dilatation des pupilles — Le pouls [illegible] pendant la crise —	Bromure 6gr —
8	Même état — pouls 124 — entre Semaines — pendant la nuit —	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1 Charles — N° 49 —

Nom Jean Bajust —
né à
demeurant à
profession
âge
tempérament
constitution
entré le
sorti le

Sortie — Autopsie

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie —
Congestion de la Encéphale

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Autopsie le 10 juin - 30 heures environ après la mort —
Encéphale - Les sinus sont Congestionnés - et renferment beaucoup de sang à l'incision de la dure-mère — Les Méninges présentent une Consistance plus grande qu'à l'état normal = un épaississement notable et une teinte opaline au niveau de la base du Cerveau et de la partie Supérieure = on trouve une Soufflure très-intense des méninges au niveau de la portion la plus proéminente de la Scissure inter-Pariétale -
Les Veines Cérébrales sont dilatées et remplies de Sang —
Les artères sont saines —
L'enlèvement des Méninges est assez difficile : on Constate ensuite sur les Circonvolutions des traînées légèrement rosées —
Sur la Coupe : on remarque un piqueté très-marqué —
Il n'existe aucune trace de ramollissement de la substance blanche des Ventricules —

Lyon. Imp. veuve Bonnetial et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Les plexus choroïdes sont volumineux, congestionnés — Le cervelet paraît aussi volumineux que à l'état normal — Le bulbe et la protubérance présentent des veines très-volumineuses — Après coupe du bulbe on trouve une légère infiltration sanguine — Le foie n'a pu être examiné au microscope [illegible] il est gras à l'œil nu — Les autres organes n'offrent rien de particulier — On remarque également des adhérences pleurales du côté gauche et de nombreuses plaques laiteuses sur le cœur —	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4ème Femmes N° 14

Nom Durand Constance
né à Chazay (Ain)
demeurant à Lyon
profession tisseuse
âge 31 ans
tempérament
constitution
entré le 2 8bre 1882
sorti le 29 8bre 1882

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Mal épileptique

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Hérédité = Mère morte à 46 ans, à la suite d'une couche
Père mort à 44 ans, d'une maladie indéterminée exercait la profession de cafetier (alcoolisme avéré)
Est le aîné d'une famille de cinq enfants
Tous sont encore vivants et bien portants —

Antécédents = on ne relève rien de particulier dans ses antécédents, au dire de son mari qui me fournit tous les renseignements, elle a toujours joui d'une bonne santé.
Pas de syphilis, cependant il faut noter une cicatrice blanchâtre, irrégulière, située au niveau de la partie int. de la clavicule G — une autre cicatrice, circulaire et brunâtre située au niveau de la partie ant. et moy. de la jambe G.

Mariée à 25 ans — 7 grossesses, pas de fausses couches —
Bonnes grossesses, Bonnes couches —

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	sur les 7 enfants, deux seulement vivent actu L'un est âgé de 7 ans, bien portant — L'un autre âgé de 8 mois est en nourrice Les autres sont morts en bas âge vers 4 à 5 ma Pas de frayeur, pas d'impressions morales vives elle est d'une nature peu impressionnable — Elle se portait très bien, lorsqu'il y a 4 ans elle est prise subitement de crises convulsives, se succédant à des intervalles assez rapprochés — À ce moment elle serait restée 10 jours sans recouvrer sa connaissan (séjour d'un mois aux 1ères femmes, on a été obligé de l'isoler dans un cabinet particulier, elle criait et se tordait en convulsions) Cette première attaque est survenue 5 mois après une couche, elle n'a pas allaité son enfant — Depuis lors la malade se portait bien, lorsqu le 18 Juin dernier elle est prise subitement de crises convulsives — (Le dernier accouchement remonte au 1er février, elle n'a pas allaité son enfant) Séjour d'un mois aux 2ème femmes, du 18 juin au 1er juillet. 10 jours après sa sortie de l'hôpital, la malade qui avait conservé un peu de raideur dans le bras g retombe de nouveau — elle fait un second séjour de 4 semaines aux 2ème femmes Il y a 15 jours la malade quittait l'hôpital en bonne santé, cependant son mari ne lui trouvait pas le regard naturel, le membre sup. g. était également un peu faible (La malade ne traîna pas la jambe en marchant) Le 29 7bre dernier, sans cause appréciable, elle est prise de nouveau de crises convulsives avec perte de connaissance — Les crises se succèdent assez rapidement, elles ont une durée de 2 à 3 minutes en moyenne et sont séparées par un intervalle de calme plus ou moins long 10 à 15 minutes environ.	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 2e femmes — N° ~~38~~ 34

Nom Durand Constance

né à

demeurant à

profession

âge 36 ans

tempérament

constitution

entrée le 9 Juillet 82 —

sorti le 31 juillet rentrée le 10 août

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Hystérie —

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Rien de particulier dans les antécédents héréditaires —

~~Pas d'antécédents~~ Comme antécédent pathologique au moment des grossesses, qui ont été au nombre de 7, cette femme a eu deux accouchements prématurés. Les autres ont été toujours simples — Le dernier accouchement date du mois de Février — La malade raconte que depuis cette époque elle a eu des malaises mal définis : céphalalgie quelques douleurs vagues, la menstruation ne s'est pas établie ; les règles ayant fait une seule apparition et en petite quantité —

Il y a 15 jours, sans cause occasionnelle appréciable, la malade a été prise d'une espèce d'attaque avec perte de connaissance

gauche

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	~~et hier~~ l'attaque a été précédé de vertiges —	
	Lés au bout d'environ une demi heure, la malade reprend connaissance et dès le lendemain se livre à ses occupations ordinaires —	
	Le surlendemain nouvelle attaque, mais constituée seulement par un vertige, sans perte de connaissance — Depuis cette époque céphalalgie frontale —	
	Actuellement, ce dernier symptôme seul persiste — on ne constate pas de trouble notable de la motilité ni de la sensibilité, sauf peut-être quelques fourmillements au membre supérieur ~~gauche~~ droit —	
	Rien au cœur — Rien aux poumons —	
	Les sécrétions notable de l'appétit —	
14 Août	Céphalalgie très-intense	Valériane de Guinard
	Contracture de la moitié gauche de la face —	
	Sensation de tiraillement —	

SCD Lyon 1

Durand Constance

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Au moment de son entrée vers quatre heures du soir, la malade est dans un état d'hébétude absolue, elle roule ses yeux à droite et à G. sans paraître s'intéresser aux personnes qui l'entourent — Au moment où je la vois elle est dans une période de repos - Les membres supérieurs offrent un peu de résistance aux mouvements communiqués, dans le sens de l'extension, cette résistance est plus marquée à D. Pour les membres inf. elle résiste dans les deux sens, la résistance est également plus marquée à D. qu'à G — Trouble notable de la sensibilité, on peut piquer fortement la malade sans que sa face trahisse la douleur qu'elle ressent — Diminution des reflexes plantaires - Tous ces signes sont plus marqués à G. qu'à D - Peau chaude, couverte de sueur - Température R. 40°1 pouls 80 - resp. 28 - La resp.n est mêlée de R.R. râles trachéaux - Toux légère, aboutissant parfois à de l'expectoration de gros crachats muqueux et spumeux — Les pupilles sont dilatées - La tête et les yeux sont plus volontiers tournés à D - L'auscultation du Coeur ne révèle pas de bruits anormaux — Je sonde la malade pour pouvoir examiner ses urines — Urines claires colorées D. 1028 — Traitées par la chaleur et l'ac. acétique elles donnent un précipité albumineux très peu abondant (un centième) 3 8bre Cette nuit la malade a pris plusieurs crises. Elle en prend une au moment de la visite	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	La malade tourne la tête à Droite en même temps que ses membres se raidissent. Puis surviennent des mouvements cloniques plus marqués à Droite – La tête ne tourne pas plus de 3 minutes – Après la période convulsive, survient la période de calme avec respiration fréquente et stertoreuse – Pendant la période de calme, la tête et les yeux sont plus volontiers tournés à Droite – La figure exprime plutôt la douleur et le ennui – Les mouvements automatiques sont plus marqués à D. qu'à G. il y a évidemment un peu de paresie du côté G. – De même pour la face, les muscles se contractent moins bien à G. –	
	Ce matin Temp. R. 39°	
4 8bre	Dans la journée de hier le malade a pris 3 lavements contenant chacun un gr. de chloral plus une potion avec Brom. de potassium 4 gr. Elle n'a pas cessé de prendre des crises, elle n'a eu qu'une heure de repos après la administration des lavements à 6 h. du soir.	
	Ce matin nous lui voyons faire une crise violente, les membres sont contractés, les yeux tous portés à D. et ~~en haut~~ vers la fin de la crise à D. et en haut –	
	Elle résiste moins aux mouvements commencés du côté G. que du côté D.	
	Pendant que nous sommes autour de son lit la malade prend une 2ème crise – Les contractions commencent manifestement par les muscles de la face du côté G. et se généralisent rapidement – La période des convulsions toniques est courte – Il en est de même pour la convulsion clonique – Pendant la période de calme, ronf.t stertoreux	

SCD Lyon 1

Dirand Constance

No 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
Etat actuel d'observation dans la journée d'aujourd'hui	Dans la première constatation elle ramène les yeux et la tête à G. — Les pupilles se contractent sous l'influence de la lumière Les yeux sont surtout portés en haut, elle a une certaine agitation, elle remue un peu les membres de ses côtés, surtout du côté D. Les yeux oscillent un peu latéralement près de la ligne médiane et fortement dirigés en haut. Mouvements automatiques des membres droits Pour les membres supérieurs ~~droits~~ réflexes moins marqués à G. — Pour les membres supérieurs ~~droits~~ les réflexes sont encore moins marqués que aux membres sup. Même différence pour le membre supérieur Gauche — La face exprime surtout la douleur et l'ennui — Quand on la pique elle réagit faiblement et seulement aux piqûres fortes — Les muscles de la moitié G de la face se contractent moins bien que du côté D. — Il y a évidemment des phénom. de paralysie de la moitié Gauche du corps Quand on lui dit de tirer la langue, elle remue un peu les dents et cherche à le faire — 4 8bre — Hier dans la journée la malade a pris trois lavements, contenant chacun un gramme de chloral et une potion avec 4 gr de Bromure de potassium Hier dans la journée la malade n'a pas cessé de prendre des crises, elle n'a eu qu'une heure de repos après la administration des derniers lavements Ce matin à la visite nous lui voyons encore prendre une crise violente — Après avoir attendu près de quarante minutes autour pour épier le début d'une nouvelle crise nous observons les manifestements phénom. suivants : Tout au début les yeux sont fixes sur la ligne médiane, les pupilles dilatées, puis elle les porte brusquement à Gauche — En même temps que les yeux sont immobilisés sur la ligne médiane, il y a arrêt de la respiration (cette période est très courte et tout ça se fait dans l'intervalle de 4-5 secondes	Ordre

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Pendant la période de convulsions toniques, qui ne dure à peine une minute, les yeux sont portés à Gauche et en haut, la tête est également tournée à G.—

Pendant la période de convulsions cloniques, la malade ramène la tête à Droite, ainsi que les yeux elle reprend de mouveau les yeux à G. pendant la période stertoreuse. —

Au début les convulsions débutent manifestement par les muscles de la face du côté G.—

Les mouvements automatiques sont toujours plus marqués du côté D.

Dans la période de convulsions toniques elle tend les bras et les jambes, la face se replie dans la paume de la main.—

Dans la période de ~~coma~~ respiration stertoreuse, la narine Gauche s'aplatit au moment de la inspiration.

La période de mouvements automatiques dure plusieurs minutes — La marche inf. Gauche devance la droite —

Tantôt la figure exprime la souffrance et le ennui, tantôt elle s'exprime plus rien — parfois la malade mâchonne — Quand on cherche à la tirer de son rêve elle gémit en lui demandant comment ça va ? elle bredouille une parole incohérente ou fait un signe de tête.

Les pupilles sont habituellement un peu dilatées, elles se contractent sous l'influence de la lumière.

Quand la malade sommeille les pupilles se resserrent puis se dilatent de nouveau aussitôt que survient un accès de toux.

Elle crache bien ce qu'on lui verse dans la bouche —

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

Durand Constance

№ 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
5 8bre	Ce matin la malade va mieux - Elle est toujours un peu obnubilée - De coté du bras G. resistance du coté du tronc - Du coté du bras D. elle resiste un peu dans les deux sens Pas de trépidation plantaire - reflexe rotulien conservé trépidation - Diminution des reflexes - Vient uriner du côté Droit - Elle sent bien les piqûres - réponds aux questions simples avance la langue sur les lèvres mais ne la tire pas longue — (pas de crises depuis hier un bien fait) persistance de la paresie du côté G - Les mouvements automatiques et volontaires sont faciles à Droite -	
6 8bre	n'a pas repris de crise - Ce matin elle est bien éveillée, parle un peu difficilement mais répond cependant aux questions qu'on lui adresse - A ses règles depuis hier - La trépidation plantaire a diminué, elle n'est plus marquée que du côté D. on l'a aussi à G. mais moins facilement que à D. Le membre du côté G. résiste plus aux mouvements communiqués	
7 8bre	Ce matin la malade se plaint de son genou G. (elle s'est fait une fois — contusion — ecchymose, rougeur, tuméfaction) elle nous dit qu'elle s'engage habituellement	
10 8bre	Les Urines sont de coloration normale - Densité 1025 - Traitées par la chaleur et l'acide acétique elles ne donnent pas de précipité -	

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

Modèle N° 61.

Nom Courtaud Durand N°145

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	3 Octobre	4	5	6	7	8	9	10
95	210	34.0 42,5								
90	200	33,6 42,0								
	190	33,2 41,5								
80	180	32,8 41,0								
	170	32,4 40,5								
70	160	32,0 40,0								
	150	31,6 39,5								
60	140	31,2 39,0								
	130	30,8 38,5								
50	120	30,4 38,0								
	110	30,0 37,5								
40	100	29,6 37,0								
	90	29,2 36,5								
30	80	28,8 36,0								
	70	28,4 35,5								
20	60	28,0 35,0								
	50	27,6 34,5								
10	40	27,2 34,0								
	30	35,5								

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle Gr Bottin N° 48

Nom J. Claude Souroux

né à Montrud (Nantua)

demeurant

profession Journalier

âge 56 ans

tempérament

constitution

entré le 18 août 1868

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

accès éclamptique.

Depuis 10 ans ébloussements tous les mois, consistant surtout en une sorte de jeute subite de la vue (brouillards)

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Cet homme affirme n'avoir jamais été malade n'avoir jamais connu d'accès jusqu'à présent. Il y a juste un mois crise au milieu de la nuit caractérisée par perte de connaissance, mémoire, contorsion des yeux, contractions toniques et mouvements violents. Il en sortit sans aucun trouble du côté d'aucun appareil au bout d'environ ½ heure. Pas de céphalalgie cette fois. Puis il se remit à travailler et depuis hier au soir il a eu trois nouvelles crises qui cette fois se sont duré la 1-¼ h. ½ h. ¼ h. et ont été accompagnées de perte connaissance. Il n'est pas tombé par terre par ce qu'on le retenu et durant la dernière il eut une abondante émission d'urine accompagnée de vomissements peut être provoqués par la substances alors ingérées dans un but thérapeutique.	

Papeterie générale, Lyon. — Méd. n° 6.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Va une s'affaiblissant depuis quelques temps mais sans sortir du crises par la vue était un peu trouble.	
	Jamais eu d'anasarque. Les jambes ne sont pas enflées. Urine normales. Ecchymoses.	
	Urines très chargées de principes terreux fournissent sous l'infl. de l'ac. nitr. abondants.	
	Ausculation. Battements faibles. Au niveau des ventricules un souffle systolique rudimentaire. Rien aux bruits. Paraissant dû plutôt à un frottement contre la paroi thoracique qu'à une lésion valvulaire. Irrégularité des battements du cœur.	L'auscultation sera faite par suivant les positions.
	Pouls assez plein très irrégulier alternant 3 par 3 battements à la suite les uns des autres séparés par une pause ayant la durée de 2 ou trois pulsations. — —	2 sangsues sur le cœur.
19.	Le matin on trouve que les pulsations ne sont pas	2 gr. B. Nat. 5 Sc. d'or. $\frac{1}{2}$
21.	Demande sa sortie. On lui donne 16 gr. d'Or. de B. à prendre en potion par jour des gr. Sc. or. amen. 250 gr Eau. 2 cuill. p. jour. Sort 2 ou 3 jours après sans avoir pu être complètement examiné.	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* Ste Jeanne N° 8

Nom D. 73 Poisier

né à Ste Foy

demeurant à Lyon

profession employé de commerce.

âge 37 ans

tempérament

constitution

entré le 12 Juin 1879

sorti le 13 Août 1879.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Crises épileptiformes

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas d'antécédents héréditaires appréciables. Plusieurs frères qui sont morts en bas âge.

On ne trouve pas d'antécédents morbides, ni tuberculeux; j'ai connu l'hémiplégie avec déviation de la face. Le malade nie toute maladie antérieure, par habitude des alcooliques; mais probable avec ses conditions hygiéniques ont été habituellement mauvaises.

L'affection actuelle remonte à 8 mois environ. Sans prodromes et sans cause appréciable, le malade cet homme a éprouvé pour la première fois une crise qui devait se prolonger bien au-delà de la nuit. Le début de la crise n'est annoncé par aucun phénomène péripherique, mais pendant quelques minutes le malade a parfaitement conscience de ce qui lui arrive; il éprouve une douleur avec battement dans toute la moitié de la tête qui paraît être au sommet du front sans se propager en arrière, puis vertige et chute dans la connaissance mais qu'il ne peut empêcher, il ne fait aucun mouvement désordonné aux objets extérieurs, de trouver un appui, et s'il est dans la rue, de

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Sujet un jeune homme de bonne santé. D'ailleurs malgré une certaine dose d'obnubilation, la perte de connaissance n'est jamais complète, pas de cris, pas de convulsions, pas de mouvements de la langue, pas de rétention d'urine, et après quelques minutes de repos, il se relève rapidement et se promène sans y éprouver la fatigue pénible, mais aussi sans garder peu de vertige une contusion durable. Ces crises commencent depuis 2 mois environ, mais depuis 3 mois elles sont plus fréquentes, elles se répètent tous les 8 ou 10 jours.

Indépendamment de ces crises le malade éprouve une douleur de tête continue dont le maximum est à la région occipitale droite mais qui s'étend aussi à toute la moitié droite de la tête. Cette douleur est très fréquente et très pénible cependant par intervalles indemnes de plusieurs jours. D'ailleurs la tête est assez bonne, ne présente pas de vertiges soutenus en dehors des crises décrites.

La marche est restée facile, les jambes ne fléchissent pas sous le malade, toutefois il a remarqué une certaine tendance à tomber en avant, sans prédominance pour un côté, et éprouve une certaine appréhension à traverser rapidement la rue en marchant ou en changeant de direction. Il a parfaitement pu remplir ses fonctions de soldat.

Pas de troubles sensoriels, ni du côté des yeux, pas de surdité, ni de vertiges, ni de bourdonnements d'oreilles. Pas de troubles de la mémoire. L'appétit est resté intact, la digestion faciles. Pas de constipation, ni de diarrhée, ni de vomissements, ni de hoquets. Pas d'amaigrissement sensible.

Ce jeune homme depuis huit jours se plaint d'une douleur de tête extrêmement violente et le malade présente du vomissement bilieux et répété.

A l'examen du malade on ne trouve rien de plus que ce qui vient d'être raconté. Pas de fièvre, une certaine incertitude de la marche.

Lorsque l'on engage le malade fortement à tirer la langue, celle-ci est déviée en dehors et en dedans, légèrement hémiplégique. Rien à la base du thorax normal. A la percussion légèrement sonore, normale, indépendante des limites du cœur, pas de souffle.

Pouls 90. Pas d'albumine dans les urines.

SCD Lyon 1

Lyon. — Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 12.

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4 F. N° 138

Nom Benoite Lauvijo

né à

demeurant à

profession repasseuse

âge 43 ans

tempérament

constitution

entré le 25 Août

sorti le 15 novembre 1837

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Brou de prot. 2 gr

La maladie actuelle est attribuée par la malade à de vives contrariétés qu'elle aurait éprouvées dans le mois de février dern... Au commencement d'Avril, étant à la messe, elle éprouva tout à coup des fourmillements très douloureux, avec crampe, qui s'accompagnèrent avec la rapidité de l'éclair le long des membres inférieurs, contournèrent, au tronc, sous la forme d'une bande qui ~~fut~~ suffoqua la malade. Elle tomba, perdit connaissance... Elle ne revint à elle qu'au bout de plusieurs heures. Elle avait de l'écume sanguinolente à la bouche.

Depuis lors il est rare qu'il se passe un seul jour sans qu'elle ait quelques accès, dont la forme est très variable. ~~Tantôt~~ L'aura part tantôt des membres inférieurs (plus fréquemment à gauche) tantôt il y a chute, perte complète de la connaissance, puis hébétude, c'est-à-dire. Quelquefois, alors, morsure de la langue. Tantôt tout le corps a des crampes, des convulsions alternant le plus souvent

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Les quatre membres et la tête, 99 fois à limitant aux membres inférieurs. La durée de ces accès est très courte, mais ils se renouvellent jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. La malade accuse une tendance au sommeil avec engourdissement, quelques fois la fuligineuse des urines. La parole est bien articulée, mais lente, traînante, le mot se fait quelquefois attendre.	
25. Août.	à 4 heures : fourmillements à la jambe droite qui persistent, durant 1' au plus, des oscillations convulsives pour atteindre. 99 secondes après la disparition des convulsions des membres inférieurs ; 99 secondes, à peu près avant les membres inférieurs la main est étendue, ainsi que les premières phalanges, les deux autres sont à demi fléchies. La tête accomplit trois ou quatre mouvements rotatoires très peu étendus (de menton à l'extrémité de la clavicule droite) antéro-postérieurs verticale sur le quart interne de la clavicule. Il n'y a pas eu perte de connaissance. L'accès a duré une minute ½ ou deux environ —	
26.	Le malade a passé la journée d'hier et la matinée de ce jour sans accès. Vers 3 h. du matin la malade a pris 2 gr. de Brom.	
27.	à 8 heures ½ du matin : Accès, qui a duré 1 minute, précédé d'une vive plainte, prolongé. Convulsions généralisées. Morsure de la langue. L'attitude qui est décrite en trois ou quatre minutes.	4 gr.
28.	Accès dans l'après midi. Chute de la chaise où elle était assise. Plaie au crâne. Manipulations, après la mise, pendant toute l'après midi.	6 gr.
30	Deux accès. Deux accès le matin.	8 gr.
31.	quatre accès depuis hier. Pouls à 80, petit, régulier. Douleurs ovariennes à gauche. Sensibilité tactile égale des deux côtés.	10 gr.
1 Sept.	Deux accès hier, dans la nuit. Deux cette nuit. Convulsions, pouls à 80 —	10 gr. 13 grammes
2 —	2 accès entre 9 et 11 heures du soir — par la bouche. par l'albumine.	0,50 cg. de Valérianate
3.	Accès complète, mais contenue hier à 7 h. soir. Plusieurs accès incomplets entre 9 et 11 h. du soir. — Pas de trouble appréciable dans la sensibilité	
6.	3 — 4 accès le 4 — Hier il n'y a pas eu d'accès. La malade a fait sa promenade habituelle. Pouls à 80,	

Lyon. impr. A. Bonnavial, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* _____ N° 138 Suite

Nom Benoite Lausin

né à

demeurant à

profession

âge 41 ans

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Pneumonie (suite)

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

9. pas de crises depuis le 5. dit se battre, répond juste, a bien mangé.
Le pouls est à 80. — Supprimer la digitale.

15. Toujours pas de crises. Depuis trois ou quatre jours, la malade se met à pousser des cris par dégoût volontaire qui va jusqu'à la battre. Elle le fait, la supplie de faire abattre, dit battre — Démangeaisons vives, sans éruption, aux membres, au tronc — à la face où existent des petites taches qui n'y a pas de démangeaison — La Glycerine a été supprimé avant hier —
Crise ce matin à 8h, convulsions. Meurt dans la matinée —

Broncho pneumonie 17. pas de crises depuis le 17. Hallucinations de la vue.

19. 2 crises hier — Douleurs de reins hier. Mouches volantes devant les yeux.

20 1 crise cette nuit. — pas de crises depuis hier matin.

23. pas de crises

25 Crise ce matin. La malade est moins affaissée. a vomi plusieurs

26. fois dans la journée quelques instants après une crise.

Pneumonie d'arrivée 27 — 1 crise hier matin — a vomi quelques instants après avoir pris un peu de
dans les poumons. soupe au bouillon. Elle avait mangé environ une heure avant.

28. a vomi à deux reprises dans la journée plusieurs fois. Un lavement
Vert, mousseux. N'a pas pris d'aliments

Supprimer la pneumonie 29 A vomi plusieurs fois cette après midi. pas de crises.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
30 oct.	Nuit cette nuit —	Bromure 5 gr.
31 oct.	Malade ne vomit pas depuis le 1 oct.	
1 nov.	Vomit depuis le 5 oct, 2 fois, hier 1 fois, jamais —	Bromure — 8
	Le facies est pâle et l'état général est bon, il y a une guérison de plaie.	Digitale 0,40
13.	Pas de vomissements depuis le 11 au soir — Réapparus hier matin avec nausées et hébétude — Pas de fièvre ni dyspnée —	Suppression du bromure et de la digitale
20 oct.	Suppression du bromure de potassium (Bromure d'ammonium)	Reprendre le matin du bromure de sodium
23 oct.	Potion avec 0,02 centig. d'extrait de belladone — Suppression du bromure d'ammonium	
25 oct.	2 gr. d'iodure potassium — Suppression de la belladone	
29 oct.	4 gr. d'iodure	
31 oct.	Suppression de l'iodure — Depuis 9 jours œdème des membres inférieurs — Depuis 8 jours bronchite avec dyspnée — Pas d'albumine dans l'urine ni de sucre:	
1 nov.	8 gr. bromure pot. — Pas d'albumine dans l'urine ni de sucre:	

Lyon, impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Carrejeau Salle 4e femmes Lit N° 7 bis F°

Prénoms Marie

Age Vingt

Profession sans

Né à

Demeurant à

Entré le 26 janvier 1886

Sorti le 3 mars 86

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Névropathie —

Epilepsie —

Chef du service M

OBSERVATION CLINIQUE

Elève interne M.

7

Le père mort accidentellement à l'asile d'épileptiques — la mère morte tuberculeuse à 3 ans.

1 frère vivant mal portant (tuberculeux ?)

La malade a été jusqu'à 7 ans d'une bonne santé. — Fièvre scarlatine à 6 ans — pneumonie bronchite — douleurs rhumatismales sans gonflement de certaines fois, dans les lèvres — Angines fréquentes, ne paraissant pas avoir de retentissement. Réglée à 12 ans — Les règles ne revinrent que tous les mois jusqu'au moment où elle fut mariée (20 ans) depuis elles sont régulières — Une seule grossesse.

Tempérament nerveux, a eu des pleurs faciles.

Depuis l'âge de 11 ans, la malade a des crises, qui au début, n'apparaissaient tous les 6 mois, et qui maintenant se renouvellent presque tous les 15 jours. Le plus souvent, la malade ne les voit pas venir — Elle perd connaissance,

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° ____ F° ____

Soubre, est exempt de douleurs pendant tout le traitement ainsi, durant toute la nuit, pendant le sommeil - Souvent elle est réveillé la langue. ____ ____
Il y a 4 jours elle eut une grande frayeur. En réglé, survenant, en même temps, elle était prise d'une sorte d'engourdissement qui fit elle, la faisaient tomber sur le lit. Actuellement, elle n'a plus de douleurs dans les membres inférieurs. Depuis 3 ou 5 ou 10 heures, les efforts sont encore exagérés en avant et en arrière, le Vomi suivent le même mouvement et les mains viennent se changer par suite d'une faiblesse assez violente - Il faut une certaine force pour écarter le bras du mouvement de la douleur. ____ ____ ____ ____ ____
Dans le membre inférieur la force musculaire est conservée - La sensibilité est partout normale, partout abolie. Sur la jambe et la cuisse droite.
Réflexes tendineux, abdominaux, plantaire, rotulien, à gauche, normaux. ____ ____ ____ ____
Pupilles égales. ____ ____ ____ ____
Sommeil général. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Urines : Pas d'albumine - ____ ____ ____ ____ ____ ____

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Gruveaux Salle 4e femmes Lit N° 20 F°

Prénoms Marie

Age 9 ans

Profession Rentière

Né à Ste Foy les Lyon

Demeurant à

Entré le 22 Sept. 84

Sorti le 20 Oct 84

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Pelliculeuse

Chef du service M

OBSERVATION CLINIQUE

Elève interne M.

Père alcoolique bien portant, vivant bien pendant 15 ans de crises épileptiformes. Tout le Talent de Lereboullet montre seulement à 9 ans, au dire de la malade. A peu environ complètement cessé depuis 10 ans. Mère en bonne santé. 2 frères bien portants. 2 sœurs mortes l'une à 3 ans, l'autre à 2 ans avec des convulsions.

Croute dans les cheveux et dentition certainement apparues. Pelade double apparue dans l'enfance. Convulsions plusieurs fois répétées à l'âge de 3 ans. Rougeole à 7 ans. Varicelle à 8 ans. Eczéma commencé à 10 ans. A l'âge de 9 ans chute grave à la tête ayant provoqué une perte de connaissance ayant exigé des soins pendant un mois.

Menstruation irrégulière depuis l'âge de 15 ans.

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 12-84. — 10.930

Imp. Mahieux et Cie - Lyon

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

A l'âge de 18 ans elle eut sans cause connue une attaque
avec perte de connaissance qui fut suivie de convulsions
des membres, pendant la nuit elle fut prise sur ces
14 crises épileptiformes. Chaque crise s'accompagnait
de perte de connaissance, de convulsions violentes de la
langue, emprise involontaire d'urine.
Pendant deux ans elle resta bien portante. Puis elle
devint enceinte pour la 1re fois à 21 ans et pendant
les 1ers mois de la grossesse elle eut 12 ou 14 crises des 1)
jours. Les crises ne se manifestèrent plus pendant
tout le reste de la grossesse. Elle accoucha heureusement
elle redevint enceinte pendant son nourrissage. Il
survint une série de crises pendant les premiers mois de la
grossesse qui cessèrent normalement. Elle accoucha encore
à terme de sa seconde.
Actuellement la malade n'a plus que rarement des crises
le jour de la période menstruelle. Elle souffre de céphalée
le jour de la période à 7 heures du matin de l'oreille
droite, quelquefois des vertiges.
La malade a fait la scarlatine à son entrée avec
une série de crises. Elle avait fait un état de mal
avec température de 41°.
Actuellement elle est bien. La malade n'a d'autre
douleur que celle que la compression provoque.
Les réflexes sont normaux. Ses pupilles normales
Les urines contiennent une trace d'albumine
Rien au cœur ni aux poumons.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom _____ Salle _____ Lit N° ____ F° ____

Prénoms _____

Age _____

Profession _____

Né à _____

Demeurant à _____

Entré le _____

Sorti le _____

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Chef du service M _____ | OBSERVATION CLINIQUE | Elève interne M. _____

120	Depuis 4 ou 5 jours la malade ressent un certain nombre de fois par jour une douleur dans le membre supérieur gauche qui la force par ce qu'elle ressente jusqu'au cou. Il accompagne de crampes de la main. La Malade dit que si elle chantait, elle tomberait. Il qu'elle soupçonne chaque objet qu'elle tient. Pas de perte de connaissance. Pas de céphalée. Poumons R Ay. Cœur Ay.
130	La malade continue à avoir de ces douleurs dans le membre supérieur gauche. Elle a eu une accès pendant la visite. Il y a de contractions fibrillaires dans le bras.
140	La malade a eu 2 grandes crises convulsives avec perte de connaissance.
161	La malade a encore de crampes de la main gauche

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 12-84. — 10.000

Imp. Allezot et Cie. - Lyon

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

	partent du membre supérieur gauche remonte et
	vers la face et prolongement de la tête et étend supérieur
	- Bruit à la Ly. Chaleur Ly
20 J.	Pas de cas de cancer gênant. Les malades sont sor
	entrés à la Charité

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Dutel, Salle 4e femmes Lit N° 22 F°

Prénoms Jeanne,

Age 13 ans

Profession

Né à St Forgeux

Demeurant à

Entré le 7 Mars 84

Sorti le 22 Mars 84

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Père et mère bien portants - 6 frères en bonne santé - 1 frère meurt à 16 ans de maladie inconnue, ayant toujours été malade - 1 sœur morte à 13 ans d'un abcès de la fesse abdominale - 1 frère mort en bas âge de convulsions -

Croûtes dans les cheveux - dents toutes mauvaises suppurées. Otite - Affection cutanée bénigne dans la 1re enfance -

Il y a 6 mois - brusquement, sans cause accessoire appréciable. La malade fait une crise convulsive avec chute, cri aigu, perte de connaissance, morsure de la langue et coma consécutif à la suite de cette 1re crise un mois se passa sans que l'enfant s'aperçut de rien, grand broncement et encore un jour elle fut prise d'une nouvelle crise convulsive avec chute et perte de connaissance

Dans la soirée elle eut une série de 2 ou 3 accès incomplets, caractérisés par une crampe douloureuse dans

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

Le mollet droit est douloureux, gonflé et la jambe à la région est le siège d'un œdème. Même état pour le côté gauche. Les douleurs très vives apparaissent par accès à la malade, avec élancements par des crises nerveuses, durent 2 à 3 minutes. Il disparaissent complètement pour revenir 24 heures après.

La malade reste 15 jours sans avoir eu que des accès incomplets, mais au bout de ce temps à la suite d'un de ces accès nocturnes elle perd connaissance, tombe dans le lit et présente une crise grave à la face externe du genou gauche.

Depuis cette époque la malade prend 2 ou 3 fois par jour des accès incomplets. Toujours les mêmes dans le côté gauche. 4 ou 5 de ces accès servent de prélude à une crise complète, 4 ou 5 de celle-ci surviennent 2 ou 3 fois. Les accès incomplets ont toujours leur durée de 2 jours avec perte de connaissance pour la dernière et 1 jour à moyenne entre deux crises. La malade reprend connaissance quelques minutes après la fin de la crise, mais reste très longtemps sans parler, comme un rêveur. Elle répond bien aux questions. Elle est un peu triste, mais n'est pas intelligente. Elle a remarqué aucun changement dans son état intellectuel. Elle a eu règles dès le début.

Depuis 2 mois elle est réglée. Les règles ont duré 2 jours, sans douleur, sans prodromes ni accidents.

L'état général est resté très bon. Le sommeil est excellent. L'appétit a été diminué. Les digestions sont bonnes. Urines normales pour la quantité. Pendant longtemps elle a été obligée, elle est maintenant à peu près continente. Elle a remarqué dans quelques cas que la présence des règles, surtout dans les trois premiers jours, coïncidait avec des crises.

Le 13 Mars Rien à signaler aucun vers dans le selle. Urines et sommeil se maintiennent en bonne voie.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Mollon Salle Ste Jeanne Lit N° 3 F°

Prénoms Antoine

Age 28 ans

Profession Journalier

Né à Ste Marcelle Tilloux (Loire)

Demeurant à

Entré le 8 Février 88

Sorti le 16 Février 88

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Le malade prétend que ses parents sont morts ; mais il dit qu'il n'est jamais en d'attaques

Mère morte à 50 ans, le malade ne peut dire de quelle affection ; père actuellement malade (affection stomacale) ; sœur morte à 20 ans d'une affection thoracique aiguë, autre sœur et deux bien portantes. Depuis l'âge de 15 ans, le malade dit avoir été sujet à des spasmes nerveux survenant par accès et caractérisés par des phénomènes vagues du côté de l'estomac suivis de congestion céphalique avec céphalalgie, épistaxis et épistaxis consécutives du côté de la gorge et de l'oreille. Ces accès revenaient souvent plusieurs fois par jour et le malade dit avoir eu alors des épistaxis assez abondantes. C'est depuis l'âge de 20 ans environ que l'affection mentale qui l'amène aujourd'hui à l'hôpital. Depuis cet âge le malade est sujet à des attaques revenant assez souvent plusieurs fois par jour ; ces attaques sont moins fréquentes aujourd'hui ; elles sont précédées de

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

prodromes parfois assez courts pour ne pas permettre au malade de donner une position convenable pour se garantir de la toux ; ils sont caractérisés par de pleurers vagues douleurs générales très mal définies par le malade. Le général, le malade a le temps de se prémunir contre la douleur. Ensuite survient l'effort même caractérisé du côté malade par un cri initial avec perte de connaissance quelquefois incomplète, par des mouvements convulsifs. L'accès dure peu en général, 1 ou 2 minutes ; les cris sont parfois assez rapprochés. Le malade a eu deux accès cette nuit (3e session) assez peu intenses, puisque l'on ne s'en est aperçu dans la salle. Après l'accès, le malade ne se sent pas fatigué ; miction abondante d'urine quelque temps après.

Le malade a toussé ici à droite ; l'appétit est conservé ; selles normales. Dans l'intervalle des accès, le malade, il y a 4 semaines
étant assis près d'un poêle, a pris par mégarde, pendant le temps de se retirer à temps, il s'est fait des brûlures plus ou moins profondes au dos de la main gauche, derrière l'épaule droite et même côté dans les parties du côté droit et un peu sur le nez. Le malade porte encore divers cicatrices sur le front, au dessus de son accès — Il porte encore d'autres cicatrices vers l'oreille gauche et la région inférieure, résultant d'une brûlure qu'il se fit, il y a trois mois.

Rien au poumon, rien au cœur

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Lafeuf Salle 4e femmes Lit N° 73 F°

Prénoms Marie

Age 50 ans

Profession ménagère

Né à Ste-Foid

Demeurant à

Entré le 7 février 85

Sorti le 15 février 85

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie ?

Chef du Service, M. ____

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M. ____

Il y a trois ans elle a eu coliques très vives dans le flanc droit, puis le malade attribue à la frayeur suppression de mois suppression

Père mort d'une affection thoracique ayant duré six mois ; frères et sœurs bien portants ; une sœur morte rapidement ; variole dix-huit à ses semaines ; depuis santé habituelle ; la malade avait même un tempérament sanguin avec de la congestion cephalique, des maux de tête et cela jusqu'à l'âge de 42 ans ; menstruation très irrégulière surtout depuis 40 ans. La malade dit n'avoir jamais eu ses règles depuis sa trente-troisième année jusque à la quarantaine ; et c'est à cet époque qu'elle fait remonter la série d'accidents dont l'affection actuelle est la suite, faiblesse des membres inférieurs, suppression habituelle depuis 25 ans au dire de la malade, extrémités continuellement froides, tête brûlante. Autrefois la malade accusa depuis sept ans des malaises revenant jusqu'à six par des intervalles de temps variables, mais moins longs autrefois qu'aujourd'hui. Dans sa jeunesse,

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

La malade avait parfois plusieurs accès par jour ; aujourd'hui accès sont moins fréquents ; ils sont séparés par plusieurs jours, parfois de semaines. La malade sent, particulièrement à la suite d'une fatigue quelconque, une sensation vague mal définie au niveau de l'épigastre remontant jusqu'au sternum ; elle cherche un siège pour se reposer et alors elle perd connaissance complètement ; l'accès dure un temps variable de quelques minutes à 20 minutes. La malade ne sait pas donner de renseignements sur ce qui se passe durant la perte de connaissance. Elle a eu un de ces accès la veille de son entrée à l'hôpital le 6 février. Au mois de décembre 84, la malade a eu une affection cutanée dont elle porte encore les traces au pli du coude gauche, au cou du côté gauche et au côté droit. L'affection s'étendait aussi à la face antérieure de l'avant-bras gauche et à la face du même côté. La malade tousse habituellement tous les hivers depuis 1870. Cet hiver, à la suite de son affection cutanée, elle eut une affection thoracique assez intense caractérisée par de la toux et une expectoration assez abondante. Cette affection a débuté vers le premier de l'an environ. Il y a 15 jours la malade toussait et crachait encore beaucoup. Depuis quelques temps, la toux a complètement cessé, au dire de la malade, ainsi que l'expectoration et aujourd'hui c'est de ses jambes qu'elle se plaint ; les règles ont supprimé depuis l'hiver de 1883-84 époque à laquelle elles eut une perte assez abondante.

Actuellement, la malade se plaint principalement de ses jambes, de sentir comme mortes, à son dire, ses membres inférieurs lorsqu'elle veut se réveiller ; aussi a-t-elle soin de se tenir continuellement les pieds et les jambes sous

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

pieds. En même temps que cet engourdissement, il vient un battement vive douleur, parfois très intense, siégeant au niveau de deux gros orteils gauche et droit. A l'examen, battements inférieurs semblent abolis; crampe musculaire douloureuse des mollets semblent fort diminués; la peau qui recouvre est plissée et tendue. La sensibilité au contact est intacte partout, partiellement perdue à la plante des pieds; les réflexes rotuliens sont abolis. La force musculaire est très affaiblie; le malade peut à peine se tenir sur ses jambes; quand essaie d'écarter ou de fléchir les jambes de la malade contre son gré, elle résiste à peine. Elle fait remonter le début de son accident vers la première de l'été. La paresie est venue peu à peu sans autre symptôme concomitant. Elle l'attribue à l'humidité à laquelle l'expose sa profession et surtout aux changements très brusques. Rien aux membres supérieurs.

L'examen des poumons ne révèle rien d'anormal.

Rien au cœur; la pulsation des radiales est à peine perceptible et contraste avec la pulsation normale des autres artères, de la fémorale en particulier; les mains sont généralement froides, parfois cyanosées lorsque le malade n'a pas soin de les tenir réchauffées.

L'appétit est faible; il l'a toujours été, selon le malade; ulcération au sacrum il y a deux ans; le malade les attribue à des brûlures.

Du côté des yeux, le malade accuse un affaiblissement de la vue datant de 3 ans ou 4 ans; le malade dit qu'au même temps que la vue s'affaiblissait, ses yeux pleuraient continuellement. Aujourd'hui à l'examen on trouve l'œil droit à la partie supérieure de la cornée; les conjonctives sont légèrement injectées, les pupilles sont immobiles, ne se dilatent ni ne se contractent sous l'influence de la lumière; ouïe affaiblie, yeux larmoyants

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

	Urines claires albumineuses ; [illegible] de la miction
9 février 85	Une dame visite qui a eu l'occasion de la voir dans sa crise dit qu'elle a [illegible] respiratoire, beaucoup contracture dans la face en l'intervalle et [illegible] commis à part
12 février	Les urines analysées à nouveau ne contiennent ni sucre ni albumine

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Laurencin — Salle 1re Jeanne — Lit N° 10 F°

Prénoms Pierre

Age 29 ans.

Profession Cultivateur

Né à St Léger Ls Paray.

Demeurant à St Julien Ls Cizy (S.-et-L.).

Entré le 22 Décembre 84.

Sorti le 30 Décemb. 84.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie (Petit mal)

Eléphantiasis de la verge.

Ancienne fracture du coude.

Chef du Service, M. ____

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M. ____

Renseignements très difficiles à obtenir à cause de l'intelligence du malad.
Père et mère morts à 70 ans de maladies inconnues; Aucun renseignement qu'on a c'est qu'ils n'ont jamais pris l'attaque; aucun des membres de la famille n'a eu de maladie nerveuse, aucun n'est tombé du haut mal.
Pas de pertes utérines ni autres — Ni alcoolisme — Ni syphilis —
Marié il y a 6 ans; sa femme n'a eu ni fausses couches ni accouchement — C'est depuis le mariage qu'aurait apparu l'éléphantiasis du scrotum.
Pas de convulsions dans l'enfance, pas de scrofule; Vaccination du coude droit pendant la 1re enfance; douleurs rhumatoïdes des membres inférieurs vers l'âge de 11 ans.
Le malade dit qu'il y a 4 ou 5 ans qu'a débuté la maladie qui l'amène aujourd'hui à l'hôpital — Cette affection a bien augmenté maintenant a été d'emblée caractérisée par l'hypertrophie scrotale. De suite, quelques jours à intervalles plus ou moins éloignés les crises nerveuses sans cause appréciable, elles reviennent précédées d'une salivation abondante pour survenir ensuite de véritables accès

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

pas lors les mouvements du corps. à la fois ; ces accès surviennent le malade en arrière et serait tombé s'il n'avait pu se raccrocher — La durée de ces accès est de 1 à 2 minutes, le malade n'perd pas connaissance il n'urine pas abondamment après, ne se sent qu'un peu de lourdeur de tête ; n'a jamais eu de troubles de la motilité ni de la sensibilité le malade dit que les personnes qui l'entourent lui affirment qu'il n'écume pas, ni tord pas la bouche, ni se mord pas la langue, ni pousse des cris. Le malade ne se rappelle pas avoir été réveillé la nuit par une crise, mais il a fréquemment de l'incontinence nocturne d'urine — Dans l'intervalle des crises, l'examen du malade est normal : les fonctions digestives, respiratoires, et circulatoires sont normales — On n'observe pas d'asymétrie faciale, la voûte palatine ne forme pas une ogive bien prononcée. — Ni contractures, ni paralysies, ni troubles de la sensibilité — Rien aux pupilles — Le matin souvent il est réveillé par des cauchemars l'intelligence est normalement développée — Pas d'odeur —

L'urine contient de l'albumine ; pas de sucre

30. N'a pas uriné de toute la journée ; a pris 2 gr de Bromure pour jour

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Fournier Salle 1ère Femmes Lit N° 15 F°

Prénoms Louise

Age 57

Profession cordonnier.

Né à

Demeurant à

Entré le 19 Août 84

Sorti le 22 Sept 84

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Galezzi ?

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Père mort d'apoplexie, âge mère ~~mort~~ encore vivante

2 sœurs mortes d'une affection chirurgicale du genou, à suite de maladie inconnue. 1 frère encore vivant

Commémoratifs ou nature ~~inconnue~~ d'une fièvre cérébrale à 18 ans, une fracture du radius l'année dernière, et ~~une affection~~ au genou survenu après un traumatisme il y a 2 mois

Ménopause est arrivée à 50 ans, elle a eu 2 enfants vivants encore.

Il y a 15 jours qu'elle est malade dit-elle, elle a vomi ses aliments et prenait souvent de étourdissements, mais ils étaient de courte durée. aussitôt tombée, elle se relevait, elle prenait habituellement un peu d'agueberre et dès lors ne s'est plus couchée.

Elle a du reste pris de vin à ~~discrétion~~ il y a une dizaine d'années. Et ses membres se raidissaient ~~à l'habitude~~, elle perdait connaissance tombait par terre. elle était obligé de se relever, depuis lors quand elle se mordait la langue, on constatait parfois de la

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

avait la sensation de constriction à la gorge.
Elle n'a pas d'appetit, a pu peut dormir depuis 15 jours, elle
a des cauchemars dans la nuit.
Abdomen et douloureux à la palpation, on ne trouve rien d'anormal
n'a maigri, 3 jambes ne sont pas enflés
Cœur rien d'anormal
Rien d'anormal non plus au poumon excepté à la percussion, ainsi
que l'auscultation.
Examiné soigneusement des deux côtés sur toute la
hauteur, - rien à noter pour l'auscultation.
La malade urine peu, l'expectoration est peu abondante
Langue un peu saburrale.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle 4emes femmes N° 154

Nom Gernière Philomène
né à Thizy (Rhône)
demeurant à id
profession ménagère
âge 18 ans
tempérament
constitution
entré le 28 mai 1882
sorti le 21 juin 1882

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Depuis l'âge de 14 ans, la malade fait des crises - pas de cause appréciable - pas de prodromes - Il n'y a que 3 semaines que la malade est réglée —

Séjour de 2 mois 1/2 mois à la salle Ste Marie, service de Mr Lépine (du 30 janvier au 1er avril dernier) —

Les crises duraient cinq minutes environ — La malade n'a pas d'aura elle pousse un cri et tombe là où elle se trouve - Convulsions - Morsure de la langue — Après la crise la malade a de la pesanteur de tête et n'a nulle souvenance de ce qui vient de se passer —

Huit jours après sa sortie du service de Mr Lépine la malade a pris cinq crises de suite, pendant cinq jours ~~de suite~~ —

D'habitude les crises revenaient toutes les 3 semaines — mais depuis son passage à la salle Ste Marie, la malade trouve que les crises

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	reviennent plus souvent — La dernière crise remonte à 8 jours — Début de la Menstruation il y a 3 semaines (durée de 2 jours). La malade est bien constituée, elle ne présente pas de traces de scrofule. Sur le bord gauche de la langue on trouve la trace d'une morsure — Bruit anémique musical au niveau des 2e et 3e espaces Bord gauche du sternum Le pouls est asymétrique, le front est bombé — Habituellement la malade se plaint de souffrir de la tête —	
	Pendant son premier séjour à l'Hôtel-Dieu la malade prenant du Bromure de Potassium — (elle est restée 2 mois sans prendre de crises) elle n'a pas continué les ressources et les crises sont revenues et plus fortes et plus nombreuses	
8 Juin	— Le Bruit anémique musical se ~~Le souffle anémique persiste~~ —	s'entend encore seulement à ~~l'espace~~ — diminué
17 Juin	— On retrouve encore un bruit de souffle anémique, par moment il a encore un timbre musical — Pas de crises depuis son entrée	

SCD Lyon 1

Épilepsie ? Névropathie.

No 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

— Le malade avait répondu déjà à divers questions sur — son état depuis un quart d'heure environ, lorsque tout à coup il se renversa la tête en arrière, les globes oculaires convulsés en haut, puis les yeux fermés — la face — se congestionna vivement, puis apparut un tremblement chez le bras droit, puis dans la jambe droite — Le Blackett comparateur avec entrain
puis empreinte la progression ensuite — puis le jument de resistable,
convulsions douloureuses dans le bras, avec lequel le malade frappait violemment la poitrine, soulevant parfois de
Sternum, pour se jeter ensuite immédiatement dans le mouvement d'extension, il y avait également des convulsions, moins accentuées dans la jambe du même côté — En même temps la visage, fortement congestionné avait
une expression de douleur, les yeux toujours fermés — il y eu
eu Simultanément des efforts nausées et vomissements, le malade
avait une perte d'urine avec
Ces convulsions durèrent 2 à 3 minutes, dès qu'elles eurent
cessé, nous constatâmes une contracture énergique
du bras et de la jambe droite, il nous fut impossible
de fléchir la jambe — La face avait également une teinte violacée
Seulement de temps en temps des convulsions, des muscles
de la commissure, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais
toujours à gauche — cet état dura 4 à 5 minutes environ
Alors seulement le malade ouvrit les yeux fixes, et les
pupilles dilatées; il eut un tressaillement général dans
tout le corps, puis immobilité absolue ; à ce moment
les contractures avaient disparues, il persistait seulement
une faiblesse du côté droit. nous soulevâmes
le bras droit dans l'extension, la main à 40 centimètres
du lit ; le bras resta immobile dans cette position
anormale — la jambe droite fut soulevée également dans
l'extension, à 40 cent. environ du lit, elle resta également
dans cette position — il nous fut impossible de
produire les mêmes phénomènes dans les membres

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

gauches – Puis nous fléchimes le bras droit toujours tendu à angle droit – la flexion se fit sans difficulté, et le bras resta dans cet état – Placant alors ma main sur la poitrine, je les fermai dans ~~désidtaus~~ – Le bras et la jambe droite restèrent encore cinq minutes dans la position ordinaire, ~~de droite~~, on les tint les muscles contractés, il n'y avait pas le tremblement qui accompagne habituellement la fatigue, puis le bras étendu ~~brusquement~~ le premier, puis la jambe –

Il y eut un moment d'immobilité absolue dans tout le système de la respiration, la face toujours ~~un~~ peu congestionnée puis le malade eut un mouvement de tressaillement, il ouvrit les yeux, présentant de nouveau la même fixité du regard, puis se tira sur son séant, prit la convexité de la main droite, sortit la jambe gauche du lit, comme pour se lever, à ce moment je le forçai à se recoucher ce qui fut obtenu avec une certaine difficulté – Alors il exhala brusquement de rire, les yeux toujours fréquemment ouverts – Il y eut en même temps, ~~qq~~ grands mouvements des quatre membres – Je fermai alors les yeux, en exerçant ~~qq~~ friction sur les paupières, alors l'immobilité devint complète – Il y eut un instant après ~~nouveau~~ retour des convulsions du bras et de la jambe droites – puis le malade eut ~~qq~~ expirations ronflantes comme un homme profondément endormi – Il ouvrit alors lentement les yeux, regarda autour de lui, répondit à mes questions, tira la langue dont on s'était saisi, sur son état – ~~Il ne se souvenait rien~~ – La succession de ces divers phénomènes avait duré de une quart d'heure à 20 minutes – Pendant les diverses périodes, j'avais à plusieurs reprises parlé très haut au malade, sans avoir jamais obtenu ni de réponse, ni de signe de réponse aucun – Une seule fois, son nom prononcé à voix haute avait été suivi d'un tressaillement brusque – Battements de cœur nombreux – Pouls

Immobilité absolue complète pendant toute la durée de la crise

– Le malade se plaignit alors de violentes douleurs dans l'oreille gauche, et dans toute la tête de ce côté gauche – Il resta ainsi ~~quelques~~ pendant cinq minutes environ, puis il prit tout à coup la même fixité du regard, et eut de nouvelles convulsions du côté droit du corps – et les phénomènes décrits plus haut se reproduisirent

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Cette nouvelle crise dura 15 minutes environ — il y eut encore une fois pendant 24 heures un trouble de l'intelligence — Mais peu à peu l'équilibre des Phénomènes nerveux revint à l'état normal — Violentes douleurs dans l'oreille — Injection légère de la Conjonctive —	
	Le Malade est sorti de l'Hôtel-Dieu de Lyon, il y a 7 mois et demie; à Marseille, il s'engagea dans la Marine marchande et fit le service entre la France et l'Algérie; il ne ressentit qu'une fois un choc à Marseille sur le Pont sur le Cap de l'Afrique — pendant 7 mois il n'eut rien à porter, ne ressentant aucune trace de son indisposition antérieure — L'épanchement de l'oreille avait disparu — Il y a 15 jours seulement, il se mit à saigner de l'oreille fortement, puis l'écoulement reparut en même temps, il ressentit de la douleur à la tête, puis les convulsions épileptiformes se répétèrent tous les jours à peu près à la même heure — Il avait des hallucinations, des bourdonnements continuels dans l'oreille droite; il se retournait parfois brusquement, croyant que quelqu'un lui parlait — Le soir, il tombait brusquement sur le pont de son navire, et perdait connaissance — plusieurs crises de suite, et fut transporté immédiatement à l'hôpital de Marseille — Il ne répétait constamment que le mot de Tambourin — Il fut longuement examiné par le médecin, qui l'endormit en lui faisant fixer un tambourin de cuivre brillant — et conclut à son admission dans un hospice d'aliénés, service des épileptiques — C'est alors que le malade — perdait connaissance dans la salle où il avait été soigné	

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4ème Femmes N° 150

Nom Blonnais Marie

né à Vt Priest (Isère)

demeurant à Lyon, rue Hérigone n° 10

profession Tisseuse

âge 24 ans

tempérament

constitution

entré le 10 8bre 1882

sorti le 30 8bre 1882

DIAGNOSTIC ET RÉSUME

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Mère âgée de 54 ans, bien portante
Père âgé de 49 ans bien portant
Est la 2ème d'une famille de 6 enfants
Trois seulement vivent actuellement
Un frère mort à 8 ans de la fièvre scarlatine
Un autre frère mort à 11 ans
Une sœur morte à 6 ans, maladies déterminées
Un frère et une sœur bien portants, n'ont jamais fait de crises
Antécédents = Bonne santé antérieure fièvre scarlatine à l'âge de 11 ans.
Depuis l'âge de 16 ans la malade prend des étourdissements, des vertiges — Depuis deux ans seulement elle prend des crises, tombe à terre sans délire, écume, la durée moyenne de la crise est de cinq minutes —
Il y a un an séjour de 15 jours aux 3èmes femmes, on l'a soignée à ce

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	moment pour le Ver solitaire — Elle faisait des petites jeans blanches analogues à des gaz de cuirs, et aplatis comme des chevalières — Au mois de février dernier la malade a encore remarqué la présence de quelques anneaux dans les selles — Etat actuel = La malade vient revenir, il semble qu'elle a un enfant dans le Ventre (il est bon d'ajouter qu'elle m'a pas revu ses règles depuis le 16 Novembre 1881) — elle demande ce qu'on lui trouve le Ventre pour lui tirer ce Ver qui la ronge — Elle ressent quelquefois qui remonte à la gorge, sensation d'étouffement — Les crises Les crises reviennent toujours fréquemment la malade prend une crise par jour en moyenne — La perte de Connaissance est absolue, elle ne se rappelle pas non plus ce qui s'est passé — Sur l'axe Bras Droit, partie moyenne de la face post. ext. on remarque une cicatrice étoilée, trace d'une chute malheureuse sur les marbres le Ver pendant une crise — A part ça le état général de la malade est excellent — L'appétit est conservé — absence de fièvre — Par la Toux, par l'expectoration Dilatation des pupilles — (facultés mentales un peu Altérées) La malade donne cependant les détails très constants sur son état — (elle demande une cure radicale, et veut qu'on lui ouvre le ventre si c'est nécessaire pour l'extraction de la bête) — Cœur = La pointe bat dans le 4ème esp. un peu en dedans du mamelon — A la Auscultation on perçoit un ~~Double~~ souffle ~~systolique~~ systolique à maximum d'intensité au niveau de la 1ère pièce du sternum. ~~Le foyer~~ Le bruit de souffle est rude et se propage dans les vaisseaux du cou — ~~Le~~ Le 2e Bruit est très sourd et assez bien localisé au niveau ~~de~~ de la 3e pièce du sternum — A la Auscult. des vaisseaux du cou on entend un bruit de souffle systolique — Bruits vasculaires très marqués — pas de souffle diastolique	Prendre des cuillerées pendant la nuit —

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	on ne percut pas de Double souffle —— pas de Double souffle de Diastole dans les Crachats —— Le pouls est petit, régulier —— Les Urines sont pâles, renferment un peu d'Albumine déposé sous forme de nuage au fond des vases — Densité 1030 — Traitée par le Sc. ag. elles ne donnent pas de précipité — Traitée par la chaleur et le Sc. acétique elles ne donnent pas de précipité — ne décolorent pas la Liqueur de Barreswil — Rien de particulier à signaler du côté de la poitrine, la respiration s'entend bien dans tout l'étendue des deux poumons en avant comme en arrière. ——	
12 8bre	Ce matin la malade a pris 60 gr. de graisses de Courge — et 20 gr. de huile de Ricin — On examine les selles, mais on ne trouve pas la tête —	
16 8bre	Vomissements — Le Pouls — la voix, la parole sont un peu altérés — Se rappelle de rien —	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 7e Mle année *N°* 37

Lachot St Paul

Nom J. Fraissinet

né à Uzerches (Ardèche)

demeurant à Lyon

profession journalier

âge 32 ans

tempérament

constitution

entré le 9 octobre 77 rentré le 27 janvier 78

sorti le 9 Décembre 77 rappelé le 12 février 78

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Morbus comitialis

Alcoholisation

Mendacium nocide

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Rien à noter du côté des antécédents héréditaires.
Cet homme dit que à l'âge de 13 ans sans cause appréciable tellegue chute sur la tête frayeur il a pris pour la première fois une crise épileptiforme depuis cette époque les crises sont revenues régulièrement d'abord tous les mois en moyenne puis tous les 15 jours au mois. Il a fait déjà un séjour à la salle St Charles en 1872. Ces crises d'après la description qu'il en donne semblent devoir être considérées comme épileptiques, elles débutent subitement, sans prodromes sans aura, aussi bien la nuit que le jour; elles sont caractérisées par la perte de connaissance, les mouvements toniques puis cloniques l'écume à la bouche, quelquefois un cri initial et enfin la période de résolution et de coma elles durent environ 3/4 d'heure en comprenant cette dernière période - dans l'intervalle la malade est

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	souvent tourmenté par d'assez violents maux de tête; il dit que son intelligence a diminué, que sa vue est moins bonne, qu'il distingue mal les objets au milieu d'une sorte de brouillard. Jamais il n'a été sujet à des vertiges, à des attaques de petit mal. Il est entré à l'Hôtel-Dieu dans un état de coma. Depuis son séjour il a pris plusieurs crises, et le 15 Novembre on le trouve dans l'état suivant: Hémiplégie, résolution nette, état de tristesse assez marqué. face et crâne symétriques. Vue affaiblie - céphalalgie frontale continue peu prononcée - langue nette sans traces de mauvaise - face teinte digestions normales. Pleurésie au poumon ni au cœur - douleur au niveau du 2ème espace	
16 Nov.	intercostal gauche vers la partie antérieure 2 crises aujourd'hui.	
20	Hémoptysie assez abondante vers 9 h. du soir.	Le malade dit qu'il a déjà
	Explusions hémoptoïques il y a 8 jours environ.	
25	Le malade n'a pas eu de crises depuis le 16.	
1er Déc.	Hier le malade eut une hémoptysie assez abondante suivie d'une névralgie	
	intercostale gauche qui dure plusieurs heures.	
27 Janvier	Le malade sorti de Bron est jeté dans le Rhône probablement	
	pendant une crise épileptique - on le transporte	à l'hôpital auquel lui
	avait donné des soins à la Charité - à son entrée	on le trouve dans un
	état de rémission complète -	
	peu à peu cet état a cessé. - Le malade a été	placé au cachot de St Paul
30 J	depuis ce matin il se plaint d'une douleur assez vive	qui du côté gauche de la
	poitrine et de la partie correspondante à la bras. Il a dû le long du bras - On n'a pas défini	
	rien de plus. L'anesthésie n'est pas complète.	d'un mal au poumon ni au
	Le malade vient de prendre une crise, il est prostré, il a la crachat de sang	
	sur son drap - le côté gauche de la face, les 2 membres de	
	ce côté paraissent moins sensibles à la piqûre, les 2 membres sont moins mobiles.	
	...	

IMP. A. BONNAVIAT A LYON

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles N° 107

Nom Jean Jouve
né à St Agrève
demeurant à
profession jardinier
âge 16 ans
tempérament
constitution
entré le 4 X bre 76
sorti le 8 X 76

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Le 10me enfant d'une famille dont les ascendants sont tous bien portants. Pas de maladie de famille.
Il y a trois mois le malade fut pris d'une syncope, cette syncope fut suivie de crises irrégulières de battements de cœur, avec douleurs dans les mollets et surtout s'accompagnant de gonflement du globe et de la région sourcilière ces mêmes parties tout en étant tuméfiées étaient soulevées par le gonflement du cœur.
Il a été traité à l'hôpital pendant un mois. pendant son séjour les crises ~~depuis deux mois~~ se palpitations de cœur étaient irrégulières, il avait de fréquents syncopes et au moment des crises on était obligé d'appliquer la moutarde aux extrémités pour empêcher l'syncope de se produire. En même temps lourdeur de tête étourdissements 4-5 fois frissons et contractures épileptiformes

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

perte de connaissance etc. Les phénomènes s'étaient amendés lorsque le malade sortit de l'hospice il y a deux mois, conservant encore des douleurs dans les membres particulièrement au mollet. Depuis cette époque le malade a eu une douzaine de crises. La dernière a eu lieu il y a quinze jours, avec perte de connaissance et contracture, le malade ne sort jamais sa langue et n'a point d'écume qui sortant par la bouche. Ces crises durent trois quarts d'heure la perte de connaissance et la contracture ont la même durée.

Le début de la crise est annoncé par une sensation de chaleur intense, avec exophthalmie légère avec picotement dans les yeux et difficulté à mouvoir les globes - acuité visuelle bien diminuée depuis quelques jours le malade se plaint de se tousser et de se sendre remuent avec les quintes de toux du sang noir tantôt liquide et tantôt mêlé à des caillots. Il a eu comme une ceinture de point de côté à droite. Le malade a maigri et sa respiration est souvent gênée.

Le cœur a ses battements réguliers, sans bruit de souffle, pas de matité augmentée.

La poitrine est également sonore dans tous les sens. Les poumons respirent très bien, de même dans le reste du poumon gauche. Dans la moitié inf. du poumon droit sous l'aisselle la respiration y est obscure sans râles, ni modification de la voix autre qu'un simple affaiblissement d'intensité, à même niveau la sonorité est à peu près normale - les vibrations y sont plutôt exagérées que diminuées.

Quelques crachats aqueux complètement pour toute non expectoration

SCD Lyon 1

Lyon, imp. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles — N° 50

Nom Pierre Luzy

né à St Maurice de Gourdans

demeurant à

profession soldat

âge 20 ans

tempérament

constitution

entré le 8 Avril 73

sorti le 2 mai 73 amélioré

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Crises d'épilepsie.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Père bien portant. Mère morte à 40 ans d'une maladie de cœur. Un frère et une sœur bien portants. Lui-même a eu à l'âge de 7 ans une fièvre typhoïde qui a duré trois mois. Depuis cette époque il a toujours joui d'une bonne santé jusqu'à l'âge de 15 ans.

Le matin en se levant, il a eu une crise d'épilepsie. Il a perdu connaissance, est tombé par terre, a uriné sous lui, s'est mordu la langue. Il a eu ensuite des vomissements. Il a gardé le lit pendant deux jours. Il a eu ensuite de la céphalalgie pendant quelques jours.

Depuis cette époque il a eu 6 attaques semblables, mais moins fortes, dont la dernière remonte à 15 jours. Il a eu en outre quelques étourdissements.

Il y a 4 mois il a eu un abcès à la région sous-maxillaire droite, qui a été ouvert et a laissé écouler du pus pendant quelques jours.

Il a eu la rougeole à l'âge de 5 ans.

Il a eu la variole à l'âge de 15 ans.

Il a eu la blennorrhagie il y a 2 ans.

Il a eu un chancre il y a 1 an.

Il a eu la syphilis secondaire il y a 1 an.

Il a eu des syphilides cutanées et muqueuses.

Il a eu des douleurs ostéocopes.

Il a eu des exostoses.

Il a eu des accidents tertiaires.

Il a eu des gommes.

Il a eu des ulcérations.

Il a eu des périostites.

Il a eu des ostéites.

Il a eu des nécroses.

Il a eu des arthrites.

Il a eu des hydarthroses.

Il a eu des tumeurs blanches.

Il a eu des abcès froids.

Il a eu des fistules.

Il a eu des cicatrices.

Il a eu des adénites.

Il a eu des bubons.

Il a eu des engorgements ganglionnaires.

Il a eu des ulcérations.

Il a eu des cicatrices.

Il a eu des accidents.

Il a eu des maladies.

Il a eu des douleurs.

Il a eu des tumeurs.

Il a eu des abcès

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 48

Nom Thomas Marie Pardef

né à —

demeurant à Lyon —

profession —

âge 17 ans —

tempérament —

constitution —

entré le 2 Janv 1871 —

sorti le 6 Janv 73

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

Emphysème pulmonaire

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Il me paraît avoir un peu d'emphysème pulmonaire et de la dilatation des cavités droites. — Mort subitement depuis longtemps. —

Depuis [illegible] malade est sujet à tousser et à éprouver de la dyspnée surtout quand il marche vite et qu'il monte. Il n'a jamais eu d'hémoptysies dans son enfance — à la fin du mois de Février dernier il commença à éprouver des douleurs qui d'abord n'étaient considérables que par une contracture douloureuse du bras et de la jambe droits — La douleur était une telle qu'il fut bientôt forcé de garder le lit. Connaissance complètement — Depuis lors il a eu cinq ou six crises semblables. — Le malade ressent d'abord une douleur atroce contracture dans un membre puis la perte de connaissance avec deux jambes et bras gauches — la respiration toujours pas de hoquet, pas de vomissements — Il n'a jamais rien bu. Etat actuel — Le malade présente : un thorax déformé et globuleux accompagné d'une expansion douloureuse et d'une dyspnée assez grande. Quantité de râles sibilants et ronflants et sibilants et quelques expectorations. Rien à signaler ailleurs

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	mois il avait présenté à Marseille — Chaleur — fièvre assez grande depuis 9 jours — Aucun trouble de l'appareil urinaire — Langue humide — rien aux poumons —	pot { Lait q.s. / Eau de Vichy 1/2
4	Apyrexie plus intense — Beaucoup de sueur —	pot { Vin de Vichy 1/2 / Eau 0.90
8	Le malade prend une crise depuis son dernier visite —	
4 juillet	Le malade est à l'usage de bromure de potassium depuis une quinzaine de jours Ons débuté par 2 gr. et depuis 6 jours il en prend 6 gr. par jour. Ce n'est que depuis cette époque que les crises ne sont pas revenues	Bromure potassium 6 gr
17		
avant 3	Le malade n'avait pas pris de crise depuis 35 jours — Il a pris deux fois la journée d'hier —	
	Depuis 9 jours il ne prenait que 4 gr. de Bromure —	Bromure potassium 4 gr
30	Depuis son entrée il a pris un certain nombre de vertiges véritables : mardi souvent il éprouvait dans la matinée trois sensations douloureuses fixées de Contracture sans perte de connaissance. Ces phénomènes reviennent parfois très fréquemment. toujours sans généralisation —	
31	Le plant dyptotion d'hier —	pot { Eau de Vichy 1/2 / Lait q.s.
1er Août 1		pot { Eau de Vichy 1/2 / Lait q.s. / Eau de Vichy 0.90
2	une crise —	1 pot
9	une Crise —	Brom. de potas. 2 gr
18		
20	une crise il n'en avait pas eu depuis 15 jours —	4 gr
5	Hier 2 crises —	6 gr Brom. de potass.
6	Hier 6 Crises —	
20 Xbre 1872	Hier en assez	
20 Janv	Hier 1 crise d'épilepsie : une heure de sommeil — Ce soir, il y a eu seulement contraction ~~de~~ tonique et clonique dans le bras droit — sans perte de Connaissance	
21 Avril	Depuis 4 jours il a eu une crise tous les 5 jours. — Bromure 8 Crises	

SCD Lyon 1

Fs. Landy — Epilepsie 48

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Depuis la suppression du Bromure de potassium par suite de Malaise de Crise —	on supprime le datura 4 gr. Bromure pota.
6 Juin	Depuis que on redonne le Bromure on reste 12 jours sans provoquer de Crise —	
24 Août	Nouvelles crises se produisant à 3 reprises tous les 4 jours ; une le 21 même le 25 ; une double crise le 29 :	6 gr.
2 Sept	Trois crises dans la journée :	
~~Octobre~~ 1	~~on a cessé le Bromure~~ ~~depuis 6 jours~~ ~~le malade a eu~~	
9	On cessé le Bromure Le malade a eu plusieurs Crises depuis 9 jours —	
14	Depuis que on a cessé le Bromure une seule crise assez forte —	
19	une Crise assez forte	
20	On donne pour la Chloral pour endormir le malade le Bromure depuis	Brom. pot. 3 gr.
21	2 Crises —	
24	~~Crise~~ Crise nocturne —	
26	3 crises — à 7 heures, 8 h. et 10 h. du soir —	6 gr.
13 Sept	une crise le 11 à midi 1/2. Même intensité.	
15	un aura le 14 toujours à midi 1/2	
17 Sept	Une crise dans la soirée vers 8 heures.	
18	Les commencements d'aura paraissent arrêtés, au delà ?	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 106

Nom Charles Stéphane Schildknecht

né à Lyon

demeurant à Varennes (Allier)

profession domestique

âge 18 ans

tempérament

constitution

entré le 5 Juillet 72

sorti le 6 juillet 72

DIAGNOSTIC ET RÉSUME

Crises épileptiformes ?

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Parents inconnus. Ce jeune homme a été élevé dans le département de l'Allier ; il dit n'avoir pas cessé d'être malade depuis son enfance. Aucune affection aiguë ; pas de fièvres intermittentes, parfois quelques douleurs rhumatismales dans les membres.

Le malade dit avoir toujours éprouvé tous les quinze jours ou toutes les 3 semaines depuis son enfance à peu près les mêmes symptômes dont la durée varie entre 8 et 15 jours. Il commence par ressentir des céphalalgies assez vives, ensuite des douleurs vagues dans tous les membres. Il ressent en même temps des étourdissements qui durent quelquefois de une à deux minutes, avec des bourdonnements d'oreilles. Pas de vomissements, pas de toux ; insomnie et appétit bons. Très rarement de la diarrhée. Il a, dit-il, des périodes cataleptiques durant une heure environ, durant lesquelles il reste complètement étranger à tout ce qui se passe autour de lui.

Il porte au bras droit des traces très évidentes d'un cautère placé il y a 6 ans.

A l'auscultation du cœur on trouve le 1er bruit légèrement prolongé à la base.

Lyon Imp. veuve Bonnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

Modèle N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* Ste Jeanne N° 20

Nom Jean Marie Legnin

né à Sauvignes (Savoie et Loire)

demeurant à Lyon

profession Ferblantier

âge 60 ans

tempérament

constitution

entré le 5 Août 1879

sorti le 17 Août 1879.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Alcoolisme.

Erysipèle de la face.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cet homme a toujours joui d'une bonne santé et n'avait aucun antécédent pathologique.

Il y a 6 mois, dit le malade, il fit une chute dans la journée, à laquelle il fait remonter toute son affection. Il est difficile de connaître si cette chute a été simplement due à des causes ordinaires ou si elle a été précédée de vertiges. D'après le malade elle serait due à un faux pas. Cette chute a eu lieu d'un point peu élevé, la tête n'a pas spécialement frappé le sol; aucun accident, aucune plaie de tête. Le malade n'a pas pu se relever ou le voulait et le lendemain il n'éprouvait plus

Cinq jours après nouvelle chute sur une chaise, cette fois sans perte de connaissance. Depuis cette époque il fait de chutes analogues qui revenaient tantôt tous les jours pendant 2 ou 3 jours, tantôt actuellement deux se reproduisent ordinairement une seule fois chaque matin.

Ces accès ne sont annoncés par aucun aura, le malade affirme qu'il ne perd pas connaissance et ne fait jamais mordre la langue. Il est absolument

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	de Tremblements convulsifs dans tous les membres plus marqués peut-être du côté droit. Quelquefois un Vrai soulèvement agité des Tremblements, mais ce n'est pas toujours la même chose. Le malade n'a pas remarqué quel était l'état de la face. Souvent douleurs de tête qui paraissent présenter leur maximum au niveau de pariétal gauche. Pas d'autres accidents. Pas de trouble digestifs, santé générale assez parfait. Pendant les 2 ou 3 premiers mois, l'affection a eu une marche progressive, elle devait arrêtée et en décroissance depuis deux mois. Le malade affirme n'avoir pas perdu la mémoire. Il n'a pas de trouble intellectuels mais les réponses sont lentes. Diminution de force des deux côtés. Affaiblissement de la vue plus marqué à gauche. Le malade affirme que ces phénomènes ne sont survenus que depuis sa maladie. La parole est également un peu gênée elle est plus grave avant l'expansion même du malade.	
	On ne constate pas de Tremblements en dehors de crises. Pas d'affaiblissement des membres. Pas de trouble de la sensibilité. A la face le nerf facial paraît relevé, l'orbiculaire des paupières est complet pendant le malade qui était à un premier degré présente plus nettement. Il lui arrive quelquefois de tourner involontairement la tête.	Un existe cependant quelquefois

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 16

Nom Henri Chegue

né à Condes

demeurant à

profession

âge 15

tempérament

constitution

entré le 19 x

sorti le 4 janvier 1875

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

même état

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas d'antécédents héréditaires.
Dès son enfance ce malade a eu des convulsions — Il a eu plusieurs fois de fortes émotions causées par la frayeur. Début de l'affection actuelle il y a 3 ans.
Pendant la 1re année le malade éprouvait tous les 8 ou 15 jours des étourdissements sans perte de connaissance, quelquefois suivis d'un ronflement après lequel le malade s'endormait profondément.
Depuis 2 ans ce jeune homme est sujet à de véritables crises, survenant toujours pendant la journée, se répétant à peu près tous les 8 jours et se ayant un retard de 15 jours à 1 mois lorsque le malade prend des médicaments. Une fois la crise terminé le malade jouit d'une bonne santé. Les digestions sont bonnes, l'appétit est bon, les forces physiques sont intactes pas d'affaiblissement des facultés intellectuelles. Le malade sent quelquefois venir ses crises et la perte de connaissance n'est

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	vres constante – mais souvent la perte De connaissance a lieu et dure pres de la moitié de ce qui se passe pendant la crise. Ces crises sont souvent annoncées, par un malaise trouble avec éblouissement de la vue, attaque ainsi caractérisée subite – perte de connaissance contraction toniques, des membres écume à la bouche, langue mordue à la partie interne, après 10 minutes le malade a vu revenir puis s'est endormi d'un profond sommeil.– La crise ne se termine jamais par une émission involontaire d'urine. Dans l'intervalle des crises, le malade ne présente aucun trouble de sensibilité ou de motilité dans les fonctions mentales	

Lyon. imp. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle 1re Charles N° 49

Nom André Finet

né à Lyon

demeurant à id.

profession cordonnier

âge 16 ans 1/2

tempérament

constitution

entré le 22 7bre 74 -

sorti le 20 8bre

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Son grand père prenait des crises auxquelles il ne peut donner aucun renseignement. Son père et sa mère n'en ont jamais eu -

Depuis 4 mois il a perdu à son tour. Elles revenaient la nuit, pendant le sommeil. D'abord peu fréquentes, elles sont actuellement quotidiennes. Elles durent une 1/2 heure environ, il crie, dit-on, pendant les crises - Il se réveille à la fin de la crise, ne se rappelant pas de ce qui s'est passé, et ayant eu une émission involontaire d'urine. Il ne s'est jamais mordu la langue - Il est fatigué pendant la journée qui suit les crises - Rien aux poumons - souffle anémique léger à la base du cœur - - Fonctions digestives normales -

Depuis que les crises sont fréquentes il bégaye et perd la mémoire - Les réponses sont lentes.

produit par une frayeur -

Lyon. Impr. A. Bonnarial, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
23 7bre	A eu une crise hier de 5 minutes de durée. A eu une crise ce matin, réunion pour	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Maurice *N°* 22

Nom J. Pugnière
né à Marseille
demeurant à Lyon
profession boulanger
âge 19 ans
tempérament
constitution
entré le 27 avril 78
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie
Eteint dans le membre supérieur droit

Dy. { 12 g. D. Droite
12 g. G. Fort.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Jusqu'à 9 ou 10 ans nombreuses maladies (rougeole, scarlatine, fièvre muqueuse) pas de convulsions. Rien à noter d'important

Les renseignements sur les antécédents héréditaires sont difficiles à obtenir - La mère est bien portante, le père aurait quitté sa famille et son fils ne sait ce qu'il est devenu - Rien à noter dans la famille germaine aurait eu des crises d'épilepsie

Le jeune homme s'est toujours bien porté dans son enfance - Depuis l'âge de 12 ou 13 ans il a contracté des habitudes de masturbation - Son caractère a toujours été irritable. Il n'a avoué ses habitudes à ses camarades.

Vers le mois de Novembre 1877 le lendemain de son 1er coït il vit se développer une ulcération superficielle sur la face interne du prépuce - Il se confia alors au pharmacien Langlade qui ne lui épargna pas les remèdes et malgré toutes ces prescriptions le chancre se cicatrisa quinze jours après; il ne fut suivi d'aucun accident secondaire et paraît avoir été un chancre mou.

Depuis un an environ le malade prétend que de temps en temps pendant son travail il ressentait des secousses convulsives dans les membres inférieurs mais à part ces troubles passagers de la motilité il se portait très bien. Il n'avait pas renoncé à ses habitudes de masturbation; vers la fin de février 78 il commença à éprouver dans le petit doigt du côté droit une sorte de tiraillement puis il compara distinctement cette sensation, cette sorte produit par une ficelle -

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

d'abord revenait 20 ou 30 fois par jour sans accès épileptiforme ventable; peu à peu elle occupa les 3 derniers doigts, gagna l'apophyse hypothénar, le poignet et monta l'avant-bras jusqu'à l'épaule. Vers les derniers jours de Mars à la suite d'accès de masturbation un matin pendant qu'il donnait ses soins à son malade fut pris de cette aura qui des trois derniers doigts s'irradia jusqu'à la face il perdit connaissance sans jeter de cri et demeura toute la journée dans son lit. En même temps tout le membre supérieur droit était agité de mouvements choréiques qui revenaient deux ou trois fois dans la journée et duraient chaque fois une demi heure au moins. La face, le membre supérieur gauche, les membres inférieurs restaient immobiles.

Le lendemain nouvelle aura nouvelles contractions choréiques du membre supérieur droit contractions de la face à droite - perte de la parole protraction suivie d'une grande excitation.

Les jours suivants la sensation de tiraillement persista dans tout le membre mais les crises épileptiformes ne reparurent pas. Le malade alla régulièrement à la consultation gratuite de l'Hôtel-Dieu. Le 11 avril nouvelle crise avec contractions choréiques plus intenses dans les doigts.

Depuis cette époque le malade est très énervé; il a des cauchemars, à la moindre observation il s'irrite et menace les personnes qui l'approchent. De temps en temps il éprouve les mêmes sensations dans tout le membre et est pris quelquefois d'un sentiment de frisson généralisé.

Actuellement apyrexie, intelligence conservée, amnésie tactile marquée - de temps en temps sensations de tiraillement dans les 3 derniers doigts de la main droite et de long de l'avant-bras - face légèrement tirée sans un tiraillement du sourcil droit - persistance de la face conservée - sensibilité tactile intacte; l'asgre le malade saisit un objet avec la main droite il lui semble que son petit doigt est comme tiraillé - Membres inférieurs de temps en temps tiraillements pas douloureux.

Perte complète de l'appétit - digestions difficiles nausées vomissements matin - Constipation opiniâtre.

Lyon. — Imprimerie A. Bonnaviat, rue Sie-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
25	le malade a été très agité hier soir – la nuit a été calme – actuellement il se plaint de troubles de la vue. La mère du malade confirme les renseignements; elle décrit de la même manière les crises épileptiformes. elle prétend que son caractère a beaucoup changé dans ces derniers mois depuis les crises qui souvent le malade mendie ses parents et veut, et même va jusqu'à les battre – Il avait eu une éruption prurigineuse probablement généralisée mais dont longtemps après le chancre, et ne paraissant pas être en rapport avec le pleurs brachial droit.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Charles N° 62

Nom Paul Levis
né à Lyon
demeurant à id.
profession Ecolier
âge 15 ans
tempérament
constitution
entré le 29 août 72
sorti le 31 août

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Convulsions.

1

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Le père et la mère du malade vivent et jouissent d'une bonne santé. 5 frères et 3 sœurs qui tous se portent bien: Le malade se rappelle pourtant avoir entendu dire par la mère que plusieurs de ses frères et lui avaient eu des convulsions pendant leur jeunesse.

Ses dentitions, maladies qu'on traverse ordinairement sans accidents, ont été pour lui l'occasion d'une suppuration des parois abdominales ~~Cependant~~ et d'une conjonctivite à l'âge de 4 ans: L'œil gauche fut plus spécialement atteint.

Depuis 2 mois environ diminution de la vue: par d'autre

Lyon. Imp. veuve Bonnaviol et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Troubles des sens: ouï de
facultés mentales: Courbature
Leger tremblement des membres
depuis une fortaine de jour:
Dimanche exercice penible
jusqu'au Lundi matin augmentation des troubles de la
vue, et tremblement exagéré des
membres: enfin après avoir
dîné Dimanche Lundi, le
malade ressentit une douleur
abdominale en même temps
qu'il perdait peu à peu con-
science de ce qui se passait
autour de lui; puis perdit
entièrement connaissance:
Cette crise arriva environ 1 heure
après le repas:
Apporté à l'hopital avec une
perte de connaissance complete
on constate le lendemain
que le malade est plongé dans
un profond état comateux,
ne pouvant répondre aux
questions qu'on lui adresse:
L'examen du malade ne revele
pour ainsi dire aucun
fonctionnels sinon une legere
raideur dans la contraction des
fesses. et un leger bruit
souffle systolique ayant son
maximum dans le 3e espace
intercostal

SCD Lyon 1

Modèle N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4me des Femmes N° 138

Nom Marguerite Barnérias

née à Lyon

demeurant à

profession : couturière

âge : 38 ans

tempérament

constitution

entrée le 6 Déc. 1879

sortie le 9 Déc. 79

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Aucune maladie antérieures, n'a eu que la variole

A toujours été bien réglée; jamais mais était d'un tempérament nerveux

Les accidents qui l'amènent à l'hôpital ont débuté en septembre 1878, et ont toujours consisté en crises qui furent d'abord espacées de 15 ou 15 jours et plus; la malade a nettement remarqué que toujours elles survenaient durant au moment des règles, et qu'à ce moment elles étaient plus violentes. Depuis ce moment les crises se sont répétées à intervalles variables et sont devenues de plus en plus fréquentes; ces derniers temps, elles se montrent tous les jours; leur durée est environ de 5 minutes; elles surviennent brusquement, la malade dit ne les sentir prévoir que 2 ou 3 secondes d'avance: elle perd quelquefois connaissance, mais rarement; le plus souvent elle peut pendant toute la durée de l'accès observer ses sensations; elle a d'abord un sentiment de défaillance, elle tombe, puis une céphalalgie violente, de l'étouffement et de la constriction à la gorge, pas d'écume à la bouche, pas de morsure de la langue; pas de convulsions ni de flexion forcée des membres; depuis quelques jours elle prétend avoir une impossibilité d'action du côté gauche pendant la crise, côté qui serait maintenant constamment plus faible que l'autre.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	En dehors des vices, elle se plaint d'un mal de tête continuel, et de vives douleurs d'estomac ; l'épigastre est le siège de douleurs, tout à fait après les repas, la digestion s'accompagne d'éructations, mais jamais de vomissements ; il n'y a trace de constipation. Les règles sont normales. Pas de palpitations cardiaques. La palpation abdominale révèle une légère hyperesthésie ovarienne, avec sensation douloureuse se transmettant à l'épigastre. On ne trouve aucun trouble de la sensibilité aux membres. Au dos, les apophyses épineuses sont sensibles d'une façon assez prononcée. Force au Dynamomètre : main droite, 40 ; main gauche, 20.	

Lyon. — Impr A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St-Charles N° 59

Nom Thierry Barthélemy
né à St-Romain (Isère)
demeurant à —
profession Berger
âge 12 ans
tempérament
constitution
entré le 14 Xbre 1871
sorti le 10 Janv. 72.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Orchite épididymite

— Rien d'appréciable du côté du thorax

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

— Et sa maladie

— Depuis plusieurs années, est sujet à de violentes douleurs abdominales. dans le genou droit.

— Le mal. ne date pas d'il y a quelques années. Dans son enfance.

— Le 7 Xbre dernier, le mal. a recommencé tout à coup avec vive douleur dans la jambe droite

— douleur qui remonta le long du membre et arriva à la gorge, le mal. persista comme cela et toujours

— Le 10, nouvelle douleur au même niveau, mais l'accès n'eut pas lieu. —

— Son état général

— Rien d'appréciable du côté du membre droit

pot. bromure potass. — 2 gr.

Lyon. Imp. veuve Rondissard et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle Dr Rothan. N° 5.

Nom Jean Baliat.
né à : Courtenay (Isère)
demeurant
profession Journalier
âge 20 ans.
tempérament
constitution
entré le 2 8bre
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Dothiénie.
Diarrhée.
Epilepsie.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Anamnèse impossible. A Rentré avoir craché matin. Depuis l'âge de 9 ans il paraît être sujet à des accès d'épilepsie qui depuis lors sont toujours devenus depuis en plus rares. Rien au poumon. Coliques. — langue	Le tonique encore un peu blanche.
8	P. 22/4. Diarrhée.	2 gr. Bismuth décoct. blanche.
9	Diarrhée.	Soupe de riz. 1/4.
8bre	Idem	4 gr.
11.	Guérison de la diarrhée. — hypochondrie. attaque d'Epilepsie.	Bétile entourée Pot. 2 gr. Br. Potass.
23.	Nouvelle attaque plus forte	4 gr. Br. Potassium gaz. 4 gr. chlor. de Potass.

Papeterie générale, Lyon. — Mod. n° 6.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
6. Nov.	2 crises apyrétiques.	pul. 4 gr. extrait bile de bœuf
7.	1 crise.	0,01 - pour dix. ?
10-11.	Crises 1 par jour.	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles N° 27

Nom Louis Seive
né à St Etienne
demeurant à
profession Coffretier
âge 23
tempérament
constitution
entré le 9 X 76
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie ?

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

antécédents héréditaires tuberculeux. Pas d'affection nerveuse dans la famille
Comme antécédents personnelles, pas de Rhumatisme pas de syphilis, mais habitudes alcooliques et surtout excès d'eau de vie.
Début de l'affection actuelle il y a deux ans la maladie a débuté par des douleurs, des crampes des contractures limitées à la cuisse droite, pendant 2 ans et demi. Cet homme n'a pu marcher qu'en s'appuyant sur une personne, il n'est pas bien explicite au sujet de savoir si la marche était impossible à cause de la douleur provoquée ou à cause de la faiblesse. ~~provoquée~~ Depuis 1 an et demi ces symptômes ont complètement cessé dans la cuisse droite, pour se porter sur le bras gauche en conservant les mêmes caractères, à certains moments les doigts de la main gauche se contractent et la main ne peut plus s'ouvrir que par la force. puis bientôt après les douleurs les crampes cessent, et la contractilité naturelle reparait
Depuis deux mois le malade a eu trois séries qui ont duré

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Démarche facile, également les yeux fermés et ouverts.	
	Nous ne soulevons la boule de la colonne, douleur dans la paroi thoracique et cérébellaire ~~Donnée au 6ème nerf cérébelleux~~ et cérébelleux nette aujourd'hui.	
correspondance	Pas de perte de la mémoire, rien du côté des sens spéciaux, rien du côté de la face comme sensibilité et contractilité. ~~Membres inférieurs~~ trouve rien d'anormal comme sensibilité, Membres inférieurs. Contractilité un peu diminuée à gauche, les diverses sensibilités sont conservés. Membres supp. contractilité diminuée à droite surtout pour la flexion, sensibilité tactile diminuée à gauche et surtout ~~la~~ sens analgésie manifeste. Le matin ces symptômes ont à peu près disparu. Il toujours été passagers.	

Lyon, impr. A. Bonnavial, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Charles N° 96

Nom Michel Capra

né à Asti (Italie)

demeurant à

profession peintre en bâtiments

âge 30 ans

tempérament

constitution

entré le 9 7bre 72

sorti le 19 9bre 72

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Convulsions

(pas d'accès ramenés.)

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Sa mère morte à 45 ans, le père à 61 ans. 4 frères et 1 sœur bien portants.

Habitudes alcooliques (vin); hémorrhagies il y a 1 an et demi et l'an dernier; pas de syphilis. Fièvre intermittente sans forme tierce et quotidienne pendant 3 ou 4 mois il y a 5 ans. Pas de rhumatisme. Le malade a eu la fièvre intermittente en Italie pendant son service militaire.

Il y a 10 ans fièvre typhoïde avec grave d'une durée de 2 mois. Blessure pendant la campagne; balle dans l'aisselle traîtée.

Ces jours passés le malade ressentit un peu de malaise caractérisé surtout par de l'anorexie; il but hier un peu plus que de coutume et ce matin pendant qu'il était à son travail, il sentit tout à coup des contractures dans le membre supérieur droit; ces contractures s'accompagnèrent de tremblement et d'une vive douleur. Le malade tomba et perdit connaissance pendant environ une demi Minutes; ¼ d'heure après renouvelé accès.

Chez le crises furent suivies d'une grande faiblesse et de profonde tristesse. Dans la journée le malade a eu quelques

Lyon Imp. veuve Chanoinat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	nausées et des vomissements bilieux — Langue assez blanche — actuellement soif ; un peu de céphalalgie —	H. de riz

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles N° 97

Nom Nicolas Roth
né à Forbach (Moselle)
demeurant à
profession Cantonnier
âge 21 ans
tempérament
constitution
entré le 18 9bre 72
sorti le 25 Juin 73

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Le malade jouissait d'une très-bonne santé lorsqu'il fut invité à une partie de plaisir il y a 4 jours; il but avec excès, ce qui lui arrive rarement, et le lendemain de la noce il ressentit un malaise général, de petits frissons, une douleur continue à l'épigastre; il avait en outre de la Céphalée, un peu de Courbature, puis q.q. selles Diarrhéiques; pas de vomissements. Q.q. uns de ces phénomènes ont persisté et le malade se plaint en outre de q.q. fourmillements dans les mains et dans les pieds. La bouche est mauvaise, la langue sale. Le malade dit ne pas dormir pendant la nuit; il ajoute avoir souvent des insomnies et d'attribut à des Crises d'épilepsie qu'il prend environ une fois par mois depuis l'âge de 17 ans. Aucun membre de sa famille n'est sujet à pareilles crises qui sont survenues sans cause appréciable. La pression à l'épigastre est un peu douloureuse. Rien du côté des différents organes.

A l'âge de 19 ans, le malade se fit avec un rasoir de ménuisier une coupure profonde antéro-externe à la partie moyenne de la face palmaire de la 1ère phalange de l'index. L'hémorragie fut abondante,

Lyon. Imp. veuve Bonnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	excoriation n'a offert un de particulier. Fortuitement le [illegible] Dr Mr Paul Perrin que la 1re phalange de l'index gauche le gênait et offrait un engourdissement [illegible]	
	offrait en continuité de la douleur il entourait l'index avec le médius et le doigt de toute [illegible] dans la paume de la main l'extrémité du doigt, à partir de la 1re phalange est notablement atrophié, effilée [illegible]	
25 Mars	Le Malade a fort guéri et [illegible]	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Ursule N° 108

Nom Bapt. Soyeux

né à

demeurant à

profession

âge 4 ans (Italie)

tempérament lymphatique

constitution

entré le 24 Avril 73.

sorti le 30 Avril 73

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Cutis d'épilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Rien du côté de l'hérédité, aucun membre de la famille présente de cutis. Le père est bien portant. A pu 3 ans; le cou apparaît le cuir qui était plissé dans le milieu, il revient d'abord les mains et les pieds, il apparaît et le mot après les membres et les 8 jours

Le mal fait le mal tout dans le même état

Lyon. Imp. veuve Bonnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1' Charles *N°* 93

Nom Fachoux 1re nx

né à Ecully

demeurant à Lyon

profession journalier

âge 27 ans

tempérament

constitution

entré le 14 V 1876

sorti le 21 V 76

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie ?

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

K Br 9 g.

Depuis l'âge de 16 ans crises épileptiques
qui étaient au début très fréquentes tous les 3 ou —
4 jours. Etiologie obscure Pas de commotion violente
pas de fausse relâche — pas de masturbation.
Pas de pertes de sang. Se sont éloignées le cours des années
et actuellement elles ne surviennent que tous les mois
ou les trois. —

En 1866 avait séjourné 9 mois à la Salle St Martin
traité par K Br.
En 1869. nouveau séjour de 12 mois à l'Hôtel Dieu.
même traitement
Cette fois partie de 1875 que la crise revient presque
tous les mois.
A été apporté le 14, V. par les gardiens de la paix
qui l'ont ramassé sur le pont de la Guillotière
et qui peuvent donner aucun détail sur la phénomène
que a se produit pendant qu'il a la crise

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Lyon. Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* Ch N° 32 / 103

Nom Jn Jardin

né à Lyon

demeurant à id

profession Domestique

âge 26

tempérament

constitution

entré le 8 Sept 78

sorti le 1er décembre 78 sans être amélioré

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Embarras gastrique

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Père et mère inconnus.

Bonne santé antérieure —

Il y a un mois 1/2 — Chute du haut d'une grange, à la suite de laquelle il resta évanoui pendant deux heures.

Depuis ce moment le malade prend des crises épileptiques tous les deux jours. — De 7 à 8 h du matin régulièrement

Diarrhée depuis ce moment les selles sont au nombre de 3 ou 4 seulement. —

Rien au poumon — Rien au cœur. —

Inappétence — amaigrissement — perte des forces.

Les crises au lieu d'aller en diminuant

Bromure de potassium 2 gr.

Albumine

Bismuth

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	revient tous les jours matin	
	le gr de Bromure —	
	on en donne 7 gr aujourd'hui	
21.	Une crise ce matin	— 8 gr. Bromure
22	Une nouvelle crise ce matin	
22	Depuis 3 jours, douleurs sur le trajet du radial gauche, avec lesquelles coïncide l'éruption d'un groupe de 20 vésicules d'herpès, dans le segment de l'espace intercostal dorsal. Ce matin nouvelle crise. Les éruptions accompagnées d'une sueur acide sur le corps.	9 gr de Bromure
26.	Nouvelle crise ce matin —	Suppress. du Bromure
28	Nouvelle crise malgré la quinine	Sulf. quinq. — 0,80
31.	Nouvelle crise —	Suppress. de la quinine
4. 8bre	Le malade prend toujours des crises tous les deux jours.	2 P.V. de Belladone 0,03
6.	A eu sa crise ce matin — Se plaint d'avoir la dysenterie	
14.	Au lieu de prendre la crise ce matin, comme elle avait de coutume — le malade l'a eue hier soir à 9h	
15.	Le malade a eu sa crise ce matin une crise pendant la visite.	
9bre 15	On remet ce malade au bromure de fer. 4 gr.	
17	On donne 6 gr de bromure —.	
2 dec	Sa 17 oct. en 2 doses, on a pu le réduire à 6 gr. à 13. sans empêcher les crises de revenir toutes les 15 jours; il prend une dragée externe on lui suspend	

Lyon, impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles. *N°* 69

Nom Crapet Thomas

né à

demeurant à

profession Cordonnier

âge 28 ans

tempérament

constitution

entré le 26 Janv 76.

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Diarrhée

Gastralgie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Tousse depuis 4 mois. Pas d'hémoptysies.
Pas d'antécéd. hérédit. notés.
Tache jaune.
Depuis 8 jours ce malade a une diarrhée intense, parfois colliquative. Il va 14 ou 15 fois à la selle par jour et toute la journée, la nuit. Il ne fait le plus souvent que 1 ou 2 selles de nuit. Il a des étranguillons.
Cette diarrhée est indolente, sans aucune spécificité.
Cependant le malade est peu abattu, la langue est rouge et humide. Il a bon d'appétit.
Pas de fièvre, ni vers au cœur.
Percussion = Submatité au sommet droit
Auscult = Râles sibilants disséminés.
Inspections pectoraux et abdominaux normaux.
Plus amaigri à droite qu'à gauche.
Aucun râle ni dans l'inspiration normale ni dans les inspirations de la toux.
Pas d'albumine dans l'urine.
Le malade a eu plusieurs diarrhées dans
et eu 2 ou 3 selles par jour

29.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Lyon. Impr. A. Bonnavial, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 93

Nom Joseph Forat
né à Lyon
demeurant à — id —
profession Chaudronnier
âge 27 ans
tempérament
constitution
entré le 15 avril 75
sorti le 15 mai

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cet homme se plaint d'être malade depuis 6 mois environ par de syphilis - pas d'habitudes alcooliques -
Actuellement douleurs nevralgiques à la face, au niveau de la branche droite de la mâchoire et de la tempe du même côté - Cette douleur revient par accès irréguliers - Sommeil parfois troublé par la douleur, mais non par des rêves ou des cauchemars - à eu d'assez grandes contrariétés - fait remonter le début de sa maladie à un empoisonnement auquel il y a 6 mois en désincrustant des tuyaux de cuivre - gêne de la parole manifeste depuis un mois environ - affaiblissement de la mémoire - faciès pale, cachectique - pas de toux ni d'expectoration - pas de trouble de la motilité ou de la sensibilité - miction et déjection normales - appétit diminué par de fièvre - pupilles normales - Nystagmus léger existant depuis longtemps - un peu de roideur de la nuque par moments -
Rien aux poumons -
Au cœur bruit de souffle anémique, s'entendant

Lyon. Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	un 1/2 temps à la pomme, mais se renforçant à mesure que l'on s'approche de la base. Déjà huit de souffle dans le vaisseau. Le cœur	
20 avril	Le malade a pris ce matin une crise d'épilepsie. Il nous raconte qu'il en a déjà eu dans le temps. Par conséquent les symptômes qu'il présente sont sous la dépendance de cette affection nerveuse.	
7 Mai	Depuis 2 jours névralgie Fin fort par des crises.	Bromure 3 gr Chloral 2 gr

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 42

Nom Schopp Antoine

né à Lyon

demeurant à

profession Jardinier

âge 41

tempérament

constitution

entré le 29 VI

sorti le 6 VII

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Tumeur gélatiniforme ?
Tumeur sécrétante
du avant bras ?
Récidive tumeur sarcomateuse ?

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Ce malade a déjà eu dans ce salle
pour des tumeurs sarcomateuses
Actuellement douleur rhumatismale
Début de la douleur le 26 VI par gêne des mouvements
du poignet. Le 27 le mal est allé en
grandissant. En ayant un peu diminué hier
Par application de pommade et le lendemain et apparut sur
le pourtour des vésicules avec rougeurs qui sont
actuellement très développées et groupées sur le bord
radial de l'avant bras, près de l'articulation radio-
carpienne, aux alentours d'une grosse tumeur siégeant
exactement sur le pli de la main qui répond à l'articulation
par des tiraillements sur le mouvement violent
douleur avec forte pesanteur tout mouvement
augmente la douleur
Rougeur et douleur dans la articulation métacarpo phalangienne
de 3 derniers doigts de la main

Mouvements.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
VII 1	adème Gy a beaucoup Démence encore un peu La face une petite tuméfaction de volume d'un pois. Dans la gaine celluleuse des vaisseaux et nerfs humoraux gauches. On perçoit aussi les pulsations artérielles gauches Asile Ste Anne 11 Septembre 1876 Le malade présente un affaiblissement notable de toutes les facultés intellectuelles. Quand on l'interroge il répond avec effort à ce qu'il paraît répondre, il prononce à peine quelques mots, il change ses traits à chaque question faite. Le moindre effort agite tout son corps. On lui demande de tirer la langue : il exécute ce mouvement et reste la langue pendante jusqu'à ce qu'on lui dise de la retirer. — Abattissement.	Poudre pointe
12	Ce matin le malade répond d'une façon assez exacte aux questions qu'on lui pose. Il explique que les douleurs qu'il éprouve dans la jambe ont paru depuis une huitaine de jours. Dans la journée il essaie un peu à faire deux pioches	
13	Ce matin le malade est assez agité. Il a eu une selle involontaire. On cherche à obtenir une réponse aux questions posées. — Il est somnolent — Si on le pique il regarde même par le point où on l'a piqué — Il essaie cependant de repousser les personnes qui le piquent — Les pupilles sont égales, contractiles, non dilatées — Le mouvement respiratoire entrecoupé par de fréquents soupirs profonds, pendant lesquels le globe oculaire est un peu fixe. Il donne à boire, il fait un peu d'effort pour avaler — Le malade accuse de douleurs aux jambes et on le voit à chaque instant se frotter les yeux. Il regarde constamment son doigt et semble compter les plis. Il prend tout ce qu'il voit. Marche un peu titubante. Le malade se promène dans la salle et examine presque tout ce qu'il voit, le met dans sa poche ou le déchire. Il mange bien, va à la selle tout seul, toujours à son ouvrage, de patience, etc. Il marche sans difficulté. — La pupille est égale des deux côtés. Le mouvement par de côté à droite. Il touche tout ce qu'il voit, met dans sa poche tout ce qu'il peut prendre. Le plaint de cette douleur d'avoir rougeur d'avoir mal aux jambes. Il causa facilement en regardant ailleurs mais que son doigt est en avant. — Cause Il se rappelle exactement entrée dans son ancien lit. Il ne faut pas essayer de lui prendre son lit, sa couverture. Il la reconnaît et la réclame avec énergie. — Le matin objets ou couverture ne éveillent aucune attention particulière. Il a reçu des allumettes contigües ayant été mises sur son lit un petit morceau de croûte noire de pain. Il l'a pris pour un morceau de pain et a commencé à le manger. Ce qui fait penser que le point de départ d'une grande hilarité et de confusion mentale. Retour qu'il a reçu semble salé dans son lit	
14	La nuit agitation considérable, délire furieux on est obligé de l'enfermer dans la cellule au matin il est encore tout hébété, ne reconnaît personne, divague	
soir	Il est parfaitement lucide et reconnaît très bien les personnes qui l'entourent. Il ne manifeste conscience de ce qui s'était passé pendant ces 2 jours. Il croit être entré hier dans l'hôpital. Et il y a 8 jours de cela. Il nous raconte alors que ces absences lui arrivent assez souvent. Cette maladie date de l'enfance. Elle a été très forte jusqu'à 16 ans	

Lyon. Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

Schopps Antoine — Suite du N° 7

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	il avait eu des accès presque tous les jours pendant plusieurs années. Depuis quelque temps ils avaient presque complètement disparu. Depuis 8 jours ils reparaissent toutes les 3 semaines à peu près ce qui l'empêche de travailler beaucoup. Il ne peut rester en place chez les patrons à cause de ses accès. Quelquefois pendant ces accès il est furieux pendant ces périodes d'autres fois il est abattu. Ces accès durent en moyenne 2 jours ou 3 au plus et il n'a aucune connaissance de ce qui se passe autour de lui à ce moment. Il va bien à l'hôpital et il y a 2 jours qu'il est sorti.	a 16 ans a eu ses premiers accès ainsi auparavant il avait été
19	Le malade qui a fort bien été ces jours derniers se trouve aujourd'hui fatigué, il éprouve de douleurs dans les jambes et les bras. il croit que ces douleurs sont les précurseurs d'une nouvelle crise	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles *N°* 105

Nom Cardon Paul Louis

né à Marseille

demeurant à Lyon

profession employé de bureau.

âge 24 ans

tempérament

constitution

entré le 13 janv. 75

sorti le 4 janvier 76

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas de maladies antérieures. Aucune maladie héréditaire. Pas de syphilis.

Depuis 5 ans ce malade crache du sang pendant un mois et demi à deux mois de temps en temps, mais jamais il n'a gardé le lit ni interrompu ses travaux. Aujourd'hui il ne tousse plus du tout, et l'auscultation ne révèle rien aux poumons. Il n'a fait aucun excès. Il a des pertes séminales chaque fois qu'il va à la selle et des pollutions nocturnes. Un médecin lui a dit que cela tenait à la constipation. Il est très excité, ne va à la selle que 2 fois par semaine, et a des hémorroïdes qui saignent beaucoup parfois. Depuis trois mois qu'il suit le traitement cet état n'a en rien varié. Son appétit est excellent même exagéré et la digestion bonne. Enfin le système circulatoire ne présente rien d'anormal.

Voici ce que j'avais à l'HD. Vers le 6 janvier il a été pris d'étourdissements, et deux semaines après d'incontinence d'urine. Il tenait alors

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Certaine sorte d'extase agréable dans laquelle il perd connaissance des objets extérieurs, il entend quand on lui parle mais ne comprend pas, il est tout entier à des rêveries belles qui semblent réelles. Cependant il a conscience de ses sensations, et juge si c'est des choses qu'il peut répondre ou non, s'il peut faire des mouvements. Mais alors il lui est impossible de remuer ni le tronc ni les membres, il a une sensation de paralysie universelle et ne peut accélérer les mouvements ni élever les bras. Cet état dure 15 à 20 minutes et peu à peu le malade recouvre ses forces, sort tout naturellement de cette léthargie. Mais il lui semble que s'il se faisait un effort pour réagir contre cette perturbation, elle durerait indéfiniment.	
	Ces phénomènes se répètent un grand nombre de fois par jour 15 à 20 fois et même davantage. Quand il est complètement éveillé il s'assied et se recouche à lui, une demi heure après.	
	La nuit il repose bien, c'est que sur le matin qu'il a eu ses dernières attaques.	
	Il n'a pas de rêves, ne sait pas trouver les objets. En dehors de ces accès il est calme et. Juste jeune et vigoureux. Juste, n'a pas d'hallucinations, d'idées ne traite rien ni des idées morbides.	
	Comme état des différents appareils des fonctions sont bien et organes, ne donnent rien d'anormal.	

Lyon, impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles N° 57

Nom Stéphanie Thiard
né à Crozet (Ain)
demeurant à
profession journalière
âge 22 ans
tempérament
constitution
entré le 12 Août 73
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

G. O
Epilepsie

Mariée, sans enfants à vingt ans. A eu la variole à l'âge de 16 ans. A fait une fausse couche de 2 mois.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Accès d'épilepsie dont le début remonte à l'âge de 16 ans, à la suite d'une frayeur. Elle ne connaît aucun membre de la famille présent de cette affection. Elle a commencé à baver à 8 ans. Depuis la contagion, perte de connaissance, grincement de dents, tuméfaction de la face, écume à la bouche, morsure de la langue, pâleur de la face, rougeur de la face, convulsions des membres, perte de connaissance, rougeur de la face, pâle

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	A l'autopsie : le poumon gauche présente quelques points emphysémateux mais sans traces de néoplasie. Le poumon droit est dur résistant, très induré ; il ne crépite plus et ne surnage pas sur l'eau. La Coupe paraît offre une surface scléreuse avec foyers de productions tuberculo-caséeuses surtout à la base ou sommet du même côté les tubercules sont moins nombreux mais l'induration est notable.	

SCD Lyon 1

N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles N° 1

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Mon mari a eu

Environ un an après chagrin fait qu'un jeune est crevé (environ 10 ou 12) de règle j'avais des crampes d'estomac terribles qui se prolongeaient jusque dans la plante des pieds et qui m'empêchaient de me coucher dans mon lit. Je restais une nuit ou deux et changer ma obligeaient à me mettre à table en deux jours ou 2 mois elles ne m'ont duré qu'environ 2 ou 3 mois et ne m'est pas reprodues depuis

Je fus environ 6 mois en traitement à l'hôtel de soin de mon mari

Il m'avait conseillé des bromures de potassium je ne l'ai jamais fait que depuis que je suis à l'hospice

A. Tournal

Lyon. Imp. veuve Bonnaviat et fils

En général la première de mes crises me prend au lit et se continue dans la journée

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Je fais remarquer à M. les Docteurs que j'étais employé au dernier dans les salles de Commerce, que j'ai eu plusieurs internements à mon premier que j'ai voir réintégré dans mon emploi à compter rétablissement mais avec un retardataire c'est là ma seule ressource pour cela donc je tiens sérieusement à ce que M. les Docteurs me voir guérir je prendrai mes dispositions pour cela m'en dire notre façon de penser il obligeance M. Hamonet qui lui en gardera une éternelle reconnaissance	
10 Fév.	Le matin — pas de vomissements, 5 selles liquides peu abondantes, dans le lit. Le matin, le malade prend le bain et il répond peu aux questions qui lui sont posées. Le pouls est peu fréquent.	
11 Fév.	Le matin — Même état d'abattement. Voix éteinte. Il répond peu aux questions qui lui sont faites. Au fond de la gorge, rougeur, tuméfaction et écoulement purulent, il n'y a pas, du reste, de douleur de la gorge.	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles N° 63

Nom Jean Chapot
né à Novalaise (Savoie)
demeurant à
profession Jardinier
âge 32 ans
tempérament
constitution
entré le 26 Juin 1871
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Crise gastralgique
Dyspepsie
Hypochondrie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

On n'trouve rien d'important à noter dans les antécédents de ce malade ; il n'a jamais eu de Hémorroïdes — il prétend n'avoir jamais eu de Syphilis et n'avoir jamais eu d'habitudes désordonnées Raison d'plus de n'y jamais insister dans quelque cas que ce soit —

La première manifestation de la maladie actuelle remonte au mois d'octobre 1869 — A cette époque — un jour en travaillant il fut pris de vertiges et éprouva une douleur épigastrique de la région précordiale à laquelle il attribua de n'avoir mangé la veille des Champignons pendant un temps appréciable — Pendant 18 mois environ il éprouva rien de tout cela au printemps dernier il eut trois accidents semblables — Premier : douleurs épigastriques — Vomissements bilieux — Vertiges et syncopes Secondes douleurs épigastriques de Courte durée — Elles commencent toujours par une sensation désagréable à la région épigastrique — Troisième douleurs épigastriques de longue durée — Vomissements bilieux — Vertiges et syncopes — Ces accidents se produisent tous les mois environ — Ils ont toujours duré 3 jours — Ils ont toujours commencé le même jour — Ils ont toujours été précédés de vertiges — Ils ont toujours été accompagnés de vomissements bilieux — Ils ont toujours été suivis de syncopes — Ils ont toujours été précédés de douleurs épigastriques — Ils ont toujours été suivis de douleurs épigastriques

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Dyspnée à peu près nulle dans l'espace de 5 mois —	
	L'état général s'améliore — Le malade reprend un peu de poids —	
	Depuis 3 semaines environ — Apparition de la diarrhée et	
	Vomissements —	
	Hippocratisme digital prononcé avec battements des artères —	
	Abdomen ballonné — Circulation collatérale, ingestion, selles diarrhéiques fréquentes —	
	Abdomen douloureux : Point douloureux épigastrique à l'espace au niveau du mamelon.	
	Percussion et normale — Le premier Bruit est perçu dans toute	
	Région précordiale avec maximum marqué au niveau de toute la pointe —	
	Le malade éprouve des palpitations quand il fait un effort —	
	Pas d'autre vice d'organe — Foie normal —	
Oct. 2	Dyspnée —	Teinture

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Jeanne N° 2

Nom Bonnard Edouard
né à Dijon (Côte d'Or)
demeurant à
profession : journalier
âge : 31 ans
tempérament
constitution
entré le 5 Février 1880
sorti le 8 Février 1880

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Ancienne fièvre intermittente
Epilepsie avec accès intermittents
Malade déjà observé à St Charles

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

De jaunisse en 1866; Une maladie antérieure qu'il désigne par le mot elle dura 2 mois, pendant 1 mois il resta au lit, il vomissait avait de la diarrhée et de la fièvre. Rentre à l'hôpital pour des accès de fièvre intermittente pour lesquels il fait déjà un séjour à Ste Charle en 1877. Il a eu ces accès depuis 1874, époque à laquelle il a été resté 4 mois en Afrique; c'est 2 mois après son arrivée qu'il eut le premier accès; les accès ont toujours affecté le même type que aujourd'hui, ils ont toujours été tierces; ils lui a eus depuis ce temps chaque année, c'est à l'approche de l'hiver que les premiers accès surviennent, pour durer pendant 5 ou 6 mois; chaque fois il prend de la jaunisse, ce qui l'inquiète l'intensité de ses accès. l'année dernière il est retourné en Afrique au mois de juillet, il a actuellement des accès depuis le mois de septembre. Les accès surviennent tous les 2 jours, le soir vers 9 ou 10 heures le dernier a eu lieu hier soir, ils durent en général près d'une heure. L'état général est altéré; il a maigri, a perdu l'peu d'appétit et une soif vive je ne trouve Il y a une douleur sur l'hypochondre gauche qui, en dehors du moment des accès, ne revient qu'à l'occasion des mouvements, et est très forte pendant les accès.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	En outre il a des accès d'épilepsie depuis 4 ans	

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle St Pothin N° 32

Nom Sage Henri
né à Faverges (Savoie
demeurant
profession berger-journalier
âge 31 ans
tempérament
constitution
entré le 23 mai 1869
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Fièvre intermittente pernicieuse
Epilepsie

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Le malade habite dans le département de l'Ain, mais localité où, dit-il, les étangs sont nombreux et les fièvres intermittentes fréquentes —	
	Il a fait déjà 2 séjours à l'hospice de Trévoux pour les fièvres intermittentes — Il en fut attaqué pour la 1ère fois, il y a environ six ans — Chaque fois, il sortait de l'hospice parfaitement guéri après un séjour de 15 jours dans un cas, et de 40 jours dans l'autre cas —	a également fait un séjour à l'Hôtel-Dieu et un autre ici —
	Il se trouve actuellement sous le coup de la fièvre, depuis 4 jours — Chaque jour a un accès; hier et avant-hier ils ont été très forts, le peu intenses qui ont eu lieu jeudi et hier samedi peu intenses — Chaque fois, on a dû donner du vin, du bouillon et du sirop — Aujourd'hui, le malade n'a pas encore eu d'accès — Céphalalgie persistante — Perte d'appétit et de forces — Quelques coliques hier — Langue légèrement blanchâtre —	
	Pas de tuméfaction notable de la rate — Les urines sont assez rouges — Il y a eu un selle hier — Rien du côté des voies respiratoires — Il y a eu peu de fièces hier —	
24		Médecine noire Bouillon Sulf. quinine 0,60
29	n'a pas eu d'accès de fièvre depuis le 25. Accès d'épilepsie dans la nuit du matin :	on supprime le sulfate de quinine port. Bromure de potassium 2 gr.

Papeterie générale, Lyon. — Mod. n° 4.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
3 janvier		Extr. gotanin 3 gr.
4	Cris hier soir	
10	Cris hier, soir	Extr. gotanin: 5 gr.
13	———	6 gr.
19	Cris hier matin	7 gr
22	Cris hier soir	8 gr.
28	Cris cette nuit à 3 h. du matin	9 gr.
3 février	— ——— à 12 h.	
5	Cris cette nuit	10 gr.
6	id. id.	
11	id. id.	12 gr.
15	" "	Suppression des bromures
18	" "	2 pilules de 1 cent.
20	3 cris depuis avant hier au soir	prendre 1 centigramme belladone
23	3 cris depuis hier, moins forts que les précédents	4 pilules au lieu de 6 pil.
25	———	8 pilules.
26	Cris très courts cette nuit. —	
27	une forte crise la nuit ——	
30	Cris crises depuis hier 2 h. de l'après midi — jusqu'à 6 h. du soir	10 pilules
31	Le malade a des hallucinations, croit qu'il y a des gens, a peur de tout le monde	Belladone supprimée et remplacée par 9 02 de nouvelle potion d'opium
3 août	Depuis lors il est plus tranquille — tout à fait intelligent — ne paraît pas regretter sa situation	2 cuillerées remplacées par 1 cuillerée de la potion
4	Le délire recommence parfois	Sans changement
9	Le délire a complètement cessé — Cris cette nuit	Potion extr. thébaïque ou suppression la potion.
15	Cris cette nuit à 1 h.	

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle Pottier N° 32

Nom

né à

demeurant

profession

âge 32 Tailleur

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Gibbosité

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
19	Crise à 4 heures matin Injection hypodermique d'une solution de bromure de potassium Nouvelle injection —	
22	Crise cette nuit, un peu moins violente que de coutume	
29	Deux crises l'une vers 4 heures et l'autre à 7 heures matin	
30	Injection —	
4 (7 bre)	Crise légère à 4 h. ½ matin — injection de la dernière.	
6	injection 1/1 de la seringue	
9	id —	
11	Crise cette nuit.	
12	Injection —	
14	Injection	
16	Injection	
17	Crise très violente hier soir —	
19	Injection —	
21	Injection —	
22	Crise moins violente que la dernière.	

Papeterie générale, Lyon. — Mod. n° 6.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 102

Nom F.S Cognat
né à Givors (Rhône)
demeurant à
profession Cordonnier
âge 60 ans
tempérament
constitution
entré le 25 Juin 73
sorti le 14 juillet

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie -

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Bonne santé antérieure ; il y a 28 ans Amputation de la Cuisse gauche à la suite d'un accident. Pas d'autres maladies antérieures, pas d'habitudes Alcooliques -

Depuis 6 mois le malade éprouve des étourdissements, des vertiges avec une légère Céphalalgie - Il accuse également une douleur assez vive et intermittente au niveau de la Colonne dorsale un peu de faiblesse générale - Pas d'autres phénomènes morbides - Pas de troubles de la miction ni de la déjécation -

La Colonne dorsale Courbure de la Colonne dorsale est dirigée la partie postérieure droite du thorax plus bombée que le Côté gauche - Cette déformation existerait depuis près de trente ans et au dire du malade serait le résultat de son genre de travail - L'examen de cette Colonne est d'ailleurs négatif. Pas de troubles de la motilité ni de la sensibilité en aucun point du corps

Rien au Cœur ; Rien aux poumons ni du Côté des autres organes -

24 Juin Cuiller Ces Crises d'Epilepsie sont débuté il y a 6 mois sans cause appréciable

Lyon, Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 54

Nom Antoine Chenevas
né à St Héand (Loire)
demeurant à
profession Tailleur d'habits
âge 42 ans
tempérament
constitution
entré le 29 juillet 73
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Crétinisme
Epilepsie.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Lyon, Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Charles N° 95

Nom Terdin ? Chenay
né à Bagnols (Gard)
demeurant à Lyon
profession tailleur d'habits
âge 51
tempérament
constitution
entré le 2 Juillet 55
sorti le 19 Juillet 55

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Morbus comitialis

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

de mélancolie

Père mort subitement — Frère ayant une affection nerveuse, sur laquelle la maladie ne donne que de vagues renseignements et consiste par des maux de tête et des vertiges — Fille atteinte d'un ? syphilis, ni d'alcoolisme —

Le début de la maladie actuelle remonte à 4 ans. — A cette époque cet homme eut de violents chagrins, et fut pris subitement un jour, des vertiges accompagnés d'une céphalalgie frontale, d'étourdissements et tomba sans connaissance. Cet état dura une heure environ — Le malade n'entendait pas et ne voyait les personnes autour de lui, mais il n'eut point de convulsions. — Pendant plusieurs jours il resta au lit souffrant de la tête et ayant une faiblesse générale —

Deux ans après il reprit une crise semblable et enfin il y a 3 jours il en fut une

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS avant pris
	fraisième — Le malade a remarqué qu'il pouvait ces trois crises syphilitiques chacune par deux ans d'intervalle à la même époque — Il ne les sent pas venir et leur début ressemble assez par sa brusquerie à celui d'épilepsie Il y a fois et surtout lorsqu'il sort, le malade ponné des vertiges, il lui semble qu'il va tomber dans un gouffre, fait des efforts pour se retenir ; puis tout rentre dans le calme — Ces symptômes surviennent surtout lorsqu'il est sur un pont suspendu, lorsqu'il est sur une grande place ou lorsqu'il est obligé de faire un brusque contour à l'angle d'une rue — Rentré chez lui, il peut reprendre ses travaux, c'est rare que ces accidents se reproduisent lorsqu'il est dans sa chambre. —	
	actuellement le malade ne présente aucun trouble dans il n'a jamais eu d'hémorroïdes — Les fonctions digestives sont excellentes — Jamais de gastralgie	
	Au point de vue de la sensibilité et de la force — il présente une diminution de la force musculaire dans les bras et les jambes. — La sensibilité est partout très obtuse, et présente un retard de 20 à 30 secondes.	
	Pas d'hallucination —	
	La miction et la défécation s'font bien.	
19 juin	Rien à noter —	

Lyon. Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Charles N° 93

Nom Benoit Perrier

né à Jonas

demeurant à

profession boulanger

âge 26

tempérament

constitution

entré le 18 février 1874

sorti le 10 avril 1874

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Cirrhose alcoolique (?)

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Nul antécédent pathologique jusqu'à l'âge de 20 ans —

A cette époque chancre du prépuce — pas de renseignements sur l'accident ni sur la nature du chancre —

A été traité par frictions mercurielles suivies suppuration —

Quelques mois après apparition d'engorgement ganglionnaire à droite, puis à gauche, douleurs nocturnes, pas d'éruption, mais remarque amygdalites à répétition —

Bonne santé jusqu'à il y a 6 mois

Il y a 6 mois sans perte de connaissance, sans céphalalgie, sans trouble intellectuel, hémiplégie droite légère à marche régulière à l'Hôtel Dieu pendant un mois environ pendant laquelle paralysie était sujette à des mouvements

Nul des excès alcooliques

Hémorrhagie ancienne et rétrécissement consécutif traitement à l'hôpital par dilatation — sortie de l'hôpital il y a 8-9 jours

Lyon. Impr. A. Bonnarial, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Sort guéri —
Il y a 3 mois ~~—~~ le malade était en bonne santé
n'éprouvant aucun trouble céphalique est pris
subitement de céphalalgie —, de dysplopie — vertige
Vue par le porte de cupidastalie en même temps
Raideur à son commencement pendant quelques
jours
le malade entre de nouveau à l'Hôtel Dieu —
Il éprouve depuis cette époque des troubles de la vue
objectifs à type vertigineux
Est mis à l'amende un jour —
Hier matin ~~le malade~~ Nouveau vertiges plus forts
violents, avec céphalalgie — le malade ne peut
voir poré peut encore. Fait vomissements, ictère,
deux selles peu d'accidents cérébraux,
Perte de connaissance, avec agitation, spasmes
les cris se répètent 2 fois dans la journée il
laissent après elle une obnubilation générale
des facultés intellectuelles
Ce soir il a de la peine à rassembler ses souvenirs
la mémoire lui fait défaut
Actuellement Etat présent Les 2 troubles de sensibilité
Dilatation pupillaire, la pupille gauche
est plus dilatée que la droite au commencement
de l'examen — et a fini elle aussi agités —
Ce matin la dilatation pupillaire n'a pas persisté
Pas de troubles de la motricité
Athérome artériel
Rien anormal
Urine dans un bocal jaune ambré
L'examen microscopique ne révèle rien
pus ni sucre
24 Je — Jour de nouvelle crise = traitement dans la
journée
10 avril 74 — Pendant bien des jours a pris une ascite douloureuse à des cathétérismes fréquents pour maintenir un rétrécissement
urétral perméable —
sont sans avoir éprouvé de nouveaux accidents cérébraux

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* S. Charles N° 80

Nom Lemaguet Cl. A.

né à Cour-de-Vaux

demeurant à

profession agriculteur

âge 40

tempérament

constitution

entré le 4 VIII 1876

sorti le 7 VIII 1876

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Epilepsie
Tremblem.t alcoolique
Congestion mentale

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

K Br 2 g/j

Alcoolisme
cirrhose épileptique Depuis 8 ans environ
pas d'absinthisme

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Lyon, impr. A. Bonnariat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Charles N° 7

Nom Claude Aimard

né à Langeac (Hte Loire)

demeurant à Lyon -

profession Chaudronnier.

âge 34 ans

tempérament

constitution

entré le 30 juillet 74

sorti le 16 août.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

~~Convalescence~~ Epilepsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas de renseignements. Mardi dernier sans malaises précurseurs il tombe ~~dans la cour~~ subitement dans l'état où nous le voyons. Il est dans une somnolence continuelle d'où on le tire en lui ouvrant les paupières. Il nous fixe et ne répond à l'interroger. Il répond très nettement par des injures. Les pupilles sont normales - La sensibilité est entièrement abolie. Il ne sent pas ~~pincer~~ pincer ou piquer. Rien au cœur ; rien aux poumons - Langue blanche - Dents cariées - gencives rouges et saignantes -

Il urine dans son lit -

Tout n'a pas l'habitude de dormir - il se réveille et répond bien -

Lyon. Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 88

Nom Grignon Vincent

né à Paris

demeurant à Blanot (Côte d'Or)

profession journalier

âge 47 ans

tempérament

constitution

entré le 18 avril 1872

sorti le 14 mai 72 —

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Crise épileptiforme.

Par l'alcoolisme

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Le malade a déjà eu plusieurs attaques. A l'âge de 10 ans il avait fréquemment des très fortes coliques qui l'obligeaient à se coucher. Ceci dura 2 ans. Mais sans que jamais son ventre ne se ballonnât.

A 16 ans il prit part à une guerre ; fait deux campagnes d'armées. Après chaque repas il avait des vomissements, quels que fussent les aliments qu'il eut ingérés.

A 25 ans, fièvre typhoïde — Le malade reste 40 jours sans connaissance.

En novembre 1870. Le malade ~~fut en se réveillant~~ ~~tout à coup~~ ressentit tout à coup une violente douleur, aigue, poignante qui s'irradiait au pied droit. — Depuis quelque temps déjà le malade était sujet à prendre des crampes, mais il y prêtait pas d'attention. — Cette douleur alla en augmentant et s'accompagna de contractures musculaires, telles que au dire du malade, le pied était renversé en dessus, fortement en angle droit sur la jambe et son genou vint toucher la poitrine

fut réveillé

Lyon. Imp. rues Stanislas et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Il perdit connaissance mais il ne sait combien de temps dura cet évanouissement – ~~il fut réveillé par les Cris~~ Au réveil il ne ressentit aucune douleur et crut que son réveil était normal ce qui était contraire à son sommeil naturel – Pendant 2 mois environ il fut très bien portant et n'eut alors une nouvelle crise qui eut le même point de départ et présenta les mêmes caractères d'abord violente douleur fulgurante au pied droit. Renversement de la plante du pied en dehors contracture de fléchisseurs de la jambe sur la cuisse et de fléchisseurs de la cuisse sur le bassin. 9 fois depuis Mai 70 jusqu'à Avril 1871 le malade perdit connaissance pendant ses crises – celles ci furent bien autrement nombreuses mais toutes ne furent pas accompagnées de syncope Le malade affirme que lorsqu'il sent venir la crise il le compte sur la Montre et que par suite de la rétraction de la jambe droite et des mouvements convulsifs dont tout son corps est agité il finit toujours par se retourner couché sur le dos. Il a été plusieurs fois à l'hôpital de Bicêtre pour y être traité – Une seule fois on lui donna du Bromure de Potassium – dont l'usage fut continué pendant 6 mois environ.– La réapparition de ces crises est assez variable et ne semble à aucune période déterminée Une chose quelconque Légère qu'elle soit, pourtant sur le Lit ou sur un point quelconque du membre inférieur les fait reparaître, mais c'est surtout au moment qu'il se couche ou qu'il se lève que le malade y est sujet. Elle suit d'ailleurs très régulièrement dans leur retour. Parfois le malade en a 2 ou 3 pendant la nuit, une nuit, ou deux un jour, et passe ensuite 8 jours ou 10. Le plus long a été de 15 jours. Cette limite n'a jamais été franchie L'état général est resté bon l'appétit persiste, toutes les fonctions s'accomplissent régulièrement.	

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle St Pothin — N° 35

Nom Lacroix Jean Baptiste.

né à Port Beauvoisin (Savoie)

demeurant à Lyon

profession Serrurier.

âge 46 ans

tempérament

constitution

entré le 29 Septembre 1869

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Alcoolisme
Epilepsie
Palpitations

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Pas de maladie antérieure. Le malade entre à l'hopital avec les symptomes suivants: Rien de côté de l'appareil digestif. Respiration saccadée et oppression très marquée à la moindre fatigue. Bruits stéthoscopiques du cœur très éclatants mais sans bruit de souffle.	
	Tremblement très marqué des membres	Pot. Bromure Pot. 1g
29 Sept.	Le malade depuis un an est sujet à des attaques d'épilepsie.	Sirop D. Thébaïque 20g.
3 Oct.	Sorti — même état —	

Papeterie générale, Lyon. — Mod. n° 6.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Lacroix jean baptiste	

SCD Lyon 1

Meningites non Tuberculeuses

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle St Polten N° 36

Nom André Comte
né à Besançon
demeurant Lyon
profession Chaudronnier
âge 18 ans
tempérament
constitution
entré le 3 Mai 1870.
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite cérébro-spinale non tuberculeuse

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	- Parents bien portants. Bonne santé habituelle. - Pas d'excès alcooliques antérieurs. - Le 2 Mai - a Thabalacia assez vive durant la matinée. - Le soir à 5 h. chute subite par congestion. Le connaissance - Convulsions toniques, pleurs cloniques - écume à la bouche. - Jactation de plaintes (cri d'effroi d'aucune sorte. Grande agitation - mouvements incessants pour remuer. - Vaccination ancienne bien caractérisée. - Les urines et les matières fécales involontaires. - La même état a subsisté pendant la nuit. et la matinée.	
3 Mai	- Le malade est dans un abandon complet: - les yeux sont à moitié fermés et la bouche légèrement entr'ouverte - le face pâle - la tête portée un peu en arrière. Les pupilles sont bien égales dilatées et dilatables. Pas de torsion de la bouche ni - Du côté droit les membres paraissent modifiés dans leur motilité qui est diminuée, surtout le membre supérieur. - Les mouvements de la main sont plus faciles et surtout la force qui s'exerce sur la pression de la main. -	
	- On ne peut nullement apprécier l'état de la sensibilité à la douleur et à la température.	

Imprimerie générale Lahure, Rue de Fleurus, 9. — Paris.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	l'agitation continue, Pouls plein à 64. - T. R. 38, 8 Soir. - Un peu plus d'calme. - Même abattement. - Sueurs à la face. - T. R. 38, 4. -	
4 Mai.	- Un peu moins d'agitation. - Cp. il remue presque constamt les membres, surtout ceux du côté gauche. - Le visage ne tient pas entièrement la paralysie mais il est atteint d'un paraît léger contracture. - La sensibil. générale est assez obtuse, et il faut piquer assez fortement le malade pour provoquer de mouvemts. - La tête est projetée en arrière et à gauche; impossible de lui faire changer de position, ce qui fatigue le malade. Cp. il n'existe pas de troubles moteurs. - Pas d'vomissements. - Lorsqu'on attire son attention, il ouvre les yeux et cherche à diriger son regard du côté où on l'appelle - Mais on ne peut tirer aucune autre réponse. - Il boit assez facilement. - Langue humide. - Il peut facilement expectorer. - Selles abondantes après clystère. - Pouls à 76. - R. normale. -	
5 Mai	- Dans la journée d'hier, un peu d'amélioration, le malade a fait comprendre q.q. paroles, et reconnaît un ami; même bras gauche q.q. mots. - Mais à 11h. du soir, il a été pris de crises d'claustriques qui se sont succédé d'une manière presque constante jusqu'à 2h. du matin. 11h. au moment de la visite il est pris d'nouvelles crises, caractérisées par de la gêne à la respiration, par des mouvemts convulsifs du côté droit du corps. - par la rotation des yeux à droite, et par une salivation abondante. - Les crises paraissent subintrantes et q.q. unes même ne sont pas accompagnées de convulsions, et on remarque alors q.q. mouvemts convulsifs des muscles de la moitié droite de la face et de la mâchoire. - La tête est inclinée à gauche et la face tournée à droite. - Pupille dilatée et d'latable. - Paralysie complète du côté droit. Sens ébl. gênés. - s'teinte. - P. = 116/4 .. T. R. 39°2 Sous l'influence du chloroforme inhalé, les crises cessent et le malade s'endort. On ne remarque alors que q.q. contractions cloniques des muscles de la face, et la pupille dilatable reste contractée et non dilatables. - P. tombe à 104	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
6 Mai	Dans la journée de hier et dans la nuit, les crises ont continué. — Ce matin, le mal. est complètement affaissé, les muscles se sont détendus, les yeux à demi ouverts, la respiration superficielle. — Les pupilles largement dilatées ne réagissent plus à la lumière. — Mort au moment de la visite. — Autopsie pratiquée 24 h. après la mort. — La région cardio-thoracique est fortement marquée, accusée au niveau des membres du côté droit, surtout au bras qui est flasque et pendant. — On remarque au niveau du trochanter droit une escarre commençante. — — A peine avait-on enlevé la voute crânienne, on voit les méninges fortement congestionnées. — Sur la surface du cerveau et du cervelet, épanchement sanguin, franchement plus marqué en avant qu'en arrière, plus abondant sur les hémisphères droits que sur les autres. — — Examinés au microscope, ces foyers sont constitués par de nombreux globules de pus, formant un réseau de fibrine. — — Dessous des méninges, les vaisseaux sont remplis par un liquide rouge foncé. — — Les poumons sont congestionnés. — On a également examiné les reins. —	Par l'hémorragie cérébrale. —

Papeterie générale, Lyon. — Mod. n° 6 bis.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle St Lothin — N° 46

Nom Viotti Charles
né à Campertogno (Italie)
demeurant Lyon (France)
profession apprenti plâtrier
âge 15 ans
tempérament
constitution
entré le 10 mai 1869
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ
Méningite aiguë
autopsie

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Samedi soir 9 mai, cet enfant fut pris subitement de vomissements auquel s'entremêlait une forme convulsive, et rendit un fragment de vers intestinal — Il vomit deux fois ensuite, mais sans expulsion de parasite, ni convulsion — Le malaise le mit au lit — Quand l'enfant ne cessa de manifester de l'agitation, se plaignant de vives douleurs dans tout côté de la tête — Tel est l'état dans lequel il passa la journée du dimanche — Dans la nuit suivante vers onze heures on s'aperçut que la connaissance lui manquait, et de ce moment date l'état dans lequel il nous est amené —	
	L'enfant est dépourvu de connaissance et paraît étranger à tout ce qui l'entoure — On peut cependant éveiller son attention en l'appelant à haute voix et en l'interpellant dans sa langue qui est l'italien — Toutefois il répond de contact — répond avec peine, à qui s'adresse toujours bien, et d'une façon très-incomplète aux questions qui lui sont adressées — Les interpellations restent souvent sans résultat —	
	Il pousse de temps en temps quelques cris plaintifs, ce qu'il n'avait pas fait avant d'être ici — Cet enfant fréquemment la main à la tête qu'il paraît désigner comme le siège de sa souffrance — Il manifeste la tête impossible et semble craindre de la remuer — Il ne se plaint que lorsqu'on le force à le faire — Il y répond par une plainte — Le pouls est fréquent — La respiration est un peu gênée — Il y a de la constipation —	
	Quelques contractions de face et des lèvres qui correspondent à l'expression de la douleur —	

Papeterie générale, Lyon. — Mod. n° 6.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Les yeux sont fermés - si on les ouvre les rayons, on constate qu'ils n'ont aucune expression; ils sont tous les deux légèrement portés du côté interne - ~~Les pupilles sont dilatées~~ Les mains s'agitent fréquemment et s'acharnent aux couvertures du lit, à la chemise du malade etc. Le malade boit très bien - il perçoit parfaitement avec les lèvres [illegible] de la glace qui contient sa boisson - Il peut la porter lui-même à sa bouche, mais il y a un peu d'incertitude dans le geste dont il dirige le mouvement, et la glace touche d'abord des points divers de la face avant d'atteindre les lèvres - Signe de l'incontinence d'urine - Le ventre est ballonné et se contracte pour remonter vers la paroi inférieure du thorax par un plan très - incliné - La peau a une chaleur normale - Pouls 22 1/4 - Respiration 7/4 - Température: 39° 4/10 Pas de selles depuis le début - Cet enfant souffrait depuis quelques jours, avant le début de son mal - Il a perdu sa mère - la cause de la mort de celle-ci ne peut nous être indiquée - Il a deux frères et deux sœurs aucune ne présente aucune maladie -	
12 mai	- Etat comateux - Résolution de tous les membres quoiqu'il existe un peu de roideur - Tête immobile aucun mouvement - insensibilité presque complète - Les pupilles sont contractées - Le malade a vécu beaucoup la nuit précédente - Il paraissait fréquemment changer ses draps - Pouls très petit, très rapide 140/4 - Respiration 12/4 - La température s'élève à 39° 8/10 - La langue sort sans faire effort pour la contenir -	
12 mai	décédé à 5 h. du soir	
	Autopsie - Infiltration purulente généralisée sur la surface du cerveau, aux plexus choroïdes, et dans les sinus ~~et dans la substance~~ et paraissant occuper la pie-mère et l'arachnoïde - Cette dernière ~~seule~~ seule présente cette altération dans les autres organes -	Les plexus choroïdiens et les plexus choroïdes sont également infiltrés de pus -

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 99

Nom Dessilin

né à — la Savoie

demeurant à Lyon

profession fondeur sur métaux

âge 58 ans

tempérament

constitution

entré le 4me Jour. 1872. —

~~mort~~ *sorti le* 5 Jour. 72. —

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite cérébro-spinale aiguë

—

Mort

—

Autopsie

Rétrac. vésic. — immob. articul.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

2 Janv. — Dat D'enero alcoolique (?)

— Surdité depuis 3 à 4 ans. —

— Déviation de la colonne vertébrale depuis son enfance. —

— Le 30 Xbre — Le mal s'est déclaré d'une violente douleur d'oreille. —

— Le 31 Xbre 71 — Frisson intense qui dure pendant toute la journée. —

— Quand le mal arrive, il a perdu connaissance — il est très agité — s'est jeté hors de son lit en se débattant — ne jouit que de cris inarticulés — se défend contre l'examen qu'on veut faire de son état. — A l'air de souffrir. —

Matin. — La tête est dans l'opisthotonos, en soulevant la tête seulement, on soulève le tronc — Le mal. entr'ouvre un peu la bouche, paralysé de laisser. — Les pupilles sont contractées

Lyon Typ. veuve Ronnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
9 Janv.	- On ne trouve pas de paralysie des membres. - T. R. 40°,7. - P. à 72 - R. à 40, type irrégulier Soir. - Abandon complet. - Le malade semble souffrir du côté de l'abdomen qu'il frotte continuellement. - - La commissure droite de l'œil paraît abaissée, et la joue de ce côté pendante - Matin. P. à 88. - irrégulier. R. à 48 Sueurs profuses abondantes pendant le sommeil. - Mouvements de contraction de l'œil droit. - Résolution des membres, néanmoins encore un peu d'action réflexe ; quand on les pique fortement. - Moins d'agitation. - Somnolence habituelle Soir : - Résolution complète. - Tête tournée du côté droit. - Se soulevant à chaque inspiration - Sueurs chaudes, moites. - Mort très-accélérée - Mort à 9 h. du soir. -	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1ère Charles — N° 99

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Autopsie
(Seule)

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

6 Janvier. — Autopsie. — Pratiquée 36 heures après la mort.
Plèvres. — Adhérences anciennes, à droite vers la base et en arrière.
Poumons. — Emphysémateux vers les bords. — Le lobe inférieur du poumon est entièrement emphysémateux. Il correspond au point de la paroi thoracique où la déviation à gauche de la colonne vertébrale est la plus prononcée. — Le lobe inférieur droit qui correspond aux adhérences est atteint d'œdème plus léger, et congestionné. — Sur divers points de la surface des bronches. —
Cœur. — Sur l'une des parties latérales. — Caillot fibrineux dans l'artère pulmonaire. —
La valvule mitrale présente des végétations fibrineuses, sans doute dues à la maladie qui a entraîné la mort. — Les valvules sigmoïdes sont épaissies et plissées. — Il adhère à peine à l'endocarde. — Le pourtour de l'orifice auriculaire — enfin les valvules internes présentent des plaques athéromateuses. —
— Les valvules aortiques sont également épaissies.

Lyon Imp. veuve Rannaval et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Foie = Il adhérence nombreuses avec le diaphragme. — Un peu congestionné

Rate — Reins = Normaux. —

Cerveau = La dure-mère présente de nombreuses adhérences avec l'arachnoïde. —

— Il est aussi facile de séparer les méninges de la substance cérébrale. — On voit alors la pie-mère fortement vascularisée — en outre les membranes contiennent dans leur épaisseur du pus en assez grande abondance, pus jaunâtre en nappe et consistant.

— Le pus se rencontre surtout dans la convexité du cerveau et devient de plus en plus abondant. —

— On rapidement trouve les méninges dans le sillon de Rolando, dans les circonvolutions — et jusque dans les ventricules latéraux.

— Il y a à la surface du cervelet —

— Par un niveau du bulbe et de la portion cervicale de la moelle — Il abondant au contraire dans la portion dorsale et lombaire de Cheval.

Le cubat. nerveux ne paraît nulle part modifié sérieusement dans sa texture et son apparence. —

— Le cubat. blanchâtre est seulement un peu vascularisé. —

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4 femmes N° 131

Nom Françoise Devenus.

né à

demeurant à

profession

âge 75 ans.

tempérament

constitution

entré le 28 février 1883

~~sorti~~ visité le 28 février à 6 heures du soir.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Suppuration de l'oreille droite - méningite de la convexité des hémisphères et du cervelet. Exsudat purulent abondant.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cette malade est amenée à 9h 1/2 elle avait pris une attaque le matin même à 5h. Sans donner de renseignements.

Nous la trouvons dans l'état suivant 1/4 d'heure après son arrivée ;

Etat comateux absolu, respiration bruyante, râle trachéaux ; la bouche est remplie d'une écume blanchâtre. Les pupilles sont fermées. Pas de déviation apparente des traits. = La tête est légèrement tournée à gauche. Les yeux sont légèrement dévié de ce côté. = ~~Il existe~~ présentent un nystagmus transversal. = Les pupilles sont dilatées, et très peu mobiles. La pupille gauche est beaucoup plus dilatée que la droite. = La cornée et la conjonctive de même que toute la face sont insensibles à toute excitation. =

La malade remue un peu de temps à autre soit le membre supérieur ~~droit~~ gauche, soit le membre

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

inférieur du même côté. = Côté gauche
Un peu de résistance du côté des biceps et des triceps du membre supér. gauche. =
Pour le membre inférieur, il ne paraît pas y avoir de résistance.
Pas de trépidation plantaire, ni rotulienne. Réflexe rotulien à peine marqué.
Les pigmures de doigts ou de la main paraissent bien qu'à de très légers mouvements, et encore pas après chacune des excitations.
Les pigmures de la plante du pied, ou des orteils donnent bien à de très légers mouvements de flexion de la jambe sur la cuisse, presque rien du côté des extenseurs du pied sur la jambe. Du reste avec elles il y a pas de propagation dans tout à l'entour.
Les traces de pigmures ne sont pas perçues. ———
Côté droit = Les membres de ce côté sont absolument immobiles.
Le membre supérieur est flasque, pas la moindre résistance.
Le membre inférieur ne présente ni résistance, ni trépidation plantaire ou rotulienne (réflexe rotulien douteux.)
Les pigmures du membre supér. ne produisent rien; celles du membre inférieur, ne déterminent pas de mouvements de déplacements, seulement quelques contractions légères dans les muscles de la région postéro-interne de la cuisse droite.
Yeux fixes. =

à 6h moins 5 minutes, nous trouvons le malade à l'agonie dans la résolution générale avec abaissement des paupières, supp. sup. stertoreux avec écume à la bouche - on ne sent plus le pouls et la respiration est irrégulière. Les membres n'offrent aucune résistance et les pigûres profondes répétées ne déterminent toujours aucun mouvement, pas même une légère flexion à aucun mouvement. Les pigûres même à l'origine de racines ne déterminent pas la moindre changement des paupières. En approchant une lumière de l'avant bras on détermine un froncement de l'épiderme mais apparemment, même alors que la respiration devient de plus en plus rare, puis on finit pour provoquer sur un point une bulle sèche qui éclate, et l'on remarque alors que c'est l'indice de la mort, alors après cela on ne voit plus se produire aucune respiration jusqu'à 6h

SCD Lyon 1

4e Femme — N° 131

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

— Autopsie le 2 Mars 1881 —

A l'ouverture de la boîte crânienne on trouve une adhérence très marquée de la dure mère aux parois environnantes et qui gêne beaucoup l'ablation du cerveau.

Il s'écoule une petite quantité de liquide trouble en incisant la dure-mère.

On voit alors que la surface de l'hémisphère est entourée partout par une zone grisâtre et offre une teinte blanc-jaunâtre dans laquelle se détachent les vaisseaux au niveau du pied de la première pariétale, de la supérieure de circonvolutions ascendantes et de la lobe pariétal supérieur, et à la surface interne au niveau du pied de la première circonvolution, au niveau du lobe paracentral et du lobe quadrilatère. Cette disposition se trouve tout à fait égale et symétrique sur les deux hémisphères. — Quand on pince il est constaté dans le tissu cellulaire sous-arachnoïdien et on l'entend complètement on entreprend les membranes qui sont plus épaisses, qui sont plus, une perdu plus considérable que à l'état normal. Dans cette méninge s'enfoncent profondément les artères de la base présentant de petits kystes atheromateux mais non oblitération. Rien de particulier dans les gros vaisseaux, notamment dans le tissu basilaire.

L'examen des circonvolutions ainsi que la coupe pratiquée sur chaque hémisphère n'offrent rien de particulier.

— Rien à noter sauf un peu de pus dans la méninge au niveau du vernis supérieur du cervelet.

— Rien de particulier du côté de l'estomac et du bulbe.

— Rien du côté des viscères de la dure-mère.

— — On trouve nos circonvolutions pariétales par le doigt du côté droit. Sur pariétal ne coupe sur le rocher on trouve la même consistance dans l'aile moyenne et la selle montrant aussi tendre que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Du côté gauche — L'hémisphère droit ne présente rien de spécial et l'on n'observe rien de particulier à l'intérieur.

— Rien aux poumons.

— Cœur un peu volumineux — Quelques athéromateux sur l'aorte qui est un peu dilatée — Surcharge graisseuse du cœur — Du côté droit rien d'anormal assez embonpoint assez sanguin.

— Rigidité cadavérique assez prononcée —

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4 ff — N° 131

Nom François Devaux

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Suppuration de l'oreille droite.
Méningite de la convexité des hémisphères
et du cervelet. exsudat purulent abondant.

Réflexions. La première cause de la maladie n'a pu être fait que [illegible] avant la mort, toutefois il en reste quelques faits intéressants.

Le côté gauche était manifestement moins paralysé que le côté droit, par rapport était le siège de quelques mouvements automatiques, alors que la résolution était complète à gauche. Et cependant les lésions paraissaient égales des deux côtés nous avons observé des phénomènes analogues dans des cas de méningite diffuse dans les pachyméningites doubles, une hémiatrophie, dans certains cas d'hémorragie double des hémisphères. On voit de même

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

les lésions de la moelle donnent lieu à des troubles prédominants d'un côté. La prédominance de la paralysie d'un côté paraît tenir soit à une lésion plus considérable, soit à une lésion antérieure dans les régions qui correspondent physiologiquement aux parties paralysées. On peut rapprocher de ces cas, ceux dans lesquels il y a d'abord une lésion très-manifeste d'un seul hémisphère et ensuite au bout d'un temps variable une lésion de l'autre hémisphère. Cette dernière peut passer inaperçue tellement les symptômes sont peu accusés lorsque la 2me lésion est moins considérable que la première, ou bien si ces symptômes sont plus ou moins prononcés, ils ne sont pas de longue durée. Ce n'est que dans les cas où la 2me lésion est beaucoup plus considérable que la 1ère durant toute la vie il existe un grand intervalle entre les deux lésions que les symptômes correspondants à la production de la 2me lésion peuvent être très-prononcés au point même de déterminer la mort.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

On peut ainsi se rendre compte comment des lésions doubles, sans destruction de la substance cérébrale ne donnent point des symptômes aussi prononcés d'un côté que de l'autre : ces phénomènes permettent de conclure que les symptômes de paralysie ne sont pas toujours en rapport avec des lésions déterminées d'un hémisphère et qu'il faut tenir compte de plusieurs circonstances au nombre desquelles se trouve l'état de l'autre hémisphère. Il semble donc que des lésions des hémisphères ne font qu'agir à distance sur les noyaux d'origine des nerfs dont la destruction donne seule des troubles constants; et que les symptômes sont d'autant plus prononcés que les lésions hémisphériques que l'équilibre existant entre les deux hémisphères est plus troublé, soit par l'étendue de la lésion, soit par sa marche en tenant compte des conditions générales dans lesquelles se trouve le malade.

Ce n'est pas à dire que dans les cas de lésions doubles la plus de paralysie n'existent que d'un côté. En effet, des lésions d'un seul hémisphère ont manifestement une action sur les deux côtés du corps, et il est évident que les lésions doubles doivent lui donner plus forte raison à des phénomènes paralytiques des deux côtés; mais ce que nous avons voulu surtout faire ressortir c'est la prédominance plus ou moins grande des troubles d'un côté apparaissant pas en rapport avec la prédominance des lésions d'un côté; ou bien l'absence presque complète de troubles à des troubles passagers correspondant à des lésions assez considérables quand il y a des phénomènes plus accusés du côté opposé.

La déviation des yeux et de la face sont des phénomènes de même ordre que la résistance ou mouvements convulsifs constatés dans le membre supérieur gauche; et qui ont fini par disparaître avant la mort.

L'absence de déviation et l'immobilité de la face semblent prouver que les lésions doubles agissent davantage sur les deux côtés de la face probablement en raison d'une action physiologique habituellement simultanée; à tel point que des lésions internes d'un seul hémisphère peuvent également causer des troubles profonds des deux côtés. Il faut remarquer aussi que les deux côtés de la face s'éloignent peu de la ligne médiane tandis qu'il en est autrement du membre supérieur dont l'indépendance de mouvements est aussi la plus considérable des divers points du corps.

SCD Lyon 1

Modèle N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4 ff. N° 131

Nom Françoise Devenus

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Réflexions (suite). - Les membres du côté droit présentaient une paralysie flasque complète, tandis que ceux du côté gauche étaient le siège de quelques mouvements automatiques. En outre, le membre supérieur gauche semblait offrir un peu de résistance aux mouvements communiqués soit parce que dans les cas de lésions double, les hémisphères se neutralisent lorsque ces lésions occupent les parties supérieures, les membres inférieurs sont plus paralysés que les membres supérieurs, soit parce que l'activité du membre inf. est moins facilement mise en jeu dans le lit que celle du membre sup. —

Sur la région plantaire ni rotulienne de réflexe rotulien à peine marqué à gauche, contours à droite. Nous avons déjà vu les réflexes tendineux être peu marqués ou nuls, dans d'autres cas de méningite. Existe-t-il un phénomène constant dans cette maladie? C'est un sujet d'autres observations feront savoir.

Les piqûres ne donnaient lieu qu'à des mouvements réflexes très limités surtout du côté paralysé (côté droit). C'est ainsi que de la face les piqûres ne produisaient aucun mouvement qu'on n'en obtenait pas davantage en piquant le membre supérieur, et que les piqûres de la région plantaire seule donnaient lieu à de légères contractions dans les muscles de la région poplito-interne de la cuisse. On voit donc que certaines portions du bulbe conservent leurs fonctions avec les parties inférieures du côté opposé (côté gauche). Les piqûres de la main produisent moins d'effet que celles de la plante du pied, les parties inférieures de la moelle fonctionnant aussi mieux que les parties supérieures.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Les piqûres d'un côté du corps ne provoquent pas de mouvements dans le côté opposé dans l'hémorrhagie cérébrale ni dans l'oblitération d'un gros tronc le côté non paralysé. Il faudrait des recherches à ce sujet dans d'autres hémiplégies. Ce défaut de propagation dans l'ataxie est peut être spécial à la lésion peut être à ce que les lésions existant des deux côtés tout simplement à ce que l'examen a été fait à une époque trop rapprochée de la mort?	Il faudrait faire comme dans le ramollissement cérébral examiner si les piqûres ne provoquent pas des mouvements dans le côté paralysé, ne se voient ils en piquant le côté paralysé, faire des recherches dans les cas de méningite avec propagation d'un côté à l'autre de la méningite? Il faut peut être à ce que les lésions existant des deux côtés? ou tout simplement à ce que l'examen a été fait à une époque trop rapprochée de la mort?
	Nous avons encore fait un examen avant la mort et nous avons constaté qu'au moment où les réflexes étaient abolis il n'existait que des battements du cœur très faibles et une respiration irrégulière. C'est la suppuration de l'oreille qui paraît avoir été la point de départ de la méningite, bien qu'il n'y eut aucune trace de propagation directe.	

SCD Lyon 1

Meningites Tuberculeuses

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles — N° 90

Nom Louis Sebastien

né à Montsoreau (St Loup)

demeurant à

profession employé de Commerce

âge 36 ans

tempérament

constitution

entré le 17 Mars 1873

mort le 1er mai 1873

Pas de suspendu à l'examen.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

G. D.

Crise épileptiforme

Tubercules cérébraux

Hémiplégie gauche incomplète et Anesthésie du petit doigt de ce côté.

Autopsie

Lundi de convulsions

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Mon malade à 36 ans a eu à homologue huit fois en deux tous les trois mois le 1er à 42 ans. — La 2e mois à 2 ans et demi de maladie commença à tourner de la fois de neige de Pâques. Il a eu à différentes reprises de petites hémiplégies, tantôt à droite et tantôt à gauche. Depuis peu de temps, amaigrissement. Depuis 3 ans épilepsie de temps en temps de deux, trois ans de convulsions à la nuit, après de nombre en de temps il a continué régulièrement de ce matin (1 à 2 par semaine)

Ce matin à 6 h. est mangé, la tête et comme tiré mon fauteuil de la fenêtre du côté gauche. Sa femme l'a entendu se lever [illegible] tomber sur une chaise puis par terre. Quand elle est accourue elle a trouvé son mari [illegible] et la face tournée vers la fenêtre. Elle a appelé à son secours. Quand on est arrivé il était mort.

Lyon Imp. veuve Rodanet et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Rougeur [illegible] de tout le dessus du pied droit, [illegible] du monum du [illegible] et de la jambe.	
	La marche [illegible] de tout [illegible] crise [illegible] douleur, [illegible] [illegible] étendue, [illegible] [illegible] [illegible]

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Le rouge de ce vaisseau est de 5 à 6. Elle touchent à la gangrène au mensonge par son côté supérieur par son côté supérieur paraissent jusqu'au cœur calleux rentrés de la substance corticale.	Rien dans le
	Les deux premiers présentent des adhérences pleurétiques lâches à peu près grand. Ils sont rouges et tantôt de petits noirs grandes parmi rentrés semis à ceux de la base au sommet plus confluents à gauche A droite allez rouges par points confluents foncés. Au sinus droit et tout qui le repose présente une teinte rouge noir hémorragique. Au trou mitral à gauche de petits caillots.	
	Les bronches présentent des rougeurs tuberculeuses. Les muqueuses de la trachée et des grosses glandulaires. Ulcérations multiples au niveau de l'épiglotte et des cordes vocales.	
	Rien au cœur.	
	Trois reines hypertrophiques très distendues mais nous avons trouvé que cette granulation jaune caséeuse au cœur au siège de l'hémorragie. Rien au péritoine.	
	Reins granulation caséeuse au niveau de cet organe disséminée ou disposée au siège linéaire par leur superposition le long d'un même vaisseau.	
	Rate hypertrophiée considérablement par de tubercules.	
	Rien du côté des organes génitaux.	
	La capsule surrénale droite présente un noyau caséeux du volume d'une noisette entouré d'une zone d'autre granulation plus petite du volume d'un grain de chènevis. A gauche on ne trouve que quelques granulations jaunes petits grains d'oseille.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

L.Ch. Ste Charles. 90 - 36 ans - employé de commerce entré le 12 mars 1873 - mort le 1 mai -

Hemiplégie gauche incomplète et anesthésie du petit doigt du même côté - crises épileptiformes - tubercules choroïdiens occupant les circonvolutions ascendantes du côté droit -

---

Signes de tuberculose pulmonaire depuis deux ans - Il y a une crise épileptiforme - depuis retour de ces crises sous l'influence d'une alimentation même légère, d'une sensation douloureuse intense etc - tantôt ce sont de petites crises, consistant en contractures toniques, peu douloureuses des doigts, tantôt de grandes avec aura facial et perte de connaissance - Il y a 6 mois - à la suite d'une crise - Hemiplégie gauche -

actuellement - tics non douloureux de la face du côté gauche - paralysie des membres supérieur gauche avec atrophie et anesthésie du petit doigt -

Convulsions limitées au côté gauche de la face sans perte de connaissance -

Contracture des doigts de la main gauche - état de repos - pourpre sur les membres supérieurs -

Asphyxie - mort -

Autopsie. Méninges libres sauf au niveau des circonvolutions ascendantes de l'hémisphère droit, où on trouve 5 ou 6 masses caséeuses, soulevant par leur superficie les méninges - par leur partie profonde encapsulées - Elles sont jaunes rendaties à la coupe - leur centre est ramolli - Elles sont isolées de la substance cérébrale par une bandelette de gaine vasculaire -

Elles occupent exactement l'entrefaille des deux circonvolutions - On retrouve un peu partout dans l'encéphale - Tubercules dans le poumon, et les autres viscères.

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4 Femmes N° 152

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le 19 janvier 1881

sorti le Mort le lendemain

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

ganglion sous-maxillaire suppuré

Adénopathie tuberculeuse

tuberculose pulmonale cavitaire moyen gauche

Autopsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Malade amenée dans un coma absolu. Les seuls Renseignements qu'on puisse avoir sur elle sont les suivants ; elle avait des douleurs articulaires depuis longtemps ; néanmoins elle faisait son travail habituel, qui ne consistait en rien qu'en soins du ménage. Ce matin les voisins entrant dans sa chambre l'ont trouvée étendue par terre sans connaissance on l'a relevée et on a appelé un médecin qui a ordonné son transport immédiat à l'H. D.

Actuellement elle est dans un coma complet. Les yeux sont fermés, les muscles en résolution impossible de la faire parler, impossible de lui faire avaler une potion. Il y a un Eczéma remarquable des extrémités, la face et les téguments en général sont d'une pâleur livide. On ne sent pas les radiales, ni les temporales, ni la fémorale on sent un ondulation à peine perceptible. Le choc du cœur n'est pas forcé et le murmure de bruit en entend les deux bruits et la région

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	moyenne à la gauche — Elle sent très faiblement, mais	
	nettement — Bruit de souffle —	
	Les membres sont mobiles, mais on les soulevant et	
	en les laissant retomber on constate la différence suivante	
	le bras droit retombe presque brusquement, il faut mettre	
	un mouvement dans la flexion fléchie — Le bras gauche	
	retombe plus lourdement, cependant il n'est pas question	
	d'une paralysie — Si l'on cherche à fléchir le bras droit	
	on en est empêché par des contractures qui	
	empêchent alternativement le fléchissement et le retour —	
	Pour le bras gauche on observe rien d'analogue —	
	Si l'on soulève les jambes on obtient pour toutes les deux	
	les mêmes résultats que pour le bras droit, c'est-à-dire	
	qu'elles restent fléchies, mais sans contracture des	
	muscles — On ne constate pas de tremblement, ni	
	d'autre altération artérielle —	
	Du côté de la tête, on observe d'abord une déviation à droite	
	de la pointe, qui se reproduit si l'on ramène la tête	
	à la ligne médiane à la position droite — La bouche est manifestement	
	asymétrique — Les plis gauches sont effacés — on remarque	
	du côté droit le commissure est abaissée — la joue est un peu	
	pendante et flasque — La malade ne ferme pas les yeux	
	Sensibilité normale — Le pouls est ample et régulier —	
	Le contact du doigt dans un côté de la bouche ou dans l'autre	
	narine est ressenti — Un peu vivement, elle amène un léger mouvement	
	de la tête de la malade, avec une sorte de plainte, tant d'un	
	côté que de l'autre —	
	L'exploration de la sensibilité des membres par la même méthode	
	amène des mouvements dans les 2 bras et dans les 2 jambes	
	— La malade cherche par un mouvement de défense à	
	se soustraire à l'excitation —	
	— La respiration est stertoreuse — Il est impossible de ne pas	
	faire observer à la malade — aux poumons on n'entend	
	rien que le bruit du stertor — Pouls 96 — 340	
	— Au thermomètre dans la région axillaire droite on trouve	
	37°,2 — Urines rendues spontanément —	
	Revoir le soir à 6 heures —	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Autopsie

Cerveau — Rien à noter avec ménagés sur la convexité
Mais à la base au niveau de l'origine apparente
des nerfs crâniens, il y a une teinte ardoisée
très peu prononcée. Du reste — Sur une coupe grenue de
Une part, le cerveau enlevé et reposant sur la voûte
on constate une blancheur anormale des méninges
pariétales au niveau de la base du cerveau et la protubérance
du bulbe, et de la face antérieure du cervelet. Ces régions
sont comme voilées. Les artères sont aplaties,
absolument libres d'athérome, adhèrent fortement à la
pie mère et à l'arachnoïde — on constate des exsudats
fibrineux et divers points et notamment au niveau
du chiasma optique — là, la base pédiculaire est intimement
soudé au chiasma — on voit une légère saillie
ovalaire sur la face antérieure du cervelet au devant
du pétro-cube droit cérébelleux moyen — du côté gauche
Une induration manifeste et en incisant on tombe sur
petit foyer de ramollissement et de substance blanche sur
un petit noyau gris central de volume d'une
grosse noix, bien nettement arrondi et enkysté —
En examinant de plus près les artères, on constate
que celle d'un volume moyen et les petites sont
parsemées de fines granulations miliaires opalines, et
cela surtout dans la scissure de Sylvius des
deux côtés —
Les corps striés et optiques de Vicq d'Azyr ne montrent rien
d'anormal.

Ventricules — Le ventricule gauche est libre d'adhérences
consistant en fausses membranes ou contient une petite quantité
de liquide clair, de consistance analogue à celle
des ventricules —
Le plancher droit est intimement adhérent dans
les 1/3 supérieurs — et on est obligé d'enlever la

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	plèvre pariétale pour avoir le médecin dans le thoracique — On constate au sommet des lésions pulmonaires à droite du côté opposé — Et en outre dans tout le lobe supérieur [illegible] moyenne droite de l'abcès obtenu d'une poire, dont le centre est formé d'un magma caséeux et tuberculeux, à droite, plâtreux à gauche, et la périphérie fibreuse — Les deux bases sont libres d'adhérences au diaphragme Foie — Rien à noter dans la petite hépatite thermique du Caucase Rein — Rate Rien La tumeur sous-maxillaire signalée, présente à l'ouverture l'aspect d'un ganglion caséeux. Aux parois à la coupe il s'écoule une substance blanchâtre puriforme	

SCD Lyon 1

Modèle N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4 bis F.s N° 140

Nom Pivette Bocquet
né à Carouge
demeurant à
profession couturière
âge de 32 ans
tempérament
constitution
entré le 26 Mai 1881
sorti le 2 juillet 1881

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

60[3] - Pénicigite
Plaque tuberculeuse au niveau de la 1re circonvolut. front. gauche

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Mari en prison ; enfants ? domestiques -

Pas d'antécédents héréditaires. Elle mère âgée de 74 ans est mère vivante. Elle a encore ses deux frères vivants et bien portants.

Elle a eu 4 enfants, dont l'un est mort en nourrice — de manque de soins. — Pas de maladies antérieures. — La malade tousse — depuis huit mois. Son enfant âgé de 5 ans présente aussi des signes d'affection pulmonaire — (bronchite simple probable). Elle est entrée aujourd'hui à la Charité.

A l'auscultation, on entend la respiration soufflante surtout au sommet droit ; ainsi que des craquements secs prononcés de ce côté. — On trouve aussi du retentissement de la voix en arrière. — En avant, sous les clavicules, les craquements sont bien plus marqués, surtout à droite, où ils ont une timbre métallique très net. — Ganglions sus claviculaires.

Pas de diarrhée, ni de sueurs nocturnes.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
Depuis son entrée, elle ne mange pas —	La malade accuse aussi de l'inappétence, une faiblesse générale, et de la fièvre le soir.	
30 juin	Depuis 2-3 jours la malade reste tout alitement, et se trouve dans un état de prostration très-grande, elle ne répond qu'avec peine, et à voix basse aux questions; elle ouvre difficilement la bouche et jamais entièrement. La figure est plutôt triste et immobile. Un peu de roideur des muscles de la nuque. Pas de phénomènes de paralysie, bras appréciable. Cependant si l'on soulève le membre supérieur gauche il retombe dans la position première avec lenteur, tandis que le droit soulevé, et retombe souvent sur la tête. Les mouvements communiqués au m. gauche, rencontrent un peu de résistance anormale, qu'on ne trouve pas à droite. Pas de mouvements spontanés dans son lit. Il faut l'interpeller à plusieurs reprises pour qu'elle donne la main, plutôt du côté droit que du côté gauche. Cependant elle a des mouvements spontanés surtout de carphologie. — Toche méningitique. Sensibilité conservée. — Réflexes normaux. Pauses fréquentes; mais pas de vomissements. Pas d'incontinence des matières fécales et de l'urine. — Elle ne prend guère que du vin et un peu de café. Un peu d'obnubilation intellectuelle; le malade répète souvent les mêmes mots, et parle de mourir. — à voix basse. — Pouls = 72; respiration = 20 — respiration un peu irrégulière. Pas d'oppression — calme absolue — indifférence à ce qui se passe autour d'elle. — Temp. = 38°3. Par moments elle parle mieux, et vomit davantage. Elle ne tousse presque plus, et ne crache pas. Signes stéthoscopiques.	
2 juillet	Pupilles un peu resserrées. — Oppression plus considérable. — Respir = 56. — Pouls 120 — Face plus colorée; face déviée et inclinée à droite. — Yeux mobiles — Roideur du cou très-prononcée, difficulté à vomir, et douloureuse. — Parle à voix basse, délire, répète les mots qu'elle entend — carphologie — ne tousse plus, pas de vomissements.	moins irrégulière.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

2 Juillet Mort dans la nuit du 2 au 3 Juillet

autopsie :

4 Juillet L'autopsie est faite dans des conditions de putréfaction avancée, rendant un examen minutieux impossible ainsi on trouve les méninges injectées, et la substance cérébrale diffluente, au point que le cerveau enlevé s'affaisse et que les hémisphères et l'isthme se séparent par le simple poids de leur pesanteur.

On remarque aussi que les méninges s'enlèvent très-facilement, elles paraissent épaissies elles sont recouvertes par la pulpe cérébrale diffluente, et on ne peut préciser à quel point elles sont altérées. Il n'y a que une lésion très-évidente; elle consiste dans une plaque pourtisée jaune, siégeant sur les méninges au niveau de la 1re circonvolution frontale gauche, et adhérent à la substance cérébrale, dont elle ne peut être séparée sans qu'il se produise d'ulcération à ce niveau. La plaque a environ 3 cent. de long. sur 1 cent et 1/2 de largeur, et sa partie post. n'atteint pas tout à fait le pied de la 1re circonvolution frontale. Il y a encore une ou deux cent. en arrière, entre la plaque et l'extrémité post. de la circonvolution.

On trouve encore cependant une lésion très manifeste, au niveau de la surface ext. des 2 hémisphères, consistant dans la production de petites hémorragies capillaires disséminées à la surface des circonvolutions, ~~et~~ qui sont à ce niveau un peu plus diffluentes que partout ailleurs.

Les coupes faites au niveau des différentes parties de l'encéphale ne montrent rien autre de particulier, en dehors de la diffluence.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

Modèle N° 61.

Nom Pierrette Bocquet

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	210	34,0 42,5											
90	200	33,6 42,0											
	190	33,2 41,5				mort.							
80	180	32,8 41,0											
	170	32,4 40,5											
70	160	32,0 40,0											
	150	31,6 39,5											
60	140	31,2 39,0											
	130	30,8 38,5											
50	120	30,4 38,0											
	110	30,0 37,5											
40	100	29,6 37,0											
	90	29,2 36,5											
30	80	28,8 36,0											
	70	28,4 35,5											
20	60	28,0 35,0											
	50	27,6 34,5											
10	40	27,2 34,0											
	30	33,5											

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N°(60) 109

Nom Alfred Capit

né à Lyon

demeurant à

profession employé de magasin

âge 18 ans

tempérament

constitution

entré le 1 Xbre 1871

sorti le 14 Juin 1872 — rentre le 8 juillet 72

DIAGNOSTIC ET RÉSUME

1 Pneumonie

Tuberculose

— Rien du côté de l'hémithorax. — Mort le 10 Août 72

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

— Pas de maladies antérieures

— Toux depuis une année — en même temps dyspnée graduellement croissante, a beaucoup maigri — très essoufflé au moindre effort. — a des hémoptysies peu abondantes à plusieurs reprises, ainsi que des points de côté et de douleurs. — Pas de sueurs nocturnes — Santé antérieure excellente jusqu'à 8 mois, époque à laquelle il a été pris de douleurs dans le côté droit.

P. — En avant — matité sous les deux clavicules — fléchissement à gauche, on bien le contraire sous les 2/3 supérieurs — Même signe en arrière — cependant la matité de gauche y est moins étendue qu'en avant.

A. — En avant, sous les clavicules, respiration soufflante avec accompagnement de gargouillement quand le malade tousse — plus bas, il y a de la rudesse de la respiration et de l'expiration prolongée. — à droite, râles muq. en tout le poumon excepté — En arrière — Vers la commissure la respiration est moins nettement bronchique, et quand le malade tousse les râles sont moins nombreux et moins gros. — Même signe qu'en avant — Sous la pointe rien d'anormal. — La respiration est autant obscure à gauche, et on y entend des râles muq. dans toute l'étendue, ainsi que dans l'aisselle du même côté —

Lyon Imp. veuve Bonnaviat fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

- A l'inspection de la poitrine, on voit en avant à gauche dans les 2e 3e 4e 5e espaces intercost. - puis des battements synchrones à la systole ventric. -

Mort le 7 7bre 1874 - Autopsie -

Le Poumon droit est assez fortement adhérent, en tous points, il se détache en grande partie en arrachant la plèvre pariétale - Le lobe supérieur contient de vastes cavernes, et est gorgé par congestion et infiltration par l'induration tuberculeuse - Le lobe moyen et la partie supérieure du lobe inférieur contient également une foule de cavernes de toutes dimensions - La partie postérieure du lobe inférieur offre congestion abondante assez prononcée, comme on peut s'en rendre compte en plongeant la pièce dans l'eau -

Le Poumon gauche - est beaucoup moins adhérent, il s'en détache même facilement - Son lobe supérieur et la plus grande partie du lobe moyen contiennent de cavernes dont la plus volumineuse occupe tout le lobe supérieur, ces cavernes sont extrêmement nombreuses - La partie inférieure du poumon sain en crépitant, présente parfaitement par granulations miliaires déjà grises ou jaunes au centre et de la grosseur d'un petit pois - la plèvre ne présente pas à sa surface les granulations dont il vient d'être question souvent -

Le Cœur est petit un peu graisseux sans lésion des orifices par des granulations sous le péricarde -

Le foie est un peu jaune et paraît un peu graisseux mais cet aspect est encore peu prononcé -

L'intestin ne présente aucune granulation - Dans le mésentère on trouve un certain nombre de ganglion dont les plus gros ne dépassent pas le volume d'une amande -

Rate parfaitement normale -

Les Reins présentent une substance corticale un peu jaunâtre et congestionnée -

Cerveau - Les méninges (pie-mère et arachnoïde) sont légèrement d'un exsudat fibrineux, sans granulation dans toute l'étendue correspondant aux circonvolutions des nerfs crâniens - Sur la surface convexe des lobes cérébraux, on remarque quelques suffusions sur la surface de circonvolution entre elles-ci et la pie-mère -

Les ventricules latéraux sont remplis d'un liquide séro-purulent au milieu duquel on trouve des caillots dans chaque ventricule -

Enfin dans la substance blanche, sur la ligne médiane à l'endroit où le corps calleux repose sur la voûte à 3 piliers on aperçoit le corps calleux ou voûte à 3 piliers [illegible] avec un point hémorragique tout autour, mais le tout très peu étendu -

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom De Angeli Salle Ste Jeanne Lit N° 78 F°

Prénoms Camille

Age 27 ans

Profession voyageur de commerce

Né à Nice

Demeurant à

Entré le 9 février 85

Sorti le 24 février 85 à 9 h. du matin.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite tuberculeuse.

Hemiplegie Légère gauche. portant surtout sur la face.

Chef du Service, M. P. Lepine.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M. Devic.

Stigmates depuis l'âge de 7 ans ; ~~pas d'affection~~ (~~pas de traces de~~ ~~scrofule~~ ~~tuberculose~~ ni de goutte)

Cicatrice sur la côté gauche du cou

Ni syphilis ni alcoolisme

Parents bien portants, un frère mort phtisique. Dit malade au service. La santé a été généralement bonne. A 25 ans le malade eut une hémorragie compliquée d'ictère. Un mois après, ~~il~~ il fut atteint d'une affection thoracique du côté droit, affection qui dura un mois avec la convalescence. Aujourd'hui. Il s'est bien porté jusqu'à l'heure actuelle. C'est au premier jour de cette année que le malade fut ressenti le début de son affection. Le malade vit dans l'espace d'une journée, son genou gauche se gonfler beaucoup mais sans douleur spontanée, légère douleur ressentie à la marche. Huit jours après, rapidement les ~~gonflement~~ symptômes se transportant du genou qu'ils abandonnent à la hanche gauche où ils se montrent quelques temps. Ils s'amendent peu dans la suite et le malade peut sortir ; mais vers le 4 ou le 5 février, au soir, dans le mouvement, le malade se

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Aff. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F°

sentit dans tout le côté gauche une sorte de raideur fixe
Depuis ce temps le malade est de fourmillement dans tout le
côté gauche du corps ; il a de l'engourdissement quand il se
lève avec faiblesse et une sensation de froid limité au côté
gauche. Le malade souffrait à ce qu'il mange ; il y a des
jours qu'il ne prend rien. Le vomissement apparaît le
malade se réveille ; alors il éprouve en même temps la sensation
de froid — epitalgie fortes habituelle à maximum au niveau
du bord antérieur de la tempe ; cette epitalgie est limitée au
côté droit du corps ; constipation, langue blanche,
envie de vomir

Actuellement à l'examen rien au cœur, rien au
poumon si ce n'est de la faiblesse de la respiration à droite et
de la respiration supplémentaire à gauche

La motilité paraît intacte des deux côtés, cependant, le membre
gauche est plus faible que le droit ; on éprouve peu de résistance
pour écarter les jambes sur la cuisse. Le réflexe rotulien paraît un
peu augmenté du côté gauche ; un peu de trépidation épileptoïde
du même côté lorsqu'on fléchit fortement le pied ; le réflexe
crémastérien paraît nul

La sensibilité normale du côté droit ; atteinte du côté gauche
Sur tout ce côté la sensibilité tactile est notablement diminuée
, le malade sent les fourmillements extérieurs, la sensibilité
à la douleur et à la température sont également contenues
, le moindre contact est perçu de ce côté sous la forme d'une
sensation de froid et de douleur ; autrefois la nourriture brûlait
le malade, en mangeant, lui faisait éprouver très vivement sur le
côté gauche de la bouche mais rien aujourd'hui.

Les réflexes restent difficilement éveillés ; il survient des
crampes avec une sensation de froid dans tout le côté gauche

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

au même temps, le malade est pris d'étourdissements et souvent il vomit — Le malade se plaint de douleurs à la deglutition

A la palpation on sent une augmentation manifeste de la ~~chaleur~~ température du côté gauche, le trajet de la jugulaire paraissant saillir sous la peau gonflé. L'œil gauche est moins ouvert que le droit

Douleur à la pression sur le sus-hyoïdien gauche à côté de la pomme

17 février — Il vomit toujours à ce qu'il prend. Il a toujours de la fièvre, la tête et le cou

15 février — Hier soir de 5 à 6 frissons, puis vomissements, mains la tête. Quand il a bu pour aller à la selle, il a vomi. Il a vomi trois fois du côté gauche

16 février — Le malade n'a pas eu de frisson, il a vomi encore ce matin

18 — Cette nuit, incontinence d'urine — On ne sait pas s'il a eu de selles

19 — Vomissements à nouveau, délire nocturne

21 — De 4 à 9 heures du soir depuis 3 jours agitation et délire; vomissements — Depuis 6 heures du soir hier le malade a le hoquet. Incontinence d'urine et de matières fécales —

22 — N'a pas vomi depuis 2 jours — Le hoquet a cessé tout à fait, il a eu seulement quand il buvait — Depuis hier soir l'agitation a fait place à un état d'abattement bien marqué — Répond aux questions qu'on lui adresse, a conscience d'avoir été vu

23 — Cause de l'émissement; le hoquet est permanent, spasmodique. Pas de vomissements. Incontinence d'urine — Sommeil agité — Le hoquet a lieu à chaque inspiration; l'expiration est prolongée et accompagnée de gémissements — Pouls = 112 R = 28 — Dans les mouvements communiqués à droite on détermine la douleur des 2 muscles sus-hyoïdiens; à certains moments la douleur est plus marquée — Répond mieux aux questions qu'hier

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Le malade meurt à 5 h. du matin sans avoir, dit la veilleuse, craché du sang.

Autopsie 30 heures après la mort.

Cerveau : Rien aux sinus ni à la dure-mère.

1° Le cerveau enlevé & posé sur sa face externe, on voit : Un exsudat qui occupe toute la base ; dans les points où il est mince on voit très nettement les granulations tuberculeuses suivant le trajet des vaisseaux ; dans les points où ils sont épais, tels qu'au niveau du chiasma du tuber cinereum, de la fosse sylvienne, les granulations ne se voient que lorsqu'on a gratté les exsudats — Pas de noyaux purulents —— Il est très difficile à cause de l'épaisseur des exsudats, de séparer la partie antérieure du lobe sphénoïdal, aussi bien à droite qu'à gauche.

2° On enlève l'estomac & le cervelet = on trouve beaucoup d'exsudat au niveau de la fente de Bichat.

3° On sépare les hémisphères = Il s'écoule une quantité notable de liquide des ventricules situés à droite.

4° Hemisphère gauche = Quelques granulations tuberculeuses à la face interne de cet hémisphère, le long des branches & du tronc de la cérébrale antérieure ; pas un point de granulation sur la face externe — En Broca on trouve de la trouve de granulations confluentes formant un plaque — L'exsudat où les granulations sont le plus abondantes est dans la scissure de Sylvius, tout le long des branches & du tronc de la cerebrale moyenne ; là on trouve des masses granuleuses, englobant les vaisseaux mais ne les oblitérant pas —— Rien aux corps de Pitres — Quand on enlève les méninges on voit à la face interne des saillies formées par des granulations, abondantes surtout dans la scissure de Sylvius mais pas adhérentes à la substance cérébrale.

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, Intercalaires. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Reins = Granulations tuberculeuses disséminées dans la substance corticale.

Rate = Même lésion. — Pas de signe de péritonite — pas d'hyperémie dans le péritoine.

Foie = Rien d'anormal.

Estomac = id.

Cœur = id.

Estomac = id.

Poumons = 150 gr environ de liquide citrin dans chaque plèvre.
La plèvre droite présente à la portion moyenne de sa face postérieure, une cicatrice étoilée, signe d'une ancienne pleurésie — Elle est épaissie sur une grande étendue. — Il est impossible de séparer la plèvre pariétale de la plèvre viscérale —
Les deux poumons sont remplis de granulations tuberculeuses, dont la plupart, récentes, ont l'aspect gris et sont demi-transparentes.

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, Intercalaires. — 11-82. — 10.000.

Impr. Ad. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

5e Hémisphère droit : Le cap calleux paraît unibité — Cet hémisphère offre suivant les points qu'on considère un aspect très-variable ; il y a des granulations isolés, des masses et des
Dans la scissure de Sylvius, les exsudats sont abondants ; à côté de granulations isolés on trouve des masses granuleuses tibuleuses, recouvrant mais ne les oblitérant pas ; ces masses représentent par de véritables plaques mais néanmoins la substance centrale adhère à leur niveau.
A la partie antérieure du lobule de l'Insula on trouve une plaque granuleuse semblable à celle qui va être décrite à la face interne de l'hémisphère, elle a l'étendue d'une pièce de 0,20 cent. ; au niveau de laquelle adhère la substance cérébrale.
Sur toute la face externe de l'hémisphère on trouve des granulations disséminées elles sont très-rares à la partie postérieure.
A la face interne on voit la cérébrale antérieure accompagnée de granulations surtout son parcours, au point où cette artère arrive à la partie moyenne et inférieure de la 1re frontale, les granulations deviennent très-confluentes et forment une plaque qui se confond avec celle qui se trouve à la partie postérieure et supérieure de la même circonvolution — Cette plaque, qu'on voit très en place à l'hémisphère a sa face interne de 1 à 2 cent. dans le sens transversal, 2 à 3 dans le sens antéro-postérieur, elle a un aspect blanc, a bord irrégulier, à sa surface on voit nettement les granulations tuberculeuses
Quand on enlève les méninges, on trouve sur la surface inférieure des granulations tuberculeuses qui faisant saillie ; ces granulations sont très-confluentes au niveau des plaques, on a pu remarquer quand on essaye d'enlever les méninges, on enlève en même temps la substance cérébrale — En soulevant les méninges on les voit, au niveau des plaques, éparties et plongeant dans les sillons sous forme de brides — Rien aux corps de Pitres.

Isthme & Cervelet : Le cervelet est pâle, anémié —
La coupe du bulbe, de la protubérance et du cervelet ne donne absolument rien à signaler —

SCD Lyon 1

Modèle N° 61.

Nom Camille De Angelis Ste Jeanne 13.

	Pouls	Chaleur R. C.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	210	34.0 42,5		Février 85												
	200	33,6 42,0														
	190	33.2 41,5														
	180	32,8 41,0														
	170	32,4 40.5														
	160	32.0 40,0														
	150	31.6 39.5														
	140	31,2 39,0														
	130	30.8 38.5														
	120	30,4 38,0														
	110	30,0 37.5														
	100	29.6 37,0														
	90	29,2 36,5														
	80	28,8 36,0														
	70	28,4 35.5														
	60	28,0 35,0														
	50	27,6 34,5														
	40	27.2 34,0														
	30	33,5														

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Faverjal Salle Ste Jeanne Lit N° 10 F°

Prénoms François

Age 27 ans

Profession journalier

Né à St André en Chalençon

Demeurant à Lyon

Entré le 5 Mars 1885

Sortie le 19 Avril à 6 h. du soir

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

GB.

Meningite tuberculeuse

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Père et mère morts alors que le malade était encore en bas âge — Ne put donner aucun renseignement sur eux — Ignore l'âge auquel ils sont morts — Dans tous il a perdu tous ses frères et sœurs —

Bonne santé habituelle — Ne se rappelle pas avoir jamais eu de fièvre — Pas de refroidissements — Pas d'accidents sur la tête — Pas de céphalée — Pas de vertiges — Pas de chute sur la tête — Pas de coups —

Il y a un an à la suite d'un refroidissement, devint gêné pour tousser et cracher — En même temps il ressentait dans la tête une douleur qui s'exagérait beaucoup au moindre effort — Néanmoins le malade n'a pas cessé son travail — Depuis cette époque les symptômes se sont beaucoup exagérés — La douleur dans la tête est devenue si forte qu'elle est presque continue — Actuellement le malade ne peut plus travailler — Il est obligé beaucoup maigri — Les paupières sont tombantes et cernées, les joues sont —

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000. Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° Fo

excoriés – Doigts hippocratiques – Yeux très offusqués ; Ne peut rien
de rien prononcer qui lui tombent la face et la partie de qui s'est
tiré tout pendant son sommeil – L'affaissement est considérable – Ne veille aucune
régression – Pas de diarrhée –

A l'examen du thorax à la percussion on arrête en arrière de la
matité aux deux sommets restant à gauche – A l'auscultation
on entend avec la respiration rude et soufflante aux deux sommets –
On entend en outre quelques craquements humides bruyants des sommets
à gauche – Quand on fait tousser le malade on perçoit des deux côtés un
retentissement métallique très accompagné – A l'inspiration profonde qui
suit la toux est accompagné de craquements très nombreux – Pas de
modification de la voix – Encrachat la sonorité est à peu près conservée
sous la clavicule – Pas de bruit de pot fêlé – A l'auscultation on trouve
les mêmes phénomènes qu'en arrière – R: 44.

A la palpation de la région précordiale on trouve le point choc dans le
6ème espace en dessous du mamelon – Pas de bruit anormal à l'auscul-
tation – Les deux temps sont nettement frappés – P: 100 petit filiforme –

Les urines ne contiennent ni sucre ni albumine –

12 avril – Se plaint depuis plusieurs jours d'un mal de tête violent très pesant – au
front à l'occiput, douleurs lancinantes et continuelles ayant existé à
la gauche à la tempe – Pas de troubles oculo-pupillaires –
Raie du côté de la mucosité à la matité, pas de cris d'aucune espèce –
Cette mort vraisemblablement survenue en dehors des périodes de fièvre.

1er – Les douleurs des reins ont été calmées par l'application d'un vésicatoire à la région
Pas de commencement ; Pas de paralysie de la vessie ni de la sensibilité –
Rien aux globes oculaires –

18 – Coryza – Toux, nasonnement – Respiration pénible – agitation, cauchemars –
Pouls une minute et quelques secondes ; les pulsations sont très fortes, la
peau chaude ; une minute après la respiration s'arrête, la pupille se contracte
une minute après elle se dilate – Les pouls et la respiration sont

Nom Salle Lit N° 10 F°

ses longues de 8 secondes — Les périodes d'hyperpnée durent de 5 à 6 secondes —
Bourgeons tors les membres — Répond à toutes les questions qu'on lui pose —
Les réflexes rotuliens sont bien diminués et même supprimés ; par de trépidation ;
persistance des mouvements volontaires & des réflexes cutanés — Perte de sensibilité
dans tous les sens — Répète l'injection de morphine faite la veille, tranquille.
P= 76.

19 Mis encore à 7 h. de l'après midi, le malade était bien pour aller à selle
et part au matin 2 fois — Quelques heures plus tard il répondait bien aux questions
qu'on lui posait et les expectorations présentent les mêmes phénomènes sauf qu'elles
sont moins longues — Quand on excite le membre supérieur droit, il retombe absolument
— Les yeux sont portés un peu en haut, la pupille médiane & animée
d'oscillations mouvements automatiques lents — Quand on fixe le membre
supérieur droit il le retire aussi bien — Vasculosation des conjonctives, pas
d'inégalité pupillaire — Il retire les 2 membres sous l'influence des piqûres
du pied — Les membres inférieurs sont dans la résolution et retombent quand on
les soulève mais le droit plus lourdement que le gauche — Rale trachéaux —
En piquant la sous-clavière il ferme les yeux, plus l'œil gauche
que l'œil droit — Pas de mouvement de la face — Le membre sup. droit
qui est décoiffé est plus fort que le gauche ; pour les membres inférieurs qui
sont corrects, c'est le contraire —

20 Mort à 6 h. du soir, sans avoir repris connaissance

Autopsie le 21 avril — à l'ouverture du crâne on
trouve pas d'hémorragie à la face interne — sur la pie-mère
épaissie nombreux abcès hémorragiques — Les méninges
englobent les nerfs et les vaisseaux à la base du cerveau —
Les ventricules les vaisseaux sont encore perméables — On trouve
aussi pas de pertes — que l'hémorragie des méninges a
respecté de Sylvius et la partie antérieure et inférieure
de la région interhémisphérique — Les méninges sont
très vasculaires et présentent des exsudats et des granulations

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Le long du raisseau — Quand on ouvre les deux hémisphères on voit s'écouler une grande quantité d'un liquide rouge qui remplissait les ventricules latéraux — A la face interne des hémisphères quelques rares granulations plus apparentes à la face adhérente à la pie mère —

Sur la face externe des hémisphères les enfoncements sont très nombreux et très adhérents à la substance cérébrale ; on y voit par ci par là tubercules, plus apparents à la face adhérente des enfoncements —

Des deux côtés les enfoncements sont profonds à droite dans la substance cérébrale au niveau de la corne sphénoïdale — à gauche au niveau du pied des circonvolutions frontales et pariétales ascendantes elle présente une petite masse de tubercules agglomérés qui correspond à une petite dépression de la substance cérébrale — Les tubercules sont plus nombreux sur l'hémisphère gauche que sur le droit — Les coupes de fibre n'offrent rien de particulier —

Rien au cervelet si ce n'est que les enfoncements sont clairsemés et présentent des tubercules surtout en arrière et sur les bords de la grande fente de Bichat — On ne trouve dans le cervelet ni dans le cerveau aucune tumeur ni aucun gros tubercule —

Au niveau de la protubérance annulaire et du bulbe les enfoncements sont garnis de petits tubercules comme au niveau de la base du cerveau —

Les Reins 140 gr. et 145 gr. n'offrent rien de particulier —

La rate est un peu volumineuse 240 gr.

Le foie est volumineux et un peu gras 1650 gr.

Le cœur présente des caillots fibrineux récents dans le ventricule droit et dans l'artère pulmonaire — Au niveau de la partie antérieure du point d'union des valvules tubercules des sigmoïdes de l'aorte on trouve une grosse végétation ancienne et absolument fibreuse — Pas

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Ce liquide d'aspect = L'aorte est absolument saine = Poids 320 gr.
Les poumons sont très volumineux, remplis et distendus. Les lobules sont plus prononcés à gauche. A côté de petits noyaux pâles et circulaires on trouve de petites altérations d'un autre genre très développé = Au sommet à la coupe on trouve quelques cavernes entourées de tissu fibreux = au centre beaucoup de granulations disséminées sans forme de grandes grosseurs et mêlées de coupoirs également d'une teinte fibreuse = Sur quelques parties il y a des lésions récentes d'une forme pneumonique mais plus rares et localisées =
Les ganglions trachéo-bronchiques sont volumineux et présentent de granulations avec transformation fibreuse à la périphérie =
Rien de côté des organes génito-urinaires =

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, Intercalaires. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Drettaz Salle 4e femmes Lit No 32 Fo

Prénoms Anne Marie

Age 28 ans

Profession Menagère

Né à Drettaz Savoie

Demeurant à

Entré le 6 Juin 84

Sorti le Mort 17 Juin 84

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Meningite Tuberculeuse

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Beaucoup de Toux nocturne

Parents morts de maladie inconnue. 4 frères vivent à l'étranger

Pas de scrofule dans l'enfance. Aucune maladie

Menstruation reglée depuis l'age de 15 ans.

La Malade s'est mariée à 22 ans. son mari éprouve beaucoup, crache du sang, il appartient à une famille de tuberculeux. Ils ont eu 2 enfants. Le 1er est mort du croup. Le 2e a 7 mois. elle le nourrissait.

Il y a 17 jours la malade fut prise brusquement d'une céphalée violente siegeant dans le front, qui ne l'a pas quittée depuis ce moment. Cette céphalée continue persistant pendant la nuit empêche le sommeil. Elle arrache des plaintes continuelles à la malade. L'appetit est complètement perdu. La langue est rouge sec, tremblante de bon épaisseur est encore

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000. Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ Fo _____

Amnésie de fixation - Tuberculoses des séreuses & des
ganglions - Pas de vomissements. Eg. nausées en ces jours
Le Facteur fait sans cesse grimacer sa face - Les yeux
sont tenus fermés - Les pupilles dilatées sont égales
(bon réflexe de convergence)
La respiration est décelée superficielle Ce malade fu-
me, s'attend rapidement. 48 Le pouls est petit
faible régulier peu rapide 96 - La peau est sèche
brûlante. T° 40°8 - La malade est agitée respire
bruyamment un peu de cyanose - Vomissements
fréquents - La face est rouge très colorée - Pommettes
Elle a eu des délires ces 2 dernières nuits - Actuellement
elle répond bien aux questions - elle accuse une sensation
de faiblesse excessive - une grande envie de dormir - pas
de prostration -
Elle dit s'être fait ça en se frictionnant - Elle ne mange
rien, vomit tout ce qu'elle prend - Epistaxis peu abondante hier
Les urines contiennent un abondant précipité blanc
à l'examen. Au thorax, on ne note rien d'anormal.
Un peu de submatité aux bases en arrière, mais la
respiration s'entend bien partout - pas de ronchus ni
sibilances à gauche surtout en avant
Les battements du cœur sont un peu sourds, mais la
matité précordiale n'est pas augmentée, il n'y
a pas de bruits anormaux
Le ventre est souple un peu douloureux dans le bas
fosse iliaque - Diarrhée Pas de gargouillement à gauche ou
La douleur est plus vive -
1 Foyer suspect douteux dans le 2e espace intercostal
gauche -
La Rate semble légèrement augmentée de volume

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

4 J. Persistance du même état. Douleurs de tête exaspérées. T 39°2 ce matin
Ventre souple indolent, un peu plus de douleur à gauche. Pas de gargouillements.
Dans ce mouvements des membres sont libres. Abolition des reflexes. Pas de raideur de la nuque.
Rien à l'auscultation des poumons.
La Malade se couche en chien de fusil sur le côté. Photophobie. Les paupières se contractent bien.
Pas de déviation des yeux.
Pas de vomissements ni même de nausées.
Ecrire méningite grave.
P 1000 - R 24

10 J. La Malade crie sans discontinuer. Elle accuse de douleurs dans les épaules plutôt que dans la tête. Elle ne s'est rendue ni sur elle même ni de la purgation. Elle n'a pas uriné depuis hier et n'a pas uriné dans la nuit.
Elle reste couchée en chien de fusil. Subdelirium.

11 J. La Malade a été calme hier. La T s'est abaissée à 38 C ce matin. Douleurs de tête persistantes.
Pas de vomissements. Hyperesthesie generalisée.
Douleurs articulaires. Pas de contracture.
Photophobie. La Malade reste couchée en chien de fusil. Stupeur. Une selle. Urine peu.

12 J. Les douleurs articulaires semblent moins vives. Elle geint un peu moins. Hyperesthesie generale. Elle se plaint davantage de la tête. Elle est calmée par les injections de morphine à trois reprises.
Pas de vomissements. Elle est allée à deux reprises

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Elle a vomi.

14 j. Même état. Douleurs de tête extrêmes. Le malade se plaint toujours. Douleurs à la nuque. Décubitus sur le côté, en chien de fusil. Abolition des réflexes tendineux. Contracture. Pas de raideur. Sueurs profuses depuis hier.

Le 15e jour le malade est morte sans convulsions, ni agitation. Conscience conservée jusqu'à la dernière minute. Elle a vomi encore une dernière fois.

15 j. A l'autopsie. On enlève le cerveau de la tête en respectant facilement les adhérences. On observe l'état de mollesse de la substance cérébrale.

A la base, le gonflement des circonvolutions et artères sont entourés de granulations tuberculeuses.

On note l'adhérence des méninges, facilement séparées, leur état de sclérose contrastant avec la grande abondance de liquide contenu dans les ventricules.

Les méninges sont parsemées de tubercules, mais on note une prédominance très nette de granulations tuberculeuses à la partie interne et inférieure du lobe occipital du côté droit.

Rien d'anormal à la coupe du cerveau.

Aux poumons à gauche on ne note rien d'anormal au lobe supérieur, mais à la partie supérieure du lobe inférieur on note l'existence d'un grand nombre de petits nids de congestion. Le parenchyme

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

à l'aspect d'un tissu semblable à celui de noyaux d'un fibrome.

A toute sa note sur toute la périphérie des clots de tuberculose pleurale, confluents surtout dans les sections intermédiaires - à ce niveau les nombreux ganglions sont jetés d'un clot à l'autre contiennent eux-mêmes des granulations tuberculeuses. Chacun de ces petits clots est constitué par une petite masse centrale d'où partent en rayonnant de fines travées de granulations.

Dans le lobe supérieur droit on retrouve à la coupe la même disposition de noyaux de broncho-pneumonie. Mais dans le lobe inférieur la congestion est généralisée les lobules se dessinent nettement séparés les uns des autres comme un pavé de la bronche principale.

On retrouve des plaques broncho-pneumoniques dans la moitié supérieure du lobe inférieur droit.

Le cœur 280 g. est assez gros - il n'y a pas de cœur d'artère - mais péricarde épaissi est un peu hypertrophié, elle donne au toucher une sensation de sclérose - cet état paraît surtout exister sur le g. cardiaque sous l'endocarde la valvule tricuspide

Les Reins 130 et 150 g. sont volumineux congestionnés mais la capsule épaissie est très adhérente, permet à peine la décortication - Il semble y avoir des altérations interstitielles.

La Rate 220 g. Le foie 1k 150 g. ne présentent rien d'anormal

Rien du côté des poumons, rien du côté du P. Thoracique ni de ses annexes

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, Intercalaires. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Lichezeit Salle Ste Jeanne Lit N° 3 F°

Prénoms Jean

Age 34 ans

Profession Guillochent

Né à

Demeurant à

Entré le 1er février 86 -

~~Sorti~~ le

décédé le 4 février 86

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite tuberculeuse (?)

Chef du service M

OBSERVATION CLINIQUE.

Elève interne M.

Le malade dans le coma est amené par une de ses camarades qui ne peut donner aucun renseignement sur les antécédents. On sait seulement qu'il n'a fait de habitudes alcooliques. Cet malade rentré le 4 à 5 heures. Il s'est plaint de maux de tête ; n'a jamais vomi, et n'a fait de diarrhée.

Le 31 janvier au soir, il parlait encore et marchait bien en titubant. Cependant, dans la journée, il titubait et marchait en se cramponnant tout d'un coup il tomba dans l'état où on l'a vu.

Jamais il n'a eu de vertige de vomissements ; mais au moment où il est tombé, il s'est mordu la langue.

Actuellement, il est dans un état de demi-coma. Il est couché en chien de fusil — il croise bien les bras, et il résiste légèrement quand on veut lui prendre la température. Il est très agité.

Le ventre est légèrement ballonné — rien aux poumons qui n'explique l'agitation, ou en tout cas, très diminué.

Il urine très difficilement.

Imp. Vitte et Cie Lyon

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

Respiration Bertrand. T.R.M. 38.2. P=68.

Dans ce journal, comme dans mes autres passages

Pièces anatomiques.

3 février. Le malade est dans le coma complet. Respiration Cyé. Bertrand

R=48 — P=118.

Mydriase. Dès le lendemain de l'accident, on a observé

comme réflexe cornéen très fort, on voit cependant

des cils clignoter de temps en temps.

Autopsie — A l'ouverture du crâne on remarque les méninges

un peu plus épaissies et plus adhérentes qu'à l'état normal —

Un peu de congestion des vaisseaux — Intégrité des artères de la base

Sur la pie mère et principalement au niveau des scissures de Sylvius

petites granulations miliaires ressemblant beaucoup à de petits tubercules.

De chaque côté du bulbe, une agglomération de petits nodules convert

mais dépendant probablement des plèvres choroïdes —

Aux poumons. A droite nombreuses adhérences au sommet. Qqs. lésion

anciennes, scléreuses ou calcaires avec un commencement de dilatation

bronchique à leur niveau.

Dans un autre point, un tubercule de la grosseur d'une fève

récents, déjà caséeux et cependant

entouré d'une coque fibreuse. Autour de lui qq tubercules semblables

plus petits. Au-dessous de lui une branche se termine par un un petit

nodule caséeux — En arrière de ce lobe, broncho-pneumonie — Cette partie

surnage pas — Lobe inf. atélectasié avec qq emphysémateux.

A gauche: Un peu de liquide dans la plèvre — Un peu de broncho-pneumonie

moins marquée qu'à droite — Atélectasie et emphysème disséminés par

Au sommet un nodule tout à fait crétacé —

Emphysème très marqué sur la languette inf. du lobe sup. paraissant

certain point interlobulaire —

50 grammes environ de liquide dans le Péricarde — Rien au cœur — Rien dans les autres

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Nachon Salle 4me femmes Lit N° 39 F°

Prénoms Virginie

Age 20 ans C

Profession Couturière

Né à Fourg (Doubs)

Demeurant à rue des Argues 12.

Entré le 4 juin 1886

Sorti le 8 juin 86

décès

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Tuberculose aiguë

Méningite tuberculeuse

Chef du service M.

OBSERVATION CLINIQUE

Elève interne M.

Père mort à 76 ans, d'accident ; mère bien portante. 2 frères et 3 sœurs bien portants. Deux frères morts à 4 ans et à 2 ans, probablement de rougeole.

Réglée à 16 ans ; menstruation ordinairement régulière la mal. est ancienne de 7 mois.

Pas de scrofule dans l'enfance ; pas d'adénites cervicales ; Pas de syphilis, pas d'alcoolisme. Jamais de rhumatisme.

Bonne santé antérieure. La mal. n'est v

Au mois de janvier de l'année dernière, elle aurait eu une bronchite, pour laquelle elle serait restée alitée pendant une quinzaine. Elle toussait beaucoup mais n'aurait pas craché de sang.

Depuis qu'elle a eu cette bronchite, elle est beaucoup plus faible qu'auparavant. Cependant, pendant toute l'année dernière elle ne toussait et ne crachait pas,

Imp. Vitton et Cie. Lyon

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

mais elle était facilement atteinte de dyspnée surtout quand elle faisait l'effort au moment ses selles.

Depuis 15 jours, elle tousse de nouveau, surtout pendant la nuit. Pas d'expectoration. Pas d'hémoptysie.

Vomissements fréquents dans la journée et la nuit. Selles abondantes.

Amaigrissement très notable. L'appétit a presque complètement disparu. Nausées et quelquefois vomissements après les quintes de toux. Pas de diarrhée.

Céphalalgie fréquente.

A l'auscultation des poumons on entend bien la respiration; on n'entend nulle part des craquements ou des râles au sommet gauche.

Au cœur les battements sont réguliers: Pas de bruit anormal. Jamais d'odème des membres inférieurs. Pouls régulier.

Rien du côté de la miction.

Rien dans les urines.

7 juin soir — Depuis deux heures de l'après-midi, la malade est très agitée elle ne parle pas et ne répond pas aux questions. Elle est très pâle.

Les deux pupilles sont un peu dilatées.

Pas de paralysie, ni de contracture des membres. Quand on imprime aux membres des mouvements communiqués, ils restent dans la position où on les a placés.

Les réflexes rotuliens sont conservés, et même un peu exagérés, surtout à gauche. Trépidation plantaire des deux côtés plus marquée à gauche.

Pouls 80.

8 juin. — A 5 heures du matin, la malade meurt. On fait l'opération césarienne. Le fœtus est mort.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

9 juin

Autopsie. Poumon. Les poumons sont petits. Adhérences aux parois des deux côtés surtout vers la base.

Dans le P poumon, surtout au sommet gauche, tubercules récents assez nombreux, réunis en îlots assez volumineux.

Le cœur est petit; le ventricule est à paroi mince, il paraît dilaté.

Foie. Le foie est assez volumineux il présente très nettement de la graisse au centre du lobule, autour des veines sus-hépatiques.

Rate très ramollie.

Reins, les reins présentent l'un et l'autre des abcès tuberculeux de assez grande dimension, de la grosseur d'une noisette environ, ~~tubercule~~ n'ont surtout au niveau des pyramides, mais un peu aussi dans les colonnes de Bertin ou dans la substance corticale. Outre ces abcès caséeux de grande dimension on rencontre des tubercules plus petits, dont quelques uns ne dépassent pas la grosseur d'une tête d'épingle.

Ovaire gauche avec coque fibreuse. Trompe non adhérente. Du côté droit la trompe est adhérente à l'ovaire.

Cerveau. Sur la face supérieure du cerveau les méninges sont épaissies, et recouvertes de exsudat, surtout en avant ~~de~~ de la protubérance, et sur la protubérance elle-même. Dans tous deux côtés, dans la direction de la scissure de sylvius on rencontre des granulations tuberculeuses assez nombreuses de la grosseur d'1 petite tête d'épingle. Au niveau de la 1ère circonvolution temporo-sphénoïdale, pié de la corne sphénoïdale, tubercule de la grosseur d'1 pois gris, qui s'est énucléé ~~spon~~ ou a enlevé les méninges. La substance de ce tubercule est sur la coupe, de couleur jaune verdâtre avec stries concentriques. Elle est assez dure.

En un point symétrique du côté opposé, ramollissement,

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

de la substance cérébrale.

Dans le cervelet : tubercule, pris de la face supérieure du côté droit.

Protubérance. Sur la face supérieure de la protubérance épaississement des méninges avec exsudat et coagulation veineuse très nette, sous forme de gros cordons noirâtres. Les coagulations veineuses se poursuivent même sur les vaisseaux plus petits qui pénètrent dans l'intérieur de la protubérance. La protubérance est ramollie et forme une bouillie entièrement hémorragique, surtout à la partie supérieure où toutes les parties constituantes de la protubérance sont altérées. Plus bas les faisceaux pyramidaux paraissent intacts, presque entourés par les parties ramollies.

Le ramollissement pénètre jusqu'au 4e ventricule du côté droit.

Bulbe : organes. Foie 1750. Cœur 210. Rate 140. Rein G et D. 160. — Fœtus 2 K.

La substance cérébrale ramollie examinée à l'état frais montre des capillaires dont les parois sont légèrement moniliformes avec des granulations graisseuses en plus ou moins grand nombre surtout au voisinage des vaisseaux de la paroi.

Pas de corps granuleux de Glage.

SCD Lyon 1

4e Femme n° 39

Modèle N° 61.

Nom Nachon Virginie

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	S 6	E 8
95	210	34,0 42,5		
90	200	33,6 42,0		
	190	33,2 41,5		
80	180	32,8 41,0		
	170	32,4 40,5		
70	160	32,0 40,0		
	150	31,6 39,5		
60	140	31,2 39,0		
	130	30,8 38,5		
50	120	30,4 38,0		
	110	30,0 37,5		
40	100	29,6 37,0		
	90	29,2 36,5		
30	80	28,8 36,0		
	70	28,4 35,5		
20	60	28,0 35,0		
	50	27,6 34,5		
10	40	27,2 34,0		
	30	35,5		

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles. N° 102

Nom Léopold Reynier.
né à Privas (Ardèche)
demeurant à
profession cordier
âge 20 ans.
tempérament
constitution
entré le 7 Nov. 72
sorti le Depuis l'âge de 5 ans, suites de tel jugement de toise — Paraît de cinq / ou d'onze / ou de l'excitation

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Incurvation du bulbe de la prostate urinaire

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

famille bien portante. Bonne santé antérieure, ni rhumatisme, ni syphilis. Jeune marié de Mars dernier. Le malade remonte un matin de toute sa force, il ne sentait pas de douleur dans les membres de la cuisse, l'objet qu'il tenait à la main lui échappait. Il dut à cette époque garder le lit pendant 15 jours, d'après les renseignements qu'il donne et un avis de médecin que le soignait il avait une paralysie de tout le côté gauche. Bien mais et dans le mois après le début de l'accident, le malade fut repris de tout le côté gauche paralysie du côté droit, mais à un moindre degré. Les bout d'y mois et demi, il dut suspendre de tout travail pendant tantôt le temps de la marche gauche

Lyon, Imp. veuve Bonnaviat et fils

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Lumais de douleur dans les membres. Actuellement le malade se plaint d'une douleur très pénible dans la moitié droite du corps qui se prolonge jusqu'au poignet. Il existe un affaiblissement notable de la sensibilité tactile. On peut piquer le malade avec une épingle sans qu'il s'en aperçoive. La sensibilité ne paraît altérée en diminution dans aucune à la température. Les mouvements de l'avant-bras de la main, sont conservés, mais le malade prétend qu'il a perdu la force, cependant on s'aperçoit qu'il peut serrer la main. Lorsqu'il veut faire des mouvements, il est obligé de regarder, sinon il ne peut les exécuter; par exemple il ne peut saisir un objet et le porter à la bouche, ou le placer dans une poche de la main, il ne peut le ramener à la vue. Il a une bonne haleine et ne mord pas et ne paraît pas avoir perdu la mémoire. Il ne peut dessiner avec la main droite, il est obligé de se servir de la main gauche. Le malade accuse en outre des troubles de la vue. Il a perdu de l'ophtalmie tendant lorsque la lumière est vive la vue est alors très nette. Ces troubles de la vision étaient beaucoup plus marqués au début de la maladie. Ils s'accompagnaient alors de vomissements, de ballonnement du ventre.	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles N° 102

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Un peu avant le membre inférieur gauche paraît peu diminué, il supporte seul pendant le poids du corps et cela le malade ayant la vue fermée, le malade a plus de peine à se tenir sur le membre du côté sain, car alors l'autre membre ne tente pas immédiatement et le malade est obligé de tâter pour ne pas s'appuyer sur le sol.

Le membre est paralysé, le malade pose et relève la jambe, c'est lourd, il veut tourner seulement, qu'il titube et paraît peu solide.

La sensibilité au chaud et au froid est conservée dans le membre supérieur et dans le membre inférieur, mais la sensibilité à la douleur. Mais la sensibilité tactile ainsi que la sensibilité musculaire sont subies de troubles profonds. Lorsque le malade ne voit pas, il ne peut se rendre compte de l'état de sensibilité, c'est ainsi que, lorsqu'il prend la jambe ou le pied gauche, il ignore ce qu'il lui fait.

Lyon Imp. veuve Bonnaviol et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Lundi [illegible] les membres, le déplacement [illegible] dans un sens ou dans autre, il ne faut indiquer la direction, la direction il ne faut à quelle direction il se trouve du membre [illegible] Maintenant réfléchir comment le côté gauche du tronc reçoit également de toutes de la sensibilité toutes, qui ne s'augmentent à mesure qu'on se rapproche de la ligne médiane [illegible] et de la colonne vertébrale [illegible] Du côté du membre supérieur [illegible] toutes de la sensibilité. toutes et membre sont très augmentés Il existe peu de paralysie de sentiment, la mémoire [illegible] une demi-heure. la force est notablement diminuée le malade tient [illegible] également obligé [illegible] mais il obéit [illegible] mouvements. Le malade se plaint de voir double. Il peu d'inégalité des 2 pupilles.	
5 Mai 73	— Le malade se plaint toujours de la tête front Sourd — Hoquet — Mêmes phénomènes que les jours précédents —	
6 Mai 73	— Le malade présente les mêmes symptômes hoquet — Contractures persistance du hoquet — le malade pousse Continuellement des Cris et ne paraissant pas avoir Connaissance de ce qui se passe autour de lui — Ce matin affaissement considérable — Le pouls est imperceptible la peau [illegible] pâleur Glaces — Le hoquet persiste — Les pupilles sont à peu Closes les globes oculaires tournés à droite la tête toujours inclinée à gauche — Ce qui a empêché pour la Examen le pouls à cet moment [illegible] cela opposé — Ne répond pas aux questions — Respire régulièrement paraissant souffrir et au moment où il contracte les muscles de la face on visite les Paralysies du côté droit — Les 2 membres sont à peu près dans la résolution complète [illegible] les mouvements à droite. Cependant les membres sont susceptibles de recevoir des impressions à certains moments il paraît agité et [illegible] délirant [illegible]
	Respiration irrégulière	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles *N°* 102

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

24 Fév. 1873.

Depuis un mois environ, l'état du malade s'est aggravé, la toux de la sensibilité et de la motilité de tout étendue a été suivie du côté du malade. Il avait eu de temps en temps des vomissements qui tout dernièrement ont été plus fréquents et principalement après les repas. Dans ces derniers temps, le malade se plaint d'un refroidissement de froid, des membres inférieurs s'est mêlé à tantôt la cuisse, tantôt la jambe, tantôt au niveau de l'abdomen, à mesure que la bande remonte de l'épigastre au cœur.
Dans ces derniers jours de fortes douleurs, point de constipation.
Ventre ballonné, constipation opiniâtre, urine rare, brûlante et boueuse, peu abondante.
Pouls de tête continue, occupant la nuque et toute la région cervicale. Etourdissements, intelligence nulle, vue gênée, moment de

Lyon, Imp. veuve Bonnetat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Entrée de malade, mémoire commencée. Ordre habituel. Depuis qu'il est à l'Hôtel-Dieu, le malade a souffert à l'œil	
	Tout le côté gauche, forte contusion de la tempe,	de la tempe,
	front et, mentionné une ecchymose	la tempe et
	Tout le côté droit, même phénomène, mais à un	
	degré moindre, lorsque l'on touche le malade sur la	
	pointe, il comprime avec, il gémit, l'abattement, le	
	malade n'indique qu'une seule pointe au lieu deux	
à noter pour le pouls et la tem.	le malade est remarquable de marcher, lorsqu'on le soutient	
	fortement, il marche alors jetant les jambes en avant	
	et frottant la chaussure l'une contre l'autre, il a	
	pointe le talon tout devant, et pouvait devait tirer toute	
	le côté droit	
26 Fév.	Depuis 8, 9 jours, douleur de tête vive, douleur	
	à l'épigastre. Vomissements.	
28 Fév.	Envie le matin, dégoût d'hommes, vomissements,	
	avait mangé. Elle a été prise pendant	
	la nuit de malaise général, de céphalée	
7 Mars	Pour elle crie plus fort que les autres,	
	heures de diarrhée. Langue humide,	
	et pâle malade. Le pouls. Contracture	
	langue. Le nez. pour la dilatation de la bouche	
	et la rétraction du côté droit.	
	Rien de particulier pour le pied droit et	
	la main. Elle mange peu maintenant.	
	gémissements il a du côté droit,	
	Langue petite, rouge,	
12 Mars.	Mêmes. Pouls 60. Pas de fièvre, rien	
13 Mars.	Même état.	
14 Mars.	Plusieurs petites crises pendant la nuit	
16 Mars.	Pendant la nuit, cris, gémissements,	
	Langue pâle,	
	Pouls 62.	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1re Chirurgie *N°* 102

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

17 Mars Hagret tendu la nuit, tumeur [illegible] d'étranglement [illegible]
reposer; abcès, ouverte par fusion
25 Mars [illegible] peu de pus - la mort a été spontanée ou autre
Chirurg. donne -
28 Mars Dans la nuit, la mort a été [illegible] connaissance
il paraît a plaint [illegible] gémissements. Il a pris
dit il la tempe [illegible] de gauche [illegible] douleur, tuméfaction
entraîné à droite [illegible] le pouls [illegible] est [illegible]
battant [illegible] fonctions. Mouvement [illegible] de la main
par de délire [illegible] convulsif [illegible] vomissement
par [illegible] injection [illegible]
1er Avril [illegible] [illegible] fonctions [illegible] [illegible]
[illegible]
2 Avril Depuis [illegible] par [illegible]
10 Avril Rondelle [illegible] [illegible] pendant la nuit [illegible]
plaint de [illegible] [illegible] vivre. [illegible] long de [illegible]
Depuis [illegible] mort - [illegible] [illegible], [illegible]
complétant [illegible] [illegible]

Lyon Imp. veuve Bonnetial et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
12 Avril	Mme D. tête violente fermeture [illegible]	
	Diffusion dans le dos gauche [illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
17 Avril	[illegible]	
18 Avril	[illegible]	
	[illegible]	
21 Avril	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
25 Avril	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
27 Avril	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
30 Avril	[illegible]	
	[illegible]	
+	Voir plus haut le 5 et 6 Mai	
7 Mai 1873	Mort à 3 h. du soir	

SCD Lyon 1

Encéphaloïde du bulbe et de la protubérance — N° 102.

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Nécropsie 24 h. après la mort.

A l'autopsie les masses encéphaliques d'une manière générale sont volumineuses; cette augmentation de volume est surtout sensible sur la protubérance et le bulbe dont tous les diamètres comparés à ceux d'un cerveau sain sont notablement augmentés.

Lorsqu'on renverse le cervelet on aperçoit faisant saillie sur la face inférieure du quatrième ventricule deux tumeurs qui occupent le côté droit du bulbe. La plus petite est située à la base du triangle bulbaire et regarde légèrement à gauche le sillon postérieur de la seconde au niveau et un peu en dehors du Calamus scriptorius. Toutes deux sont dures bosselées, du volume d'une petite châtaigne la supérieure étant un peu plus grosse que l'inférieure. Leur surface de section est lisse d'une vert coloration jaune tirant sur le vert. (Coul. marron d'une coupe de foie) elles sont entourées d'une même zone congestive où existent évidemment des vaisseaux.

A première vue l'œil n'aperçoit à gauche du sillon médian. Cependant de l'examen attentif on constate que la substance bulbaire est soulevée en un point à peu près symétrique de celui que occupe à droite la tumeur de la base du triangle. Le doigt par la pression y révèle la présence d'un corps dur et bosselé que la coupe démontre être une tumeur de même nature que les deux premières: même volume, même coloration, même zone congestive; elle paraît se confondre avec la première tumeur du côté droit; mais le sillon médian les sépare.

Tout autour de ces tumeurs la substance nerveuse est notablement ramollie, caractère pathologique

Lyon Imp. veuve Bonnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Que on retrouve d'ailleurs quoique à un degré moindre dans le bulbe tout entier.

. . Les deux lobes supérieurs du poumon droit sont emphysémateux ; le lobe inférieur est congestionné. La densité est augmentée - à son niveau et dans l'espace interlobaire la plèvre viscérale présente des lamelles pseudo membranes assez étendues, noirâtres, irrégulières, mais ça et là d'épaisses exsudats fibrineux d'un blanc sale. Ces exsudats sont emprisonnés entre la plèvre et une pellicule de substance conjonctive : par le raclage on les enlève sans attaquer la substance du poumon. La plèvre diaphragmatique et la plèvre pariétale du côté droit offrent des exsudats analogues à ceux de la plèvre viscérale et qui semblent leur correspondre. à la coupe. Ce même lobe inférieur - pour la pression ne crépite plus ; tout élasticité a disparu et en comprimant la coupe ne se fait par sortir d'air : il est atélectasié. Les grosses bronches et les bronches de 1ère division sont remplies de mucus.

Le poumon gauche présente de multiples adhérences longues et minces. Le lobe supérieur en décomme au sommet deux ou trois groupes de néoplasmes gris ayant chacun ten centim et 1/2 dans tous les sens puis une surface de section framboisée, comme granuleuse -

- Le péritoine est uni à la paroi abdominale antérieure à l'intestin et aux viscères abdominaux, surtout à la route par des fausses membranes résistantes. Dans la fosse iliaque droite on trouve des granulations nombreuses du volume d'une grosse tête d'épingle et pigmentées. Dans le grand épiploon leur volume est plus considérable ; on y voit des amas de volumes égaux dont la dimension varie de la tête d'épingle à un noyau de cerise.

- La partie inférieure de l'intestin grêle offre disséminées dans toute la surface intestinale des ulcérations à bords saillants et déchiquetés de forme arrondie et transversalement disposées par rapport aux viscères. Quelques unes sont apparentes à la surface extérieure que elle soulève.

La rate est saine mais volumineuse - Les reins normaux le foie est le siège facilement déchirable par le raclage il est granuleux - Granulo-graisseux -

Vessie - Prostate - Testicules - Pas d'autres lésions -

Modèle N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Jeanne N° 25

Nom Prin Guenot
né à Villeneuve
demeurant à
profession corroyeur
âge 40 ans
tempérament
constitution
entré le 9 juin 1881
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Tumeur cérébrale (tuberculeuse).

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas d'antécédents héréditaires —
Pas de syphilis antérieure ; le malade ne buvait jamais à l'excès, mais lorsqu'il travaillait bien, il absorbait près de 3-4 litres de vin.
Il n'a jamais eu qu'une simple bronchite, il y a 3 ans. Jamais de crises ou d'attaques pongées.
Il y a environ 6 mois, il s'est aperçu que son bras droit, puis sa jambe droite perdaient de leur force ; cet affaiblissement est allé en augmentant surtout pour le bras, au point de l'obliger à cesser son travail depuis 3 semaines. Depuis 15 jours il a été pris ~~de~~ presque d'un tremblement continuel, mais qui s'arrête par intermittence.
Ce tremblement occupe tout le bras droit et toute la moitié inf. du même côté. La tête et la face n'y participent pas.
Pas de nystagmus ; jamais de troubles oculaires.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Pas de tremblement de la langue ni d'embarras de la parole. Parfois ~~cataplexie~~ tic Le tremblement du membre supérieur d'accentue, ou se reproduit lorsqu'il était arrêté, si l'on fait saisir un objet quelconque au malade, et si on lui le fait porter d'un endroit à un autre. Toutefois, même dans ce cas, le tremblement n'est jamais bien considérable. A la jambe, le tremblement est moins prononcé; le malade touche avec son pied ~~toutes~~ difficulté, tout ce qu'on lui donne à toucher. Les réflexes rotuliens sont diminués, pas de ~~réflexes~~ réflexes plantaires Sensibilité à peu près normale, aussi bien aux membres inf que au membre supérieur. La force musculaire du m. sup. droit est très-faible, et la pression de la main est presque insignifiante, alors que celle de la main y est bien plus considérable Un peu de raideur dans les mouvements communiqués de la jambe droite Le malade se plaint de tousser depuis longtemps. A l'auscultation: on trouve des ronflements assez nombreux dans la creux sus-claviculaire droit qui est plus profond que le gauche. Ronflements dans la fosse sus-épineuse du même côté.	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Charles N° 85

Nom Anthelme Bourgat
né à Lyon
demeurant à id
profession vernisseur en meubles
âge 62
tempérament
constitution
entré le 14 Juin 75
sorti le
mort le 18 Juin 75

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Tuberculose

Tubercules du cerveau
Méningite tuberculeuse

Les anciennes lésions des poumons trouvés à l'autopsie, paraissent démontrer que Anthelme a eu à différentes époques des affections que l'on peut considérer comme étant de nature tuberculeuse et qui cependant ont guéri.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Les renseignements sur ce malade sont incomplets à peu près complètement

Cinq jours avant son entrée à l'hôpital, il se plaignait de mal de tête, et d'une lassitude générale — Néanmoins, il continua ses occupations pendant 2 jours — Puis il garda la chambre, et 2 jours après il fut trouvé dans l'état actuel : ce malade présente une prostration générale, il ne répond pas aux questions qu'on lui adresse ; la tête est fortement tournée du côté droit, et les yeux paraissent immobilisés dans cette position. —

Les membres supérieurs présentent de la contracture et conservent leurs mouvements automatiques. Les membres inférieurs sont immobiles : lorsqu'on les dresse à une certaine hauteur les membres supérieurs et inférieurs ils retombent aussitôt ; mais ne retombent pas d'une façon lourde et inerte comme

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Lorsqu'ils sont attentifs de paralysie. Les traits de la face ne sont deviés ni d'un côté ni d'un autre, ils expriment la torpeur : Les pupilles sont légèrement resserrées, mais elles jouissent encore du mouvement de dilatation ~~et~~ La sensibilité reflexe est conservée mais avec un retard sensible de 20 à 30 secondes — La respiration est régulière mais stertoreuse — Le malade ne tousse pas — Il ne mange pas, et boit avec difficulté — La miction et la défécation paraissent normales La peau est chaude — pas de transpiration En résumé, le malade est dans un état de résolution complète, mais sans paralysie limitée, il n'offre que des symptomes encephaliques diffus.	
15	Pas de changement dans l'état général	
16	Le thermomètre ne descend pas à la partie supérieure gauche, la pupille de ce côté est dilatée La veine est distendue par l'urine et remonte jusqu'à l'ombilic on retire 1 litre 1/2 d'urine L'état general n'a pas changé	
17	La respiration devient moins régulière, plus accélérée — Les contractions des membres supérieurs persistent toujours — Le malade entre en agonie	La tête est en arrière — le regard est fixe —
18	Mort en matinée à 5 heures	

Lyon. Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Autopsie

Cerveau Meninges epaissies, couvertes par places de petits points blancs jaunâtres qu'on reconnait pour des tubercules, surtout sur les parties latérales

Tubercule gros comme un petit pois, de couleur jaune ressemblant à la pulpe du marron d'inde trouvé dans la Couche optique du coté droit et faisant une legère saillie dans le ventricule. Il s'enleve facilement de la substance cerebrale. — Un second tubercule de même forme, et de même grosseur dans le corps strié du coté gauche (noyau extra ventriculaire)

Cervelet presente de l'epaississement et une couleur blanchâtre des meninges. —

Les artères cerebrales et cerebelleuses sont saines. —

Plèvres

Plaresie double ancienne caractérisée par la presence de neo-membranes — A gauche les adherences sont surtout diaphragmatiques, on ne peut detacher le poumon qu'en l'incisant. — A droite la plevre est epaissie à la partie moyenne et forme comme un ruban épais.

Pas de liquide dans les plevres.

Poumons

Poumon gauche moins volumineux que les droit. On trouve dans les deux poumons de tumeurs de la grosseur d'un petit pois disseminées au nombre de 4 ou 5 - d'une d'elles presentant l'aspect caseiforme les autres parfaitement cretifiées et ne s'ecrasant que sous le marteau —

on trouve aussi un ganglion bronchique du volume d'une amende rempli de matière cretacée

Rien dans le foie — Les reins — le peritoine et les testicules sont sains. —

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4 m. f. *N°*

Nom Marie Meunier

né à

demeurant à

profession chiffonnière

âge 48 ans

tempérament

constitution

entré le 1er Juillet 78

sorti le 31 idem (morte)

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite chronique tuberculeuse
Pachyméningite
Tubercules cérébraux
Hemiplegie droite, et
Contractures des membres
Eschares fessières
Phlegmon de la fesse.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

On ne possède absolument aucun renseignement sur cette malade et sur ses antécédents pathologiques. Elle ne répond pas aux questions qu'on lui adresse; de temps à autre elle marmotte spontanément quelques phrases, inarticulées, et très-décousues. Son état général est assez bon; elle mange bien, elle se promène tant bien que mal dans la salle, et manifeste l'idée fixe de partir chez elle. Son état intellectuel laisse donc fort à désirer, puisqu'elle offre l'aspect d'une démente. Pour compléter cette analogie, elle urine et défèque dans son lit ou à terre, sans même chercher à prendre aucune précaution.

Outre cela, elle a une hémiplégie droite. Le facial inférieur droit est fortement touché: la commissure labiale est abaissée, rapprochée de la ligne médiane, et accolée en partie; la malade se refuse à tirer la langue. La joue est flasque, et affaissée. — Les deux membres du côté droit sont paralysés légèrement, la malade peut bien imprimer quelques mouvements, surtout au M. Inférieur, qui

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	rend la marche possible, bien que toute, traînante et mal assurée. — On trouve dans les deux membres de la contracture : au genou, elle occupe les adducteurs et les fléchisseurs. — Au coude, elle est bien nette et marquée, même considérable, et elle siége surtout dans le biceps. — Les M. du côté gauche jouissent de tous leurs mouvements ; toutefois, surtout dans l'extension, on remarque une résistance, (variable d'ailleurs), aux mouvements communiqués. — La sensibilité est manifestement diminuée dans toute la moitié droite du corps : toutefois les fortes piqûres y sont bien senties. — Sur les deux fesses on remarque une petite eschare, superficielle, à bords violacés, entourée d'une large zone érythémateuse.	
24	— Depuis hier, il s'est déclaré une fièvre intense (39°-39°5), la malade est affaissée, son regard est devenu plus terne ; au M. Sup. D. on trouve de l'œdème dans la partie déclive du bras et de l'avant-bras. Au contraire, près le G. trochanter du même côté, on trouve un phlegmon assez étendu ; la peau est très-fluctuante, et la périphérie présente toutes les teintes d'une ecchymose qui se décolore. La malade a dû faire une chute qui a passé inaperçue. On incise largement le phlegmon, et on le draine.	
31	— Tendance à la résolution complète ; 52 respirat, 128 pulsat radiales ; gravité ; paralysie contracture à la G. plus que la droite ; ~~la droite de sorte~~ la fortune de la main G. provoq. quelques mouvem ; elles de la main droite ne produisent aucun mouvem. — La contracture du coude droit a diminué notablement ; tandis que celle du côté G. persiste énergique.	

IMP. A. BONNAVIAT, A LYON

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Thorax. Quelques adhérences récentes et légères; pas de liquide dans les plèvres. — Aux deux sommets on remarque des lignes étoilées et déjuinées: la coupe révèle à ce niveau les lésions d'une sclérose pulmonaire limitée: on sent une surface plus dure, plus résistante à la coupe; et élastique comme du caoutchouc. — Du autre, dans le poumon droit, vers la scissure interlobaire qui sépare le lobe supérieur du lobe moyen, on trouve une masse assez volumineuse de tissu fibreux, cicatriciel; et, lorqu'on incise cette masse en son milieu, on ouvre un kyste du volume d'une noix, qui laisse échapper un liquide purulent, jaune-brun et très-opaque.

Cœur. Surcharge graisseuse assez notable

Le Foie et les reins sont très-nettement graisseux.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Autopsie 24 h. post mortem.

Persistance de la rigidité cadavérique dans les membres.

Pachyméningite au niveau du lobe frontal gauche, les méninges sont adhérents à ce niveau, et on ne peut les enlever qu'en entraînant un peu de matière cérébrale. A la face interne de la Dure-mère existe une fine membrane transparente, au-dessus de laquelle on trouve quelques petits foyers hémorrhagiques récents. Les deux lobes frontaux offrent une teinte plus pâle que le reste de l'encéphale : c'est surtout marqué pour le lobe gauche au niveau des deux premières circonv. frontales. — ~~Examen~~ Les méninges, d'une façon générale, sont épaissies, plus fibreuses, adhérents à la subst. cérébrale, et criént un peu sous le scalpel. Près du cervelet, on remarque sur elle une série de petites granulations extrêment fines, blanchâtres. — Les sinus n'ont rien ; les artères sont perméables dans toute leur étendue. — Quant à la subst. cérébrale elle-même, on y trouve des foyers de ramollissement, et de petites tumeurs ; en voici la distribution topographique :

1° Ramollissement occupant la partie inférieure du noyau lenticulaire du côté gauche. Il a une direction antéro-postérieure, commence à l'extrémité antér. du noyau, et s'arrête au niveau du pied des frontales.

2° Ramollissement occupant la partie supér. et ext. du noyau lenticul. du côté droit, et simulant un décollement de la subst. blanche qui confine à ce noyau.

Dans ces deux foyers, on voit la lésion s'accroître en épaisseur à mesure qu'on la considère plus en arrière, de telle sorte qu'elle finit par gagner la capsule interne et un peu le noyau caudé.

3° Tumeurs jaunâtre, composée de plusieurs masses inégal, offrant la consistance du marron cuit et le volume d'une ~~grosse~~ noisette. Son siège est situé sur une ligne partant du milieu de la lèvre inférieure de la scissure sylvienne gauche, et atteignant l'interstice qui sépare la première de la deuxième circonvolut. temporale. Dans la scissure parallèle, elle a la partie antér. du lobe frontal gauche ; les méninges ont entraîné une petite portion de subst. cérébrale, de couleur blanchâtre, et offrant une certaine consistance. A ce niveau, se trouve un ramollissement superf. atteignant cependant la subst. blanche. On trouve encore des points ramollis, mais très-superf., c.-à-d. seulement au niveau de la subst. grise sur la partie antér. de la 2ème circonvolut. frontale et sur toute l'étendue de la troisième (gauche). — Il existe encore un point très-limité d'induration avec ramollissem. et dépression de la subst. cérébrale sur la 1re circonvol. front. gauche, à sa partie moyenne —. La subst. du ramollissem. des corps striés offrait aussi sur un point de la coupe une certaine résistance à la coupe et au toucher.

autour, il y avait du ramollissem.

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4me Fce N° 119

Nom Claudine Roustel

né à Lozanne.

demeurant à Lyon

profession Dévideuse

âge 27 ans

tempérament

constitution

entré le 12 Oct. 1881

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Cataracte entièrement
Crises épileptiformes
Jodure de Kalium

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cette malade tousse depuis une vingtaine d'années environ. Cependant depuis quelque temps elle est devenue plus oppressée. Depuis 9 mois elle prend des crises environ tous les 15 jours. Ces crises débutent par une douleur assez vive dans un bras ou une jambe et s'étendent rapidement à tout le reste du corps; la malade ~~est~~ est agitée de mouvements convulsifs et généraux; elle perd connaissance et ensuite elle tombe dans la somnolence et la prostration. On ne trouve pas de trace de morsure sur la langue.

Un peu de sensibilité des membres du côté droit qu'à gauche.

La malade accuse une céphalalgie assez intense sous forme de crises fréquentes; mais elle existe depuis 40 ans, et même elle est bien moins forte à présent.

Ces crises débutent de préférence dans les deux membres ~~ou~~ du côté droit. Depuis quelque

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	temps, ces deux membres présentent des troubles de la sensibilité et de la motilité. La malade est droitière. Le m. sup. droit est moins fort que le gauche ; la pression de la main est moins considérable ; il existe un peu aux mouvements de flexion et d'extension. Il en est de même au membre inf. A la face, la langue paraît déviée à droite. Pas de déviation des yeux ; la face droite est plus plissée. La sensibilité est diminuée à droite, à la face, et aux membres ; en revanche, le côté gauche paraît un peu hyperesthésié. Le réflexe rotulien semble aboli à droite. Le réflexe plantaire est bien conservé. Pas d'incontinence d'urine sauf dans les crises. Appétit diminué ; toux assez fréquente ; expectoration peu abondante. A l'auscultation on ne trouve qu'une légère obscurité de la respiration et, un peu d'augmentation de la sonorité normale. — rôles sup. au sommet. La première fois que cette attaque dure, la malade a conservé l'état constaté pendant quelques jours dans l'impossibilité de se servir de son bras droit. Dilatation pulmonaire considérable. Poumon très marqué. — Rien au cœur. La mère de Virginelle Louise Jeanne 5 ans, guérie en deux fois (?), elle souffrit en des bras de femme, et des enfants qui servaient morte à un âge avancé. =	Toutes sur les deux cuisses

SCD Lyon 1

N° 119

№ 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
26 janvier 1881	~~La malade se plaint d'éprouver un peu de faiblesse dans le côté droit et un peu de difficulté pour parler; mouvement de la bouche ~~	
10 novembre	~~10 novembre~~ — Le matin nous assistons à une des mises hebdomadaires à cette malade — pour gestes de commissurence elle a commencé par éprouver de secousses cloniques dans les muscles de la moitié droite d'abord, puis à tressaillir la jambe et ensuite la main droite — même sujet droit ensuite à l'hémiplégie et le gêne notamment du bout d'un instant les muscles du pied sont entrés aussi en contraction, mais les muscles du bras, de l'avant-bras et de la main n'ont pas présenté de mouvements — La mise en contraction pendant une ou deux minutes par des commissures hebdomadaires au membre inférieur, et se termine au bout d'1 ou 2 minutes, 4 ou 5 minutes, après contractions des muscles de l'abdomen du côté droit, qui entrent en contraction les muscles du côté gauche, mais sans prédominance du côté droit. au bout de 4 ou 5 minutes, nouvelles contractions cloniques — fortes et de plus courte durée dans la cuisse — Pendant toute la durée de la crise, la malade ne pleure pas de douleurs dans tout le côté droit, mais elle ne perd pas connaissance, elle répond que toutes les fois qu'elle pense à, il survient les mouvements prédominants au membre inférieur droit, et que ces actes cessent en diminuant à Lorsque la malade de mouvoir ses membres immédiatement après la crise, voulu qu'elle levé la jambe gauche, elle put à peine l'élever le membre supérieur droit; quand elle put à peine remuer la main droite, mais remue bien la droite — Sensibilité — sans on trouve une légère diminution de la sensibilité dans le côté gauche, mais lorsqu'on recherche si il existe des différences au toucher et au pincement, on n'en trouve pas de manifeste, les réponses étant toujours exactes; elle entend peu à droite. Les pupilles sont bien sensibles des deux côtés. Il y aurait plutôt une diminution de sensibilité d'une façon générale.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Mêmes caractères de la sensibilité à droite. Diminution de la sensibilité à droite. Le pincement de la peau à droite et à gauche est perçu à gauche, et ne l'est pas à droite. Le pincement de la pointe de l'oreille est perçu à droite. Les glandes plus vives à gauche qu'à droite.	
	Pour les divers degrés de diminution de la sensibilité dans la région malade, voir la note. = Même trouble pour la température. Du côté de la paralysie, la sensibilité paraît un peu diminuée, la différence est encore plus marquée pour l'odorat. = Rien du côté de la face ni comme motilité, ni comme sensibilité. = Pas d'hallucinations manifestes.	
	Absence absolue de contracture dans le côté droit. =	
11 novembre	Hier = Hier dans l'après-midi, pendant la nouvelle visite commencée semblable à celle qui a duré environ 1/4 d'heure. Puis elle est tombée dans un état demi-comateux avec perte des membres du côté droit : c'est dans cet état que nous l'avons trouvée à 6 h. du soir ; nous avons constaté qu'elle ne répondait plus aux questions. La sensibilité était complètement diminuée à la piqûre profonde et était seule perçue, à gauche, le pincement de la peau. = Pendant toute la journée, la malade a présenté des gémissements. Dans la soirée elle est revenue peu à peu de cet état, mais sans perdre l'aphasie complète. = Le matin nous trouvons la malade assez prostrée, mais plus accessible qu'hier, elle nous parle spontanément. Elle a uriné au lit. Mais elle répond aux questions, peut remuer ses quatre membres et les moindres pincements de la pointe de l'épingle sont perçus du côté droit. On remarque seulement que les mouvements communiqués au membre droit, en perdant de leur résistance, gardent de leur étendue ; cette résistance augmente notablement au moment de la parole. Par de véritable contracture au membre inférieur, on note	Le malade a pris une tasse de tisane à 6 h. du soir.

SCD Lyon 1

N° 119 Pitt.

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	La malade tousse beaucoup et crache abondamment. La poitrine est très sonore, sonorité tubaire exagérée, retentissement de la voix et de la respiration, sonnant pourtant à la manière bronchique au sommet droit. Pouls 92. = Peau n'est pas chaude. Environ 40 respirations. = Veine jugulaire très distendue, pouls veineux. La malade conserve aujourd'hui un certain degré d'obnubilation et de difficulté de la parole.	
12 novembre	La malade est à peu près revenue à son état habituel. Elle conserve encore difficulté de la parole.	
15 novembre	~~La malade a passé mieux, a dormi toute la nuit~~	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

N° 21 bis.

174. Suite

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

17 novembre — La malade est revenue à son 1er Mouvement; cependant elle est plus faible que auparavant; elle peut se tenir debout en s'appuyant sur le membre inférieur gauche, mais elle ne peut marcher à cause de la faiblesse du membre droit. Celui-ci jouit du reste de tous ses mouvements; pas de contracture, il ne présente pas de trépidation bien appréciable; cependant lorsqu'on relève la pointe du pied il y a une légère oscillation accompagnée d'une certaine résistance analogue à ce qu'on observe au début de la trépidation. = Du côté gauche rien de semblable. = Sensibilité légèrement diminuée sur le côté droit. = Un peu de raideur à la flexion pour le membre supérieur droit. —

Lorsqu'on lui dit de prendre sa main droite de la gauche, les deux femmes, on a que des signes ébauchés à cause de l'hémi-hébétude intellectuelle. =

[Renseignements fournis par une personne de la famille de la malade comme étrangère. =

Il y a 5 ou 6 ans, elle aurait fait une grave maladie de sa tête on nous donnera ultérieurement des détails. On sait seulement qu'elle ne prenait pas de crises avant ces trois derniers mois, et qu'elle n'avait jamais eu d'attaque de paralysie avant cette époque. =

Il y a un peu moins de 3 mois, la malade était à son travail lorsqu'on la vit pâlir, de mouvements convulsifs du côté droit et tomber sans connaissance à ce moment qu'on croit d'1 heure ou 2, qu'elle revint à elle. Depuis lors elle se remit à son travail sans présenter aucune paralysie; depuis cette époque elle a pris environ tous les 8 jours des crises convulsives, localisées au côté droit avec perte de connaissance, et sans chute. = Cependant

SCD Lyon 1

Claudine Kovacek. n° 119. 4e sem.

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	La malade présente tout au début de la crise une attaque d'embolisation intellectuelle; ses voisines qui l'épiaient au début de la crise, à ce qu'elle ne pouvait plus exister ses bruits de pas comme d'habitude : son mari commençait à trembler et alors on lui disait d'aller se reposer un instant, ce qu'elle n'aimait pas pour éviter ennuis, la crise passée, elle reprenait toujours son travail. Il n'est que le jour de son entrée à l'hôpital, qu'elle a pris une nouvelle grande crise avec perte de connaissance. =	
7 décembre.	Depuis la crise dont nous avons été témoins, la malade est restée très affaiblie du côté droit, bien qu'elle puisse faire tous les mouvements avec le membre supérieur; elle ne peut guère s'en servir car elle laisse tomber facilement les objets qu'elle veut prendre. Le coude est raide, et le biceps offre toujours une résistance assez grande qui augmente à mesure après les mouvements. Les mouvements de contracture de la main et des doigts qui sont très rapides, et remarquable il ne manque que la force. = Sur le membre inférieur l'affaiblissement est tellement grand, que la malade ne peut se tenir debout seule, et que le membre reste légèrement fléchi et raccourci par suite de la contracture des fléchisseurs. La malade ne peut pas du tout s'appuyer sur ce membre. En remettant la malade au lit, et en cherchant à étendre le membre (droit) on voit qu'il est le siège de mouvements convulsifs, qui se produisent dans les muscles fléchisseurs de la cuisse; ce sont de grandes secousses irrégulières qui de temps en temps existent aussi du côté du membre inférieur et des péroniers. = Ces convulsions cessent lorsque la malade est au repos, mais il suffit d'étendre la jambe ou d'abaisser le pied, pour produire à nouveau les mouvements convulsifs dans les muscles de la	

SCD Lyon 1

N° 119. Clouston Rouet.

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
7 décembre	= cuisse ou de la jambe. sont produits lorsqu'on a touché du pied. Ces mouvements se produisent d'autant plus facilement que les mouvements imprimés sont plus brusques. En répétant ces mouvements, les mouvements anormaux se produisent constamment. = Les excitations cutanées au moyen de piqûres, du chatouillement, ne donnent pas bien à ces mouvements. En percutant les tendons, on produit seulement une contraction musculaire dans le muscle correspondant, et si la percussion est forte, dans les muscles voisins, mais non les mouvements convulsifs de même genre que les précédents qui ne donnent bien cependant qu'à un mouvement du muscle frappé. = C'est bien par le tiraillement des muscles indiqués précédem. qui produit les phénomènes convulsifs. On trouve en même temps une exagération des réflexes tendineux, et la moindre percussion sur le tendon rotulien donne lieu à des ~~ser~~ contractions non seulement du triceps fémoral, mais encore des autres muscles fléchisseurs, (sans convulsion, comme nous l'avons dit). En tirant sur la rotule on a une secousse énergique en retour, mais sans trépidation véritable; il semble que la laxité du muscle (triceps) soit trop grande pour la production de ce phénomène. = Sous le pied, on a des réflexes très-facilement, en percutant les différents tendons extenseurs ou fléchisseurs; et on détermine la trépidation et seulement la trépidation en relevant la pointe ~~du pied~~ du pied, sans que l'abaissement se donne lieu, ou les mouvements convulsifs, mais jamais de trépidation	Ce dernier seul à baisser la pointe du pied. Ces mouvements se produisent d'autant plus facilement que les mouvements imprimés sont plus brusques. En répétant ces mouvements, les mouvements anormaux se produisent constamment. = Les excitations cutanées au moyen de piqûres, du chatouillement, ne donnent pas bien à ces mouvements. En percutant les tendons, on produit seulement une contraction musculaire dans le muscle correspondant, et si la percussion est forte, dans les muscles voisins, mais non les mouvements convulsifs de même genre que les précédents qui ne donnent bien cependant qu'à un mouvement du muscle frappé. = C'est bien par le tiraillement des muscles indiqués précédem. qui produit les phénomènes convulsifs. On trouve en même temps une exagération des réflexes tendineux, et la moindre percussion sur le tendon rotulien donne lieu à des ~~ser~~ contractions non seulement du triceps fémoral, mais encore des autres muscles fléchisseurs, (sans convulsion, comme nous l'avons dit). En tirant sur la rotule on a une secousse énergique en retour, mais sans trépidation véritable; il semble que la laxité du muscle (triceps) soit trop grande pour la production de ce phénomène. = Sous le pied, on a des réflexes très-facilement, en percutant les différents tendons extenseurs ou fléchisseurs; et on détermine la trépidation et seulement la trépidation en relevant la pointe ~~du pied~~ du pied, sans que l'abaissement se donne lieu, ou les mouvements convulsifs, mais jamais de trépidation

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Bande d'Esmarch, jusqu'à la partie moyenne de la cuisse, puis on la défait jusqu'en bas, la compression étant maintenue à la partie supérieure. — On constate l'exagération de la déperdition des phénomènes du pied. En étendant longuement on trouve plus que des traces des mouvements fibrillaires, particulièrement pour ce qui se porte pour une bonne partie de la cuisse. — 3 minutes, la réexcitation a complètement disparu, on constate les mêmes phénomènes qu'à la pl. convulsifs. — On enlève la bande et on voit réapparaître les phénomènes de réexcitation, d'abord à un léger degré, 4 minutes (6 cm.) au même degré qu'avant la compression.	(3 minutes.) La réexcitation, mais insuffisante pour faire exécuter la jambe, on ne trouve que des traces de mouvements convulsifs que la compression dans le tiers inférieur de la cuisse, pour ce qui concerne la bande et convulsifs et la mise en bande
	La malade examinée 2 heures après présente les phénomènes convulsifs sous l'influence des mouvements communiqués comme précédemment, mais les phénomènes sont beaucoup moins marqués que lorsqu'elle a été sortie une première fois pour se tenir debout et pour marcher. On remarque de même qu'à ce moment la contracture des muscles de la cuisse et surtout du biceps crural persiste mais moins prononcée que [illegible] persistance des troubles de sensibilité et [illegible]	
	Tout à l'heure. — Les orteils gonflés sont de plus en plus douloureux. Les réflexes tendineux existent, mais moins marqués que de coutume. — La malade prétend que les mouvements convulsifs sous l'influence de l'électricité, ont commencé à se produire 15 jours ou 3 semaines après les dernières crises.	

SCD Lyon 1

4e Service. 119. Suite. Renvoi

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
8 Décembre	La malade se trouve dans les mêmes conditions qu'hier, on détermine les mouvements communiqués par l'extension brusque de la jambe et par l'abaissement du pied, ou son inclinaison en dehors. On remarque même que les mouvements (dans ces derniers) ne restent pas localisés au pied et qu'ils s'accompagnent de mouvements dans les muscles de la cuisse; il n'est qu'en produisant l'abaissement direct du pied qu'on arrive quelquefois à localiser les mouvements dans les muscles de la jambe sans participation de la cuisse. Les mouvements convulsifs deviennent aussi aussi intenses qu'hier, qu'on a été contraint à trois reprises différentes de cesser l'expérience. On remarque toujours l'opisthotonos entre la trépidation et les mouvements convulsifs; au moment où la trépidation commence à se produire, les muscles de la cuisse ne sont plus le siège de secousses, mais restent roides, durs, saillants, puis se détendent aussitôt, pour rester flasques pendant que la trépidation a lieu. Si l'on frappe sur le tendon rotulien pendant que les mouvements convulsifs se produisent, on voit apparaître une contraction non seulement dans le triceps, mais encore dans les fléchisseurs et les adducteurs de la cuisse; tous les mouvements convulsifs reprennent immédiatement.	
	La compression de l'artère fémorale n'observe pas une diminution des mouvements convulsifs: seulement qu'au bout de 4 ou 5 minutes on ne peut plus déterminer de mouvements dans le pied, il n'en est pas de même des mouvements dans les adducteurs et les fléchisseurs de la cuisse lorsqu'on étend le membre, mais ces mouvements sont très faibles et très rapidement. L'état épileptiforme n'existe	à celui que nous avons

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	bandes avec la compression par la bande d'Esmarch.	
	On enlève la compression, on voit peu à peu les mouvements	
	commencer avec plus d'intensité et au bout de	
	5 minutes dans les mêmes conditions qu'avant la	
	compression. = On place alors une bande	à l'avant-bras à 1/3 supér.
	avec les 2/3 supér. de la cuisse, de manière à comprimer	
	(Coloration bleuâtre, sans dilatation de veine superficielle)	
	circulairement le membre assez fortement dans le premier	
	et on attend 4 ou 5 minutes sans toucher au membre.	
	On essaye alors de déterminer les mouvements commandés,	
	et on constate que non-seulement on les produit plus	
	facilement, mais qu'ils persistent beaucoup plus longtemps.	
	Les convulsions sont manifestement exagérées.	
	On ôte la compression et bientôt	Le membre présente
	les mêmes commémois qu'au premier lien.	Un centimètre de
	produire des convulsions pendant 10 minutes ou	
	moins sous ces premières phénomènes répondent.	
	= On a cherché la réfrigération dans toutes les conditions	
	signalées ci-dessus et on a toujours trouvé persistance	
	au même degré et toujours exagération des convulsions.	
	= Les excitations cutanées et notamment le chatouillement	
	lent ici et des mouvements réflexes de toute la moitié	
	de la cuisse, mais même cercle qui dans le cas des convulsions,	
	mais sans que celles-ci se produisent.	
9 décembre —	Persistance des mêmes phénomènes. =	
	Syndrome depuis son entrée, depuis le 9 déc.	
10 décembre —	Persistance des mêmes phénomènes sans modification,	
	Depuis commencement quelques mouvements sur	
	membre supér. on détermine de temps en temps des mouvements	
	commandés dans la totalité? = Les mouvements demandés	
	sont toujours entravés à cause de la résistance du biceps	
	et du triceps. Surtout des 1ers. Les mouvements	
	des doigts sont toujours libres, mais tout le membre est soumis	

SCD Lyon 1

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
11 10bre	— On constate toujours les mêmes phénomènes du côté du membre inférieur dans les mêmes conditions et avec la même facilité. Nous trouvons comme précédemment l'antagonisme entre la trépidation et les mouvements volontaires du pied, mais du pied seulement, car si on obtient longuement la pendule pendant que la trépidation du pied a lieu, on n'obtient peut-être avec des contractions limitées à la cuisse pendant que la trépidation continue, mais peu à peu qu'il survienne des contractions dans les muscles de la jambe (toujours dans les extenseurs) la trépidation s'arrête. Nous avions déjà remarqué que le malade pouvait faire des mouvements volontaires avec le membre inférieur sans provoquer de contractions; nous avons constaté aujourd'hui que l'on obtient aussi même longue opposition avec flexion complètement la jambe on n'a pas besoin d'obtenir longuement; on n'a qu'à la fin de l'extension complète qu'il y a une légère oscillation tremblement que n'a pas le caractère irrégulier, spasmodique des contractions et qui est sans doute dû au tremblement produit par la contraction permanente des fléchisseurs. Cette constatation est d'autant plus remarquable que le membre mouvement d'extension provoqué amène la contraction. Du membre supérieur nous ne pouvons pas déterminer aujourd'hui de mouvements convulsifs, mais les muscles du bras présentent la même résistance qu'auparavant. D'une manière générale la malade est beaucoup plus faible, elle ne peut plus s'aider pour aller à la chaise-clé. De cette elle mange très peu depuis quelques jours, mais les muscles du côté droit-gauche très affaiblis fonctionnent toujours de leurs mouvements. On soumet pour à nouveau les mouvements d'extension de la jambe on remarque cependant qu'à la fin du mouvement il y a 99 l. de légers mouvements convulsifs, mais il est à remarquer que le plateau du pied présente une résistance d'autant plus grande que le membre est faible parce cette circonstance peut favoriser la production du phénomène; toujours est il que les fléchisseurs de la jambe sur la cuisse sont contractés sur les extenseurs, car la jambe étant étendue, si on le doigt en appuie sur la rotule on produit un tremblement considérable.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Dans ce moment le malade est dans son lit et peut étendre la jambe lorsqu'il a produit le mouvement, mais on observe alors que les mouvements communiqués produisent très très peu de mouvements consécutifs, mouvements qui sont du reste très petits. Dans cette position il n'est pas possible non plus de déterminer la trépidation ; en effet le malade dans son lit ne détermine les mêmes mouvements que j'ai signalés, qui sont plus ou moins accentués à certains moments. La contracture encore me analogie entre les mouvements déterminés par les contractures de la jambe et du pied et ceux qui donnent lieu à la trépidation, c'est que les mouvements finissent par cesser lorsqu'on a bien complètement les muscles en mouvement ; plus les mouvements sont d'autant plus marqués que les muscles ont été brusquement étendus et qu'on agit plus brusquement.	

SCD Lyon 1

N° 119 5e Jours. Rousset

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	13 Décembre. La malade est beaucoup plus affaiblie. Elle a peine si elle peut mouvoir ses membres droits. Il lui faut pour beaucoup d'efforts et les mouvements sont lents : cependant elle peut encore fléchir le membre inférieur, et l'étendre. Le membre supérieur est incomplètement relevé en abduction, les mouvements persistent moins dans les doigts ; elle n'a pas eu de nouvelles crises, la résistance du biceps et du triceps ~~sont~~ est très prononcée, bien que le membre puisse être complètement fléchi ou étendu. Mais si on lui demande énergiquement pour produire ces mouvements on voit un peu tremblement accompagner le membre ; on sent au commencement de chaque mouvement imprimé une légère trépidation un peu plus marquée du côté du biceps. On ne peut toujours pas déterminer de trépidation du côté des fléchisseurs de la main et des doigts, mais en fléchissant brusquement la main, tout en lui laissant une certaine mobilité. On détermine une trépidation assez prononcée, comme précédemment qu'on le désire. Cette trépidation des extenseurs y a été notablement plus longtemps ; car le membre supérieur a été exploré ces jours derniers à ce point de vue, et ce n'est que ces jours qu'on a constaté un léger mouvement indiqué pour la flexion, et qui très probablement existait déjà pendant tout le temps. Il existe aussi aujourd'hui une légère trépidation de la main, lorsque le malade s'efforce de soulever le membre et cette dernière n'existait auparavant pas aussi nettement. Les mouvements anormaux des membres inférieurs sont certainement augmentés. Le moindre mouvement d'extension de la jambe produit des contractions dans les fléchisseurs, et la moitié de la partie interne de la cuisse. De même pour les	

Ma revu la petite malade [illegible] et une à peine correspondant aux

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	mouvements d'adduction du pied (pour abaisser) en dehors en dedans dont bien à des mouvements des muscles extenseurs et abducteurs surtout, ainsi le triceps sural se produit plus facilement et avec plus longtemps que précédemment, tous les mouvements se produisent sous l'influence de la (les fractions sur les muscles) surtout sous l'influence d'une traction longue et ils cessent de même, dès lors que la traction est parvenue au maximum, dès surtout lorsqu'elle cesse : les excitations entières ne les produisent nullement, ainsi aucun les mouvements volontaires d'adduction de la jambe, ce n'est qu'à la fin de l'extension que l'on obtient quelques mouvements d'oscillation qui paraissent se passer dans les péroniers.	ou pour l'ordre de mouvements des muscles la triple action de triceps et avec plus mouvements de même excitation sous l'influence d'une traction longue et ils cessent de même, dès lors que la traction est parvenue au maximum, dès surtout lorsqu'elle cesse : les excitations entières ne les produisent nullement, ainsi aucun les mouvements volontaires d'adduction de la jambe, ce n'est qu'à la fin de l'extension que l'on obtient quelques mouvements d'oscillation qui paraissent se passer dans les péroniers.
	Aucun mouvement spontané. =	
	En comprimant le sciatique à la partie supérieure de la cuisse, on arrive à anémier le membre à un certain degré avec l'intégrité de la peau qui se produit au bout de quelques minutes. Au bout de 5 minutes on cherche à produire les mouvements comme précédemment. On voit que les mouvements des muscles de la cuisse et de la jambe sont déjà diminués, et que la trifurcation du triceps sural persiste à peu près au même degré. Après avoir renouvelé les mêmes mouvements pendant 2 ou 3 minutes, on voit les mouvements de la cuisse et de la jambe diminuer et cesser bientôt que ceux du mollet diminuent notablement. Vers 2 ou 3 minutes, c'est-à-dire 10 à 12 minutes depuis le début de la compression, il n'est plus possible de déterminer aucun mouvement. On constate seulement une élasticité anormale dans les muscles, due à la perte brusque de l'exagération des réflexes tendineux. Les mouvements réapparaissent aussitôt que l'on cesse la compression et ne tardent pas à devenir aussi intenses	

SCD Lyon 1

N° 119 — Suite — 15

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Ses compagnons. On constate toujours ordinairement la trépidation, que tous les reflexes tendineux sont très exagérés. = Lorsque la jambe est demi-fléchie la percussion, même légère, sur le tendon rotulien donne une secousse du triceps et dans les autres muscles de la cuisse, et s'il est porté une secousse de tout le membre. Si le membre étant dans cette position, on fait la rotule en haut, la percussion sur le tendon a un effet beaucoup moins marqué; lorsque le membre est dans l'extension, comme il n'existe de la résistance que du côté des fléchisseurs et que le triceps est tout à fait flasque, le tendon rotulien est dans le relâchement et la percussion légère ne donne rien; il faut percuter très fort pour avoir un effet très léger dans les muscles de la cuisse; même en tirant la rotule en haut de manière à tendre le tendon, on n'obtient pas un effet plus marqué. Lorsque le membre est dans l'extension, celle-ci n'est pas toute à fait complète, cette persistance de la contraction des fléchisseurs, ou même lorsque le malade s'efforce d'être excité: en appuyant alors sur la cuisse et genou on sent comme s'il était mû par un ressort.	on remarque que en raison de la contraction des fléchisseurs, on ne réalise jamais la trépidation du tendon rotulien, parce que la rotule remonte, le genou se fléchit et le membre inférieur se met en demi-flexion par un ressort.
	Cas de trépidation des orteils — Bien que les mouvements excités du pied ne soient pas de même caractère d'égalité et de régularité qu'on remarque dans les mouvements précédents, il est évident que tous ces mouvements se rapportent de la même manière et appartiennent de la même nature. — Si les mouvements ont été décrits précédemment c'est parce qu'ils sont à la disposition des membres et des orteils qu'ils ont à mouvoir.	du côté des fléchisseurs de la jambe, et on remarque que du côté de l'extenseur, il est plutôt le siège d'une contraction tonique.

Ma revue de petite neurologie générale, et dans le point correspondant aux deux

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	— Un membre supérieur on fait la compression partie supérieure et l'on voit la turgescence de la veine sous qui on pousse dès lors rapidement s'il y a augmentation. puis diminue en tout de quatre à cinq minutes pour disparaître et huit minutes après le début de la compression. Il ne reste alors toujours que l'engorgement des veines. — Quelques secondes après la cessation de la compression les mouvements reviennent comme à l'état habituel. La malade est somnolente et lorsqu'on pousse les membres pour produire les mouvements il y a une résistance dans les muscles communiqués et la respiration est plus marquée. Ces phénomènes sont notablement augmentés quand elle est réveillée.	
19 Décembre = Même état.		
22 Décembre = Persistance des mêmes phénomènes sauf que l'affaiblissement des membres du côté droit a encore augmenté, c'est à peine si elle peut détacher l'avant bras du lit, mais elle fait encore les mouvements des doigts. ——. Un instantané pris, placée sur la chaise on remarque que la malade est inclinée du côté droit, les bras tombent d'une façon inerte. = L'affaiblissement général a aussi beaucoup augmenté, la malade s'alimente peu. = Elle dort toujours beaucoup, sans que l'on trouve du côté de la paralysie, autre chose que les phénomènes indiqués ci-dessus.	
27 Décembre = Hier soir à 7 h. 1/2 au moment où la malade venait d'être mise sur la chaise, le membre supérieur droit a été le siège de mouvements convulsifs et de mouvements tels qu'il s'étendait presque à la hauteur de la tête de la malade, en même temps le bras et la cuisse étaient le siège de mouvements analogues, mais moins marqués que dans le membre supérieur. = Rentrée dans son lit les mouvements cessent. = Le matin la respiration, et le pouls sont embarrassés; elle meurt à 8 h. du matin	

SCD Lyon 1

N° 119 – 4e femme – Autopsie faite le 24 Xbre 1881 –

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

– Rien de particulier du côté des trois cr de la dure – mère
– Arachnoïde grenue paraît fine mais veilli comme avec un peu d'épaississement très
visible des circonvolutions ; au niveau de la partie supérieure de la région pariétale et
au niveau de la portion correspondante de la face interne. A l'état endroit la consistance est
également diminuée – Vascularisation paraît identique des 2 côtés et n'offre rien de
particulier –
– Les artères de la base ne sont nullement athéromateuses. Pas d'oblitérations artérielles.
– Rien enfoncé la méninge ne dit que celle-ci paraît adhérente au niveau du lobule
pariétal supérieur dans la portion correspondant au bien supérieur de la circonvolution
pariétale ascendante, ainsi qu'au niveau du lobule quadrilatère. A ce niveau la méninge, Angioleucomyes
présentant notamment un liseré épaissi blanchâtre plus marqué en quelques points où on
voit de véritables petits nodules blanchâtres de la grosseur d'une tête d'épingle. La substance cérébrale
à ce niveau est molle, mais par la palpation on sent au milieu de ces parties molles des
portions dures et irrégulières, principalement sur le bord de la lésion. La lésion cérébrale de la
circonvolution pariétale ascendante paraît faire partie intégrante de la lésion. Mais cette cir-
convolution présente dans son tiers moyen un aplatissement de la partie médullaire qui est
un peu plus molle tandis que le bord est conservé dans consistance normale.
La circ. frontale ascendante se termine par un pli profond aboutissant à la première
frontale qui est en rapport immédiat avec le lobe quadrilatère. C'est cette première
partie de la première circonvolution qui devait être la portion la plus élevée de la cir-
convolution ascendante dont la consistance est un peu diminuée, mais la consistance est
encore beaucoup plus diminuée au niveau du lobe quadrilatère et surtout dans les trois portions
qui sont en rapport avec la pariétale ascendante et qui présente un aplatissement
très notable – Les lésions méningées précédemment ont été limitées à une fine opacification
au profondement on voit qu'elles suivent les sillons comme si qu'elle s'étendaient un peu plus
loin qu'on pouvait le voir au premier abord.
– Coupe frontale – Les faisceaux frontaux supérieurs présentent tout à fait à la partie supé-
rieure une légère diminution de consistance et paraissent plus humides
– Coupe pariétale – On tombe à la partie supérieure et contourne entière sur l'extrémité
de la portion la plus élevée en rapport avec, dans, de la grosseur d'un grain qui
est entouré d'une substance cendrée diffluente – Une lésion analogue se trouve près de
la face interne au fond du sillon calloso-marginal. Les petites tumeurs sont en rapport
avec la méninge et avec les petites rougeurs méningées précédemment – Toute la substance
blanche est plus diffluente surtout dans les portions avoisinant les parties superficielles
jusqu'à une profondeur de 2 centimètres. Outre la diffluence on note aussi une
teinte un peu plus jaunâtre –
– Coupe pédicule pariétale – Sur toute la portion la plus élevée de la coupe qui
correspond au lobule pariétal et au lobule quadrilatère on trouve au milieu de la substance grise
des petits nodules grisâtres, et dans le point correspondant aux deux

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* N°

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4e femmes N° 152

Nom Dupraz Francine DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

né à Ayn (Savoie)

demeurant à Lyon

profession Dentelière

âge 16 ans

tempérament

constitution

entré le 10 Juin 1882

sorti le Morte le 17 Juin à 11 h du matin

Méningite tuberculeuse

Droitier

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Père mort jeune — mère Bien portante — Une sœur également Bien portante —

Cette jeune fille a toujours été très chétive, elle toussait fréquemment —

N'a jamais eu de glandes au cou — pas trace de scrofule — Appétit habituellement bon.

Le 9 Juin elle faisait encore son travail — à 3 heures de l'après midi, c'est à dire peu d'instant après le Dîner qui a lieu à 2 heures, elle est prise subitement d'une crise avec perte subite de connaissance et convulsions — Les personnes qui nous donnent ces renseignements sont ses maîtresses qui nous disent qu'elle louchait plutôt du côté droit et avait de vilains yeux — C'est la première crise qu'elle prend, n'a pas repris sa connaissance. Non réglée —

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Pas de fièvres eruptives — N'a pas eu d'œdème des membres inférieurs —	
	Signes constatés à l'entrée : L'œil gauche est fermé à gauche — la pupille droite est plus resserrée que la gauche — L'œil droit regarde en face —	
	Les pupilles se resserrent et se dilatent assez facilement et rapidement — Quand le malade s'agite et fait de grandes inspirations les pupilles se dilatent immédiatement — Au repos les pupilles se resserrent — Les yeux sont de préférence tournés du côté gauche — On remarque de petites contractions fibrillaires au niveau de la paupière inf. droite	
	La respiration est régulière, mais de temps en temps le malade geint, s'agite et alors la respiration est plus profonde — (Resp. irrégulière	
	Les réflexes cutanés sont conservés — Le réflexe tendineux n'est pas bien net ; dans tous les cas il est notablement diminué —	
	Pas de contracture, elle se défend seulement quand on cherche à lui ramener le bras gauche elle résisterait peut être un peu plus du bras gauche	
	Le malade bouge, la recherche des réflexes est difficile — Sitôt qu'on la laisse tranquille s'assoupit et se cache sous ses couvertures —	
	Elle ne tire pas la langue quand on l'invite à le faire à ce moment — Taches méningitiques — Respiration un peu irrégulière — De temps en temps grandes inspirations plus fortes coïncidant avec son réveil —	
	Les pupilles se resserrent peu sous l'influence de la lumière — Les yeux ne sont pas tout à fait fermés —	

SCD Lyon 1

Dupras francois – Méningite (suite)

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

l'œil Gauche est un peu plus fermé que l'œil Droit.
Elle se plaint beaucoup quand on la tourne, se couche sur le côté tantôt à gauche, tantôt à Droite, mais la préférence à Droite – La tête est fortement renversée en arrière – pas de paralysie, pas d'ædème, pas de troubles trophiques, pas de souffle céphalique – Temp. 38° – On découvre une cicatrice cervicale au niveau de la partie moyenne du cou, sur le bord du sterno-cleido-mastoidien – On ne perçoit rien à l'auscultation des sommets, mais cet examen est très imparfait à cause des gémissements de la malade –

11 Juin = Au repos les yeux sont plutôt tournés à gauche. La malade se cache toujours sous ses couvertures. L'œil G. est plus déviée que la D. – Elle ramène les yeux à la partie médiane, elle les porte plus volontiers à gauche, cependant de temps en temps on les voit se dévier à Droite – Elle bouge beaucoup plus qu'hier, elle n'a pas cette somnolence aussi profonde qu'elle avait hier –

La malade ne bouge que la main D. Elle ne se sert pas du tout de la main G. cette dernière soulevée retombe mais lentement Elle ne retombe pas tout-à-fait plat sur le lit –

Elle se tient à la renverse la tête plutôt inclinée à Droite –

Elle bouge surtout la jambe Droite – elle retire souvent cette dernière – Tout le côté G. du corps reste immobile Elle bouge constamment les membres du côté Droit De temps en temps elle fait un mouvement d'ensemble du tronc – La chatouillement de la plante du pied provoque des réflexes, beaucoup plus marqués à Droite qu'à gauche –

Le réflexe tendineux persiste des deux côtés – il est assez prononcé, plus qu'hier –

Pas de trépidation plantaire ni rotulienne. Légère résistance des fléchisseurs à gauche, rien du côté des extenseurs – Résistance plus marquée des fléchisseurs à Droite – Ventre en Bateau a uriné dans son lit – La malade prend difficilement sa potion ; ajoutée à 2 grammes

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Face = Le sillon naso-labial D. est plus marqué — La commissure G. paraît abaissée — Quand on la fait rire elle se plaint, la partie Droite est plus grimaçante que la gauche — La paupière D. se contracte mieux — Nystagmus — On ne constate plus la contracture fibrillaires de la paupière inf. D.	
	Les réflexes pupillaires ne sont plus aussi resserrés qu'hier — Elles ne sont jamais en repos à la lumière — L'approche de la lumière les fait se contracter, celle du côté D. se contracte un peu plus que —	
	Pas de salive — Le lavement laxatif n'a pas fonctionné — Respiration obscure, elle recrache tout ce qu'on lui donne — Aujourd'hui ce qu'on donne en excitant c'est la dilatation de la pupille le resserrement n'est jamais aussi prononcé qu'hier	
	Tendance à la Rotation des corps de G. à D. — Les réflexes, d'une façon générale se produisent d'autant mieux que la malade est resté plus longtemps en repos — Le système nerveux s'épuise vite et en répétant l'acte de chatouillement d'un même excitant, le réflexe perd de son intensité et de sa netteté —	
12 juin.	Quand elle est calme la pupille est moyennement dilatée — La malade se tient en chien de fusil — Le matin elle a répondu merci à la voix qui lui demandait si elle voulait boire — Quand on lui parle elle répond par quelques mots — Les réflexes pupillaires et respiratoires sont toujours les mêmes — Le membre D. résiste sensiblement les côtés de l'extension — Le membre G. n'offre pas de contracture il est parfaitement flasque (persistance de la tour) est toujours couché, la tête très bien cachée sous la traversin — Couché sur le côté les jambes repliées — Pour les membres inf. résistance des fléchisseurs, Les 2 côtés quand on commence les mouvements aux jambes la malade crie toujours beaucoup — Les réflexes tendineux persistent des deux côtés, Ventre en bateau persistance aussi. Des réflexes cutanés — comme précédemment La face est la même — Même déviation des yeux — En somme la seule différence qui existe avec l'état constaté hier c'est qu'il y a un peu moins d'agitation des côtés D. Que le membre inf. est plus flasque et que la malade répond un peu plus vite	Toutefois lorsque pendant les mouvements du membre droit on a provoqué une légère résistance du biceps — Me Voici fort —

SCD Lyon 1

Dupras François Méningite (suite)

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
13 Juin	La malade a crié toute la nuit elle tousse beaucoup — L'œil G. est plus mobile que l'œil D — Elle mâchonne — La déviation des yeux est moins marquée que précédemment. Elle geint, elle se retourne, elle n'a pas l'assoupissement constant — Contracture des muscles de la nuque — la malade est en opisthotonos — La face est plutôt tirée à G — Les yeux ont plus de tendance à se porter à G — quoiqu'ils se portent dans tous les sens — mais quand les yeux sont dirigés à D — pendant que l'œil G. se tire à D — l'œil D. ne se meut que sous l'influence médicamenteuse — Les pupilles sont dilatées d'une façon permanente, restent les prop. G. elles se contractent légèrement de temps en temps, mais pas aussi bien que bien, du reste il n'y a pas de période de calme et d'assoupissement comme précédemment, la malade est presque constamment agitée, et l'agitation porte sur les quatre membres. (Les moments de calme et d'assoupissement sont rares) et la pupille se ferme la main en pronation avec les membres sup. la malade remue ses couvertures, saisit le bonnet de son lit, fait des mouvements automatiques divers, de même également avec le 2 membres, on remarque seulement que les mouvements du membre G. sont plus forts, le bras semble se contracter par moment — En général le mouvement commencé ne rencontrent pas de résistance aussi bien d'un côté que de l'autre; lorsqu'elle est le plus agitée, alors elle résiste et la résistance se fait sentir pour le côté D. du côté du biceps, pour le côté G. du côté du biceps — on peut rencontrer parfois une résistance dans les muscles opposés, mais ce n'est jamais qu'à un faible degré — Enfin la rigidité paraît plus marquée du côté D. que du G —	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
Tantôt que ces jours passés c'était à droite	Les membres inf. sont simultanément ou alternativement, fléchis, étendus, portés de D. à G. dans l'adduction, la abduction — Il existe toujours un certain degré de résistance du côté de fléchissement surtout du côté D. Le reflexe tendineux rotulien est à peine marqué du côté de la paralysie on ne peut rien se prononcer particulièrement à droite, mais on le trouve au contraire très marqué chez la malade. Déterminé des mouvements involontaires marqués du côté G. ~~tantôt plus~~ on remarque rotations dans la commissure D est moins mobile que celle G. Les piqûres sur le membre inférieur à des mouvements réflexes, beaucoup plus marqués pour le membre inf. plus marqué aussi du côté D. Non seulement la piqûre du membre sup. donne lieu à un reflexe mais prononcé, mais il y a aussi un retard très manifeste, que dans le membre inférieur — Les piqûres du tronc donnent lieu à une agitation générale, et à des mouvements plus marqués du côté du membre inférieur — Elle change souvent de position, se tournant tantôt sur le côté droit mais le plus souvent sur le côté G. dans le sens de D. à G. — (Idée = si on pique d'un côté ou de l'autre les contractions prédominent du côté piqué et il y a en même temps une agitation générale avec mouvements des membres sup. pour se défendre — Déglutition toujours difficile — Incontinence — Constipation — Pouls 100 — Resp. 20 — irrégulière — Rougeurs ecchymotiques sur les points saillants — Fesses — Coudes — Elle tousse beaucoup on trouve Expectorations crachats sur le bord de ses lèvres débris de crachats purulents — Ce matin elle a prononcé quelques paroles, mais au moment de la visite il est impossible de rien en tirer	

SCD Lyon 1

(Dupraz francois) (Méningite)

No 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
14 Juin	A la suite d'une prise de Calomel 0,05 et de Scammonée, la malade est allé abondamment de ventre hier dans la soirée — Elle avait très agité la minuit a 4h du matin — Depuis lors elle est plus calme — La respiration persiste — Temperature a certains moments le matin exacerbations, — persistance de la contracture des muscles de la nuque Quand on soulève les membres sup. ils retombent tantôt elle fait encore qq. mouvements automatiques avec les deux membres, mais plus volontiers avec le membre droit — Pas de resistance aux mouvements communiqués, sauf une très légère au moment ou se produit le mouvement automatique — Quand on fléchit la malade au front sur la ligne médiane, la contracture est à peu près égale des 2 côtés, cependant peut être un peu plus marquée à droite — Quand on agit cette contracture est faible — Mêmes reflexes, plaintes, dilatation de la pupille sous l'influence des frictions — Pas de mouvements automatiques Mêmes phénomènes qu'hier, temps sans un peu plus marqués à droite qu'à gauche — Temps sans un peu de resistance des fléchisseurs aux mouvements communiqués, persistance des reflexes cutanés, temps sans plus marqués que aux membres sup. et plus prononcés à droite absence de reflexes rotuliens —	
15 Juin	Persistance de la temp — Les yeux sont plutôt déviés à gauche — Machonnement — Facies méningitique très prononcé — En somme mêmes phénomènes qu'hier, sans beaucoup moins d'agitation et plus d'affaissement — La malade a commencé hier soir à uriner au lit — a parlé aussi dans la nuit quoiqu'elle ne soit pas agitée, presque des cris de temps en temps — Ce matin elle est mieux que nous ne l'avons jamais vue, moins affaissée, moins agitée — Demandant spontanément à boire, tirant la langue, donnant la main à la main, faisant aussi un peu remuer les mouvements de flexion et d'extension des membres, se tirant même sur son séant	

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

(Dupuy Jean Louis) Meningite

N° 21 bis.

DATES	15 juin HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	On remarque toujours un affaiblissement prédominant du côté gauche surtout dans le membre supérieur — qui ne peut pas maintenir longtemps élevé, qui est mu avec plus de lenteur et qui retombe plus facilement — La commissure G. est également un peu moins mobile que celle du côté droit — La malade ouvre les yeux, regarde d'un côté et d'autre spontanément et comme sur le cri demande —; mais lorsque les 2 yeux peuvent être parfaitement dirigés à gauche si elle regarde à D. l'œil G. seul est dirigé en dehors, tandis que l'œil D. ne dépasse guère la ligne médiane — Les pupilles sont dilatées — La malade répond assez facilement et sans précipitation, on n'observe pas les mêmes relatives des jours précédents	
	La langue n'est pas déviée, saburrale — Les membres sup. ne présentent pas de résistance aux mouvements communiqués Si la malade ne s'y oppose pas, mais on trouve une résistance des fléchisseurs de l'avant-bras sur les membres — Le réflexe rotulien a reparu à un léger degré des 2 côtés — Mêmes phénomènes que précédemment pour les réflexes cutanés —	
	La toux est beaucoup plus fréquente que précédemment — La malade geint toujours un peu de temps en temps — Quand on lui demande ce qui lui fait mal elle répond toujours l'estomac — Pas de vomissement — Le pouls est accéléré à 120 régulier — La peau est chaude — Les jambes fléchies —	
16 Juin	Elle a parlé dans la journée, toussant, se plaignant presque constamment — Vers 7 h. du soir elle a été prise de délire — on a été obligé de la contenir — (elle était agitée) Le matin elle est redevenue calme répondant peut-être mieux aux questions que hier — Elle donne la main, serre la main, tire la langue tel qu'elle ne peut pas bien voir —	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Toujours un peu plus de faiblesse à gauche — Pour tous les autres phénomènes, rien à celui d'hier —	Constate un état identique
	Est allé abondamment de ventre —	
	La pupille de l'œil G. est toujours plus dilatée et l'œil G. est toujours plus mobile	
	Elle se plaint toujours de l'estomac et a bien soif — Elle demande spontanément à boire. Elle est ainsi quand on lui demande la main en la priant de serrer : je ne puis pas serrer bien fort, car je suis faible.	
	Elle tousse toujours beaucoup — Ses lèvres sont souillées par des débris de crachats sanguinolents —	
17 juin	= Pendant la nuit la malade a été très agitée cependant en faisant des mouvements moins forts que précédemment et en conservant sa connaissance. Elle a toussé, craché, avec gênement comme la veille précédente et à la fin elle ne pouvait plus se débarrasser de ses crachats qui étaient plus abondants que précédemment — Morte à 4 h. du matin —	

Autopsie — le 18 juin à 9 h. du matin

En ouvrant la dure mère, les circonvolutions paraissent un peu tassées, et surtout les sinus sont très noirs, très remplis — En enlevant l'encéphale il ne s'écoule qu'une petite quantité de liquide — Les sinus contiennent des caillots noirs récents — A la base de l'encéphale on remarque un exsudat gris-blanchâtre épais surtout immédiatement au niveau et en arrière du chiasma des nerfs optiques — Cet exsudat enveloppe tous les vaisseaux et les nerfs de la base en s'étendant sur la protubérance et le bulbe où il est de plus en plus mince, il s'étend aussi en avant vers les nerfs olfactifs en s'amincissant, il contourne aussi à gauche une large anomalie la scissure de Sylvius de chaque côté. (Il est à remarquer que la tunique de la Sylvienne droite est un peu épaissie par l'exsudat de ce côté) — En mettant à découvert la face de la scissure de Sylvius on trouve un exsudat rempli de granulations grisâtres —

et les vaisseaux

SCD Lyon 1

Depras François (Méningite)

№ 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Autopsie (suite) Aussi bien d'un côté que de l'autre. Les cinq circonvolutions sont très adhérentes et friables. Il existe aussi un exsudat avec tubercules à l'origine des cérébrales antérieures. Les deux moteurs oculaires communs sont pris également. L'exsudat est aussi épais au niveau des moteurs oculaires ext. tantôt il passe au niveau du moteur oculaire ext. suivi une artère cérébelleuse recouverte elle même d'exsudat. La cinquième paire est prise également des deux côtés. ~~Immédiatement en arrière des 7e et 8e paires on voit la couche exsudative granulations tuberculeuses.~~

En suivant les artères sylviennes on voit qu'elles sont restées perméables.

Tout le long de la grande fente de Bichat il existe un exsudat avec granulations et la pathologie est également recouverte par l'exsudat des deux côtés.

Les ventricules latéraux contiennent un peu plus de liquide qu'à l'état normal - liquide louche et il existe aussi des tubercules le long des vaisseaux des plexus choroïdiens.

Vers la Convexité des Hémisphères on remarque outre la congestion et la sécheresse, l'épaississement des méninges, une teinte opaline des méninges çà et là le long des vaisseaux, et des granulations isolées sur ceux qui avoisinent la scissure de Sylvius, notamment au niveau du lobule pariétal inférieur — En examinant le fond des sillons on trouve partout sur les méninges de fines granulations, parfois elles sont plus nombreuses dans le sillon de Rolando et les sillons avoisinants, mais en somme on en trouve partout et cela au fond des sillons le long des vaisseaux —

Rien de particulier sur les coupes - On remarque seulement que les parois des ventricules sont un peu ramollies par imbibition — Congestion et vascularisation assez prononcées —

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Hemisphère Gauche = On trouve absolument la même disposition en ce qui concerne les tubercules de la convexité — partout des tubercules dans le fond des sillons, peut-être sont-ils un peu moins confluents dans le sillon de Rolando — Sur la coupe pédiculo-pariétale on trouve sur un foyer le ramollissement blanc à l'extrémité antérieure du lobe sphénoïdal — foyer ayant 3 dimensions d'une noix — Il n'existe aucun tubercule à ce niveau, seulement on remarque les vaisseaux qui se rendent à cette région présentant des tubercules très confluents

Cervelet = Il existe sur le lobe médian à la partie antérieure quatre petits tubercules de la grosseur d'un grain de riz — En incisant plus profondément on voit qu'ils forment par leur réunion, une masse de la grosseur d'une noisette — Rien de particulier dans les circonvolutions du cervelet

Rien dans la protubérance — rien dans le bulbe —

Poumons = Les poumons sont très emphysémateux — Le poumon G. est à un haut degré — Le côté droit, c'est surtout le bord antérieur — La surface des poumons est d'un blanc rosé avec des dépressions légèrement bleuâtres — En incisant le lobe sup. d'un poumon vers les parties centrales on trouve de petits tubercules blanc jaunâtre, mais il n'en existe pas au niveau du bord antérieur qui est emphysémateux au plus haut degré — Par contre on trouve une grande quantité de tubercules disséminés et de récente formation, dans les parties centrales de l'organe — Les vaisseaux en entrant dans le lobe présente une dilatation — Les bronches en général, et la trachée en particulier, présente les dimensions d'une petite

SGD Lyon 1

Modèle N° 61.

Nom Duprez — 4èmes femmes — 152

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95	210	34,0 42,5											
90	200	33,6 42,0											
	190	33,2 41,5											
80	180	32,8 41,0											
	170	32,4 40,5											
70	160	32,0 40,0											
	150	31,6 39,5											
60	140	31,2 39,0											
	130	30,8 38,5											
50	120	30,4 38,0											
	110	30,0 37,5											
40	100	29,6 37,0											
	90	29,2 36,5											
30	80	28,8 36,0											
	70	28,4 35,5											
20	60	28,0 35,0											
	50	27,6 34,5											
10	40	27,2 34,0											
	30	35,5											

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

(Dupray. francisa) (Méningite)

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Cette cavité ainsi que les deux Bronches sont remplies de Mucosités purulentes — Les côtés du poumon Droit, sont sains sauf au niveau du Bord ant. où emphysémateux on trouve une Congestion manifeste et il n'existe ni Tubercules ni Dilatations bronchiques de ce côté — Rien sur les côtés des plèvres — Le péricarde contient une forte dose de liquide — Le cœur n'offre rien de particulier, ni les reins, ni le foie, ni les veines, ni la rate, ni le intestins, ni le péritoine	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

DATES	4e Ff. N° 192 HISTOIRE PATHOLOGIQUE Duprez François	PRESCRIPTIONS Méningite tuberculeuse

Réflexions. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette observation, c'est la disparition ou tout au moins l'atténuation notable de l'hémiplégie gauche à l'apparition à ce moment d'un certain degré de parésie du côté droit de la face qui, du reste, n'a été que passagère.

Le retour des mouvements du côté gauche ne peut pas être attribué à la résolution des lésions, puisque celles-ci vont en continuant en augmentant progressivement. Sous la même raison on ne peut guère croire qu'il est dû à cette impression produite par l'apparition de lésions, lésion s'localisant d'autant mieux que ces lésions ne gagnent pas en profondeur et ne détruisent pas la substance cérébrale. Autant, des lésions en apparence aussi superficielles donnent bien d'autres fois à des paralysies persistantes. L'apparition d'une parésie du côté droit de la face au moment du retour des mouvements du côté gauche nous fait penser que l'un des hémisphères qui n'était pas encore envahi par les lésions ou qui l'était à un degré est devenu le siège d'un plus grand nombre de lésions au point de déterminer une parésie passagère de la face du côté droit à mesure le retour des mouvements du côté gauche. Puis les lésions s'équilibrant à peu près un chaque hémisphère, c'est la parésie du côté gauche qui a persisté, c'est-à-dire celle qui s'est montrée la première. A l'appui de cette hypothèse on peut remarquer que la paralysie du côté gauche était à peu près flasque (il existait qu'un peu d'incurvation du côté des fléchisseurs du m. inf.) tandis que les membres du côté droit étaient continuellement agités; il y eut avec le retour des mouvements du côté gauche il y eut une certaine degré d'incurvation aux mouvements communiqués et même une agitation spontanée assez notable. Or, nous avons déjà eu l'occasion d'observer plusieurs fois l'apparition de la contracture du côté paralysé sous l'influence d'une lésion survenant dans l'hémisphère qui était sain, c'est-à-dire du même côté que la paralysie. Chez notre malade nous ne pouvons pas affirmer que la paralysie était due à la lésion des méninges internes du côté opposé; car lorsque l'orifice des lésions situées au niveau des méninges, il est très-possible que la paralysie provienne des lésions corticales du même côté. Du tout cas cette question n'est pas résolue. — La prédominance des lésions sur l'hémisphère droit ferait plutôt pencher pour une action croisée; mais cette prédominance étant en réalité très-légère, nous avons aussi signalé

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

l'appareil de la circulation de la cyclose droite ne trouvait de même impossible à dire si par ce fait la circulation était entravée plutôt du côté droit que du côté gauche. En tout cas il n'y avait pas de phénomènes tuberculeux, d'altération apparente au niveau des régions dites motrices. On peut attribuer les deux troubles des centres nerveux, soit à une entrave de la circulation par le fait de la compression tuberculeuse sur le trajet de petits vaisseaux, soit à des phénomènes d'irritation des couches corticales voisines des méninges atteintes, soit peut-être à ces deux causes réunies. En faveur de la première hypothèse, on remarquera que dans un point correspondant à l'extrémité antérieure de la scissure sylvienne gauche où les granulations étaient très-confluentes sur la voussure se rendant à cette région, il existait un véritable foyer de ramollissement. Cette question est difficile à élucider en raison de la multiplicité des lésions. Nous pensons y arriver il faudrait multiplier les observations en notant avec soin toutes les particularités relatives au siège des lésions, mais il faudrait aussi examiner avec exactement que possible les méninges de la base. afin de reconnaître pour connaître avec exactement que possible les effets de la simple irritation des méninges, de l'un des méninges de la base.

La maladie a débuté brusquement par une attaque convulsive. Dans ce cas les phénomènes qui ont suivi ne laissaient aucun doute sur la nature de la maladie, mais nous avons vu d'autres fois notamment chez des enfants ce même début suivi d'un état fébrile qu'on pouvait rapporter à toute autre affection. D'où l'importance de la remarque aussi exactement que possible sur le mode de début dans les cas où l'on peut songer à une méningite tuberculeuse. Nous remarquerons encore que ces convulsions peuvent être assez prononcées sans passages pour un peu attirer l'attention des parents qui ne donnent alors de renseignements précis que longtemps après les phénomènes qui ont pu se produire.

La malade après avoir perdu connaissance dès le début de son affection n'a recouvré un peu ses facultés intellectuelles que pendant les derniers jours qui ont précédé sa mort. Comme très-vraisemblablement les lésions ont été en augmentant on ne peut pas attribuer le retour de facultés intellectuelles à une diminution. Ce retour reconnaît probablement pour cause le siège superficiel des lésions, l'accoutumance du cerveau et peut-être aussi l'envahissement des parties plus ou moins éloignées (cithare de l'encéphale, moelle).

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE 4 ff. n° 182 Dupraz François	PRESCRIPTIONS

Réflexions (suite) - Comme c'est vraisemblablement la première lésion qui a donné lieu aux phénomènes convulsifs, on peut rapporter ceux-ci aux lésions de l'ectrument sphénoïdal gauche qui paraissaient être les plus anciennes. Cela rendrait compte de la prédominance des convulsions du côté droit (renseignement cependant incertain) au début, mais surtout de la déviation des yeux du côté gauche car cette déviation a précédé l'apparition de la paralysie. Il n'est pas impossible que les lésions hémisphériques gauches aient donné lieu tout à la fois d'abord aux convulsions généralisées avec prédominance à droite et ensuite à l'hémiplégie incomplète du même côté, avec déviation des yeux à gauche. Nous avons déjà observé chez un cas où avec une hémiplégie d'un côté, il y avait eu des convulsions du côté opposé et probablement sous l'influence de lésions hémisphériques superficielles, car, dans notre cas, ces lésions ne sont pas été suivies d'autopsie. Chez notre malade on observait encore la première forme de contracture rhythmique des muscles de la paupière inférieure droite, restée des convulsions de ce côté, tandis que les yeux étaient dirigés du côté opposé. Il est présumable que pendant la convulsion les yeux devaient être dirigés à droite, tandis qu'après sous l'influence de phénomènes paralytiques succédant aux convulsions, ils étaient déviés à gauche. Il est vrai qu'il existait aussi des lésions tuberculeuses dans le cervelet et que ces lésions pouvaient aussi avoir une influence sur la déviation des yeux du côté de la paralysie. Je suis néanmoins porté à croire que les phénomènes paralytiques présentés comme nous les avons observés chez notre malade ont l'alcoolisme des lésions cérébelleuses ou des lésions d'un point pédonculaire de l'isthme, mais seulement chez des malades atteints de lésions superficielles touchant aux méninges. Ce n'est pas à dire que l'existence de lésions du bulbe au niveau de l'isthme ne pouvaient avoir aucune influence sur cette déviation, mais on voit que les lésions du bulbe peuvent exister sans déviation et inversement sans déviation aussi pronon-

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Cette observation d'apoplexie de cerveau, avec paralysie, nous paraît avoir une influence sur la coïncidence, la déviation des yeux, comme sur la paralysie, et des convulsions, qui n'est pas encore déterminée. Au premier abord la déviation des yeux paraissait n'offrir d'autre particularité que la direction à gauche du côté de la paralysie, une prédominance de la déviation de l'œil gauche, mais ensuite, lorsque les yeux ont été dirigés à droite, c'est encore l'œil gauche qui a été le plus dévié ou même le seul dévié, l'œil droit restant presque immobile ou ne déviant qu'un peu à gauche. Bien plus, lorsque le malade a repris connaissance la vieille et l'avant-vieille semaine, on a pu remarquer que les yeux ne se mouvaient plus également de chaque côté; que l'œil gauche pouvait se mouvoir en tous sens, tandis que l'œil droit ne pouvait pas dépasser la ligne médiane à droite et ne pouvait plus ne plus se diriger complètement à gauche, le mouvement de ce côté étant encore restreint. Il résultait donc de nos divers examens que l'œil gauche, non seulement que l'œil gauche a été plus dévié que l'œil droit, mais aussi qu'il est resté plus mobile. Cette diminution de la mobilité de l'œil droit indiquait évidemment un certain degré de paresie des muscles de cet œil et notamment de l'oculo-moteur externe. On n'observe ordinairement rien de semblable avec les lésions hémisphériques simples de la [illegible] nous avons aussi la paresie existe dans les cas de lésion hémisphérique double; mais on peut voir des phénomènes analogues à ceux que nous venons de rapporter lorsqu'il s'agit de lésion protubérantielle. Cette paralysie certaine d'un côté, tandis que les muscles sont plus ou moins paralysés de l'autre côté, constitue, comme l'on sait, une des formes de paralysie alterne. Or nous avons aussi une paralysie alterne bien que la protubérance ne fut le siège	

SCD Lyon 1

5 DATES	4me ff. 4: 192 HISTOIRE PATHOLOGIQUE Dupraz Françoise	PRESCRIPTIONS

Réflexions (suite) - D'ouverture lésion appréciable en dehors de l'appareil méningétique. Quant à celle-ci elle paraissait égale des deux côtés. Les nerfs moteurs de l'œil paraissaient aussi enveloppés d'une gaine égale par l'exsudat de la base, et le rapport du moteur-oculaire externe droit avec la tumeur ne nous paraît pas une cause suffisante pour expliquer la paralysie, d'autant que le moteur-oculaire commun présentait aussi un certain degré de parésie. Il faut donc chercher une autre explication. Et d'abord dans tous les cas de lésion double de la protubérance ou des hémisphères la déviation des yeux ne dépend pas de l'intensité de la lésion d'un côté. L'ordre d'apparition des lésions est important à considérer comme nous l'avons déjà dit, ainsi que la coïncidence des lésions protubérantielles et hémisphériques. Il est très-possible que la parésie de l'œil droit soit en rapport avec la parésie des membres gauches dans un cas où les lésions étaient répondues sur toute la base de l'encéphale, et ne gênaient peut-être que d'une façon très-minime à produire une paralysie alterne. A l'avenir nous devrons rechercher si il en est ainsi dans tous les cas de méningite avec hémiplégie et déviation des yeux du côté de la paralysie, où de l'hyperémie que nous avons constatée dans quelques cas dans des conditions qui restent à déterminer au moyen de nouvelles observations.

La paralysie du pneumogastrique droit (phrénique) était peut-être un phénomène de même ordre que ceux dans la parésie des membres du côté opposé.

Les variations dans la direction des yeux devaient être communes. Contrairement en rapport avec la gravité du pronostic. Déviation plutôt du côté droit, c'est-à-dire opposé à la déviation des yeux - rapports recherchés à faire à ce sujet.

Les pupilles ont été très-resserrées chez malades pendant la période comateuse, et on a remarqué souvent que le resserrement était d'un côté plus prononcé. Il a toujours été plus marqué dans les moments de somnolence une diminution des mouvements respiratoires, tandis que la dilatation s'est toujours produite pendant les moments d'agitation avec accélération et irrégularité des mouvements respiratoires. Le resserrement pupillaire a toujours

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	~~et~~ plus prononcé du côté droit, toujours produits sous l'influence de la lumière mouvements de rétrécissement maximum pendant les mouvements de dilatation, marqués du côté gauche. Ainsi de l'œil et de l'iris ont constamment côté droit, de sorte qu'on peut dilatation de l'iris à une paralysie D'autre part, il est à remarquer bien que les muscles de l'œil fussent la pupille était plutôt rétrécie, vraisemblablement pour cause sympathiques qui ~~étaient~~ atteints, ~~surtout~~ de l'œil, ~~et cette pupille~~ des muscles du côté gauche. Quant à dilatation qui se produisait les mêmes causes que chez phénomène de Cheyne-Stokes ou après l'amaurose provoquée. — Nous avons vu que sous l'influence de la lumière la pupille se contractait toujours ce phénomène qui était très-marqué dilatation, il était beaucoup moins rétrécissement, ~~la contraction~~ pupille ~~était~~ ~~sous~~ l'action de la lumière était ~~diminuée~~. ~~La contraction~~ ne ~~paraissait~~ pas non plus produire un effet de rétrécissement lorsqu'on l'approchait de l'œil au moment où la dilatation ~~de sa~~ ~~dilatation~~ en tout ou moins, l'effet était très-peu léger pour pouvoir inaperçu ; mais aussitôt que la dilatation de la pupille s'était produite elle se reconnaissait par le défaut de lumière et l'on observait encore une série de légers rétrécissements de dilatation jusqu'au moment où il survenait une nouvelle phase de rétrécissement ou de plus grande lumière.	le mouvement de l'iris à ses retours ~~a toujours~~ manifesté ~~a toujours été plus~~ de ce côté, le mouvement ~~a été plus~~ ~~diminué~~ de atteinte la plus grande moto-oculaire commune que pour l'œil droit notablement paralysé. Cela était reconnaissable une paralysie des filets comme les autres ~~alternait~~ aussi avec celle ~~au~~ rétrécissement alternativement, pendant dilatation, il reconnaissait au moment des ~~atteinte~~ pendant la période de ~~atteinte~~ ~~dans~~ l'œil droit ~~du côté~~ ~~La contraction~~ ~~immédiatement~~ ~~approchait~~ ~~de~~ ~~contraction~~ ~~ou~~ ~~moins~~ ~~l'effet~~ ~~était~~ ~~très~~ ~~aussitôt~~ ~~que~~ ~~la~~ ~~dilatation~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~pupille~~ ~~se~~ ~~reconnaissait~~ ~~par~~ ~~le~~ ~~défaut~~ ~~de~~ ~~lumière~~ ~~et~~ ~~l'on~~ ~~observait~~ ~~encore~~ ~~une~~ ~~série~~ ~~de~~ ~~légers~~ ~~rétrécissements~~ ~~de~~ ~~dilatation~~ ~~jusqu'au~~ ~~moment~~ ~~où~~ ~~il~~ ~~survenait~~ ~~une~~ ~~nouvelle~~ ~~phase~~ ~~de~~ ~~rétrécissement~~ ~~ou~~ ~~de~~ ~~plus~~ ~~grande~~ ~~lumière~~.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	4ème fév. N°152 Dupraz Françoise	
	Réflexions (suite) – De ce que la dilatation pupillaire se produit vers un rapprochement de l'œil approche la lumière, dans les cas de ce genre, certains auteurs ont pu croire que la lumière avait alors une action inverse de celle qu'elle a habituellement. Or, si dans quelques cas il a pu en être ainsi c'est que la lumière excitait suffisamment le malade pour le faire entrer dans la période d'agitation et par conséquent la dilatation pupillaire. Mais dans notre cas la dilatation pupillaire s'est rapport produite au moment de l'approche de la lumière. Cela a certainement pu produire l'effet indiqué précédemment. Toutefois le plus souvent il n'en était pas ainsi comme nous l'avons dit plus haut, puisque la lumière déterminait alors un léger resserrement même pendant la période de calme. Il est donc probable que VIII il n'y a simple coïncidence entre l'approche de la lumière et la dilatation pupillaire.	
	La respiration présentait le rythme observé dans les resp. de Cheyne-Stokes, sauf qu'il n'y avait pas de pause complète, la période d'augmentation des mouvements respiratoires augmentant pendant la période d'agitation. Il est à remarquer que les phases relatives des mouvements respiratoires avaient été modifiées pendant les 2 ou 3 derniers jours, ce qui coïncidait avec l'amélioration des autres troubles cérébraux.	
	Les réflexes cutanés étaient conservés, quoique amoindris à gauche. Ils persistaient ordinairement, un effet, dans la méningite. Ils étaient d'autant plus prononcés que le malade était examiné après un temps plus long de repos. C'est là une règle générale concernant la sensibilité réflexe que la distinction de la sensibilité proprement dite dans laquelle la perception est d'autant plus vive que les excitations sont plus fréquentes et plus rapprochées. Quant à la diminution des mouvements réflexes du côté paralysé on peut dire aussi que c'est un phénomène général se rapportant au degré de paralysie de l'état constitutionnel du malade et consistant en un trouble survenu dans l'appareil sensitivo-moteur correspondant	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	aux membres paralysés. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que les réflexes sont augmentés du côté paralysé; le plus souvent ils présentent des caractères différents de ceux des membres sains. Nous ne voulons pas, du reste, nous occuper actuellement de ces cas dans lesquels ces réflexes, différent totalement de ceux de la méningite. Chez notre malade on constatait plutôt diminués du côté paralysé que du membre sup. gauche. Il était ainsi habituellement; mais, c'est aussi le membre inférieur qui est habituellement le plus paralysé. Non seulement le membre sup. réagissait moins, mais même il mettait plus de temps avant de réagir sous l'influence des excitations. Ce retard dans la production du mouvement ne peut donc pas être attribué à ce que les excitations portent sur des points plus ou moins éloignés de ceux où l'on constate le rapport avec le plus fréquemment ordinairement au membre rapporté aux mêmes causes.	
	Le réflexe rotulien était conservé, mais très affaibli. Le réflexe tendineux de la R. cutanée semble conservé. Nous avons constaté sa disparition dans la méningite. Le phénomène de trépidation rotulienne plantaire persistait toujours faire défaut. On peut dire d'après les faits que nous avons observés que dans la méningite le réflexe rotulien fait défaut ou tout au moins est notablement diminué alors qu'il n'existe jamais de trépidation rotulienne ou plantaire: ce qui peut donc quelquefois servir à la distinction de la méningite d'avec la fièvre typhoïde compliquée de troubles cérébraux, la trépidation existant souvent dans ce dernier cas.	
	Pendant tout le cours de la maladie nous avons constaté une résistance plus grande des membres inférieurs que des membres sup. aux mouvements communiqués. Et de même les membres inf. avaient conservé à un degré plus marqué qu'aux m. sup. le mouvement spontané, autrement dit les réflexes, les sensibilités cutanée, tendineuse. La rétraction prédominait surtout du côté des fléchisseurs d'où la position dite en chien de fusil signalée fréquemment dans la méningite.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	4me Sf. n°152 Dreyroz Françoise	

Réflexions (suite) Lors de notre premier examen alors qu'il n'existait pas de paralysie manifeste, il nous a semblé que le membre sup. g. présentait un peu plus de résistance aux mouvements communiqués que le m. sup. droit. Ce phénomène était l'indice de la lésion qui en s'accentuant a donné lieu aux phénomènes de paralysie. Cette remarque est basée sur des faits observés antérieurement dans lesquels nous avons trouvé de la contracture correspondant à de la ~~contracture~~ raideur légère et avec de la contracture précédant des symptômes de paralysie aux foyers de ramollissement. Ce n'est pas que la même lésion donne lieu à des symptômes consécutifs de contracture puis de paralysie; mais ces symptômes sont en rapport avec l'intensité de la marche de la lésion. Il est facile des lors comprendre qu'avec la contracture, seule en apparence, il existe déjà une diminution de la force. Si la contracture prédomine avec elle une lésion superficielle, peu intense; tandis que la lésion devenant plus intense plus profonde détermine une paralysie plus marquée en même temps qu'une contracture moins prononcée, d'autant moins que la paralysie est plus complète et que l'état général du sujet est plus mauvais (Il est bien entendu que nous n'entendons parler que de contractures récentes; encore y a-t-il bien des circonstances relatives au siège de la lésion, à sa marche, etc. qui peuvent modifier ce que nous disons d'une façon générale).

Lorsque la paralysie est survenue du côté gauche, nous avons alors trouvé une augmentation de résistance du côté droit et une résistance plus grande des membres de ce côté avec mouvements communiqués. Sur le m. inf. on ne remarquait que cette différence de résistance; mais pour le m. sup., tandis que le m. g. résistait notant du côté de la flexion, pour le m. droit la résistance existait notant du côté de l'extension. Nous avons souvent noté

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	cette différence dans la résistance offerte du côté opposé. Ce n'est pas par de résistance prédominante du côté un membre paralysé, mais c'est plutôt trouve cette résistance tandis que c'est surtout le biceps qui reste dans les membres paralysés. – Enfin la résistance offerte par les membres sup. ou inf. paralysés ou non, présente toujours une grande variabilité surtout pour les m. sup., les m. inf. présentant toujours une résistance plus ou moins prononcée C'est après un repos ou lorsque le malade était agité de parfois sans cause appréciable que la résistance existait ou était plus marquée. Parfois, enfin, elle faisait défaut aux m. sup. surtout du côté paralysé. Les conditions capables d'influer sur la production de ces phénomènes sont donc nombreux. De même, on observe les mêmes phénomènes avec des lésions de nature diverse dans des localisations différentes.	pour les membres paralysés à dire que les mouvements du triceps brachial dans du côté opposé que l'on Les mouvements de la tête spontanément dans la flexion. paralysés ou non, présentent surtout pour les m. sup., plus ou moins prononcés malade était agité de paraît existait ou était plus aux m. sup. surtout d'influer sur la
	Lorsque l'on provoquait fortement la force il se produisait une agitation générale, mais les mouvements étaient plus prononcés du côté paralysé. Ce qui semble indiquer qu'il s'agissait de mouvements réflexes. Les muscles de la nuque présentent une résistance aux mouvements communiqués à même notion que celle des membres avec prédominance du côté des muscles de la nuque. Quand la contracture est forte, elle ramène la tête en arrière spontanément de même que les m. inf. sont spontanément dans la flexion. mais si elle est moins prononcée, elle ne devient sensible que sous l'influence de l'excitation qui consiste à étendre les membres affectés, lesquels résistent alors plus ou moins.	plus prononcés mouvements de même notion la tête en arrière spontanément sont spontanément dans la flexion. sensible à étendre les membres
	Avec la diminution de l'agitation nous avons constaté la diminution de l'affaiblissement général, la diminution de la résistance musculaire et la disparition de l'agitation, la diminution de la résistance musculaire et la disparition des troubles réflexes. La fièvre n'était pas en rapport avec l'intensité des troubles. Elle ne peut pas non plus rendre compte des troubles qui survenaient la nuit pendant les derniers jours et menaçait constamment de déterminer la mort, alors que pendant le jour il survenait une amélioration évidente de tous les symptômes. C'est une particularité observée dans un certain nombre de malades, mais qui paraît surtout prononcée dans la tuberculose et notamment dans la tuberculose des méninges. La lésion de ces nerfs aurait facilité le diagnostic en cas de doute, mais elle nous paraît supposer que la toux soit provoquée par des tuberculoses remontant à un temps plus ou moins éloigné. Or, il existait une dilatation bronchique dans le poumon g. avec emphysème gradué. Les poumons des deux côtés, de sonorité assez tubulaire dans le poumon g. plus de dilatation bronchique. Rien ne permettait de penser que ces anciennes lésions tuberculeuses avaient été suivies de production de nouvelles lésions tuberculeuses pulmonaires ? Il était en effet bien établi, contrairement à l'opinion admise	(trois fois) agitation, délire) nuit pendant la mort, alors que symptômes. ?

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Baronnat Salle Ste Jeanne Lit N° 23 F°

Prénoms Louis

Age 26 ans

Profession Journalier

Né à Lyon

Demeurant à

Entré le 8 Mai 1882

Sorti le Décès le 20 Mai à 10h du soir

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

of Méningite

Chef du service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Père mort à 59 ans ~~mort~~ Mère morte à 38 ans d'un refroidissement. Deux frères morts en bas âge. Une sœur vivante bien portante

Etant jeune, le malade a eu de l'otorrhée des deux oreilles, et de la blépharite avec une tache sur l'œil gauche qui a maintenant disparu. Il n'a pas eu d'adénites cervicales. Depuis 8 ans est toujours bien porté. Pas d'alcoolisme.

Il est très sujet à prendre des refroidissements, se tenant par suite de son état, devant des fourneaux où l'on fait la fonte. Le dernier hiver il a beaucoup toussé, et au mois de janvier son état s'aggrava, et au bout de 15 jours il dut cesser son travail. Il a eu deux hémoptysies peu abondantes vers le fin du mois de février. Sueurs de transpiration nocturne. Depuis le commencement de sa maladie il a la voix ~~f~~ voilée et ne peut pas parler à haute voix

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F°

Urines colorées par le dépôt Nuag. d'albumine par la chaleur et l'ac. nitrique

Actuellement. Le malade est un peu amaigri, la figure est un peu pigmentée en jaune gris, surtout autour du nez et des yeux. Il n'a guère de sommeil la nuit mais pas de sueurs, il tousse beaucoup et rend des crachats muqueux, purulents. Pas de dyspnée. Les jambes présentent un peu d'œdème. L'appétit est conservé pas de vomissements ni de troubles gastriques pas de diarrhée. Le ventre n'est pas ballonné.

Poumons. Matité prononcée aux deux sommets en arrière. Sonorité à peu près complète aux bases. Matité en avant des deux côtés sur le sternum. Son un peu tympanique à gauche.

A l'auscultation. En arrière à droite respiration très soufflante dans toute l'étendue du poumon. elle l'est davantage au sommet où on trouve aussi des râles fins. A gauche au sommet respiration également soufflante et à timbre métallique. Le murmure vésiculaire a disparu on entend des râles fins à timbre métallique également. Le résonnance de la voix prend le même caractère.

En avant à gauche mêmes râles.

Rien au cœur.

Depuis le 5 Mai ~~le mois de janvier~~ il prend des crises épileptiformes. Il en a déjà eu quatre. Auparavant il n'en a jamais eu. La crise commence par de l'aura qui part de la main droite. Celle-ci est affaiblie elle est tremblante comme s'il avait eu une paralysie. A l'aisselle de cette main il n'y a pas de sueurs. Elle est agitée par de petites contractions musculaires. La sensibilité est bien conservée.

Rien aux membres inférieurs. rien du côté de la face. A la suite de la crise d'hier il n'avait rien eu. Ce n'est qu'après celle de ce matin que son bras est paralysé.

12 Mai. Il a pris 4 crises depuis hier. La paralysie a augmenté, elle tient tout le bras. La sensibilité un peu diminuée.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom _____ Salle St Jeanne Lit N° 93 F° _____

Prénoms _____

Age _____

Profession _____

Né à _____

Demeurant à _____

Entré le _____

Sorti le _____

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Chef du service, M. _____

MÉDICAMENTS

Élève interne, M. _____

PRESCRIPTION	S. ALIBILES	CESSATION	PRESCRIPTION	USAGE INTERNE	CESSATION	PRESCRIPTION	USAGE EXTERNE	CESSATION
8 mai	Vin		8	VI gouttes noires dans 30 g. d'eau.	11	12	Lavement Chloral 2 gr	
11	Vin Quina		11	pot. Elix. Garus 30 Sp. diacode 30.				
			11	Bromure de potassium 6 gr Eau 100 gr Sp. d'oc. d'anis 30 gr				

H. H. — S. G. — Feuilles de Médicaments, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° ____ F°

PRESCRIPTION	S. ALIBILES	CESSATION	PRESCRIPTION	USAGE INTERNE	CESSATION	PRESCRIPTION	USAGE EXTERNE	CESSATION

Nom _____ Salle _____ Lit N° 23 F°

13 Mai — Le malade a pris deux nouvelles crises dans le milieu de la nuit, la première a été légère et ne lui a pas fait perdre connaissance. La seconde qui est survenue une heure après a été beaucoup plus forte mais il n'a perdu connaissance que quelques instants. Toutes ces crises commencent par des douleurs et des contractures du membre supérieur droit, les doigts se fléchissent sur la main, celle-ci sur la poignet et tout le bras se contracture. La face est grimaçante pendant ce temps là, et le malade grince des dents.

Aujourd'hui le bras droit peut faire quelques mouvements ce qui tient à ce qu'on l'examine peu longtemps après la crise que la veille.

15. Depuis 48 heures les crises ont été moins fortes c'est à peine si le malade a perdu connaissance mais elles ont été moins fortes. Il a des troubles à peine marqués de la sensibilité du côté droit. Rien de particulier au membre inf. — Crayons pas de trouble appréciable de la sensibilité. Il lui est arrivé une fois de perdre les urines au moment d'une crise, il y a 3 jours.

16 — N'a pas eu de nouvelle crise hier.

17 — Le malade a eu cette nuit une grande crise puis une plus faible. Ce matin il est plus affaissé et couché toujours sur le côté droit. Persistance de la monoplégie incomplète du bras droit sans paralysie du membre inf. du même côté, et seulement avec des signes de paralysie douteux du côté de la face en raison de la présence d'un abcès gingival. Persistance de la sensibilité.

19. Pas de crises mais un peu de subdelirium la nuit. Ce matin le malade regarde bien, mais il est très affaissé. La paralysie du membre sup. est toujours incomplète. — Crayons un abaissement de la commissure droite malgré la guérison de l'abcès

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

20 mai	Pas de nouvelle visa – Même état du bras – En somme bien le particulier dans un affaiblissement général plus grand respiration plus difficile et râles très légers perçus à distance – Un peu de subdelirium cette nuit et ce matin 48 respirations – Pouls très petit 112 –

SCD Lyon 1

Nom Bazonnat Salle Ste Jeanne Lit N° 93 F°

Rien de particulier dans les sinus

Cerveau — En enlevant le cerveau, il s'écoule une quantité assez notable de liquide séreux, louche. Au niveau de la base du crâne, il existe un peu d'épaississement des méninges aux abords des vaisseaux et du chiasma. En examinant les méninges, sur le trajet des vaisseaux, on trouve de tubercules dont le volume varie depuis le plus petit point perceptible, jusqu'à celui d'une tête d'épingle. C'est surtout dans la scissure de Sylvius gauche, que ces altérations sont le plus manifestes, tant en avant et en arrière du chiasma. Dans la scissure de Sylvius droite et à un plus léger degré dans la partie ant.re de la scissure interhémisphérique, quelques tubercules peu nombreux sur les méninges au niveau de la grande fente cérébrale. Il en existe très peu sur la pie-mère et seulement à la partie ant.re Les vaisseaux paraissent sains

Hémisphère Gauche — Les méninges sont épaissies surtout à la partie moyenne de l'hémisphère on aperçoit des tubercules par transparence. ~~En outre on voit~~ C'est surtout au niveau et en avant de la partie moyenne de la frontale ascendante que ces lésions sont le plus prononcées En ce point elles présentent même une induration ~~assez~~ au dessous de laquelle la substance paraît moins consistante. En enlevant les méninges, on les trouve converties de granulations tuberculeuses, d'autant plus volumineuses qu'on approche davantage du point indiqué. En général elles ont le volume d'une tête d'épingle et atteignent le volume d'une lentille. On voit que le point qui est complètement dépourvu correspond au pied de la 2e circonvolution frontale. A ce niveau il existe une saillie du volume d'une noisette s'étalant à la base sous forme de plaque formée par des granulations confluentes, et dont la partie saillante plonge dans le pied de la partie la plus élevée du pied de la 2e circonvolution frontale qui à ce niveau est presque très distendue et présente une fluctuation manifeste. La plaque est adhérente à la portion la plus élevée du tiers moyen de la frontale ascendante. On peut la séparer de cette circonvolution dans la déchirure, quoique elle soit très adhérente, tandis qu'il n'en est pas de même du côté qui plonge dans le pied de la 2e circonvolution. Cette surface de la plaque est irrégulière, paraît formée d'une accumulation de masses blanchâtres, dans l'intervalle desquelles se trouvent des exsudats hémorrhagiques. Sur la coupe de la plaque, on voit qu'elle se sépare en deux parties, bien accolées l'une plus mince ayant 5mm d'épaisseur, consistant de granulations et formée du côté de la frontale ascendante, l'autre ayant 6mm d'épaisseur plus molle, tournée vers le pied de la 2e frontale. Les deux sont réunies par un tissu conjonctif infiltré

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F°

On voit aussi de nombreux vaisseaux qui paraissent se rendre au centre de masses blanches arrondies, formées par les tubercules qui remplissent leur gaine. Au dessus et au dessous, en avant de la frontale Ascendante on trouve deux petites plaques peu saillantes formées par des granulations encore distinctes, tandis que elles se confondent avec la grande plaque.

La substance cérébrale environnant la plaque tuberculeuse offre une coloration légèrement jaunâtre et est tout à fait diffluente, sur une étendue de 3 ou 4 cent en avant au niveau du pied de la frontale. La même altération se retrouve sur la partie correspondante de la frontale ascendante mais sur un point très limité de 2 ou 3 cent en hauteur.

La portion immédiatement en rapport avec la plaque présente des hémorrhagies punctiformes avec destruction de la substance cérébrale.

Hémisphère droit. On trouve des granulations tuberculeuses en assez grand nombre dans la scissure de Sylvius, mais ailleurs elles sont moins nombreuses on en trouve disséminées sur les vaisseaux dans toute les régions. Les méninges sont un peu épaissies.

Rien de particulier dans l'hémisphère droit.

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle 1re Jeanne — N° ~~11~~ 21

Nom Elie Labrune

né à

demeurant à

profession cordonnier

âge 20 ans

tempérament

constitution

entré le 21 avril 1882.

sorti Mort *le* 14 Mai à 10 heures du soir

Autopsie faite le 16 mai à 9h du matin

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Dothiénentérie

Méningite tuberculeuse

Décès présumé le 20 Avril 82.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Père vivant, a eu mère succombé à une suite de couches. 5 frères ou sœurs, deux sont morts très jeunes, les autres sont en bonne santé.

A l'âge de 10 ans il aurait eu une maladie qui aurait duré 6 mois et qui il paraît était cérébrale et typhoïde. = Il aurait gardé en outre des traces de cette maladie, il souffrait à diverses reprises, ce sont ses termes, d'étourdissements. — Ne fournit pas d'hérédité. Pas d'autres antécédents particuliers.

Depuis environ 10 jours il se sentait malade, il éprouvait de la céphalalgie, pas d'épistaxis, pas de vomissements, pas de diarrhée. = Il ne présente pas de symptômes, mais sa maladie paraît avoir augmenté tout à fait subi

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	de prendre le lit il y a 4 ou 5 jours. =	
	Anorexie ou nulle ; langue blanche ; peau d'appétit,	
	sèche et sonore, pas de vomissements. =	
	Ventre non ballonné, ni douloureux. Cas de	
	taches rosées, pas de gargouillement.	
	Céphalalgie entièrement manque. Rachialgie. =	
	Rien anormal. = Rien à signaler.	
	Pas d'albumine.	
	T. R. 39°.	
28 avril	Cas de modifié. Toujours fièvre, Cas d'entrée	
	pas encore abdominaux	
2. Mai	pas de taches rosées pas de Ballonnement	
	Douleur et Gargouillement dans la fosse iliaque droite	
	pas de diarrhée excessive — Le malade rend ses selles	
	tels quels — Rien à l'auscultation —	
	On commence les Bains froids	
4 mai	Pas d'albumine dans les urines.	
6 mai	Pas de taches — persistance de la diarrhée —	
	La température est modérée — On n'a pas retiré de bains depuis	
	hier —	
12 mai	Depuis 8 jours le malade est plus somnolent —	
	Depuis hier il est beaucoup plus absorbé —	
	On est obligé de répéter les questions pour	
	se faire comprendre — Il est obnubilé —	
	Jamais de taches rosées —	
	On a beau l'interpeler il ne répond pas —	
	regard hébété — Il est incapable de prendre	
	n'importe quoi seul —	
	Il se plaint quand on cherche à le faire asseoir	
	Hier Il a eu un vomissement bilieux —	
	Il se plaint quand on touche le Ventre	
	aussi bien à gauche qu'à droite —	
	pas de paralysie, pas de Contracture — Somnolence	
	un peu plus de résistance aux mouvements du	
	côté gauche — pas de trépidation — pas de reflexe rotulien	
	Réflexes cutanés conservés —	
	résiste un peu plus du côté gauche —	
	Coloration très brune des muqueuses —	
14 mai	Les pupilles sont contractiles et moyennement dilatées	
	— Le malade a de la carphologie, il gesticule plus la main droite	
	La vessie est considérablement distendue, il urine par	
	regorgement — pas de reflexe tendineux, pas de trépidation	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

un peu plus petit que le précédent

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Les jambes sont oedemacees — Quand on lui chatouille la plante des pieds, le réflexe a lieu et en même temps le malade se met à uriner — Il a le regard fixe en avant en haut — Tourne les yeux sans regarder — Les yeux sont plutôt portés à gauche surtout à gauche — et principalement quand on relève les paupières et que le malade résiste — Petites oscillations qui tirent les yeux à gauche — Un peu de nystagmus latéral — La pupille gauche est un peu plus dilatée que la droite — Quand on cherche à le faire regarder à gauche il le fait aux péniblement, mais quand on cherche à le faire regarder à droite l'oeil gauche se tourne mieux l'oeil droit est plus fixe — La figure se contracte bien des deux côtés — Il grince des dents — La respiration est irrégulière — Il se plaint quand on le pique — Diminution notable de la sensibilité en général Un vomissement bilieux ce matin — On sonde le malade — Depuis hier le malade a eu 4 coryzal — Resp. 48 — pouls 100 — Il ne parle pas le temps on temps il faut entendre un gémissement	

SCD Lyon 1

Labrosse Elie – Sᵗ Jeannet 21 – Méningite

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Autopsie le Mardi 16 Mai à 9 heures du matin =	
	Cerveau – Quand on incise les méninges il s'écoule une assez grande quantité de liquide, beaucoup plus qu'à l'état normal – Il existe une Méningite tuberculeuse de la base très prononcée, les exsudats de la base englobent le chiasma et les vaisseaux ~~de la base~~ et se prolongent surtout le long de la scissure de Sylvius – Il existe de nombreuses granulations qui se détachent sur les exsudats et principalement le long des vaisseaux –	
	Sur la convexité des hémisphères on ne voit que quelques rares granulations disséminées sur la partie inf. moyenne et antérieures, c'est aussi le long des vaisseaux que ces granulations s'observent, elles sont du reste peu nombreuses et on en compte à peu près de 20 à 30 de chaque côté sans exsudat appréciable à l'œil, tandis qu'au niveau de la base elles sont confluentes – Elles ont environ le volume d'un grain de millet, quelques unes sont plus petites, quelques unes aussi plus volumineuses – Les exsudats et les granulations sont encore très prononcées le long de la grande fente cérébrale de Bichat, enfin on trouve aussi les mêmes lésions très abondantes sur la protubérance et le bulbe, toujours de préférence sur le trajet des vaisseaux – Il existe aussi quelques granulations disséminées sur les faces supérieures et inférieures du cervelet – Les lésions sont disséminées de chaque côté d'une façon à peu près égale – Il existe également au moyen de la protubérance du côté droit immédiatement au dessus du faisceau pyramidal à égale distance de la ligne médiane et du bord externe un tubercule du volume d'un petit pois ayant 4 ou 5 millim. dans le sens ~~vertical~~ antéro-postérieur, 3 millim. dans le sens vertical – 2 ou 3 millim. dans le sens latéral – Ce tubercule a une teinte jaune légèrement verdâtre et une résistance un peu plus grande que celle du tissu cérébral –	
	Dans le lobe latéral droit du cervelet à un centimètre de la surface cutanée on trouve également un tubercule un peu plus petit que le précédent	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* _____ N° _____

(2)

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

On en trouve encore un ~~peu~~ plus volumineux au centre du lobe gauche du cervelet près du corps rhomboïdal un peu au dessus. Le centre de ce tubercule est un foyer de ramollissement et offre l'aspect d'un pus verdâtre. Un autre tubercule de la grosseur d'un grain de millet (un peu plus gros) dans le même lobe près de la surface externe.

Rien de particulier sur les coupes des hémisphères.

La moelle n'a pas été examinée, mais les tubercules paraissent très confluents sur les méninges qui avoisinent la partie inf. du bulbe.

Le poumon Gauche présente des adhérences pleurales ~~tellement~~ fortes, qu'on ne peut extraire qu'une partie du lobe inf. (par incision abdominale, sujet réclamé) Cette portion est criblée de granulations miliaires confluentes.

Le poumon droit ne présente pas d'adhérences et est emphysémateux et au premier abord ne paraît pas affecté, il n'existe pas de tubercule sur la plèvre, mais on aperçoit très manifestement des granulations à travers la plèvre, et en incisant le poumon on le voit également rempli de granulations miliaires confluentes.

Rien de particulier du côté du cœur —

Le cœur gauche aurait peut-être des parois plus épaisses qu'à l'état normal — L'aorte ne paraît pas malade (Il n'y a ~~pas~~ qu'une valvule sigmoïde ~~deux~~ ~~valvules sigmoïdes~~ au lieu de trois à l'état normal), mais une autre beaucoup plus petite en avant qui présente cependant à sa base les bases de la ~~deux~~ deux valvules — Rien du côté de l'artère pulmonaire.

Le foie volumineux, un peu gras, ne présente pas de tubercule, il n'existe pas non plus d'inflammation du péritoine, ni ~~d'inflammation~~ de granulations sur le péritoine.

Les reins volumineux, présentant d'un et d'autre côté un grand nombre de granulations tuberculeuses dans leur

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

de pains de mie blanc jaunâtre disséminées ça et là verrières, formant comme de petites colonnes dans le sens des vaisseaux de la région corticale.

Même aspect à l'extérieur on voit les tubercules apparaître à travers la capsule qui cependant se laisse facilement détacher.

Pas de granulations sur l'intestin, cependant on trouve les ganglions mésentériques un peu tuméfiés, l'intestin contient des matières solides et quelques matières louveuses. On trouve sur l'intestin grêle, les plaques de Peyer légèrement rouges et tuméfiées mais non ulcérées. Il n'y a qu'à la partie inf. de l'intestin grêle, au niveau de la valvule de Bauhin qu'il existe deux ulcérations anciennes, à fond blanc châtre et à bord bleuâtre, l'une a les dimensions d'une pièce de cinquante centimes, aplatie de telle sorte que les dimensions sont un peu plus grandes dans le sens transversal tandis que celle se trouve une autre ulcération un peu plus grande, de forme irrégulière, comme taillée à l'emporte pièce, et plus étendue dans le sens transversal.

Dans le gros intestin on ne trouve rien de particulier, si ce n'est une transformation de follicules clos

Amphithéâtre des Hôpitaux
Le 16 Mai 11 h. du Matin
P. Lereboullet

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* _____ *N°* _____

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

SCD Lyon 1

Mr Labrosse

SALLE Ste Jeanne

Nom Début présumé le 26 Avril 82. N° 21

Dates	Heures des bains		Durée des bains	Température du bain	Température du malade			Observations
	matin	soir			avant le bain	immédiatement après le bain	une heure après le bain	
Avril		1 ½	15	25	39,8	38,7		
		4 ½	"	"	38,3			pas de bain
		7 ½	"	25	39,3	38,9		
		10 ½	"	"	38,6			pas de bain
Mai	1 ½		"	"	39,5	38,7		
	4 ½		"	"	38,7			pas de bain
	7 ½		"	"	38,5			
	10 ½				39,2	38,5		
		1 ½			38,9			pas de bain
		4 ½			39,2	38,6		
		7 ½			38,5			pas de bain
		10 ½			38,8			pas de bain
Mai	1 ½	1 ½			38,4			
	4 ½				38,5			
	7 ½				38,7			
	10 ½				38,9			
		1 ½			38,8			
		4 ½			38,5			
		7 ½			38,9			
		10 ½			38,6			
Mai	7 ½				38,5			
	4 ½				38,7			
	7 ½				38,4			
	10 ½				38,6			
	7 ½				39.4			

SCD Lyon 1

SALLE

Nom N°

N° 18

Dates	Heures des bains		Durée des bains	Température du bain	Température du malade			Observ.
	matin	soir			avant le bain	immédiatement après le bain	une heure après le bain	
5 mai		4 ½			39, 2			
		7 ½			39. 6			
		10 ½			38, 9			
6 Mai	7 ½				39, 1			
	4 ½				38, 8			
	7 ½				38, 5			
	10 ½				38, 9			
		1 ½			39, 4			
		4 ½			39. 1			
		7 ½			39,			
		10 ½			38, 5			
7 mai	7 ½				38, 9			
	4 ½				38, 6			
	7. ½				38, 2			
	10 ½				38, 5			
		1 ½			38, 7			
		4. ½			38, 6.			
8 mai	6				38, 7			
		5			39. 1			
9 mai	6				38, 4			
		5			38, 5			
10 mai	6				38. 2			
		5			38, 8			
11 mai	6				38, 4			
		5			39			

SCD Lyon 1

SALLE

N.°

Heures des bains		Durée des bains	Température du bain	Température du malade			Observations
matin	soir			avant le bain	immédiatement après le bain	une heure après le bain	
6				38,3			
	5			38,5			
11				38			
	11			38,6			
11				37,6			
	11			38,4			

SCD Lyon 1

SALLE

Nom

N.o

N.o 18

Dates	Heures des bains		Durée des bains	Température du bain	Température d malade			Observati
	matin	soir			avant le bain	immédiatement après le bain	une heure après le bain	

SCD Lyon 1

n° 10 Lhomme

Modèle N° 61.

Nom Labrune Elie. Avril 1882. Mai

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
95	210	34,0 42,5											
90	200	33,6 42,0											
	190	33,2 41,5											
80	180	32,8 41,0											
	170	32,4 40,5											
70	160	32,0 40,0											
	150	31,6 39,5											
60	140	31,2 39,0											
	130	30,8 38,5											
50	120	30,4 38,0											
	110	30,0 37,5											
40	100	29,6 37,0											
	90	29,2 36,5											
30	80	28,8 36,0											
	70	28,4 35,5											
20	60	28,0 35,0											
	50	27,6 34,5											
10	40	27,2 34,0											
	30	35,5											

SCD Lyon 1



SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Jeanne N° 6

Nom Louis Point

né à Lyon —

demeurant à Lyon —

profession Facteur de postes

âge 34 ans

tempérament

constitution

entré le 11 8bre 1882 —

sorti le ~~Mort~~ 12 8bre 1882 à 6 heures du soir

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ.

GB - Méningite

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Renseignements fournis par deux de ses camarades qui l'accompagnèrent à l'hopital —

n'a pas eu de changement de la voix —

pas de crachements de sang

était une femme très sensible, comme facteur — la femme le croit Rhumatisme

ses cinq enfants sont tous morts, derniers ne sont pas arrivés à terme

Hérédité = Père et mère morts jeunes, d'épuisement —

Une sœur morte à 12 ans — maladie indéterminée —

Antécédents = Bonne santé habituelle — Pas de syphilis, pas d'alcoolisme — se plaignait parfois de vgs douleurs rhumatismales dans les membres inf.

Cause depuis la campagne de 1870 — Par d'hémoptysie —

Depuis un an ou deux la voix est devenue plus voilée, la expectoration plus abondante —

Jeudi dernier 9 8bre le malade a commencé à se plaindre beaucoup de la tête — Il éprouvait de violents maux de tête —

le lundi soir 9 8bre il s'est mis à délirer —

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	J'ai été appelé à toute promptement pour le malade — Le malade s'est mis au lit avec de la fièvre et alors est survenu le délire — Peu à peu son état s'est aggravé au point où nous le trouvons actuellement —	
	Etat Actuel = On apporte le malade à l'hôpital vers onze heures du matin, il est étendu sur un brancard, sans connaissance.	
	Les membres inf. sont en résolution complète, pas de mouvements automatiques ni extra. Des membres inf. pas de résistance aux mouvements communiqués — Abolition des reflexes tendineux, diminution des reflexes cutanés — Quand on pique le malade sous la plante des pieds il retire un peu les jambes, la sensibilité est obtuse —	
	Rétention d'urine — On sent une tumeur sus-pubienne qui indique la réplétion vésicale — Le cathétérisme est impossible, on se heurte contre un rétrécissement du canal siégeant au niveau de la portion membraneuse —	
	Le ventre n'est pas ballonné pas d'affaissement notable —	
	Respiration stertoreuse, râles trachéaux nombreux — à l'examen de la poitrine en avant, on trouve de la matité sous la clavicule gauche — là le murmure vésiculaire est entendu comme bruit de pot fêlé — Retentissement exagéré des râles — En arrière on entend aussi les râles trachéaux la resp. est peut-être un peu supplémentaire à la base gauche, mais l'auscultation est rendue difficile par la présence de nombreux râles trachéaux —	

SCD Lyon 1

Louis Point Méningite
CA

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

En cherchant à asseoir le malade pour le faire uriner on remarque la raideur de la nuque et du tronc —

Raie méningitique assez marquée sur le thorax et l'abdomen —

Cyanose des lèvres, de la face et des doigts — Sueurs profuses sur la face, et la partie sup. du tronc — Les cheveux sont mouillés par la sueur —

Du côté des membres sup. on trouve de la résistance aux mouvements communiqués, mais marquée surtout du côté du biceps — La résistance existe dans les deux sens —

Carphologie, le malade ramasse ses couvertures — tremblement des mains —

La tête et les yeux sont plus volontiers tournés à D. — Les pupilles sont resserrées — Cependant quand on interpelle le malade il porte la tête et les yeux également du côté D. — En le interpellant très fortement on arrive à faire à fixer son attention, c'est en vain qu'on lui dit de tirer la langue —

On explore de nouveau les membres inf. au point de vue de la résistance aux mouvements communiqués, on trouve un peu de résistance du côté des fléchisseurs, mais cette résistance est très faible, elle est plus marquée après une exploration un peu énergique — Rien du côté des extenseurs —

Le malade a du ménagement —

Etat général très grave — pouls 140 — resp. 56 — Temp. rectal 40° —

Le 4 Mars — Même état — le malade fait des mouvements automatiques du côté des membres inf., pas de résistance aux mouvements communiqués —

Pupilles un peu rétrécies

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Persistance de la résistance dans les mouv. sup. plus marquée cependant du côté du biceps — La tête et les yeux sont tjrs plus volontiers tournés à D. — Etat général tjrs très grave — respiration stertoreuse, râles trachéaux nombreux —	
12 8h	Est tjrs parfaitement abouchable, mais donne la main et tire la langue lorsqu'on lui demande, en fluttot souriant — répond par des signes à toutes questions qu'on lui adresse — Resp. 46 — très stertoreuse, râles trachéaux nombreux, expiration un peu forcée — pouls difficile à compter, paraît à 180 — aussi vite qu'on peut compter — Résolution commence Présente la résistance dans les mouv. inf. cependant il tonge un peu les membres — Les réflexes cutanés sont tjrs diminués — Pas de réflexe tendineux — Mâchonnement, fait des mouv. de la face, des grimaces — Les pupilles sont moyennement dilatées — Pas de phénom. de hémiplégie — Cathétérisme vésical impossible — On fait une ponction de la vessie — issue de 1200 gr d'urine — Aspect : colorée, teintée par le sang — renfermant une forte proportion d'albumine — Densité 1045 — Quoique le malade fasse des mouvements volontaires et automatiques des quatre membres surtout des mouv. sup, il ne présente pas la résistance aux mouvements communiqués — Cette nuit il n'a pas été plus agité — Peu ou pas d'assoupissement — Le mouv. inf. G. est plus volontiers soumis à la flexion — Dans les mouv. sup il persiste à certains moments — persistance de la cyanose de la face et des doigts — un peu de carphologie, à ce moment on recherche la résistance des mouv. sup. on peut	

SCD Lyon 1

Paris Point — Gt — Méningite

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Autopsie faite le 14 8bre 82 à 10 h 1/2 du matin — Au niveau de la base du 1er abord l'épaississt de la méninge — Cependant celle-ci sont plus résistantes qu'à l'état normal — elles sont adhérentes aux vaisseaux et aux différents anfractuosités de la base — Mais sillons de la base — Mais surtout au niveau de la scissure de Sylvius et de la g.e fente cérébrale de Bichat, et j'a même à ce niveau des exsudats blés manifestes sur divers points — En raclant la scissure de Sylvius on aperçoit blés manifest! Des granulations blanches mais en petit nombre sur les bords de la g.e fente cérébrale — Les vaisseaux ne sont pas athéromateux ni oblitérés —	
	Les Poumons présentent des adhérences pleurales aux deux sommets surtout le côté G — Le P. G. est diminué de volume tandis que le P. D. est volum. emphysémateux	
	Du côté G. on trouve au sommet un tissu cicatriciel au niveau duquel se trouve un dépôt de matière crayeuse la gousse sans mais elle fait irruption dans un dessus et on avant une excavation anfractueuse du volume de trois, dans le 1/3 sup. plusieurs excavations contiennent un liquide gris rougeâtre et les parois de la cavité ont une coloration rouge brunâtre — Tout autour des cavernes tissu tuberculeux sur lequel on aperçoit ça et là qq. fins granulations	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Mais les parties du P. situées au-dessous ne présentent pas d'altération grave de congestion. Du côté D. Le sommet présente un tissu scléreux dans lequel se trouvent disséminés de petits foyers blanchâtres constitués par une accumulation de matière analogue à la précédente sans aucune coloration accentuée. Le reste du P. est sain sauf qu'il est très emphysémateux	Sans prescriptions appréciables. Opium

SCD Lyon 1

Modèle N° 61.

Nom Louis Pont. N° 6

octobre

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	11	12	13	14	15	16
95	210	34,0 42,5						
90	200	33,6 42,0						
	190	33,2 41,5						
80	180	32,8 41,0						
	170	32,4 40,5						
70	160	32,0 40,0						
	150	31,6 39,5						
60	140	31,2 39,0						
	130	30,8 38,5						
50	120	30,4 38,0						
	110	30,0 37,5						
40	100	29,6 37,0						
	90	29,2 36,5						
30	80	28,8 36,0						
	70	28,4 35,5						
20	60	28,0 35,0						
	50	27,6 34,5						
10	40	27,2 34,0						
	30	35,5						

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

Modèle N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Jeanne N° 8

Nom Doucet Marius

né à Gelles (Puy de Dôme)

demeurant à

profession : fumiste

âge : 56 ans

tempérament

constitution

entré le 22 Janvier 1880 dans le service de la Clinique chirurgicale de M. Desgranges

sorti le 11 février 1880 -

mort

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Tuberculose

lésions pulmonaires anciennes très limitées

pleurésie tuberculeuse - abcès tuberculeux

sous-cutanés à ganglionnaires - tuberculose

cérébrale à méningite tuberculeuse -

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Renseignements presque nuls ; cet homme se dit malade depuis 5 ou 6 mois. Son intelligence est très altérée : si lorsqu'on lui pose une question, il paraît réfléchir un moment, puis, tantôt ne répond pas, tantôt répond d'une façon peu compréhensible, tantôt au contraire donne des réponses assez nettes, sans tremblement, sans bégaiement. La physionomie n'a que très peu d'expression ; la face n'est pas asymétrique, mais peut être un léger abaissement de la commissure labiale droite ; la langue est tirée bien droite hors de la bouche ; les yeux sont sur la ligne médiane, également ouverts, les pupilles sont égales.

Au premier examen on est frappé de l'existence d'un tremblement très marqué des membres supérieurs ; il prédomine au membre droit ; ce sont de mouvements de flexion et d'extension des doigts, qui sont constamment dans un degré plus ou moins prononcé de flexion ; des mouvements de antéro-postérieur ou de latéralité du poignet, et quelques mouvements de l'avant-bras ; ces mouvements existent constamment, même au repos, on ne peut les faire cesser, et en essayant de tenir fortement le membre, on constate à sentir quelques contractions ; au membre supérieur gauche, tremblement analogue, mais un peu moins prononcé ; habituellement, ce membre, tout en tremblant repose sur le lit

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

tandis que l'autre fait des mouvements étendus, comme pour arranger ses vêtements, retirer les couvertures. L'un et l'autre sont capables d'un certain effort, mais peu intense. Les deux mains peuvent un peu serrer, mais il est difficile d'apprécier la différence de l'une à l'autre, parfois il serre davantage de la gauche, parfois c'est le contraire. Les mouvements communiqués sont gênés par les contractions spasmodiques qui persistent comme des temps d'arrêt soit dans le mouvement de flexion, soit dans le mouvement d'extension, surtout dans ce dernier.

Les membres inférieurs sont parfaitement étendus : on peut les fléchir et les étendre alternativement sans éprouver de résistance ; il n'y a pas de trépidation.

La sensibilité est partout conservée, ou du moins les piqures sont partout senties, mais vu l'état de l'intelligence du malade, il est impossible d'apprécier exactement les troubles qui peuvent exister. Si on pique l'un des membres supérieurs, il retire le membre, plus ou moins vivement, et d'ordinaire porte l'autre à l'endroit piqué ; pourtant le mouvement de retrait paraît être parfois plus brusque pour le membre droit. On ne trouve pas de différence sensible d'un côté à l'autre pour la face et le tronc. Les piqures provoquent une légère plainte et un mouvement d'un membre qui se porte au point piqué.

Quant aux membres inférieurs, il existe une différence suivant le côté ; des deux côtés les piqures provoquent des mouvements du membre piqué, avec une plainte si la piqure est très forte, mais tandis que du côté gauche les piqures ne provoquent qu'un léger mouvement de flexion, ou même qu'une contraction sans mouvement, du côté droit on obtient plus facilement un brusque mouvement de flexion qui amène le pied près du bassin où la main peut venir toucher l'endroit piqué ; souvent la piqure du pied droit est suivie d'un mouvement du pied gauche qui se porte au point piqué. Le chatouillement de la plante des pieds provoque de réflexes qui prédominent également du côté droit.

Pas d'eschare : Rien au coeur Pas d'oedème

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
10 Février	Au moment de la visite on le trouve somnolent. Il y a des mouvements dans les doigts, surtout du côté droit. Quand on l'excite, il ouvre les yeux, regarde du côté excité, mais sans rien dire, sans faire aucun mouvement volontaire ; le tremblement augmente beaucoup pendant l'excitation ou les mouvements. Abstraction au repos complet, on sent des contractions spontanées et irrégulières dans les muscles de l'avant-bras et du bras, surtout dans le biceps. Lorsqu'on essaie de produire des mouvements, on sent de la résistance et la figure se contracte avec une expression de douleur. Sur la face externe de la cuisse, un peu au dessus de la partie moyenne, il y a une petite rougeur arrondie, un peu saillante, à base indurée, on sent à ce niveau une légère collection liquide sous-cutanée. Pour les mouvements sont possibles : pas de paralysie, ni de la face ni des membres. Temp. rect. 38°,3 La vessie est distendue. Au thorax, on trouve quelques râles sonores des deux côtés, de la matité et une obscurité complète à la base gauche, il tousse un peu. Rien au cœur : pouls, 104. L'œil gauche est parfois porté un peu en dehors. Il avale difficilement. Rien de particulier aux sommets pulmonaires, sauf un peu d'obscurité aux sommets gauche tenant probablement à la pleurésie. Renseignements : Le malade est entré à l'hopital dans un service de chirurgie il y a 3 semaines environ, pour un kyste du poignet ; on ne remarqua rien à ce moment qui put faire penser à des troubles cérébraux, il n'y avait pas de tremblement : on fit sur le kyste de la compression pendant quelques jours ; puis une ponction qui donna issue à du pus, puis une injection de teinture d'iode qui ne donna bien qu'à une réaction inflammatoire légère ; ce n'est que 2 ou 3 jours et plus tard qu'il eut du tremblement des membres supérieurs. Il y a 6 mois il a fait un séjour à l'hopital St Pothin pour « de la tête » ; à part cette légère toux, il se portait bien. Il n'y a pas eu de phtisiques dans la famille.	Ordonné : Lait, bouillon, potages, œufs, viande rôtie, vin de Bordeaux, 1 litre. Sinapismes aux membres inférieurs. Ventouses sèches sur le thorax. Potion avec : Sirop de codéine 30 gr. Eau de fleurs d'oranger 30 gr. Eau distillée 100 gr. Une cuillerée à soupe toutes les 2 heures.
11 Février	Hier soir on remarquait une aggravation : augmentation du coma, sueurs profuses. Ce matin, le coma est complet, la face est couverte de sueurs abondantes. Les membres sont dans la résolution, le tremblement est presque nul. Par les réponses on ne provoque que de très légers mouvements. Les urines contiennent de l'albumine.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

12 Février

Autopsie. Parois du crâne minces. Rien de particulier à la dure-mère ni aux sinus. Rien dans les vaisseaux encéphaliques. On remarque une exsudat fébrin sur la face inférieure du cerveau, englobant le chiasma et les différents nerfs, sur la face inférieure de la protubérance, sur la face supérieure du cervelet et sur ses parties latérales où il est très marqué du côté droit. En certains points, surtout vers les régions antérieures on aperçoit un fin semis de granulations. Sur les parties supérieures des hémisphères, surtout en avant et en dehors se trouve un exsudat infiltré de sérosité. En outre, on trouve 2 tubercules dans l'encéphale: un dans la protubérance, à droite de la ligne médiane, à 5 m.m. au dessus de la ligne de séparation de la protubérance et du bulbe; il est jaune, non ramolli, à la coupe l'aspect d'un marron d'Inde, et est de la grosseur d'une petite noisette; l'autre est situé dans environ le genou du corps calleux, de consistance et de couleur analogue au précédent, mais un peu plus gros. Rien de remarquable dans les autres parties de l'encéphale.

La face interne de méninge nécessite de tubercule miliaire à l'intérieur et longeant vaisseaux.

Poumon droit non adhérent, ne présentant rien de particulier.

Poumon gauche. La plèvre qui l'entoure présente une cavité qui n'existe qu'aux parties antérieure et externe, qui contient un peu de liquide séreux et au niveau de laquelle la face séreuse est tomenteuse, rugueuse, présentant au toucher une sensation analogue à celle produite par la langue d'un chat; sur le feuillet pariétal, on voit nettement de nombreuses granulations tuberculeuses. A la partie postérieure les deux feuillets sont adhérents et infiltrés de sérosité. Au sommet existe des lésions tuberculeuses sous forme de petites cavernes contenant du pus.

Les ganglions bronchiques, les ganglions aortiques, ainsi que des ganglions situés vers la partie inférieure de l'œsophage, sont volumineux et remplis de pus.

L'un des reins ne présente rien de saillant à l'œil nu. L'autre ~~de~~ vers sa partie moyenne un petit nombre de granulations blanchâtres confluentes.

Un peu d'athérome aortique.

Un petit abcès sous-cutané de la cuisse, incisé, donne issue à du pus.

La tuméfaction du poignet gauche fait penser pour un Expert à un autre abcès de même nature. -

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle 1re Jeanne — N° 8

Nom Doucet Marius -

né à

demeurant à

profession

âge 26 ans

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Réflexions. Nous avons été frappé au premier abord par le tremblement des membres supérieurs et notamment du membre droit qui ressemblait à celui que nous avions déjà constaté dans un cas de tubercule de la protubérance; toutefois nous ne nous arrêtâmes pas à ce diagnostic en raison de l'absence de phénomènes paralytiques nettement accusés. nous pensions que le tremblement pouvait tout aussi bien provenir de l'irritation des mêmes régions de l'encéphale par une méningite d'autant qu'il existait des signes de compression du cerveau

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Il parut alors à tous que nous fit immédiatement voir qu'on avait commis une erreur de diagnostic à la clinique chirurgicale en prenant la tumeur du poignet pour un Kyste. Nous étions manifestement en présence de phénomènes infectieux dont le point de départ pouvait être dans quelque lésion siégeant à la peau ou aux muqueuses, orifices naturels, ou bien dans de la lésion tuberculeuse du poumon ou d'un autre organe. Un examen minutieux des différentes parties du corps et notamment du cuir chevelu et des orifices naturels, ne nous ayant fait découvrir aucune lésion, et d'autre part l'absence de gros désordres articulaires, de la toux subintrante de la fièvre nous firent penser qu'il ne s'agissait pas d'une infection purulente. Nous pensâmes alors plutôt à une tuberculose en raison de la pleurésie bien que l'auscultation des poumons ne nous apprit rien. De la sorte, on pouvait expliquer l'accident cérébraux par une

Lyon Imp. veuve Bonnaviat et fils

Impr. Aff. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Méningite tuberculeuse ~~et~~ ponctiforme par les tubercules du cerveau avec ramollissement ~~périphérique~~ mais dans des régions ne donnant pas lieu à des troubles moteurs et sensitifs marqués. L'autopsie a confirmé notre diagnostic, sauf sur le point concernant le tubercule de la protubérance dont nous avions seulement entrevu la possibilité en raison des caractères du tremblement. S'il n'y avait pas de paralysie plus marquée cela provient à ce que la lésion protubérantielle voisin n'était pas interrompu complètement et que la paralysie était en partie masquée par la résolution générale provenant de la congestion de l'encéphale. Nous remarquerons que le tremblement était plus marqué du côté de la lésion et que les mouvements étaient moins facilement provoqués du côté opposé. Ce sont là un signe qui pourra peut-être nous guider dans un autre cas de ce genre.

Dans l'état actuel de la science il est difficile de dire pourquoi la tuberculose prend quelquefois ce caractère infectieux à marche rapide avec production d'abcès multiples. Il faudrait à l'avenir dans les cas de ce genre rechercher dans quel état se trouve le système lymphatique et notamment le canal thoracique.

SCD Lyon 1

HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE. — Salle St Pothin. — N° 15.

Service de M. Tripier.

Nom Jean Micoud
né à Auvergne
demeurant
profession Domestique.
âge 38 ans
tempérament
constitution
entré le 18 Juillet 1868.
sorti le 31 août 1868

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Pleurite avec
légère épanchement.

—

aggravation de la maladie
Elle s'étend à tout le poumon.

—

Pachyméningite aiguë

—

Mort

Autopsie

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Tempérament robuste. quelques troubles digestifs antérieurs. Jamais il n'a craché de sang. Rien jusqu'à Samedi dans la nuit. — à ce moment là sans avoir pris froid, du moins il ne se souvient de rien à ce sujet, il commença a être oppressé à tousser et à souffrir d'un point du côté droit pour lequel on lui plaça un vésicatoire loco dolenti. Il a un peu vomi a perdu l'appetit et présente à l'heure qu'il est une langue très rouge et manifestement colorée par de la bile. Il est un peu oppressé et surtout devoré d'une soif ardente accompagné d'une amertume extrême de la bouche. Il paraît avoir eu à l'hypogastre indigné de la fièvre et quelques frissons. Matité à droite et en arrière dans les 2/3 inf. du poumon un peu d'égophonie dans la partie inférieure. En av^t le poumon fonctionne bien	t. jour. 2 gr. ac. de Potasse D. le Dig. 30 gr. — Soupe grasse

Papeterie générale, Lyon. — Mod. n° 6.

H. C. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Aff. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Plèvre viscérale très-densifiée regardant l'extrémité de la tunique albuginée du testicule. Poumon droit densifié, ~~[illegible]~~. Poumon gauche sain. Rien du cœur. Les autres viscères sont trop décomposés : on ne les a pas examinés. Aucune lésion des membres inférieurs. - On n'a pu voir s'il y avait lésion vasculaire du cerveau - Pas de caillots dans le cœur.	

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Strasser Salle _____ Lit N° 41 / F°

Prénoms Elisa

Age 38 ans

Profession ménagère

Né à Wanga

Demeurant à Lyon

Entré le 5 Juin 84

Sorti le

Morte le 15 Août 84

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite tuberculeuse ?

Chef du service, M. _____

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M. _____

La malade entre dans un état d'accablement — qu'on
peut à peine tirer quelques renseignements
Elle serait malade depuis le 12 mai, c'est à dire
depuis 18 jours
La maladie aurait débuté le 12 Mai brusquement;
la veille elle ne ressentait aucun malaise, avait été
à son travail — le matin en s'éveillant elle essaya
en vain de se lever; elle avait une grande faiblesse, des
nausées, et une violente céphalalgie — Toute la matinée
elle eut des vomissements qui depuis ne se renouvelèrent
plus — Pour la journée, quelques épistaxis
Depuis, elle est restée au lit, conservant une céphalalgie
très vive et une grande faiblesse — Elle n'aurait jamais
eu la diarrhée, à part les jours où on la purgeait
Actuellement elle se présente dans un grand

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F°

anéantissement, avec un faciès typhique — d'une grande oppression
elle ne va pas plus mal que les jours précédents,
au contraire, elle se trouve mieux — Temp. 38°.6 —
Si elle entre à l'hôpital, c'est à cause des bruits qui
font chez elle ses enfants et un face un atelier de
chaudronnerie —
La langue est un peu saburrale, pas trop sèche — Pas de
diarrhée : la fosse iliaque droite est douloureuse —
Les yeux ont conservé l'aspect lymphatique — La malade est
Rien au cœur
Rien aux poumons
6 juin — Pas d'albumine ni de sucre dans les urines
7 juin — Hyp. de dysphagie
Mauvais sommeil — elle se plaint des reins — Un
peu de raideur de la nuque
Les réponses sont lentes, il faut exciter la malade
Elle a souffert beaucoup de la tête hier, dans la région
occipitale — Pas de reflexe rotulien — Pas de trépidation
Pupilles normales, pas de photophobie
Yeux normaux
8 — Elle a souffert toute la nuit de la tête
Ce soir, son mari vient la voir, et donne les
renseignements suivants :
Son père est mort à 45 ans d'une maladie de foie
Sa mère est morte à 56 ans, on ne sait de quoi
Elle a une sœur, qui se porte bien
Elle a 3 enfants bien portants
La santé habituelle est excellente — Elle ne tousse jamais
Il y a 15 mois, elle a eu une fausse couche au 6e mois,
après une chute — La sage femme fit de vains efforts
pour avoir le délivre, et un médecin, appelé ensuite, fit
pendant une heure des vains également infructueux :

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

Elle réunit seulement à extraire un morceau gros comme le pouce

Cinq jours après l'accouchement, elle eut un métrorragie qui le mari estime à plus d'un litre, avec gros caillots. Durant les huit jours qui suivirent, elle continua à perdre des caillots.

Elle garda le lit pendant 4 semaines.

Deux mois après elle eut son retour de règles. Mais le menstruation était irrégulière, venant toutes les 3 semaines, toutes les 5 semaines etc.

L'appétit était bon; le malade n'avait pas de fièvre, pas de douleurs abdominales, pas de pertes fétides.

Le 12 Mai elle tombe malade subitement. Le début eut lieu par des vomissements verts et une céphalalgie.

Le second jour, gros frisson, qui dura une ½ heure, et céphalalgie. Les vomissements ont duré 3 ou 4 jours. Mais la céphalalgie a persisté tout le temps, très violente. Plus de frissons.

L'appétit nul, pas de toux.

Il y a 10 jours qu'elle est tombée dans l'état d'anéantissement où nous la voyons aujourd'hui, et qu'elle a du subdélirium.

Elle n'a jamais eu de diarrhée.

Enfin, les 15 derniers jours, elle a eu des pertes vaginales abondantes, grises, tenant très mauvais, et qui ont coulé ces derniers jours.

Les ulcères ~~furonculeux~~ qui couvrent la peau ont débuté il y a 15 jours.

9 Juin — Hier, la malade a eu un petit frisson.

La céphalalgie est toujours vive. On a toujours de la peine à essuyer la malade, elle est en peau raide.

L'anéantissement est toujours aussi complet; la face est immobile,

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

indifférent. Il faut exciter vivement le malade pour lui arracher quelques paroles, mais elle comprend les questions qu'on lui pose, et y répond avec lucidité.
Pas empâtement, légère subdélirium.
Pas de diarrhée. Rien au cœur. Rien aux poumons.
Pouls 64. Respiration 16. Aspect général accablé, mais très calme.

10 h. Toute la nuit elle a crié en se frappant de la tête. Elle a uriné dans son lit. Bon de frictions.

11 Idem. Traitement antisyphilitique; idem 2e friction; repos au lit. Un peu moins mauvais. Sueurs diminuent cependant. Un peu de vomissement dans la nuit. Sans de fièvre ni rien de particulier. Assoupissement et stupeur.

12 Voilà deux nuits que la malade est plus calme. Elle reste affaissée au repos, mais qu'on la touche, elle crie et nous insulte. Pas de contractures des membres. Les pustules persistent toujours, les anciennes se sèchent, de nouvelles apparaissent; ce matin elle a uriné sur le fond. Respir. et pouls toujours très calmes.
Jadure 4e fr. frictions mercurielles.

13 La malade est plus calme, mais on ne peut la toucher sans lui arracher des cris, les membres étant douloureux. L'éruption pustuleuse continue.
Rougeur et de raideur dans les bras. Idem dans les jambes. Les réflexes rotuliens sont défaut, le réflexe cutané persistant.
La nuque est raidie dans l'extension, et la flexion provoque et douloureuse.
Elle reste les yeux mi-clos, le visage indifférent, le membre facial immobile, et ce n'est que quand on l'excite qu'elle se plaint.
Quand on la pique, elle se sert plutôt de la main gauche que de la main droite pour se défendre.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

14 Juin — Hier rien d'anormal de temps.
Dans la nuit elle a poussé des cris brefs
La face est rouge. La nuque et les reins sont
douloureux quand on veut la faire asseoir
Elle se sert bien de ses deux mains. Pas de contracture.
Elle se plaint d'une vive douleur frontale, et tient la
tête immobile.
Elle est moins assoupie qu'hier.
Quand on la fait lever pour aller à la chaise, elle se tient
droite toute seule, mais elle ne peut marcher ni
remonter dans son lit toute seule, malgré son désir
de se passer des soins et de n'être pas touchée
Respiration calme régulière, 20.
Pouls réguliers 80
Pas de raie méningitique.

15 Cette nuit brefs et inconscients du matin. Même aspect
16 douloureux des membres. La mobilité est toujours intacte
Un gros abcès dans l'aisselle droite et dans l'aisselle
gauche.

17 La malade crie toujours, appelle ses enfants
Subdelirium permanent

18 Le moteur oculaire externe du côté gauche est atteint, la
malade ne peut dévier l'œil gauche en dehors pour
suivre le doigt. Les deux pupilles sont à peu près
également dilatées.
Ce matin elle se trouve mieux, elle parle, elle rit, sa
physionomie est moins immobile. La nuit a été calme.

19 Cette nuit, délire, elle s'est levée et voulait aller
aux cabinets.
Ce matin elle est abattue, les traits sont tirés, la respiration
plus fréquente (24 respir.) — Pas de contracture. Pouls 120

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

20 Cette nuit elle a beaucoup vomi. Elle s'est levée et est tombée
Elle est mieux ce matin, elle se plaint un peu
4 a fait agitée calme. Ce matin elle est
tranquille, mais avec un peu de subdélirium
12 Nuit tranquille. Mouches sur les lèvres inf. et sur les bords
libres des ailes du nez
13 Elle est calme, comprend tout ce qu'on lui dit et y répond bien
Sang paralysie du moteur oculaire externe gauche
14 Même état
15 La malade se plaint toujours de céphalalgie. Elle
a vomi souvent. Elle a pu cependant se promener un
peu hier. Elle présente de nouveaux petits abcès
sous-cutanés sur l'abdomen dans l'aisselle. Elle
a aussi pas d'autre paralysie que celle du nerf oculaire
externe gauche.
2 Juillet Depuis plusieurs jours elle est calme, assise,
répondant bien aux questions qu'on lui pose, et se
plaignant de céphalalgie. Ce soir elle a mis elle
crie « au voleur ». Elle mange des potages.
4 Elle est calme. Souvent elle se lève, va vers la fenêtre,
mais elle ne peut revenir seule, et ne peut retrouver
son lit. Elle a encore trop de la céphalalgie.
7 Elle est gaie, et demande à manger.
8 Elle souffre plus du côté gauche que du côté droit.
10 Son mari l'a fait manger hier soir. Dissolution
toute la nuit.
11 Elle continue à avoir de gros abcès cutanés. Sur le flanc inférieur
droit, près de l'aisselle, elle a eu gros comme des
noix, fluctuant, très douloureux.
20 Juill. La malade était dans le même état. Hier, elle est tombée à l'étuve avec une
contraction générale qui a duré 2 à 3 minutes. Le même phénomène s'était passé il y a
8 jours au dire de la sœur, mais il était moins marqué.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

21 Juillet — La malade a eu une crise convulsive hier soir et une autre ce matin, précédé d'un cri. Elle paraît plus abattue elle répond aux questions, et montre la tête quand on lui demande quelle douleur elle ressent. Les membres et la sensibilité ne sont pas altérés.

Pouls 62. Rien au cœur.

La crise de ce matin était caractérisée par des convulsions généralisées.

26 Juillet — Le pus examiné ne contient pas de bacilles.

1er Août — Depuis 2 jours elle est plus endormie. Les mouvements imprimés sont plus difficiles. Elle ne mange plus spontanément comme auparavant, on est obligé de lui donner à manger. Un nouvel abcès à l'anus, elle souffre.

7 Août — La malade est toujours assise, ensommeillée, ne répondant pas aux interrogations, mais ne présentant aucune paralysie.

La paralysie de la vessie externe persiste, n'est plus appréciable.

Resp. 32, un peu irrégulière. Pouls petit 108.

La malade ne souffre plus spontanément de la tête; elle urine moins facilement. La pression au niveau de l'épigastre est un peu douloureuse.

Dans les mouvements imprimés à la malade elle se plaint de souffrir du dos. Le tronc est raide, les mouvements des membres supérieurs ne sont pas douloureux, mais les membres inférieurs et dans la demi-flexion, et les mouvements sont douloureux. Elle ne s'alimente que peu de jours puisque quelle est incapable de prendre seule, qu'elle ne demande pas, mais qu'elle avale quand on la lui met dans la bouche. Elle est plus constipée. Il y a rougeur à gauche, sur la partie la plus saillante de l'os, une tache rougeâtre dont la couleur est un peu violacée, du côté droit, il y a aussi une petite rougeur, moins marquée qu'à gauche.

8 Août — La malade souffre toujours, mais la douleur paraît être localisée dans la région articulation coxo-fémorale.

12 Août — Elle tombe subitement du côté gauche vers l'arrière, l'oreiller même mouvement.

13 Août — La malade s'affaiblit, affaissée presque dans la résolution. La face commence

Nom Salle Lit N° F°

elle a pendant un dîner et de jour et de paupières qui s'ouvrent et se ferment, clignement très gênant. La peau est chaude depuis 2 à 3 jours.
Respiration stertoreuse, pas de matité pourtant marquée.
Pouls fréquent, très faible. La malade ne répond guère aux questions.
Pas de crise convulsive, ni vomissements.

12 Août. Elle est toujours dans le même état de prostration, la peau est chaude, la malade s'amaigrit de jour en jour.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Straser Salle La Femme Lit N° 41 F°

Prénoms Elise

Age

Profession

Né à

Demeurant à

Entré le

Sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Autopsie du 16 Août 84

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

En enlevant le cerveau et le cervelet une grande quantité de liquide séreux s'échappe abondant jusqu'à l'état normal. La base de l'encéphale n'offre rien de particulier. Ni ce n'est un épaississement notable de méninges qui entourent toute blanchâtre et qui relient les différents organes.

Rien en suivant le cours de Sylvius et écartant les lobes antérieurs, on ne trouve pas d'exsudat, et notamment pas de traces de tubercules. Les artères ne paraissent pas altérés, et les nerfs également; il n'y a donc normal que l'épaississement des méninges, et les adhérences des vaisseaux et des nerfs aux méninges [illegible] voisines.

Les ventricules latéraux sont dilatés par du liquide incolore, leur paroi interne présente une teinte blanchâtre avec un peu épaississement.

L'hémisphère droit ne présente rien de particulier, soit dans la circonvolution soit dans l'intérieur de l'hémisphère. L'examen est fait après l'ablation des méninges qui n'offrent rien de particulier.

L'hémisphère gauche ne présente absolument aucune lésion.

Le cervelet ne présente rien de particulier.

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Ad. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ Fo _____

Rien de particulier dans la portion étudiée

Rien de particulier du côté de la direction et de la forme normales

Rien de particulier du côté des poumons qui sont un peu emphysémateux et congestionnés avec base un peu indurée. Cependant on trouve au sommet droit à la petite main du volume d'un pois, d'abord par coupe transversale une petite masse tuberculeuse ramollie.

Le cœur peu volumineux n'offre rien de particulier, sauf cependant des adhérences filamenteuses du feuillet du péricarde au niveau de l'oreillette droite et de l'infundibulum. Surcharge graisseuse du cœur droit, le cœur gauche a paroi ferme, assez épaisse. Poids : 230 gr.

Pas de plaques à l'aorte ni ailleurs

Rien de particulier du côté de l'œsophage et de l'estomac

Le tube digestif n'offre rien de particulier non plus, aucune adhérence intestinale, aucune tumeur. — Rien du côté du pancréas.

Le foie est peu volumineux, plus dur au toucher un peu graisseux, la vésicule est remplie d'une bile verte épaisse, et de gros calculs, polyédriques, au nombre de 2. On remarque au niveau du bord antérieur du lobe droit, et du lobe gauche, un noyau blanchâtre, sensiblement arrondi, d'un centimètre de diamètre environ sur la coupe on la trouve jaunâtre avec une dépression centrale, blanche, cette petite tumeur est visible à la surface et plonge dans la substance hépatique, aucune autre lésion de cet ordre sur les autres parties du foie.

La rate est très petite.

Les reins de volume normal n'offrent rien de particulier

Les organes génitaux internes, les ovaires, les trompes, n'offrent rien de particulier.

Rien de particulier aussi du côté des ganglions, mésentériques, lombaires ni de la colonne vertébrale, rien du côté de la cage osseuse.

L'escharre de la fesse est restée superficielle.

n'offre pas de lésions d'intérêt.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom M Dermay Salle Ste Jeanne Lit N° 6 F°

Prénoms Joseph

Age 20

Profession garçon de bureau

Né à St Jorioz (Hte Savoie)

Demeurant à rue Thomassin 32

Entré le 29 Avril 1883.

Sorti le 4 Juin à 1h du Matin

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Rhumatisme

Méningite tuberculeuse

Chef du service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Il y a 3 ans une qui a duré une vingtaine de jours

Père mort d'un rhumatisme qui n'aurait duré que 8 jours.

Mère bien portante.

Il a eu jadis et eut souvent des douleurs articulaires qui n'avaient que deux mois.

Février 1882 le malade a travaillé dans l'eau pendant un mois de janvier, en décembre de la même année apparition de douleurs dans les membres qui persistèrent à peu près un mois.

Actuellement apparition il y a 8 jours de douleurs dans les membres inférieurs qui ont envahi successivement les membres supérieurs. Le 2e ou 3e jour de la température s'est élevée. L'articulation tibio-tarsienne gauche a été atteinte peu après.

Actuellement le malade est pâle, les conjonctives sont blanches, etc il a des sudations grand la nuit.

Il n'a pas de rhumatisme.

Rien au cœur.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F°

Ej — Depuis quelques jours la température se maintient élevée, sans cause appréciable. Les douleurs rhumatismales sont très vagues. Rien au pourmon ni au cœur.

30 — Le fièvre persiste, il est pâle. Pas de nouvelles douleurs. Toujours rien au pourmon ni au cœur. Il se plaint de souffrir de la tête depuis une quinzaine de jours. Il a mal de l'épistaxis. Hier il a vomi une soupe qui il avait pris ½ d'heure avant. La langue est humide, peu saburrale. Les selles seraient normales cependant on trouve du gonflement dans la fosse iliaque droite. Le ventre n'est pas météorisé ni douloureux. Le volume de la rate n'est pas augmenté. On trouve 2 taches rosées de nature douteuse. Pas d'épistaxis, pas de otalgies. Les pupilles sont égales pas de photophobie pas de strabisme, intelligence intacte. Les réflexes tendineux des membres inf sont exagérés on trouve de chaque côté un peu de trépidation plantaire et rotulienne surtout à droite.

Tous les mouvements s'exécutent sans douleur. Pas de taches méningitiques.

31 — Le malade a vomi hier soir, son potage, et dans la nuit de la tisane; ce matin il a supporté son potage, mais il souffre toujours beaucoup de la tête.

5 juin. — Le malade se plaint toujours beaucoup de souffrir de la tête. Il a vomi. Il a eu du subdelirium la nuit. Il est effaissé. La face pâle, sans paralysie. Iodure de pot. 2gr. glace sur la tête.

4j — Il a parlé toute la nuit, c'est encore même ce matin. Il répond aux questions seulement quand on le presse. Il souffre de la tête au niveau de la région frontale. Pas de vomissements ce matin. Langue normale. Pupilles un peu dilatées, la gauche plus que la droite. Pas de photophobie. Tous les mouvements des membres s'exécutent bien. Un peu de résistance du côté de la nuque (?). Réflexes tend. et rot. très vifs pas de tous. Il reste silencieux il faut lui arracher les paroles.

pouls 60.
respirat. 24

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

5 Juin — Le malade est toujours très affaissé et en état de subdélirium sans agitation. Il cherche souvent à se lever il paraît indifférent à ce qui se passe autour de lui. Il est impossible d'obtenir une réponse aux questions qu'on lui fait. Il n'exécute même pas les mouvements qu'on lui commande sauf par fois la langue. Même état des membres, et en dernier même état qu'hier sauf que le mutisme est plus prononcé. — Quand il se lève pour uriner, il perd son urine en route

pouls 72

6 — pouls 84. resp. 24. Il est affaissé immobile dans son lit pâle et en sueurs. On ne peut en tirer un mot il fait quelques signes pour répondre aux interrogations. Il a beaucoup de raideur du côté de la nuque. il n'a pas trace de paralysie. Les réflexes tendineux sont très diminués — il n'a pas uriné depuis 3 jours ~~il urine~~

7 — Depuis cette nuit le malade est plus affaissé la face immobile, les paupières mi-closes, la bouche entr'ouverte. Les yeux saillants, portés à gauche, sous l'influence d'une excitation, ils se portent aussitôt à gauche et la pupille se dilate. — Il ne parle pas, il avale difficilement. Les membres sup. sont le siège de mouvements de carphologie. Les membres inf. sont immobiles pas de réflexes cutanés tendineux. Les mouvements communiqués aux membres sup. présentent une résistance prononcée surtout dans le sens de la flexion. Du mieux à droite à gauche il a aussi dans l'extension. — Légère résistance de la nuque et raideur générale. Les membres inf. donnent une résistance pour la flexion à droite et pour l'extension et flexion à gauche — mais plus légèrement qu'à droite

respiration bruyante 36

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

(8 juin) hier soir les membres supérieurs étaient très contracturés. Ce matin au contraire très grosses flasques. Le membre inf. est entièrement flasque pas de réflexes rotuliens ni achilléens. Le malade va, titube en s'affaiblissant de plus en plus marqué.

La lumière d'une bougie produit encore un peu de contraction de la pupille. Les yeux oscillent surtout vers la gauche. pouls 160 à 180. respiration 60. râles trachéaux. toux. cutiréaction, respiration stertoreuse irrégulière, s'arrêtant reprendre ensuite. Pupille gauche plus dilatée que la droite. La face est couverte de sueur, il y en a à peine sur le reste du corps.

Aucune des réflexes cutanés plantaires il y en a aussi à la main surtout à la main gauche. La pupille droite est plus contractée que l'autre.

Autopsie le 10 Juin

En enlevant le poumon droit on remarque au niveau de la partie supérieure postérieure sous la plèvre pariétale une collection purulente qu'on peut évaluer à 100 gr. Cette collection est en rapport avec une cavité cotiformes contenant également du pus retiré au dessous de la veine cave supérieure au niveau de la bifurcation. Cette cavité qui peut contenir environ présente des saillants pointus une membrane tenant à une matière caséeuse peu abondante. Elle est environnée d'un tissu pulmonaire de la grosseur d'une noisette dure assez dense qui semble avoir été le canal des ganglions caséeux en voie de ramollissement. En certains points des ganglions caséeux ramollis à un degré plus avancé donnent lieu à un abcès dont le pus a fusé dans le tissu cellulaire sous pleural de la partie supérieure postérieure du poumon droit. Les poumons sont remplis de granulations grises demi transparentes les granulations sont plus nombreuses au sommet qu'à la base. Elles siègent au sommet gauche ou elles forment des petites masses agglomérées plus volumineuses commençant à prendre une coloration

SCD Lyon 1

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, Intercalaires. — 11-82. — 10.000. Impr. Alf. Louis Perrin.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Voute crânienne au sommet gauche une petite cavernule pouvant contenir un petit haricot. Envahissement de formation récente. Les poumons sont congestionnés le poumon gauche présente même en arrière une zone de tissu hépatisé partiellement atélectasié formant comme une zone de verticalité sur les 2 lobes sur une largeur de 2 travers de doigt.

Les ganglions bronchiques sont volumineux mais durs noirâtres rebroussés. Il reste pas de ligne de démarcation entre les plèvres et seulement quelques adhérences lâches.

Le Cœur pèse volumineux présente un ventricule complet du péricarde aucune lésion d'orifice

Le Foie présente sur sa surface des taches blanches qui ne font pas saillie et qui en raison de cela n'attirent pas l'attention mais les incisions faites sur ces points montrent qu'il s'agit de granulations tuberculeuses blanches grisâtres ou en bronze aussi quelques unes sur les coupes mais elles sont plus difficiles à apercevoir mais du reste moins nombreuses que sur la surface

La Rate ne présente rien de particulier au niveau de sa capsule qui est cependant un peu épaissie Mais sur la coupe on voit qu'elle est criblée de granulations grises tuberculeuses très fines

Sur les Reins on aperçoit de petites taches blanchâtres correspondant à des granulations identiques au nombre de 5 ou 6 sur la surface de chaque rein sur les coupes ces granulations apparaissent très nettement il en existe au moins autant plus ou moins loin de la surface. Dans certains points sous forme de petites traînées blanches

Rien de particulier sur l'intestin ni sur le péritoine.

L'Encéphale En l'enlevant il s'écoule une assez grande quantité de liquide, épaississement des Méninges au niveau de la face du crâne à tel point que les différents organes que l'on trouve au niveau présentent des adhérences anormales

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Sous les mêmes raisons on sépare très difficilement la scissure et l'on ouvre très difficilement la scissure col. Les méninges ainsi épaissies granulations bien manifestes On en trouve pas non plus très manifestement sur les vaisseaux à la base ou dans les scissures de Sylvius Mais on trouve plusieurs granulations tuberculeuses le long des vaisseaux et scissures dus on 3 granulations plus volumineuses plongeant dans la substance cérébrale au niveau du lobe quadrilatère gauche A droite on trouve aussi 2 ou 3 tuberculeux sont au niveau de la face inférieure du lobe sphénoidal qui remonte au niveau de l'extrémité antérieure présente une différence très prononcée.	Actuellement les 2 hémisphères de Sylvius d'chagrin ne présentent pas de
	Les Hémisphères ne offrent rien de particulier sauf une distension anormale avec mollesse et ramollissement des parois des ventricules latéraux.	
	Le Cervelet et l'Isthme de l'encéphale ne offrent rien de particulier si ce n'est l'épaississement et l'adhérence des méninges tout autour de la fente de Bichat	
	Articulations radio-carpiennes - On trouve au niveau de ces plusieurs points en particulier des sinus articulaires sur la synoviale des granulations tuberculeuses qui transparents ayant le volume d'une petite tête d'épingle quelques unes même de volume moins volumineuses mais seulement du côté droit.	
	A gauche nous n'en avons pas trouvé d'une façon manifeste et bien que nous ayons fait l'examen avec le microscope que Nous n'en avons pas trouvé non plus dans la première articulation carpo métacarpo phalangienne du côté droit qui avoisine le siège de douleurs	
	Foie, du cœur : 320 gr.	

SCD Lyon 1

Ste Jeanne N° 24

Modèle N° 51

mars 1882

Nom Joseph Mermaz

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
95	210	34,0 42,5																		
90	200	33,6 42,0																		
	190	33,2 41,5																		
80	180	32,8 41,0																		
	170	32,4 40,5																		
70	160	32,0 40,0																		
	150	31,6 39,5																		
60	140	31,2 39,0																		
	130	30,8 38,5																		
50	120	30,4 38,0																		
	110	30,0 37,5																		
40	100	29,6 37,0																		
	90	29,2 36,5																		
30	80	28,8 36,0																		
	70	28,4 35,5																		
20	60	28,0 35,0																		
	50	27,6 34,5																		
10	40	27,2 34,0																		

Impr. Alf. Louis Perrin.

— S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom _____ Salle 4e Femmes Lit N° 157 F°

Prénoms Léonnie

Age 21 ans

Profession _____

Né à _____

Demeurant à _____

Entré le 1er Octobre 1883

Sorti le _____

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite tuberculeuse

Chef du Service, M. _____

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M. _____

Les personnes qui ont amené cette malade n'ont donné que des renseignements très incomplets. Elle n'aurait jamais eu une vie très régulière et aurait surtout eu des habitudes alcooliques. Le 4 Octobre Depuis huit jours elle avait des douleurs de tête et du malaise général Le 1er Octobre, elle se mit à table comme de coutume quand on la vit subitement s'affaisser sur sa chaise et perdre connaissance. Un médecin appelé aussitôt constata une hémiplégie droite. Depuis ce moment elle n'a pas recouvré l'usage de la parole

Quand on l'amène à l'hôpital la malade est toujours dans le même état, mais elle commence à reprendre connaissance. Quand on lui dit de faire un mouvement, elle essaye de s'asseoir sur son lit, mais ne fait pas le mouvement demandé. Les 4 membres

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

supérieur et inférieur du côté droit sont complètement paralysés. Le membre supérieur est flasque. Le membre inf^r ne présente un peu de contracture dans le sens de la flexion. La sensibilité est complètement abolie. On peut enfoncer une épingle dans la peau sans déterminer le moindre réflexe. Pas de trépidation plantaire.

La face ne présente aucune déviation. Les commissures sont sur le même plan. On ne peut examiner la langue, la malade refusant de la tirer. Les gencives présentent de la gingivite, saignent facilement. On voit sur elles de petites ulcérations grisâtres.

La malade perd involontairement ses urines et ses matières.

Bien au cœur. Un peu d'irrégularité des battements.

2. Octobre — Ce matin la malade n'est plus assoupie comme hier. Elle balbutie des syllabes inarticulées. Quand on pique la face ou le bras avec une épingle, elle sent manifestement et pousse un cri non à plusieurs reprises. Elle exécute des mouvements très étendus avec son bras droit. Elle remue également la jambe quand on pique la plante du pied. Un peu de trépidation plantaire et rotulienne. Pas de déviation des yeux. Le côté gauche de la face se contracte mieux que le droit. On ne peut toujours pas examiner la langue. — Urines Temp. 39. 4.

3 — Quand lui la malade est encore assoupie parle bien, et répond à peu près aux questions qu'on lui pose. Elle ne sert seulement des membres du côté droit. Encore un peu de raideur du bras droit. Langue sèche, rouge. Elle est seulement un peu affaiblie du côté droit. Elle a pu monter sur son lit. Sensibilité bien revenue. Quand elle lit le côté gauche se contracte mieux. Elle n'est pas constipée. Elle a uriné — un peu de sensibilité à la pression du ventre

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

5 Octobre Hier soir la malade se trouvait à peu près dans le même état que le matin, répondant aux questions simples, mais dans la soirée elle a commencé à pleindre et à tomber dans un assoupissement plus prononcé. Ces phénomènes se sont accentués pendant la nuit et persistent ce matin. Actuellement nous trouvons la malade dans l'état suivant : Etat Comateux avec résolution générale sauf quelques mouvements très restreints du membre sup: droit et la tête dirigée du côté droit. Les yeux sont également tournés à droite, ils présentent de légères oscillations qui les portent de la partie médiane à droite. Toutefois ils sont plutôt fermés, les pupilles sont dilatées, toutefois elles présentent alternativement des phénomènes de resserrement et de dilatation, aussi elles se resserrent un peu sous l'influence de la lumière. Les paupières sont entrouvertes, les paupières gauches plus que les droites. La face est sans expression, plutôt colorée. La bouche est entr'ouverte, on voit des fuligosités sur les dents. La malade reste absolument dans cet état.

Lorsqu'on soulève le membre sup: droit il retombe lentement et on donne lieu à quelques mouvements automatiques. En imprimant des mouvements à ce membre, on éprouve de la résistance surtout du côté de la flexion. Cette résistance est d'intensité variable. Le membre inf: droit présente à peine un peu de résistance du côté de la flexion et retombe quand on le soulève. La pointe du pied relevée présente un peu de résistance et un peu de trépidation.

Le membre sup: gauche soulevé retombe tout à fait inerte, et n'est le siège d'aucun mouvement spontané, il ne présente également aucune résistance aux mouvements communiqués. Le membre inf: gauche est également inerte et sans résistance. En relevant la pointe du pied on a une trépidation très manifeste. Car de trépidation rotulienne.

Lorsqu'on chatouille la plante des pieds on provoque des

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

mouvements réflexes avec prononcés dans le membre inf^e droit. En chatouillant le pied gauche on a dans ce membre quelques mouvements mais très légers. Lorsqu'on pique la plante du pied ces réflexes sont plus marqués des deux côtés, mais toujours prédominant à droite, elle retire avec facilement ce membre. Elle retire aussi le membre gauche quand les piqures sont très prononcées, à ce moment elle retire aussi le droit simultanément. Les piqures du membre sup^r droit déterminent des mouvements dans ce membre pour se soustraire à la piqure. Quand on pique la main gauche on ne donne lieu le plus souvent à aucun mouvement et parfois seulement après des piqures très fortes à un léger mouvement de flexion des doigts. Le plus souvent ces piqures donnent lieu à des mouvements automatiques du membre opposé. Il lui arrive même d'élever ce bras et de le porter sur la tête. Les piqures du tronc du côté gauche donnent lieu à ces mêmes mouvements. Inversement les piqures du tronc à droite produisent des mouvements de la main droite qui est portée sur le point piqué. Les piqures de ces diverses parties ne donnent lieu à aucun mouvement.

Quand on pique la face du côté droit, on produit une occlusion de l'œil avec froncement des yeux avec marqué de ce côté, moins marqué du côté opposé, et quelques mouvements au niveau de la face. Le côté gauche reste absolument immobile. Ces mouvements sont autant marqués quand on pique du côté du nez que sur la ligne médiane. En même temps on donne lieu aux mouvements du membre sup^r déjà indiqués. Lorsqu'on pique les parties latérales de la face du côté gauche on ne produit rien, mais en piquant vers l'ouverture du nez on donne lieu à l'occlusion des paupières à peine marquée à gauche et plus manifeste à droite. Ces mouvements sont moins marqués que si on pique avec la même intensité du côté droit. Pendant les piqures on a observé les mêmes variations dans les mouvements des yeux et des pupilles, et la face est restée fixée à droite.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

La respiration est irrégulière et chaque expiration est accompagnée d'une plainte en rapport avec sa durée = En outre on trouve le phénomène de Cheyne Stokes. Les pauses sont de courte durée et à ce moment il n'y a plus aucune plainte. Puis la respiration reprend très ample et fréquente (36 à 40 resp. par minute). et va en diminuant de fréquence et l'expiration est de plus en plus prolongée avec la plainte jusqu'au moment où l'apnée se produit. Il n'y a pas de changements notables de la pupille dans les variations de la respiration.

Le pouls est très faible et excessivement fréquent. 160.

L'impulsion du cœur n'est pas très forte, mais elle est nette. Le battement de la pointe est dans le 5e espace en dedans du mamelon. A l'auscultation on trouve un bruit de galop très manifeste malgré la rapidité des battements qui sont en même nombre que ceux du pouls. Le rythme du galop très accusé à l'oreille se perçoit aussi en plaçant la main sur la région précordiale.

On ne trouve pas de différence de chaleur bien notable à la main des deux côtés du corps. La peau est plus chaude qu'à l'état normal, mais pas autant que la température centrale l'indique on trouve 40.4. dans le rectum.

On a sondé la malade pour avoir de l'urine et on a trouvé qu'elle était très colorée et d'une densité de 1031. La la liqueur est manifestement acide par le papier de tournesol. La la chauffant on n'a qu'un léger trouble, mais en ajoutant de l'acide acétique on a un précipité très abondant. On l'obtient aussi en traitant l'urine par l'acide azotique. La malade a été du ventre abondamment hier et a uriné.

Elle n'avale pas les liquides qu'on place dans sa bouche ils remontent ou déterminent de la toux et du hoquet. Celui-ci se produit de temps en temps spontanément et deux fois.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

Prénoms _____

Age _____

Profession _____

Né à _____

Demeurant à _____

Entré le _____

Sorti le _____

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Chef du Service, M. _____

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M. _____

5 oct. soir. Même état sauf que la respiration est plus fréquente et que la gêne est à peine indiquée. On a constaté les mêmes réflexes cutanés et tendineux ainsi que la persistance du bruit de galop avec la même fréquence des battements du cœur. Le pouls était plus faible et impossible à compter. Cette respiration bruyante avec plaintes a persisté avec la même intensité jusqu'à 2h du matin. Vers 7h du matin elle n'a plus que des râles trachéaux accompagnant la respiration. Elle est morte à 9 heures.

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom _____ Salle 4e femmes Lit N° 157 F° _____

Prénoms _____

Age _____

Profession _____

Né à _____

Demeurant à _____

Entré le _____

Sorti le _____

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Chef du Service, M. _____

Élève interne, M. _____

MEDICAMENTS

PRESCRIPTION	S. ALIBILES	CESSATION	PRESCRIPTION	USAGE INTERNE	CESSATION	PRESCRIPTION	USAGE EXTERNE	CESSATION
2. Oct.	Lait ½ lit.		2. Oct.	Solution { iodure de pot. 2 gr. / Eau 120.	3.	2. Oct.	onguent napolitain 3 p. j.	
Goutte	Coupé		3. Oct.	Solut. { iodure de potass. 2 gr. / Eau 60 gr.	⚲ St.	⚲ St.	lav. sulf. ajouter 0,80	

H. H. — S. G. — Feuilles de Médicaments, A. — 11-32. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

à la surface mais aussi dans les parties profondes les granulations sont très petites - Quelquefois l'une d'elles a le poseur d'une lentille - Elles sont en nombre égal dans les 2 reins -

Foie
Rate

Le foie est volumineux et gras - Il pèse 16 - La rate augmentée de volume présente à sa surface mais surtout dans l'intérieur un grand nombre de granulations tuberculeuses, la plupart assez fines, quelques unes atteignant le volume d'un pois - Poids 260

Rien de particulier du côté des péritoine, de l'intestin et des organes génitaux -

Le sujet ne présente aucune cicatrice ni aucune autre lésion apparente.

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Jeanne N° 34.

Nom Auguste François Eugène Simard. DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

né à Montagnat (Ain).

demeurant à

profession Cisseur de Dessins. Méningite tuberculeuse

âge 16 ans

tempérament

constitution

entré le 19 Janvier 1883.

sorti le

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Père mort à 47 ans après 4 ans de maladie.
Mère actuellement vivante.
Il a eu 6 frères ou sœurs; 4 sont bien portants, 2 sont morts très jeunes.
Bonne santé antérieure; cependant a l'âge de 4 ans il a été malade; il ne dit pas quelle a été cette maladie.
Pas de glandes au cou, ni aux aines d'ailleurs.
Il est malade depuis 10 à 12 jours; il s'est tenu la tête de plus en plus lourde, ses jambes ne le portaient pas; depuis il a travaillé plus depuis 5 jours.

Actuellement:
Le malade est très pâle, faible; il fait à peine la station debout. Il a eu jamais eu d'épistaxis, mais a la tête lourde, fort mal, quoiqu'il ne dolori pas du tout.
Langue couverte d'un enduit blanchâtre épais; sur les côtés pointillé rougeâtre qui va peu à peu avec la rougeur normale au reste de la muqueuse. La bouche est mauvaise.
Pas de rougeur de la partie supérieure des piliers antérieurs et de la luette. Il se plaint de rester d'avoir eu mal à la gorge au début.
Il souffre d'une douleur vague et diffuse au niveau de la région épigastrique et de l'abdomen.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Appétit ne jeune. Constipation depuis 8 jours. Douleurs à la pression de la fosse iliaque abdominale ; mais pas de gargouillement, ni de taches rosées.	Pas de vomissements. Les pas le ballonnement
	Pouls = 96 P. Cœur = pointe à la 5ème espace Bruit de souffle systolique à la base.	Dehors les narines ;
	Poumons. Sonorité normale - Râle sibilant à la 2 pommes	
	Rien de particulier à la rate.	
20 j.	Les pas de gargouillements.	
22 j.	Gargouillement. Pas de taches rosées. Langue blanche, peu sèche. Pas de douleurs abdominales.	
23 j.	Etat stationnaire. Le malade ne va à la selle que s'aide des lavements, mais alors les selles sont légères.	
26 j.	Epistaxis rien. Le malade a la figure très pâle. Il est abattu, mais n'a pas de trouble cérébral. Pas de taches rosées. - Ce soir le malade a de la rétention d'urine. On est obligé de le sonder.	
	Les urines sont claires - Pas de matières grumeleuses blanchâtres qui disparaissent par l'ébullition à cette époque	
Pas d'albumine dans les urines de sonde	Langue sèche par des taches rosées.	
	Il est fait régulièrement des lavements comment il va à la selle. Il semble qu'il ait des selles légères quand il prend des lavements	
27 j.	Etat général mauvais. Le malade est dans une sorte de stupeur, répond cependant aux questions et ne délire pas. Il a peut se tenir sur ses jambes. La langue est assez humide, l'urine semble sans taches rosées. On est toujours obligé de le sonder.	
29	Le malade a délire toute la nuit	il a complètement perdu connaissance
	Ce matin il est dans un état de adynamique complet - Délatation	
	pupillaire énorme. Chute de la paupière supérieure droite.	
	Râle trachéal.	
	Pouls 136. - Respiration précipitée. visage cyanosé - l'asphyxie fait de progrès rapides -	
	On lui fait une injection d'éther -	
	Mort à la fin de la visite.	

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom _____ Salle _____ Lit N° ____ F° ____

Prénoms _____

Age _____

Profession _____

Né à _____

Demeurant à _____

Entré le _____

Sorti le _____

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Autopsie de Auguste Briant - N° 4. St Jean

Chef du Service, M. _____ | OBSERVATION CLINIQUE | Élève interne, M. _____

Poumons Le Poumon gauche présente de nombreuses fosses anfractueuses, remontant au sommet.

Tout le sommet est farci de tubercules, à la période ultime de leur développement, mais la plupart sont en voie de ramollissement - quelques uns sont creusés en cavité dans le tissu cellulaire.

La Base est fortement congestionnée - brun noirâtre.

Le Poumon droit, n'offre rien d'anormal, sauf une peu de congestion à la base - quelques ganglions bronchiques sont hypertrophiés à la coupe.

Les Ganglions péri-trachéaux et bronchiques sont très hypertrophiés - noirâtre - quelques uns atteignent le volume d'une noix, l'un deux très volumineux est complètement ramolli - donne à la coupe un flot de pus. D'autres présentent au centre un commencement de ramollissement - tout autour à la périphérie

Cœur - P: 240 gr. rien d'anormal

Reins, un peu congestionnés. P: 959

H. H. — S. G. — Feuilles d'observations, A. — 11-82. — 10.000. Impr. Alf. Louis Perrin

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Rate normale - 353

Foie - 1650 gr - Tissu normal

Intestin : Dans la dernière portion de l'Intestin grêle, 2 plaques de Peyer hypertrophiées, non encore ulcérées - Dans la 1ère partie du gros intestin, au niveau de la valvule de Bauhin, on trouve 4-5 plaques dont deux ulcérées, 1 grand axe transversal.

Le Mésentère et Tous les ganglions plus ou moins hypertrophiés

Cerveau Dure mère intacte - Cependant à la partie supérieure, elle adhère à l'un Hémisphère - présente une granularité assez considérable de petits granulations de couleur grisâtre, blanc-jaunâtre, qui tous probablement de consistance de Pacchioni.

A la base, entre les 2 lobes olfactifs - Dans les espaces quadrilatères de la région de Sylvius gauche surtout, et sur la frange des racines, on trouve de nombreuses granulations de la grosseur d'une tête d'épingle, blanches, dépendant de la Pie-mère, qui se confond avec elle - A la région sylv. gauche se trouve un foyer purulent gros comme une noix

Sur la face supérieure des lobes supérieurs médians des circonvolutions on voit un traînée longitudinale blanc-verdâtre, semblable à des grains concrétés et situés dans la Pie-Mère

Les Ventricules Latéraux sont remplis d'un liquide séreux

SCD Lyon 1

0. H. Ste Jeanne

Modèle N° 61.

Nom Pinard Auguste

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	20	21	22	23	24	25	26
95	210	34,0 42,5							
90	200	33,6 42,0							
	190	33,2 41,5							
80	180	32,8 41,0							
	170	32,4 40,5							
70	160	32,0 40,0							
	150	31,6 39,5							
60	140	31,2 39,0							
	130	30,8 38,5							
50	120	30,4 38,0							
	110	30,0 37,5							
40	100	29,6 37,0							
	90	29,2 36,5							
30	80	28,8 36,0							
	70	28,4 35,5							
20	60	28,0 35,0							
	50	27,6 34,5							
10	40	27,2 34,0							
	30	35,5							

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle 4e Femmes N° 121

Nom M. Vittoz

né à

demeurant à

profession couturière

âge 46 ans

tempérament

constitution

entré le 14 février 1882

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite tuberculeuse

Autopsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas de renseignements sur l'hérédité : 4 enfants
vivants. Pas d'autres accidents de la petite
enfance. Pas d'autre maladie grave ; réglée à
l'âge de 14 ans, régulièrement jusqu'à 40 ans.
Ménopause depuis 6 ans ; aucun accident
ménopausique. Pas d'accidents [illegible]
Elle aurait ressenti depuis
Juin, aurait eu des vertiges dans l'estomac.
Elle aurait eu il y a 8 ans un abcès qui aurait
(ouvert au dehors) depuis lors on aurait trouvé dans la région inguinale droite
l'orifice resté fistuleux. = Hypertrophie
progressive d'une glande inguinale droite, suivie bientôt d'engorgement à la
partie antérieure de la région dorsale et engorgement
également des 2 glandes lombaires. —
Elle tousse depuis 6 ans ; n'a jamais
craché de sang. —
Depuis 8 mois elle est plus malade
a perdu l'appétit et tousse davantage

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Elle aurait beaucoup maigri. N'a pas eu de règles ces temps derniers. = Elle entre à l'hôpital le cinquième jour de la persistance de ces symptômes.	
	Langue blanchâtre, pas d'appétit. = Ventre assez douloureux spontanément, pas de sonorité. = Douleurs vagues siégeant au niveau de la vessie, sur la ligne médiane, ces douleurs s'irradient sous forme d'élancements, de picotements dans les membres inférieurs. Pas de troubles de la sensibilité. = La marche n'est pas en fait pas troublée. = Pas de transpiration plantaire ou autre. = Rien à l'auscultation du cœur. = Sonorité thoracique égale des 2 côtés. — A droite, et à gauche respiration obscure à droite elle est très obscure. S'accompagne de râles muqueux surtout à la pointe aussi à droite, à gauche, respiration râles muqueux très nombreux aussi bien en arrière qu'en avant. Pas de toux et de voix. ——— Légère retentissement. Pas d'albumine.	
10 Mars	= Strabisme interne du côté de l'œil gauche, impossibilité de porter l'œil gauche en dehors. = Toujours douleurs vagues dans le dos et les membres inférieurs. = Pas de troubles de la sensibilité. pas de contractures. rien du côté des membres supérieurs. =	
20 Mars	Id. — Pas de changement du côté des membres ou de la face. = Marche impossible, mais elle peut faire tous les mouvements dans son lit.	
21 Mars	= Depuis hier soir elle souffre de la tête, et paraît un peu essoufflée. Toujours douleurs dans les membres inférieurs et vers le dos.	

SCD Lyon 1

Février 1883 — n° 121. — Lucie

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* _____ N° _____

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

22/bre — Lamalade est toujours somnolente, parle avec un peu de subdelirium, la nuit surtout. Lorsqu'on l'interroge elle répond promptement aux questions; mais dès qu'on la laisse en repos, elle s'assoupit de nouveau. On remarque alors que l'éclosion des paupières droites n'est pas toute à fait complète. L'œil droit est à la partie médiane et en soulevant

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

la paupière gauche, on voit que l'œil de ce côté est un peu en dedans de la ligne médiane. — La malade porte l'œil droit dans toutes les directions dans l'étendue normale, mais l'œil gauche ne peut être porté en dehors : il ne peut même pas atteindre la ligne médiane, restant toujours très légèrement dévié en dedans. Les autres mouvements en haut, en bas sont normaux. La pupille est mobile, un peu moins resserrée à gauche qu'à droite. Contient un peu de vascularisation anormale de la conjonctive. — Lorsqu'on dit à la malade d'ouvrir les paupières, elle exécute très bien et très complètement ces mouvements et l'occlusion n'a lieu que ~~dans les~~ lorsqu'il n'y a pas d'effort. Cependant on constate encore que l'occlusion se fait plus énergiquement à gauche qu'à droite ; il existe toujours de la diplopie. — On remarque encore que le sillon nasal de l'œil droit est moins prononcé que celui de gauche, et que les

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Les mouvements de la jambe droite sont manifestement moins prononcés que ceux de la jambe gauche quand il s'agit de mouvements étendus comme ceux provoqués par une grimace, par une piqûre : les mouvements restreints paraissent s'exécuter également d'un côté et de l'autre. = Il existe donc un léger degré de paralysie faciale droite qui n'existait pas hier ou qui était moins manifeste, car nous l'avions recherché sans la trouver. Les mouvements de la langue s'exécutent bien et lorsque elle est tirée au dehors, elle est portée un peu plus à gauche, on peut à l'attribuer à l'état des dents (à peine appréciable,)	La sensibilité de la face aux moindres piqûres persiste : les mouvements des membres et la sensibilité, ainsi que les réflexes normaux persistent : seulement faiblesse très grande de tous les membres.
	Le réflexe rotulien recherché dans le lit fait défaut.	
	Rien du côté des autres nerfs crâniens.	
	Elle ne vomit pas. Lorsqu'on lui demande : elle nausée, elle répond de douleurs au front la tête.	
	- Pas d'incontinence ni de rétention d'urine.	
	Elle se plaint de ne pas pouvoir dormir depuis hier et demande souvent à aller à la selle. Les lavements ne sont pas gardés.	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

n° 121. 5e Chambre

HOTEL-DIEU. — *Salle* N°

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

23/février. Hier soir, la malade s'est levée seule et debout se tenant aux pieds de son lit elle a présenté des mouvements des membres inférieurs qui ressemblaient à des mouvements convulsifs (danse de Sydenham). On est arrivé près de la malade on l'a assise sur une chaise et alors les 4 membres ont été agités pendant 5 minutes environ; on a replacé la malade dans son lit et elle a continué de présenter une grande agitation tellement

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

que pendant la nuit, on a été obligé de la contenir au moyen d'un drap passé au niveau du tronc. — Il n'y a pas eu en somme de phénomènes convulsifs proprement dits, mais plutôt des mouvements pour changer de position et chercher à se lever.

Nous la trouvons ce matin, inclinée sur le côté droit, la tête fortement inclinée de ce côté, de telle sorte qu'il y a incurvation à droite, du cou et du tronc; lorsqu'on place la malade dans une position verticale, on éprouve une certaine résistance pour redresser le redressement de l'incurvation, et la malade ne tarde pas à reprendre sa position première. La malade remue tous les membres surtout ceux du côté gauche. A chaque expiration elle pousse un gémissement et ne paraît pas souffrir beaucoup de ce qui se passe autour d'elle; en tout cas ne répond pas

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	aux questions. = Les paupières Les yeux sont habituellement légèrement dirigés à droite, disant le siège de cette lectualité, mais tandis que l'œil gauche ne dévie jamais à la partie médiane, l'œil droit atteint et dépasse même la ligne médiane. = La conjonctive droite Tuyau de gauche assez dilatée, celle du côté droit est très congestionnée. Les pupilles sont très peu à peine dilatées moyennes. ———	sont à demi closes mouvements de ne gauche ne dévie que quelquefois même la ligne est très congestionnée. côté droit
	Acuité respiratoire accrue. Des râles sonores et entendus, d'abord subtils. = Langue sale. Très légères face ou aux membres supérieurs. La malade est mal à l'aise ou moins plus agitée, dit souffrir moins fortement quand qu'elle retire la partie piquée ou qu'elle cherche à se défendre. Le mouvement défensif se fait surtout à droite qui à droite. =	aussi moins de supérieures à la
	Les paupières au niveau de la plante des pieds donnent lieu plus fréquemment à des mouvements partant du côté gauche. . Lorsqu'on pique la face sur la ligne médiane on donne lieu d'abord que les mouvements musculaires se donnent lieu sont aussi restreints et plus marqués à gauche qu'à droite, plus marqués au niveau de l'orbiculaire qu'au niveau des parties inférieures de la face. = Respir. 32. = Les expirations sont très très-prolongées, régulières. Pouls = 100. Température 37,3. Bien que la malade ne paraisse pas avoir conscience de ce qui se passe autour d'elle, elle cherche à se soustraire à la douleur et à se défendre des mains qui la tourmentent ou qui lui font subir les épreuves.	

SCD Lyon 1

121 bis

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* N°

Nom
né à
demeurant à
profession
âge
tempérament
constitution
entré le
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

23 Févr = Il n'y a pas d'hémiplégie complète mais que mouvements dans dt, mouvements presque nuls que les membres droits s'exécutent mais, le membre supér. peut être fléchi, étendu en présentant une légère résistance à ces mouvements au pli du coude du biceps que du triceps, surtout dans les moments où l'autre membre est très agité. Quant au membre supér. gauche, c'est une résistance considérable dans les 2 sens, qu'il présente

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

continuement.

Pour les membres inférieurs, quelque agités presque constamment résistance aussi légère des fléchisseurs aux plis à gauche qu'à droite. Pas de rigidités tendineuses pas de trépidation plantaire ou rotulienne. — Aucune rigidité tendineuse dans un sens

Le côté gauche a une température plus élevée que celle du côté droit, cette différence est surtout accentuée pour la face et pour le membre supér, mais très peu de différences appréciables. — —

23 Févr = 5 h. soir. Pouls très marqués, les 2 pouls paraissent inégaux par l'expiration : les battements sont égaux mais à droite qu'à gauche : les pulsations sont sensiblement à peu près identiques et tous deux sur la ligne médiane : pas d'ailleurs également développés et d'une force égale. = Pas de trépidation plantaire ni rotulienne, pas de rigidités tendineuses, sensibilité diminuée aux membres inférieurs, la malade excite les

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	mouvements à défens— au c. m. les supérieurs Corps en conjugué Visage — en les bras. — 12 Mêmes phénomènes par émotion ou pour de me à la résistance	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4 femmes N° 121

Nom Vettoz Marguerite.

né à

demeurant à

profession

âge 46 ans

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

— Autopsie le 25 février 1882

— Pie méningite suite à ne s'écoule pas le liquide - Les circonvolutions sont légèrement tassées ainsi les d'un côté que de l'autre - Pas de particularité dans les sinus ni sur la dure-mère -

A la base les méninges présentent une teinte opaline avec un peu d'épaississement et une injection plus grande qu'à l'état normal - Les artères désignées ainsi qu'à la région (Willis vaisseaux etc) sont comme encerclées et comme unies par les méninges épaissies. La carotide droite est manifestement teinte, mais la carotide gauche

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

est affaissée — Pas d'altération des artères qui ne présentent non plus aucune lésion d'athérome. Les méninges sont le siège d'un exsudat épais qui entoure au niveau du chiasma, tant autour de la tige pituitaire - Les méninges sont extrêmement ~~plus~~ épaisses sur la protubérance où on peut même les enlever avec facilement, sans qu'on remarque une adhérence particulière pour les différents nerfs. Le moteur oculaire externe gauche a une teinte un peu moins blanche et est un peu plus étalé, aplati que celui du côté droit

— On trouve un exsudat qui accompagne l'artère vertébrale droite jusqu'à la protubérance près du moteur oculaire externe; ainsi qu'à la partie interne, antérieure et inférieure du hémisphère.

— Pas enlevant ~~les méninges~~ les méninges sont épaissies en avant de la protubérance et du bulbe, mais aussi en arrière sur la face inférieure du cervelet - Le ventricule contient plus de liquide qu'à l'état normal. Il y a un peu d'épaississement de la membrane ependymaire, surtout ~~sur~~ sur la corne inférieure, plus marquée à ~~du~~ gauche du côté droit - Le ventricule latéral gauche paraît plus distendu que le ventricule latéral droit

— Hémisphère gauche - Il est très facilement les méninges en raison de la pachymère, toutefois il y a encore peu de lésions de circonvolutions - Aucune altération apparente sur la différents coupes.

Hémisphère droit — Même difficulté pour enlever les méninges de ce côté, mais

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	aucune lésion extérieure. Rien non plus sur le corps. — Rien du côté des cervelet. — Pas de lésion appréciable du côté de la protubérance ou du bulbe. Rien notamment sur le corps pyramidal gauche. — Rien si ce n'est la moindre trace appréciable sur le nerf de la 7e paire. — Rien de spécial aussi dans la moelle cervicale. Rien non plus dans la cavité abdominale ni sur le trajet du nerf dans la cavité abdominale.	
	Rate. Foie, reins = normaux. Le cœur ne présente que quelques taches laiteuses sur sa surface extérieure. = Poumon droit présente quelques rares foyers tuberculeux mais pas de cavernes. = Pas d'adhérence au sommet. Le poumon gauche présente des adhérences très étendues au sommet, et sur ses parties latérales: il contient également quelques rares foyers tuberculeux. —————— Intestin et organes génitaux internes = Sains	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* Ste Jeanne N° 17

Nom Jules Perrin
né à St. Rambert (Ain)
demeurant à
profession tonnelier
âge 45 ans
tempérament
constitution
entré le 22 août 1881
sorti — *le* Mort le 26 août à 10 h. du soir

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Tuberculose pulmonaire
Méningite tuberculeuse

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Lorsque le malade est apporté à l'Hôtel-Dieu, il est incapable de parler. Voici les renseignements fournis par sa femme.

Cet homme a été militaire et a fait de nombreuses campagnes. Depuis qu'il a quitté le service il exerce la profession de tonnelier et travaille souvent dans les caves. Dans ces diverses circonstances il a eu souvent l'occasion de contracter des refroidissements ; mais c'est surtout depuis cinq ans qu'il tousse d'une manière habituelle. Depuis la même époque il a considérablement maigri et perdu de ses forces. — Ses parents n'ont jamais toussé et sa mère se porte encore très bien. — Il a un fils également bien portant.

Enfin, il y a huit jours, la maison

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

que il habitait, place St. Pothin, brûla ; dans l'incendie il prit encore froid, se mouilla, et fut très-impressionné. A partir de ce moment il ~~fut~~ alité ~~a~~ accusa un mal de tête, et une fièvre très-intenses. Cinq jours plus tard, il y a 7 jours, sa femme venait de lui servir sa soupe, lorsqu'elle s'aperçut que tout-à-coup il ne pouvait plus lui répondre. Depuis lors, on a constaté une fièvre ~~intense~~ violente, ~~une paralysie~~ la perte de la parole, une paralysie des mouvements.

Il remue les yeux à droite et à gauche, et agite les membres presque continuellement, surtout du côté droit. Il tire un peu la langue lorsqu'on l'en prie, et ne paraît pas avoir perdu connaissance ; il fait même quelques signes de tête affirmatifs ou négatifs lorsqu'on lui adresse une question. Lorsqu'on lui demande où il souffre il passe la main sur la tête partie frontale et pariétale de sa tête, et même sur celle de sa femme.

On trouve que la sensibilité aux piqûres est considérablement retardée et diminuée.

Il ne crache presque pas et avale ses crachats ; constipation depuis quatre jours.

A l'auscultation on entend des craquements dans toute la hauteur du poumon gauche, surtout en avant, et au sommet.

Diminution des réflexes tendineux et cutanés plantaires.

Sensibilité retardée et diminuée.

Les yeux paraissent plutôt déviés d'une manière presque constante en haut et à droite.

Faiblesse du membre sup. gauche ; surtout les mouvements communiqués sont un peu douloureux.

Pas d'aphasie, mais le malade délire.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
26 août	Le malade présente toujours de la carphologie de l'agitation ; il délire, pousse par moments des cris, et prononce des paroles incohérentes Mort à 10 heures du soir	
28 Août	Autopsie — Méningite tuberculeuse prédominante à la base, les méninges sont épaissies et présentent une quantité considérable de tubercules, surtout sur le trajet des vaisseaux et principalement au niveau des scissures de Sylvius ; les lésions ainsi que sur les vaisseaux qui se distribuent aux régions pariétales - Les tubercules sont plus nombreux du côté gauche. Cependant les artères de la base ne sont ni oblitérées ni rétrécies. Les ventricules latéraux sont distendus par de la sérosité, la voûte à 3 piliers est ramollie -	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

Jules Perrin (suite)

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
24 Août	Le malade est mieux, il répond parfois d'une manière sensée aux questions qu'on lui adresse, d'autre fois il divague. Il est toujours agité, et a de la carphologie. Le bras gauche est toujours raide.	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* Ste Jeanne N° 8

Nom Jacques Fourjon

né à ~~St Etienne~~

demeurant à

profession ~~tourneur~~

âge ~~57~~ ans

tempérament

constitution

entré le ~~8 août 1881~~

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

~~Goître fonctionnel~~

~~probablement du corps~~

Jules Perrin

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1re femme — N° 13

Nom Vinoy Antoine

né à Lyon.

demeurant à id

profession Employé de Commerce.

âge 33 ans

tempérament

constitution

entré le 28 avril 1880

~~*sorti*~~ *mort le* 2 mai 1880

DIAGNOSTIC ET RÉSUME

Méningite tuberculeuse

Cette observation est intéressante en raison des formes symptomatiques que la maladie a présentées surtout au début. —

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cet homme est amené en délire et ne pouvant donner aucun renseignement —

= Depuis 10 jours, ce malade aurait eu un accès de fièvre dernier dit, avec abcès au côté et au coude gauche. — Abcès qui ont été soignés et ouverts à l'hospice de Villefranche —

= Depuis la guérison de ces abcès, il aurait toujours eu fièvre avec maux de céphalalgie —

= Il a eu vomissements depuis 8 ou 10 jours, survenus des troubles du côté de la vue = Il est venu deux fois à la visite de M. Gayet qui lui a fait prendre 4 gr. d'iodure de potassium par jour = Son diagnostic était: Choréo-hémiplégie ou tuberculeux de l'hémisphère gauche —

= Perte complète de la vue du côté gauche = un peu de chute de la paupière de ce même côté depuis 4-5 jours = Ce malade serait depuis 2 jours, c.a.d. depuis le 26 avril dans l'état où il se présente actuellement;

= Il ne répond pas aux questions qu'on lui fait = Les yeux ouverts, avec une légère chute de la paupière à gauche; il reste complètement indifférent à ce qui se passe autour

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	de lui — Malgré ouverts, vous ne regardez — Il fait effort manifeste — Le malade ferme de lui-même les yeux — Il ouvre pour l'examiner il obéit à plusieurs ordres successifs mais ne regarde aucun objet à la fois — Pas trace de paralysie de la face — ni des membres — Réflexes tendineux conservés — Réflexes normaux — Sensibilité conservée — Mouvements du tronc et des membres faciaux — — Le langage est bon à peine — — Pas de fièvre —	
29 avril	Le malade a délire toute la nuit, il s'est levé plusieurs fois	
30 avril	Il a eu encore du délire toute la nuit, il s'est levé, en ce matin pourtant l'intelligence paraît un peu revenue — il répond par oui ou non —	
1er mai	Le malade continue à être dans un état d'agitation continuelle se débattant dans son lit — Il tomberait inévitablement, s'il n'était maintenu par une camisole de force — Agitation automatique et continuelle des doigts, qui semblent toucher quelque chose, carphologie —	
	Il n'a paru pas avoir du tout la notion de ce qui l'entoure de lui — Il a les yeux ouverts, mais ne fixent rien — La pupille du côté gauche est un peu tombante — En approchant rapidement la main devant, comme pour frapper on obtient par réflexe des clignements — — En approchant du cornée pendant les mouvements de la tête la tête du côté opposé — La pupille droite présente une dilatation deux fois plus grande que celle de gauche — Elle diminue sous l'in- fluence de la lumière — A gauche elle est à peu près immobile — Réflexes de la plante des pieds conservés — Les piqûres des membres inf, de la face, la brûlure sont ressenties — — La conjonctivite gauche paraît plus intense que celle de droite Aucune paralysie de la face ni des membres, qui sont tous très Face congestionnée — Semble parler par la bouche seule mouvements — Rêve très agités —	
3 mai	L'autopsie du cerveau est faite qui est complètement — Le cerveau tout entier examiné — Se voit sur toute sa surface, sur le cervelet, comme à la base de petites granulations miliaires disséminées — Le nombre point où elles sont beaucoup plus confluentes, c'est dans toute l'étendue de la scissure de Sylvius droite — Rien d'anormal de particulier à signaler	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4ème femmes N° 128

Nom Bourget Jeanne
né à Apinac (Loire)
demeurant à Lyon
profession Cultivateur
âge 65 ans
tempérament
constitution
entré le 14 mai 1880
~~*sorti*~~ *mort le* 19 mai 1880

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite tuberculeuse

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cette malade entrait à l'hopital salle 1ère Fem. service de M. Ollier le 8 mai, pour une ostéite de l'extrémité inférieure de tibia gauche
= On la fait passer aujourd'hui 14 mai aux 1ères = Elle arrive dans un tres mauvais renseignement et incapable. Dans donnés = On peut bien encore lui arracher la réponse oui ou non pour quelques questions, mais dit avec la plus grande peine =
= Elle est dans l'état suivant ;

La malade a la tête inclinée un peu à gauche et l'on constate une incurvation de la col. vertébrale avec convexité regardant à gauche
= Elle tire la langue droite mais on paraît pas dévié. Elle est un peu de haute elle est jaune chy mitrogneux, il est vrai. Mais il faut tenir compte de l'état de la dentition de la malade et surtout de l'état de propreté
A un certain moment on a pu constater des mouvements convulsifs de la face, faisant du tiraillement à droite et à gauche, simulant tic de la langue qui n'est pas déviée =
= Elle tousse les deux bras ; un peu moins à gauche que le droit =
Dans les mouvements d'extension des membres supérieurs on remarque une plus grande résistance à droite
= Le bras droit est en outre fortement tenu, agité par des tremblements =
= Les membres inférieurs sont dans l'extension complète, et les pieds, appliqués contre le lit =
= Tout dans la résolution ; et la malade paraît être

au niveau de la région cervicale

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Dans, la plus complète impossibilité de tout mouvement = Les réflexes sont diminués, mais la sensibilité générale de la surface du pied. = On ne peut obtenir aucun tremblement de la malade ni à la température point de vue des sensibilités au tact = La paralysie des membres inférieurs, des 2 côtés comme du reste de la malade paraît être plus prononcée du côté droit, et il en est de même pour la force = Pour le membre sup, la malade se retire sans faire la grimace = = Incontinence des matières fécales = Rétention d'urine = Escare sacré, latéral, 1 centimètre de chaque côté offrant toutes les apparences d'une chancre simple = Cœur battements très précipités = on ne perçoit pas de bruits de souffle poumons : Sa crachat : respiration rhonchus bien = g.g. râles sous-crépitants surtout en arrière et en bas = arrière : g.g. râles sous-crépitants aussi =	de sans faire escarre manger tout seul à table = Soins à donner de la malade et à la température des 2 côtés comme du reste de la malade = = Sonde à demeure à retirer sans faire = Rétention d'urine
	Voici les renseignements qui sont donnés par la fille de la malade = Il y a 2 ans, elle avait des plaies des 2 côtés qui sont toutes guéries un an = actuellement, il est facile en effet de constater plusieurs cicatrices suite d'adhérences superficielles = = Au mois de décembre dernier 1879, elle était obligée de rester au lit pour un mal de jambe, qui a guéri depuis = elle est restée de paralysie complète des 2 côtés = Elle a pendant tout le temps qu'elle est restée chez elle eu de l'incontinence des matières fécales, de l'étourdissement, une sorte paralysie = huit jours avant son entrée à l'hôpital, elle pouvait se faire à table de la soupe et de la viande dont elle est coutumière = A son entrée à l'hôpital, elle avait toute sa connaissance et répondait aux questions qui lui étaient faites = Il serait seulement à noter que jours après son entrée à St Pierre que la parole est devenue tellement embarrassée ; que on ne pouvait plus comprendre la malade = en même temps, survenue de la contracture des membres rétention d'urine 16 Mai : mort	

SCD Lyon 1

1re = Femmes = N° 198 = Bourgeois Jean = Meningite tuberculeuse

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
16 mai	Autopsie : Le cerveau enlevé, on remarque une fausse membrane des méninges et tout particulièrement à la périphérie des Ventricules = Les méninges de la moelle facilement enlevées = = Des granulations en grand nombre occupent le pourtour des ventricules et surtout à la base, vers l'isthme de l'encéphale et dans les scissures de Sylvius = = Dans la scissure de Sylvius gauche, et suivant la direction des vaisseaux, ces granulations sont encore en plus grand nombre que partout ailleurs = Au niveau, la frontale externe est remplie par un caillot. — = Depuis deux cette même lésion, en altérant les méninges, on retrouve une petite tumeur de la grosseur d'une noisette, constituée par des tubercules ramollis à leur centre et situés au pied de la 3ème circonvolution frontale, au pied de la circonvolution frontale ascendante et empiétant le lobule de l'insula = = Les méninges sont adhérentes au niveau de la protubérance et du bulbe : on y rencontre quelques granulations tuberculeuses = Y a-t-il encore des granulations sur les méninges spinales ? Vérifier, elles ne sont pas visibles = = Les différents coupes du Cerveau et de la moelle ne présentent rien de particulier à noter = = Les poumons sont le siège d'hypostases = ils sont criblés de petits tubercules disséminés dans toute l'étendue des deux poumons, mais point de cavernules, point de caverne = Ils ne sont en aucun endroit accolés avec la plèvre pariétale = = Le cœur, un peu volumineux présente un certain degré de surcharge graisseuse = pas de lésions d'orifices = = Foie : un peu gras, Reins - rate : n'offrent rien d'anormal = Une incision faite au niveau de la partie inférieure de la jambe gauche permet de constater l'intégrité de cet os = tibia	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4 m. f. N° 156

Nom Jeanne-Marie Cantal

né à

demeurant à

profession tisseuse

âge 16 ans

tempérament

constitution

entrée le 13 août 78

sortie le 18 août " (morte) Autopsie

DIAGNOSTIC ET RÉSUME

Granulie
Méningite tuberculeuse
Hémiplégie gauche

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Santé délicate, mais sans accident de scrofule ; pas de toux habituelle. La mère est morte à 35 ans, d'épuisement, après une longue maladie. — Il y a Cette jeune fille a eu la rougeole dans son enfance, et la dysenterie en 1873. — Il y a 6 semaines, elle a été atteinte d'une diarrhée assez intense qui a duré 15 jours ; en même temps sont survenus des points de côté, dont l'un, assez persistant, occupe la partie moyenne du rebord des fausses-côtes droites ; et quelques hémoptysies.

Amaigrissement assez notable, perte des forces ; céphalée frontale intense ; vomissements alimentaires continuels depuis deux semaines ; suppression de la menstruation depuis trois mois. — Le ventre n'est pas ballonné ; il existe du gargouillement disséminé et un peu de douleur à la pression ; foie de volume normal ; — rien au cœur — bruits vésiculaires sains. Matité du côté droit du cou ; aux deux sommets, en arrière, perte d'élasticité, respiration prolongée, respiration

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
un peu	soufflante, ~~[illegible]~~, retentissement exagéré de la voix, pectoriloquie aphone (tout cela marqué à droite). Pas de râles appréciables. — Etat demi-somnolent; la malade est très-abattue. La fièvre est ~~[illegible]~~ modérée.	
16-	Céphalée considérable; la tête semble très-lourde à la malade. Les pupilles sont paresseuses, et se contractent peu à la lumière; elles sont habituellement dilatées, et on remarque aujourd'hui pour la 1re fois que la droite l'est plus que la gauche. — Pas de selles depuis 4 à 5 jours, au dire de la malade. — Délire tranquille et doux: la malade marmotte toute seule des lambeaux de phrase; elle tutoie les personnes qui l'entourent, et répète machinalement des prières qu'elle croit réciter. — Fièvre élevée aujourd'hui: pour la 1re fois, elle a dépassé 39°. — Pouls 70; Respirat. régul. 48.	
17-	Coma. ~~Abolition~~ Etat. Yeux convulsés en haut et à droite. Mouvements automatiques des membres. La face est déviée à droite; il s'écoule un peu de saliva par la commissure droite. La commissure gauche est accolée; — Lorsqu'on pique les tégum on observe 1° que la sensibilité n'est pas abolie du côté gauche, 2° qu'il est impossible d'apprécier les nuances qui pourraient exister, à cause de l'état comateux de la malade 3° que les piqûres du front déterminent des contractions dans le côté droit de la face. — Les pupilles sont dilatées, les conjonctives injectées; la tache méningitique s'observe aussi bien d'un côté que de l'autre. — Diminution des réflexes et suppression presque totale des mouvements dans les membres gauches. — Il existe un peu de contracture dans le biceps du bras gauche. La face est très fortement déviée à droite — Ce qu'il y a de remarquable, c'est la tendance incessante aux mouvements dans les membres du côté droit — Elle forme davantage la paupière gauche. Le contact de l'épingle sur les conjonctives ne provoque des réflexes qu'à droite — Les mouvem. qu'elle fait avec le M. D. sont très-énergiques: flexion ou extension, il est ~~[illegible]~~ difficile de lutter contre le mouvem. produit — Elle n'a pas sa connaissance; elle est dans le coma, et ne profère pas une seule parole; elle serre les dents et il est impossible de lui faire avaler une goutte de liquide. Resp. 32 — P. 88. Il y a du pouls veineux — Sous une forte excitation dans le M. G. on ne provoque de temps à autre des réflexes que dans le M. sup. — Hoquets de temps à autre — Vomissements hier dans la journée.	
	Ce soir, P. 115, Resp. 42; même état que ce matin, avec plus de calme; les conjonctives sont injectées et œdématiées dans la partie seulement qui reste exposée à l'air entre les paupières mal fermées; pupilles un peu diffuses, avec gêne considérable de la circulat. en retour. — La paralysation	

IMP. A. BONNAVIAT, A LYON

SCD Lyon 1

Jeanne-Marie Cantal N° 15

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Les globes oculaires ne leur impriment aucun mouvement
Rien de temps à autre mouvem. automatiques dans les M. du
côté droit ; sensibilité persiste à gauche ; Rien. contracture
Du biceps G. face très-colorée ; tache méningitique ; coma
absolu.

18 août - Ecume blanchâtre très finement accolée à la bouche et aux narines
un peu de strabisme divergent -
Pouls. environ 160. Respiration 43. Température
Résolution complète. - " pas d'urine.

Autopsie 24 h. après la mort

Persistance de la rigidité cadavérique. Exsudat jaune verdâtre, épais, opaque, sur les méninges de la base : il occupe surtout le grand confluent antéro-inférieur, la protubérance et le bulbe ; et au niveau des grandes fentes de Sylvius les bandelettes optiques et le chiasma sont englobés dans l'exsudat. - Dans toutes les régions sus-énoncées, on remarque une grande quantité de petites granulat. miliaires et blanchâtres ; elles sont aussi très visibles le long des petits vaisseaux qui rampent sur les circonvolutions. - Les artères carotides sont comprises elles-mêmes dans l'exsudat, qui y adhère solidement ; elles offrent un calibre bien différent : celle de droite offre certainement une lumière moitié moindre que l'artère gauche ; lorsqu'on enlève les méninges qui semblent la comprimer, elle reprend une partie de son calibre primitif, toutefois elle n'arrive pas encore à égaler l'autre. —. Les ventricules contiennent une quantité assez notable de sérosité, qui a déterminé, par imbibition, un léger ramollissement des parois avoisinantes. —. A la coupe, on ne trouve dans le cerveau aucun foyer de ramollissement ni de tubercules, sauf un petit tubercule gros comme épingle, à la partie inférieure de l'hémisphère droit, mais il existe une anémie générale de toute la substance cérébrale ; et cette anémie paraît plus accusée dans l'hémisphère droit. où il existe à peine ~~un peu~~ et léger piqueté dans la capsule et dans les noyaux. a la convexité, les méninges semblent seulement légèrement opalescentes. — L'examen microscopique de la capsule de chaque côté et du bulbe n'a rien montré de particulier.

Coeur. Petit. Aucune lésion d'orifice

Poumons et plèvres. Parois de granulations miliaires, qui sont surtout extrêmement abondantes du côté droit, ainsi que sur la plèvre médiastine. Il y a dans la plèvre droite un verre environ de sérosité : à la partie ext. du lobe moyen de ce côté on trouve un exsudat hémorrhagique, de consistance gélatineuse, produit dans une néo-membrane.

Abdomen. Pas examiné

Pour le vomissement par le traitement classique
pupilles égales et réactives normalement

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles *N°* 100

Nom Mallenz Jn Bte
né à St Trivier (Ain)
demeurant à
profession Cultivateur
âge 28 ans
tempérament
constitution
entré le 28 VI 76
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite tuberc ?

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas de vomissements dans la journée. Il y a eu des vomissements avec épigastralgie ce matin. Vomissements bilieux. Pas de photophobie en ce moment. Pas de phénomènes rhumatoïdes. Pas de signes spécifiques. Pas de perte de connaissance.

Pas mal jeune, pas vieux. Forcené ?
Père vivant. Trois bien portants
Pas d'alcoolisme. Pas de rhumatisme
Bonne santé jusqu'à la guerre. En 1870 71 a fait la campagne dans l'armée du Nord. A souffert pendant cette époque de 79 varioles
hémoptoïques — et a eu la Variole.
Depuis cette époque il a constamment toussé sans avoir de nouvelles hémoptysies —
Il y a 9 mois (Commencement ?) douleurs à mi-cuisse
Il y a 6 jours environ que le Malade a été pris de céphalalgie opiniâtre qui a augmenté progressivement et qui est actuellement très intense. Pas de vomissements
Le malade a eu des sécheresses dans la nuque
Mais l'amélioration n'a été que passagère
Le pouls est rare. L'expectoration nulle
L'auscultation fait constater des [illegible] en arrière
dans les deux régions sous épineuses et sous claviculaires droites. Ont pu être mises à jour il y a 9 mois
antécédents en ces points ?
Légère épistaxis aujourd'hui 28 VI
Pas de vomissements. Pas de trouble intellectuel
pupilles égales et réactives normalement

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Constipation depuis 6 Rf. Garguelem à dans [illegible] droite –	
	Battem Dures. – Pouls = 68 R=	98 99 30 39,1 38,3 38,8 38,2,
30	une selle par lavement. céphalée persiste	
VII	Prostration continue + être très grande. Céphalalgie	
6	abrutissement persiste – céphalalgie toujours vive	
	Sécrétions toujours catarrat – Sur la poitrine. Sur la tache [illegible]	
	tache méningitique très saillante – , pupilles resserrées + égales	
	Cornée contractiles. Mouvem immobile – pas d'injection – Somnolence	
	+ silence – Rien le plus toujours de la tête, dans le [illegible] antérieure	
	Réponses très lentes – traînées. Faciès – et dit qu'il [illegible] 3 fois	
	consécutifs qu'on a arrêté de le stimuler, il tombait [illegible] la position où	
	il était lorsqu'il parlait. Sur la contracture	R= 20 . P= 96
	Pouls régulier, assez fort. Sur la paralysie	
	Rien nouveau à la caractère très franche	
	du mouvement [illegible]	
	Sur les bruits [illegible] au Cœur. Sensibilité a conservé très [illegible]	
	[illegible] bien conservée.	Ki – 1g.
1	Agitation depuis hier soir 6 heures jusque 9 h du	Vésicat à nuque
	matin + insomnie – Physionomie de la malade comme [illegible]	
	le céphalalgie. Ce matin somnolence – prostration	
	plus grande – répond à peine aux questions qu'on lui vous	Lav. purgatif.
	adresse – Pas de vomissements.	
8	Ce matin la malade est beaucoup plus abrutie – Décubitus	
	toujours latéral – Impossible de lui faire comprendre ce qu'on	
	veut – On ne peut lui faire tirer la langue – pupilles [illegible]	
	légèrement plus dilatées – toutes deux à peu près également	
	un peu à droite strabisme – Rendons de mouvements de la nuque – On ne	
	peut fléchir le tronc. Ne pas en cette matière d'agitation	
	comme hier. – Ne prend rien. – Urine pas été rendue. Sur la	
	contracture des membres – Somnolence continuelle	
Jour P= 68		
9	affaiblissement progressif. Le malade ne répond plus du tout. Il est dans la prostration	
	le plus complète – La gangrène gagne malade baisse [illegible]	R= 16 tis régulier
	agite + petite mouvements spasmodiques irréguliers	S= 60 injections
10	Sur la [illegible] contracture congestion a progressé partout cependant le malade paraît plutôt	
	gêné à gauche. La [illegible] gauche, contracture	les effusions mucosités qui remplissent
	le malade paraît plutôt gêné à gauche il y a des mouvements saccadés spasmodiques	
	du bras de la tête Sur la contracture.	Membres en résolution progressive
P: 80 R. VF.	complète – Tache méningitique très apparente –	Larm oculaire. Selles [illegible]
	La malade est complètement dans le coma. Respiration très sèche. Respirat stertoreuse	
	pendant qu'on l'examine. La respirat. s'arrête brusquement le pouls reste congestif	
	la température atteint injection jusqu'à 42 minutes régulières, [illegible]	
	la respirat revient, d'ailleurs irrégularité très grande – Après 3 minutes [illegible]	
	respirations; la mouvement s'arrête pendant 30 secondes et recommence	
	Pouls petit très obtus	
Jour P= 112	11 – Face cyanosée – Yeux légèrement ouverts. Pupille [illegible]	
	Le pouls [illegible] pupilles [illegible]. Rien [illegible] à gauche. Bouche fortement	

Salicylate [illegible] acide

Lyon, Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

Autopsie. Cavité crânienne. Toute la pie mère est partout
recouverte de nombreuses granulations de volume variable
Elle en trouve aussi sur la face externe de la base
sur cependant plus abondante à cette dernière région. Ces
principales dans les scissures de Sylvius, sur les bords de la
protubérance et où on les trouve le plus. Là en point il
y a un exsudat fibrino-purulent avec rétraction pour tenir les
petits vaisseaux fortement rapprochés.

Rien dans la substance cérébrale elle même
La pie mère rachidienne est aussi parsemée de granulations
tuberculeuses
Poumons foie de granulations caractéristiques petites nombreuses
dans un lobe d'emphysème dans la base
Avec nombreux gg cicatrices sans vestiges crétacé
Les plèvres sont de granulations superficielles — et la région grand
nombre de celles qu'on voit y voir sont apparues par
transparence

Péritoine pas de granulations tuberculeuses
Mésentère contient de nombreux et volumineux ganglions et
recouvrant une substance analogue à matière tuberculeuse
dans ganglions est fondue, enveloppée comme si elle était crétacée

Voies urinaires. La vessie ne présente pas de granulations
Mais on trouve de col, vers le verumontanum on la voit
de granulations innombrables et de ganglions petit pelle
Les intestins ne présentent ni ulcérations ni granulations

Foie rate de granulations. Cyrrhose hypertrophie
Rate cruelle
Reins exempts. — Dans il faut noter la substance
corticale a une teinte jaunâtre grisâtre. avec dans la
zone de septum parenchymateux. gg granulations tuberculeuses

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

Modèle N°. 61. N°. Salle St. Charles

Nom Jean Louis Joseph Mordens

Juin 1876.

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	28	29	30	1 juin	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	210	34,0 42,5																
90	200	33,6 42,0																
	190	33,2 41,5																
80	180	32,8 41,0																
	170	32,4 40,5																
70	160	32,0 40,0																
	150	31,6 39,5																
60	140	31,2 39,0																
	130	30,8 38,5																
50	120	30,4 38,0																
	110	30,0 37,5																
40	100	29,6 37,0																
	90	29,2 36,5																

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
Le foie mesure en un sens trop moins de l'intérêt de la ligne et la ligne des granulations tuberculeuses.	entre la fin mois et l'ombilic ; on l'y atteint en suivant la portion d'un cercle dont le tubercule central paraît plus saillant qu'à l'ordinaire elle n'offre pas d'altération.	
Poumons	Le sommet du poumon, petite caverne de la grosseur d'une noisette, rayon cicatriciel. Le reste du tissu pulmonaire est fortement congestionné infiltré tuberculeux dans toute son épaisseur en même temps de l'emphysème. Adhérences anciennes de la plèvre.	
Foie	Un peu petit, graisseux.	
Reins et Rate	N'offrent rien de particulier.	
Vessie	Rien de particulier.	
Cœur	Le cœur est graisseux, sa face interne de l'endocarde offre une teinte un peu violacée (décomposition cadavérique).	

HOTEL-DIEU. — *Salle* St Charles *N°* 107

Nom Deschamps

né à

demeurant à

profession employé des ports

âge 23

tempérament

constitution

entré le 2 janvier

sorti le 9 janvier

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Meningite cephalo rachidienne

même état

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas d'antécédents alcooliques

Il y a 18 mois pendant une traversée en mer le malade fut pris de douleurs siégeant particulièrement aux malléoles douleurs continuelles ne ressemblant pas à des picotements ou à des fourmillements, il fut traité dans un hôpital de la cochinchine par des bains sulfureux d'abord pris on administra des bain de vapeurs immédiatement après le bain le malade fut pris d'une forte céphalalgie puis quelques heures plus tard d'une fièvre intense avec délire qui a duré pendant 5 jours voici quel fut son état après cette période de 5 jours. Le malade reprit connaissance mais les idées étaient très-obtuses la mémoire était presque totalement abolie, la parole difficile, le malade ne pouvait prononcer que quelques mots en bégayant qu'on pouvait à peine il dire Oui et non.

SCD Lyon 1

Ces troubles de l'intelligence ont diminué peu à peu et on disparu au bout de six mois

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Trouble des sens acuité visuelle très diminuée surtout dans l'œil gauche — le malade apprécie difficilement les odeurs et saveurs, rien du côté de l'ouie — ces symptômes ont persisté en s'atténuant depuis une période de 3 ou 4 mois

1° Contracture des muscles masticateurs les dents étant étroitement serrées le malade a pu pendant 2 mois et demi être nourri avec du bouillon et du lait —

Pendant les 2 mois le malade a uriné involontairement et a été sujet à de la diarrhée et de la constipation

Paralysie presque complète des membres supérieurs, à peine quelques mouvements des doigts, pas de sensibilité, pas de contracture. Cet état commença à disparaître au bout de 2 mois 1/2 il y avait eu un peu d'adynamie dans les premiers jours

2° Contracture des membres inférieurs les jambes fléchies sur les cuisses et les cuisses sur le bassin. impossibilité de les allonger et de leur faire exécuter aucun mouvement Douleurs vives spontanées, hyperesthésie extrême au moindre attouchement, sécheresse de la peau des membres inférieurs, au début le malade n'a pas eu de sommeil mais dans ces derniers temps pendant qu'il marchait à la guérison il en a eu de si forts que le sommeil était rendu impossible. Au début le malade poussait des cris dans les douleurs des membres inférieurs aigus, la marche fut d'abord extrêmement pénible. Le malade a été traité par des courants continus qui même dès le début produisaient des mouvements

Il a eu deux fois la pneumonie pendant 12 jours Atteint fois d'angine gangréneuse qui a duré 15 jours

la guérison a marché d'une façon régulière jusqu'à ce que les membres inférieurs soient atteints de paralysie.

Lyon, impr. A. Bounaviat, rue Ste-Catherine, 18.

SCD Lyon 1

Il y a 8 mois le malade avait pendant près d'un an des douleurs en ceinture

N° 21 bis.

DATES	Cautérisations au fer rouge. HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Aujourd'hui le malade souffre d'une douleur presque continue égale dans les jambes - D'une façon intermittente douleur dans les reins, sensibilité à la pression dans les dernières vertèbres de la région dorsale. La marche est possible facile même, quoique cependant le malade traine légèrement la jambe gauche. Le toucher donne la sensation de piqûre caoutchouc - la marche n'est pas rendue plus difficile lorsque le malade ferme les yeux recouvert de Les sensibilités sont cependant intactes Depuis 2 mois Diminution de force dans le membre inférieur gauche. Dans les membres inferieurs. le malade ne peut marcher pendant plus d'un quart d'heure sans être fatigué. Les membres inferieurs ne présentent plus aucune diminution des forces.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 62

Nom Philibert Decarroux

né à La Roche (Haute Savoie)

demeurant à

profession Cocher

âge 41

tempérament

constitution

entré le 17 avril 1874

~~sorti~~ mort le 20 avril

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Meningite tuberculeuse

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Rien du côté de l'appareil digestif
~~Pas d'alcool~~ Buvait un peu d'alcools
Quelquefois de l'absinthe
Pas d'antécédents jusqu'ici pas de maux
à ce moment sans étiologie appréciable
~~appropriés~~ Epistaxis répétées par le fond des yeux
Ces hémorrhagies sont quotidiennes
et assez abondantes
Ni épistaxis à ce moment aucune
hémiparésie dans la région innervée
Les hémorrhagies durent pendant 2 ans
environ puis disparaissent
Quelque temps après le début de cet
écoulement sanguin remarque
des troubles généraux, de l'amaigrissement
de l'affaiblissement, de la tendance
aux sueurs nocturnes

Lyon. Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SOD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	A ce moment ne tousse pas — Ce n'est qu'après la disparition de l'hémorragie que survient la toux — C'est ~~a~~ qui d'abord légère au début, devient ensuite un peu pénible avec expectoration — sans jamais d'hémoptysie — Il y a 2 mois disparaissent définitivement sans jamais plus revenir Durant 15 jours — pendant ce laps de temps la toux aurait diminué d'intensité — Depuis 2 ou 3 ans aurait eu à différentes reprises des crises paroxystiques à type de nature ~~indéterminée~~ asthmatiques — Renseignements pris sur le nombre et le caractère exact de ces crises, — actuellement amaigrissement assez prononcé — sueurs nocturnes, Gonflement de la main Gauche, douleurs diffuses, gênant le mouvement Toux et expectoration —	
20 août 92	~~Toux expecto~~ Respiration obscure en arrière Quelques râles sonores disséminés dans les 2 poumons, plus nombreux fins aux 2 bases — plus à droite Râles muqueux également fins dans toute la hauteur du poumon, mais moindres	
21	— Température 40 — continuation du régime, Toux assez fréquente, même état à l'auscultation — Nuit à 92 — Un peu avant midi accès de suffocation avec expectoration sanguinolente —	

SCD Lyon 1

St Paul 62 — Philibert Decarone

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Température toujours très élevé — Délire par de fortes sueurs — Depuis hier soir le malade prend des lavements à la quinine depuis le 21 août Même délire avec excitabilité très grande Langue sèche — Rétention d'urine —	

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 99

Nom Grand Henry

né à Lyon

demeurant à

profession journalier

âge 31 ans

tempérament

constitution

entré le 7 fev 76

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Meningite tuberculeuse ?

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

A tousse pendant une quinzaine de jours au commencement de janvier 76. sans discontinuer avec fièvre. La toux a diminué d'intensité mais depuis 8 jours il garde le lit à des maux de tête, de la surdité des vertiges et de la céphalalgie. Il dort peu n'a pas eu de sueurs il a été toujours le ventre rétracté, ce jourd'hui il n'a rien vomi. Pas de douleurs abdominales.
La constipation est absolue, la face paraît rougeâtre, le pouls est plein un peu fréquent.
L'oreille est sensible aux deux côtés.
Rien aux reins.
Pas de râles sibilants ni respiration rude dans les 2 poumons. Quand il tousse on entend un peu de craquement.

8/2 = Le malade a eu une selle diarrhéique dans son lit sans rien apercevoir.
Obnubilation intellectuelle

9.10 Délire violent. Cris. Répète à tous les mouvements qu'on lui fait faire et crie à l'hyperesthésie générale. Crie quand on le fait asseoir =
Le délire est violent obstiné le malade dit qu'on veut l'empoisonner qu'on lui donne à manger. A crié jusqu'au

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	midriase assez prononcé. Ne réagissant plus du tout à la lumière, même peu. Pas de paralysie. On est obligé, de l'attacher dans la camisole de force. Les pupilles ne se contractent plus sous l'influence de la lumière, l'œil gauche est occupé par un leucome. Temp = 38.8. matin. 9 = 72	

Lyon, Impr. A. Bonnaviat, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

Modèle N° 61.

Nom Henri Grand St Charles n° 99

Février

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	210	34,0 42,5											
90	200	33,6 42,0											
	190	33,2 41,5											
80	180	32,8 41,0											
	170	32,4 40,5											
70	160	32,0 40,0											
	150	31,6 39,5											
60	140	31,2 39,0											
	130	30,8 38,5											
50	120	30,4 38,0											
	110	30,0 37,5											
40	100	29,6 37,0											
	90	29,2 36,5											
30	80	28,8 36,0											
	70	28,4 35,5											
20	60	28,0 35,0											
	50	27,6 34,5											
10	40	27,2 34,0											
	30	33,5											

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles. N° 87 89

Nom Mignot

né à Valence (Isère)

demeurant à Lyon

profession domestique

âge 23 ans

tempérament

constitution

entré le 1er Mars 1872

~~*sorti*~~ *mort le* 25 Avril 72. —

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Méningite (?)

Pas d'autopsie possible. —

— Nombreux accès adynamiques. —

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

3 Avril

- Depuis une année environ, le malade est sujet à de la céphalalgie - son caractère a changé graduellement - il est devenu plus sombre, - plus renfermé - a eu des chagrins assez vifs. - enfin on a remarqué une difficulté plus grande pour parler. -

- Vers le commencement de Mars 1872 - il perdit subitement la parole - devint tout à coup incapable de faire aucun travail. -

- Depuis lors, le malade reste alité - il ne présente néanmoins ni hémiplégie - ni paraplégie - ceci à plusieurs reprises - il s'est levé et a pu marcher. - Pas d'appétit - Incontinence d'urine et de matières fécales. - Selles diarrhéiques. -

- Le ventre n'est ni douloureux, ni ballonné. -

- Le malade ne tousse pas - à l'A. de poumon, on ne perçoit que faiblement le murmure vésiculaire qui paraît normal.

Lyon Imp. veuve Bonnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	- Rien de particulier au cœur. - - Les pupilles sont contractées. - - La sensibilité à la douleur est partout forte. - La motilité ne paraît nulle part modifiée. - - Le malade ne quitte pas son lit. Ordinairement il dort. - Sueurs nocturnes abondantes. -	
3 Avril	Matin. T. A. 38°6. - P. à 120. - Soir. T. A. 38°8 P. à 116	
4 Avril	Matin. T. A. 36°1 P. à 108 37°6 P. à 124 Soir T. A.	
5 Avril.	Matin T. A. 35°2 et T. R. 38°9. - P. à 106. R. à 23 Soir T. A. 35°7 P. à 112. -	
10 Avril	- Le Temps est moins beau. - mon malade est toujours dans le coma. - - Lorsqu'on soulève sa tête seule, on soulève en même temps le reste du tronc. - - Les Contractures dans les membres, et + hyperesthésie des membres inférieurs, au moment où on arrive vers le malade - Pupilles contractées. - - Pas de vomissements. - Pas de crises d'éclampsie. -	
11 Avril	- R. à 48, elle est courte. - Pouls à 128. - - Sommeil de tendance. - Fuliginosités sur les lèvres et la langue. -	
12	La température varie beaucoup de 35°2 à 39° le coma, la contracture paraissent augmenter quand la température est élevée et qu'il y a de sueurs. Quand on peut tirer de la vie qq paroles, lorsque la température est basse. -	
21 Avril	- Esclave au sacrum. -	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Saint-Charles N° 71

Nom Jean Antoine Pupier
né à Bessenay (Rhône)
demeurant à
profession journalier
âge 40 ans
tempérament
constitution
entré le 26 juin 1871
sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

~~Fièvre typhoïde~~
Méningite tuberculeuse

Antécédents indignes. Mal de la femme du malade il y a 22 ans.
Père mort à l'âge de 40 ans d'une affection de poitrine.
Mère morte très âgée.
2 frères ou sœurs morts vers 30 ou 40 ans de la poitrine.
Plusieurs enfants bien portants.
Un mois avant d'entrer à l'hospice les plaques de faiblesse générale de céphalalgie, de vertiges existaient 9 ou 10 jours avant la entrée les douleurs étaient tellement vives qu'elles lui faisaient pousser des cris.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Jamais de maladies graves antérieures.—
Il y a huit semaines, à la suite d'un chaud et froid cet homme eut du mal de tête, de la fièvre et fut obligé de s'aliter. — Pas de point de côté mais quelques quintes de toux avec expectoration blanche. — Somnolence, anorexie. — Pas de vomissements, mais diarrhée. — Cet état est resté stationnaire jusqu'à aujourd'hui.
Actuellement fièvre continuelle. Peau chaude. Pouls à 100. Transpiration continuelle et abondante. Stupeur très notable et par moment folie calme. Pas d'épistaxis. Langue sèche et blanche. — Toux peu fréquente, avec expectoration peu abondante et blanche. —
Anorexie. Pas de diarrhée. Pas de douleur. Pas de gargouillement. — Rate Pas de matité. Pas de frottement.

27 matin		P. 100	T. R. 39.3
Soir.		P. 112	T. 40.4/5
28	matin.	P.	T. R. 39.2
	Soir		T. 39.6
29	Id		T. 39,7

Lyon. Imp. veuve Rossetat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
30. soir	Céphalgie persistante. T. 38 T. 39.6	
1 juillet	T R 38.3. — matin — Soir 40.	
2 -	T. 39.	
3 -	Soir T. 39.	
12 Juillet	Depuis 3 ou 4 jours le malade vomit constamment les boissons qu'il prend. P 76 - Ventre déprimé - Jour de selles - Céphalgie persistante sans localisation précise - assoupissement fréquent - Réponse lente - Pas de cris, ni de délire -	cupe
13 Juillet	Depuis hier le malade n'a vomi qu'une fois	Vésicat. à la nuque
14 -	Le malade n'a pas revomi.	
17.	Retour aux persistance des vomissements — Pouls très petit à 84 -	
19	Temp. soir - 39°.	
20	Assoupissement - un peu de délire - pas vomissements Ventre rétracté en bateau - P 88 Dans toute la région gauche tâches ecchymotiques sur attention de la nuque depuis hier - Au microscope on trouve quelques rares globules rouges —	Collution - { Miel Alun brûlé Les { Gomme Valériane
21	Le nuque n'est attentive à toute la	vu —
25	Le malade est toujours dans le même état de prostration = Il a la rougeole. Les pupilles contractées = Il a la rougeole Commencement depuis plusieurs jours : la sensibilité tranquille - Il meurt demain cependant Il a eu de l'agitation Il est tombé de son lit — Le pouls est petit à 84 Les vomissements ont cessé : rien à l'abdomen — Mouvements respiratoires indiqués par Hutchinson Bruit de souffle Crépitants à la respiration pendant 10 secondes environ à la nuque Il est délirant —	
26	Persistance du même phénomène respiratoire —	

SCD Lyon 1

HÔTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 71

Nom Jean Antoine Pupier
né à
demeurant à
profession
âge
tempérament
constitution
entré le
sorti le Mort le 4 août à 7 h. du soir

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Pneumonie
Typhus
Autopsie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

27 juillet — Respirations fréquentes — douleurs dans les plèvres — toux — Points de côté du côté droit et du côté gauche —

28 — Le malade a repris connaissance — il a le délire plus — hier il a mangé un potage — Constipation depuis plusieurs jours — La respiration est plus régulière et moins fréquente — le pouls est plus fort — Hier le malade a mangé deux potages et quelques légumes — T. 84 —

Août 1 — Le malade est assez agité — la peau est à 36 — il a la face rouge — il a eu sa sonde pendant la nuit — Délire et agitation — La pneumonie de droite a repris — Depuis hier rétention d'urine —

3 — Pouls 140 — persistance du muguet — et de la rétention d'urine — les urines sont devenues fréquentes — La Respiration est régulière — et fréquente — 52 —

4 — meurt à 7 h. du soir —

Autopsie — L'autopsie a été faite 24 heures après la mort —
Cerveau — Rien de particulier à l'ouverture du Crâne et de la dure-mère — L'arachnoïde et la pie-mère sont épaissies et blanchâtres dans toute

Lyon. Imp. veuve Bonnaviat et fils

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	leur surface : entre ces deux membranes on trouve du liquide à la loge inférieure ainsi que la prostate des Circonvolutions — à la partie supérieure des hémisphères on peut facilement détacher la dure mère sans altérer la substance grise —	très facilement.
	Cerveau lui-même ne présente pas de modification importante — dans la moitié postérieure on trouve du pus entre les plexus choroïdes — mêlé aussi sur les méninges on trouve de Granulations —	
	Poumons — à droite adhérence des poumons à la plèvre costale — au bord antérieur des deux poumons hypostase très prononcée — au sommet du poumon droit induration et apparence de retrécissement caverneuse — à la même à la coupe on trouve dans le tissu induré plusieurs petits foyers, contenant des petits blocs jaunâtres du volume d'une noisette qui ramollissent sous le doigt — Existence analogue à droite, même liquide —	
	Il existe aussi deux cavernes de formation récente contenant une matière purulente — au sommet des poumons Granulations : même état, moins prononcé, pas de cavernes récentes	
	Nulle part de Granulations visibles à l'œil nu	
	Péritoine et intestin — Le péritoine absolument sain, sans apparence de Granulations — aucune trace de liquide ni d'adhérence —	
	Foie et rate — sans signe de perforations anciennes — paraissent sains —	
	Reins — Un peu tuméfiés augmentés de volume —	
	Vessie : Epaisie, normale : Contenant une grande quantité de matières muco-purulentes très fétides — (Urine aigüe Vu dans les derniers jours)	
	Organes Génitaux = La prostate et les testicules ne contiennent aucune trace de lésions tuberculeuses —	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Marie N° 13.

Nom Catherine Robert

né à

demeurant à

profession Tisseuse —

âge 17 ans —

tempérament

constitution

entrée le 29 février 81 —

~~*sorti*~~ *mort le* 1er mars 1881 —

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cette jeune fille a été réglée, il y a un an — Flux menstruel a toujours été régulier — Aucune maladie antérieure — Le 20 février dernier, a été exposée au froid — La nuit du 20 au 21 fut mauvaise elle eût de l'insomnie et de la céphalalgie — Dans la matinée, elle eût un frisson peu intense — Elle ne garda pas le lit jusqu'au 23 février c'est à dire avant-hier — A ce moment, elle avait perdu complètement les forces et éprouvait une douleur peu intense dans le côté gauche — Depuis ce jour, la douleur de côté a disparu, et a gagné la région de l'épaule — Actuellement, la malade ne peut

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Le Vomir sur ses jambes – Un peu de Stupeur – Céphalalgie – Pas de Toux – Anorexie complète – Langue Humide et Salivale – Selles régulières – Température très-élevée – Pouls – 120 – Douleur vague en arrière et à droite le long de la colonne – Ventre non douloureux – Rien au cœur – Percussion normale partout – Auscultation – En arrière et à droite, Souffle le long de la colonne à maximum au niveau de la portion supérieure de la colonne dorsale mais limité – Un peu d'égophonie – Rien dans les autres portions du poumon droit ainsi qu'à gauche –	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4ème Femmes *N°* 187

Nom Catherine Robert

né à

demeurant à

profession Tisseuse

âge 17 ans

tempérament

constitution

entré le Femme 7bre Marie le premier

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

La malade a été examinée ce matin ; elle avait entièrement sa connaissance, mais seulement elle répondait à toutes les questions avec une parfaite lenteur, mais elle s'inquiétait de son état et demandait des renseignements sur la maladie, la figure de cette était très expressive. La malade racontait que la maladie avait débuté il y a un mois par un malaise du côté de la gorge, depuis lors en même temps elle avait eu des douleurs du côté de la face, diplopie, perte de l'embarras de la parole et affaiblissement des membres surtout du côté gauche.

Nous avons constaté en effet un état paralytique des 4 membres avec prédominance de la paralysie du côté gauche. Cet état

fut manifeste

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	la malade pourrait mouvoir les membres du tout côté droit — Plaie détruit elle est faible dans les jambes surtout droite — marche gauche, et la marche est toujours difficile. elle progresse à petits pas mais avec un peu d'affaissement du côté gauche lorsqu'elle repose sur le membre de ce côté — Pas de contractures — la sensibilité est altérée — la malade ressent des fourmillements une certaine gêne dans les membres droits gauche elle dit qu'elles sont comme mortes on constate une diminution de la sensibilité — aveugle à gauche des deux côtés également diminués. On trouve enfin le réflexe tendineux rotulien très marqué à droite et absent à gauche — La malade mange difficilement — Pli de parésie du côté des yeux et de la langue — Pas de bâillement — Le contenu du chiffre sur le voile du palais ne détermine pas de mouvements — Pas de troubles généraux appréciables — La malade ne pouvait pas manger elle-même mais elle mangeait bien ce qu'on lui offrait — Elle ne se plaignait de rien et semblait souffrir	
1er jour	Actuellement, la malade ne répond plus aux questions qu'on lui pose elle a la face immobile, et le regard général fixe; elle fait seulement quelques mouvements variés et toujours des membres — Le résultat de nos investigations ont prouvé la méthodiquement — La face est immobile, les lèvres fermées, et la commissure droite légèrement abaissée, en écartant la face on les narines on ne détermine que très difficilement et de temps en temps, une contraction très légère du muscle de la face, et il est impossible d'écarter les lèvres, que le contractant alors énergiquement Les dents sont serrées par le fait de la contracture permanente des muscles; les gencives sont affaissées intactes dans la bouche et s'écoulent au dehors Complètement — Lorsqu'on appelle la malade par son nom elle ne remue que quelques muscles, le pli	
de parésie		

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

pas compris, dans d'autres cas mouvement impossible de tirer la langue — Yeux ordinairement ouverts — Regard dirigé le plus souvent à droite En appelant l'attention de la malade de ce côté, on parvient parfois à les faire diriger davantage, elle ne tourne jamais à la partie médiane mais exceptionnellement à gauche, mobilité très limitée, et j'aurais dû dire plus, complète, quelle droite surtout pour l'œil gauche Lorsque on approche le doigt ou la lumière près de l'œil, cet œil se ferme ou a un léger clignement, les yeux restent le plus souvent fixes, avec la pupille naturellement dilatée de chaque côté est immobile — Sensibilité générale de la tête et la tête est fortement portée en arrière et on constate une contracture des muscles de la nuque, avec une certaine raideur du tronc

— La malade peut mouvoir les 4 membres mais plus du côté gauche, on constate une résistance dans les mouvements communiqués au membre supérieur, peu prononcé également des deux côtés, les mouvements pour élever le membre pour amener pour le flexion — Pas de contracture au membre inférieur — Anesthésie générale de la sensibilité — Le chatouillement et les piqûres très légères ne paraissent pas perçus, mais les piqûres plus fortes donnent lieu à un mouvement instinctif — Les réflexes cutanés sont également, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* N°

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Autopsie de 2 mois

Poumons dont assez volumineux, occupant complètement adhérent à la plèvre pariétale, qui est obligé d'enlever avec lui — A la coupe, on ne trouve pas de tubercules, le tissu est normal — crépite bien — Les plèvres, surtout présentant une épaisseur de 2 ou 3 mm. —

Du côté gauche, on trouve du liquide en assez notable quantité, 200 gr environ — pas d'adhérences — La partie inférieure du poumon présente un peu d'atélectasie. Les parties supérieures sont le siège d'hyperémie et d'œdème. Les bronches remontant jusqu'aux ramifications renferment un peu de liquide spumeux — A la coupe on constate la présence de nombreux infarctus rouges disséminés dans tout le poumon.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Cerveau — Les circonvolutions paraissent assez développées — Cependant il y a peut-être un peu de liquide en arrière, les anfractuosités paraissent plates — Sous la dure mère on ne trouve pas de collection sanguine — La pie-mère est normale — Les vaisseaux sont un peu congestionnés et on trouve un peu de liquide, de même sous la pie-mère — Les ventricules sont absolument vides de liquide — On ne trouve rien sur les coupes des circonvolutions — Les noyaux centraux, et ceux de la base ne présentent rien d'anormal — La moelle est enlevée pour être examinée

Foie — Rien à noter

Reins — Rien

Cœur — absolument normal

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

Lyon, le 9 mai 81

Mon cher Confrère,

J'ai retrouvé la trace de Mlle Robert.

Je l'ai vue deux fois, chez Mme Charpeune, 61, rue Masséna, où elle était ouvrière — la première fois lundi, 21 février: céphalalgie, vomissements, vertiges, apyrexie; éruption de nei forme; la patronne était convaincue qu'elle avait la petite vérole. — la seconde fois, jeudi, 24 février: mêmes symptômes; pupilles égales; engorgement des deux membres d'un même côté; ~~[illegible]~~ Ce jour là la malade se découragea se plaignit de souffrir du gosier et

d'avaler péniblement. L'examen de l'arrière gorge, fait très attentivement pour la seconde fois, fut négatif.

Je conseillai de vite la transporter à l'Hôpital, en je dis à ses mâles que je craignais un effondrement dans la tête. On me dit alors qu'elle avait plusieurs fois pris des crises avec perte de connaissance.

Voilà tout ce que je me rappelle sur le compte de Mlle Caroline Robert.

Agréez, mon cher confrère, mes respectueuses salutations

Votre tout dévoué

Alex. Gaudibert

SCD Lyon 1

Pachyméningites

a Hétérotopies des épanchements douloureux dans les m. inf.

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1re Jeanne N° 19

Nom Jean Gauthier
né à Chalon (S. et L.)
demeurant à
profession journalier
âge 28
tempérament
constitution
entré le 29 mars 79
~~*mort*~~ *sorti le* 3 juin 1879

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Rachy-méningite hypertrophique
et méningite purulente ultime

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

mère morte en couche — père mort à 76 ans d'affection
gravelleuse — ils avaient eu 6 enfants, dont le malade est
le dernier mais il ne sait pas de quelle maladie sont
morts les frères ; l'un d'eux est mort par accident —
aucun de sa famille n'a eu à cette époque, de
fièvres intermittentes et une chancre à l'âge de 28 ans —
ce chancre fut suivi d'une éruption de boutons sur
le corps, de maux de gorge, de plaques muqueuses
aux organes —

Il y a longtemps malade remarqua que la vue
baissait dans les yeux ; aujourd'hui cette amblyopie
s'est accentuée davantage — Depuis un an
des troubles urinaires se produisent ; il garde difficilement
ses urines — enfin au mois de Xbre 78, il commence
à ressentir des élancements douloureux dans les m. inf.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Il y a une douzaine d'années ce malade travaillait dans la confection des objets de la ville — il fit ce travail pendant tout un été mais vers la fin il commença à éprouver dans les m. inf. des douleurs se produisant sous forme de petits élancements douloureux rapides — ces phénomènes ont persisté pendant une douzaine d'années —	
	Il y a 2 ans ce malade remarqua que la vue de l'œil gauche s'affaiblissait en même temps que l'affaiblissement des membres et aujourd'hui cette diminution s'est accentuée davantage — Depuis un an se sont produits des troubles de la miction qui ont eu une marche croissante ; actuellement l'incontinence est à peu près complète et il garde son urine toute la journée au moins de X heures 7 h, les élancements douloureux dont il se plaignait depuis longtemps augmentèrent d'intensité et de fréquence, en même temps que le malade commençait à éprouver dans la partie inférieure des m. inf. gauche des troubles de la motilité sous les m. inf. qui refusèrent par moment tout service sans la marche — cette gêne ne cessa de s'accentuer rapidement croissante — elle s'est accompagnée d'une atrophie musculaire et jusqu'aujourd'hui le malade a pu rester couché.	
	actuellement les douleurs sont presque continues, d'après le malade, se produisent par accès fulgurants, mais dans ces accès il se plaint d'une douleur constante profonde qui lui fait redouter l'examen pas de douleurs en ceinture bien manifestes — il fit cependant ressentir une petite douleur dans les flancs — à la pression sur la colonne vertébrale est douloureuse à partir de la région lombaire —	
	On trouve une paralysie des m. inf. incomplète — le malade peut soulever encore très bien les m. et les fléchir sur le bassin — les m. ont leur tonicité diminuée — la sensibilité est très diminuée dans toute la longueur des m. — réflexes plantaires presque éteints — pas de contracture — atrophie des masses musculaires, bien marquée par l'aspect —	
	Tarait à jeun bien marqué des pieds et des jambes	

SCD Lyon 1

Jan Janthier salle Jeanne 19 — 2ème feuille

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Affaiblissement des membres a commencé à se produire de la même manière a augmenté progressivement depuis cette époque. Le même qui s'est produit chez le malade a commencé à éprouver de la difficulté pour uriner et un certain degré de rétention d'urine qui a fait place il y a un an à de l'incontinence se produisant sous forme de mictions involontaires dans le nuit et dans la journée.	
	Impossibilité absolue de marcher est survenue à partir du mois de décembre 1878 et depuis la même époque l'incontinence a été absolue et l'urine est perdue goutte à goutte et par poussées. Les souffrances ont augmenté depuis la même époque sous forme d'élancement douloureux partant de la ceinture pour atteindre l'extrémité des membres, avec des intervalles d'apaisement.	
	Jamais rien du côté des membres supérieurs.	
	L'état du malade est à peu près stationnaire depuis son entrée à l'hôpital cependant légère rémission des douleurs depuis 8 ou 10 jours.	
7 Mai —	Actuellement le malade est ordinairement couché dans la position horizontale, bien que la paralysie soit loin d'être complète. Le malade peut soulever les membres, faire quelques mouvements de flexion et d'extension, mais la force est considérablement diminuée, la résistance est presque nulle aux tentatives de flexion et d'extension; le malade ne peut plier ni étendre ses jambes.	
	La sensibilité au tact est complètement abolie pour les membres inférieurs avec la perte de l'espace; mais elle persiste au dessus de la ceinture. La sensibilité à la température a disparu à la douleur persiste, mieux aux extrémités que à la racine des membres. La diminution de la sensibilité est légère au ventre, elle existe plutôt au dessus de l'ombilic.	
	Les réflexes plantaires sont conservés, sont très forts du côté droit que du côté gauche; il semblerait que le pied droit est un peu crispé à droite. L'ébranlement de la plante des pieds	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Détermine de douleurs dans les membres, de lancées dans les jambes.

Légère rougeur dans le mamelon de la mamelle droite au niveau du côté interne, dans le mouvement des mouvements communiqués.

Se plaint beaucoup de ses douleurs spontanées + qui ont augmenté de fréquence dans les pieds. Hémiplégie douloureuse, en ceinture.

Légère oedème du dos du pied et de la partie inférieure des deux jambes.

Rien à signaler à l'auscultation.

Toutes les inspirations, et expirations paraissent augmenter les douleurs. Mouvements de douleur mouvements rapides d'extension dans les jambes, surtout à droite.

Rougeur centrale de la largeur d'une pièce de cinq francs, et en dehors d'elle ulcération de l'entier de la largeur d'un 0.03 au dessus de la partie sup. du mamelon intermédiaire immédiatement au dessous de la partie la plus saillante du sternum

Les artères sont très athéromateuses, le battement du cœur présente quelques irrégularités, par de bruit anormal; la pointe bat dans le 5ème espace au dessous du mamelon.

Amaigrissement général, sans que les membres paraissent spécialement atrophiés. — Dynamomètre 35 de chaque côté. Gauche pour manger, mais droitier pour les travaux manuels.

Pas de fièvre; mais pas d'appétit. La plupart du temps constipation cependant il est arrivé deux fois d'aller du ventre involontairement.

La colonne vertébrale ne présente pas de déformation, mais elle est très douloureuse à la pression dans la moitié inférieure de la région dorsale.

Examen de l'œil par M Dor : — Pas de myopie ni d'hypermétropie — Acuité visuelle n'est plus que de 10/30 environ — A l'examen ophthalmoscopique on trouve une excavation papillaire des deux côtés, mais elle diffère de celle du glaucome, en ce que les veines ne sont pas coudées que d'un côté, et la papille n'est pas nettement limitée tout son pourtour; de sorte que la lésion fonctionnelle est moins avancée que ne paraissait l'faire croire l'image ophthalmoscopique.

Marcel a bien marqué ses pieds et ses jambes

SCD Lyon 1

Gauthier — salle Jeanne 19 — 3e année — 1e année

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
25 mai	Le malade continue à avoir de l'incontinence d'urine et de matières, avec paraplégie incomplète, contractures, etc. — Il enfonce profondément la tête dans l'oreiller, diminue en jambe et dort la nuque appuyée	
	affaissement progressif ; pouls 96, petit, dépressible.	
26 mai	Idem — Frissons depuis quelques jours.	
28 mai	Le malade est dans le délire pendant toute la nuit, fait des intentions avec mouvements et projections des grandes dépendances ; fait des mouvements de mastication ; qu'il mâche et fléchit légèrement comme pour l'avaler ; dans les mouvements communiqués on ne trouve plus de résistance ni dans la flexion ni dans l'extension, tout en répétant les mouvements ou détermine encore dans les lèvres, car le malade se plaint rarement, et on mine instant on sent la miction et la défécation se produire ; et le malade paraît avoir conscience car il cherche à ne pas être mouillé en dirigeant le siège de côté et en se soulevant légèrement. Une légère pression de la plante des pieds produit aussi des mouvements réflexes très-marqués — Rien de particulier dans les M.S. qui tous participent à l'amaigrissement général. La figure du malade exprime l'angoisse, la agitation ; sueurs entrecoupées ; traits déformés rouges.	
29 —	L'affaissement, la faiblesse et tous les autres symptômes persistent.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

Sg. - N°19 - salle Ste Jeanne - 58 ans. journalier
é le 29 mars 79 - mort le 3 juin 79.

---

malade a eu des fièvres intermittentes durant
service militaire en Afrique et la syphilis il
ans - Il éprouva des élancements douloureux
s les membres inférieurs depuis qu'il a travaillé
ns des égouts, il y a une douzaine d'années -
uis deux ans est survenu un affaiblissement
membres inférieurs qui est allé en progressant.
même temps il a présenté un certain degré de
ntion d'urine qui a fait place à un
de l'incontinence - d'abord incomplète puis
lue depuis le mois de Xbre 78. Il urine à l'insu
uche à gauche et par jets - De la même époque
ent aussi l'impossibilité absolue de la marche,
atrophie musculaire des membres inférieurs et
augmentation d'intensité et de fréquence
élancements douloureux qui partent de la
nture pour atteindre l'extrémité des membres.
ressait rien du côté des membres supérieurs.
tuellement paraplégie incomplète: le malade
lève les membres inférieurs - pas d'atrophie -
inution considérable de la sensibilité à la
leur. - pas de contracture. Trépidation
ère - atrophie marquée des masses musculaires
s cuisses.
accès douloureux sont presque continus - il
en outre une douleur constante profonde.
la colonne vertébrale est douloureuse à la
ssion surtout à la région lombaire. —
ère douleur dans les flancs, mais pas de
leur en ceinture bien manifeste.
Fourmillements marqué des pieds et des jambes -
fois quelques jours, légère atténuation des douleurs

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

Malgré sa paralysie incomplète le malade peut se tenir sur les jambes et reste constamment
lé : la sensibilité à la douleur et à la température
sont très conservées, surtout vers les extrémités des
res, que la sensibilité au toucher -
réflexes vont revenus - peut-être sont-ils exagérés
ité. La chatouillement plantaire détermine
s d'ancunements douloureux dans les membres.
résistance des douleurs fulgurantes - parfois il
des picotements dans les pieds. - L'excès aux
douleurs en ceinture
tes les excitations paraissent augmenter les
leurs. Au réveil de l'Hébdomadaire douloureux
vent se produire un rapide mouvement d'extension
jambes qui cesse aussitôt
colonne vertébrale est toujours douloureuse
pression, surtout à la partie supérieure de la
ion dorsale - pas de déformation -
mouvements communiqués déterminent une
ère résistance des muscles de la cuisse, surtout
extenseurs.
réflexes des extrémités inférieures et l'incontinence
naire persistent - Le malade est constipé, cependant
a eu deux selles involontaires.
ch aire centrale de la largeur d'une pièce de 5 fr.
chers une ulcération de 2 centim. de large
dessus du Bellon antérieur, au-dessous de la
ture la plus saillante du sacrum.
rue du malade est affaiblie - acuité visuelle
10/30 - pas amyopie, pas hypermétropie -
l'ophthalmoscope, excavation papillaire des
ux côtés - mais elles diffèrent de celle de
ucôme en ce que les veines ne sont pas coudées
d'un côté et la papille n'est pas nettement

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

…compris sur tout son pourtour?. En somme
…lotion fonctionnelle est moins avancée que
…pourrait le faire croire l'image ophthalmoscopique
…affaiblissement général, sans atrophie
…ente des membres inférieurs. — inappétence —
…de fièvre — athérome artériel — Le cœur bat
…régulièrement.
…affaiblissement progressif. - diarrhée - L'escharre
…ure s'est éliminée en partie et laisse donc une
…face qui suppure. — Depuis quelques jours,
…issons et fièvre.
…malade a eu du délire pendant toute la nuit. -
…ne intense avec sueurs et prostration très-grand
…l est inquiet, agité — sa parole entrecoupée —
…traits de la face sont tirés — Il n'y a plus
…résistance à la flexion des mouvements commun-
…qués - mais ceux-ci déterminent encore de
…douleurs - Le malade ne se plaint nullement de
…même instant Il perd ses matières et son
…ine, ce dont il paraît avoir conscience -
…reflexes plantaires sont toujours très-marqués.
…rt.

Autopsie - 3 juin

…trouve une escharre sacrée plus large que la paume
…la main et s'étendant plus à gauche: en outre
…escharre large comme une pièce de 2 frs au talon
…ubre. -
…moelle paraît augmentée de volume dans toute
…étendue — Elle offre partout une consistance
…ne sauf au dessus du renflement cervical où elle
…ère au moyen d'un stylet à la partie latérale
…te de la corne postérieure droite qui présente
…et effet une petite dépression.
…cisant sur la ligne médiane la partie postérieure
…le première, on trouve qu'elle offre en abondance
…t produit par un exsudat purulent qui

SCD Lyon 1

retrouve également sur la moelle et gri
et siège dans le tissu cellulaire sous arach
ien – s'étend à toute la long de la
le à la partie postérieure, mais on la trouv
à la région antérieure où il est beaucoup
s prononcé. En outre, en arrière, il est
ent notable au niveau du renflement
ure et de la région cervicale, au dessus du
flement cervical. En ce dernier point la
e mère présente un épaississement fibreux
ui donne 1 millim. d'épaisseur environ, et
ché à sa face interne par une ou 2 couches
n exsudat purulent – Celui-ci est très abondant
i au niveau des racines rachidiennes de la région
ent à la moelle, elle paraît un peu amincie
région cervicale, la pie paraît avoir envahi
vité crânienne.

inflammation des méninges avec exsudation
lente se continue au niveau de la base du
eau – On trouve depuis au dessus du chiasma
ns la fente cérébrale de Bichat – Le cerveau est
, diffluent – ses ventricules sont distendus par
iquide – Les vaisseaux sont dilatés, leurs
ois sont molles – Rien à noter sur la face
xe du cerveau, le cervelet, le bulbe, les 4e ventricule
volumineux – congestionné.
augmentés de volume – adhérences corticales graisseuses
ns emphysémateux – pneumonie hypostatique
deux bases – Léger exsudat pleural du côté
oit.
r sain – altération du foie – gras de la rein
Vaisseaux.

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

Autopsie du 3 Juin 79

Ste Jeanne n° 19

Un renflement saisit plus large que la paume de la main, s'étendant plus à gauche —
Au talon gauche, on trouve un renflement de la largeur d'une pièce de Deux francs —
La moelle paraît plus volumineuse dans toute son étendue — Elle offre partout une consistance ferme sans ramollissement au dessus du renflement cervical, où elle est un peu plus molle — A ce niveau, on constate une adhérence de la dure mère à la partie latérale postérieure droite ; il y a en effet à ce niveau un exsudat qui est adhérent à la partie latérale de la face postérieure de l'axis, qui présente à ce niveau une dépression circulaire de 3 millim. de diamètre —
En incisant la dure-mère à la partie postérieure droite, on trouve qu'elle offre un épaississement produit par un exsudat purulent — que l'on retrouve également sur la moelle, qui paraît siégé dans le tissu cellulaire sous-arachnoïdien — L'exsudat existe tout le long de la moelle à la partie postérieure, mais on le retrouve aussi à la région antérieure, où il est beaucoup moins prononcé. Du reste à la partie postérieure, il est plus accusé, au niveau du renflement lombaire, et de la région cervicale, surtout au-dessus du renflement cervical. Dans ce dernier point

SCD Lyon 1

la dure-mère présente un épaississement
qui leur donne un millim. d'épaisseur
et il existe en outre un ou deux caillots formés par un exsudat purulent. Ces
purulents sont aussi très abondants au niveau
racine nerveuse de cette région. Quand

Quant à la moelle sur la coupe de
au dessous de la pie-mère épaissie et
purulent, la moelle intacte paraît
A la région cervicale le pus paraît
envahi la cavité arachnoïdienne.

Cerveau — L'inflammation et suppuration
exsudation purulente se continue au niveau
de la base. Du cerveau, on il existe au
des chiasma, un exsudat purulent, qui
que sous la tente cérébelleuse de Pachion.
Rien de particulier du côté du 4me ventricule
ni du côté du cervelet — ni du bulbe.
Le cerveau est mou et diffluent. Le cerveau
de ly unde dans les ventricules distendus
d'état et les parois sont molles. Sur
sur la face convexe du cerveau.
Rien de particulier dans les autres parties
du cerveau.

Foie — Le foie est volumineux — du bord
la partie antérieure est épaissie de
Capsule — est à la face avec la disposition
stellée. Congestion du foie.

Reins — Les reins sont assez volumineux.
substance corticale, un peu graisseuse.

Poumons — Les poumons sans volumineux
emphysémateux. La base droite

ex le Liège d'une pneumonie hypostatique,
altération semblable du côté gauche. Léger
épanchement pleural du côté droit —

Cette ex présente, présente q.q. plaques jaunes
et deux plaques calcaires, au niveau de la crosse.
Quelques valvules sont saines —

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle La Femmes N° ~~[illegible]~~ 117

Nom Catherine Cottrau Poulain

né à Dolomieu

demeurant à

profession Tisseuse

âge 74 ans

tempérament

constitution

entré le Samedi 1881

sorti le 4 ~~mars~~ Juin 1881

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ ~~Cachet~~

Ramollissement ~~[illegible]~~ des deux hémisphères cachexie, mouvements fébriles, contracture du côté droit.

Décubitus

Autopsie

Converge depuis 15 ans dans la rue Boileau, etc, une loge [illegible]

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Santé habituelle jusqu'à avoir été robuste.
A eu 10 enfants dont 7 morts en bas âge,
1 tué en 1870

La fracture de la cuisse a laissé un raccourcissement avec claudication

Douleurs vagues rhumatismales depuis longtemps

Fracture de la cuisse droite, il y a deux ans — Jusqu'à maladie depuis cinq mois — Coma débute par de l'inappétence. Vomissements après les repas — Constipation habituelle — Il y a douleurs sous l'épigastre — Cet état a duré 4 mois environ ; la malade se dit améliorée depuis 99 jours —

A l'examen des organes et négatif Rien aux poumons ni au cœur —

La malade a la langue un peu blanche, un peu d'inappétence, elle va de ventre ~~[illegible]~~ Vomissements tout actuellement après repas —

Pas d'albumine dans l'urine

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
Avril	La malade depuis qu'elle est ici, paraît abattue, elle est très faible, elle tourne autour de son lit, dans l'attente de savoir où elle va — elle mange très peu — Diarrhée — Le changement de temps paraît avoir contracté un peu de contracture dans le côté droit au bras — La malade ne se sert pas de la main et tout de ce bras — la main est habituellement fléchie — On apprend par son fils, qu'il y a 12 ou 13 ans, elle a eu une attaque avec hémiplégie du côté droit — Il est resté la paralysie du bras, que la malade remue facilement, mais avant elle ne se servait jamais — A cette première attaque, elle est restée plusieurs jours sans parler —	
Avril	La seconde attaque a eu lieu il y a 2 ou 3 mois — Cette fois le membre n'est pas été touché, mais la face — a été atteinte encore —	
1 Avril	— En arrivant on remarque que le pouls du côté droit est plus abaissé — l'œil paraît plus petit, plus enfoncé, et l'ouverture palpébrale + petite — Le pli nasogénien est plus prononcé — Les plis de la peau autour de l'œil et de la bouche sont plus marqués à droite qu'à gauche, et surtout lorsqu'elle rit, et à ce moment, la commissure labiale est tirée en dehors et en haut, tandis que celle du côté gauche, reste presque immobile et paraît plus effilée — Tout le côté gauche de la face paraît moins mobile — Elle fait la langue plus facilement du côté droit — Elle est gênée sur la région mastoïdienne, mais un peu portée à gauche en avant — A travers aussi un peu de raideur dans le biceps du côté gauche — La sensibilité paraît conservée — Un peu de raideur dans les mouvements de tous les membres, sans — Rien de net dans les mouvements du membre inférieur — examen difficile à cause de l'ancienne fracture —	
3 Mai	Depuis 3 jours, légère indigestion : vomissements, diarrhée ;	
4 Mai	depuis, le malade est bien plus faible. Depuis 2 jours, la salive s'écoule de la bouche, quoique celle-ci ne paraisse pas plus paralysée qu'auparavant — Les signes de démence sénile sont plus accusés vers le soir ; cependant la malade répond bien aux questions simples.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
4 9bre mort. 1881	N° 117. Suite. La malade n'est effectivement jamais en restant gâteuse ; elle pensait cependant quelques aliments légers qu'on lui donnait obligé de lui donner, car elle était incapable de se servir de ses membres. Le membre supr. droit notamment était contracturé dans la flexion et immobile : c'est à peine si elle faisait quelques mouvements avec le membre gauche mais encore elle ne pouvait pas s'en servir pour se laver. Le membre inférieur droit avait une certaine résistance aux mouvements communiqués, mais bien inférieure à celle du côté droit où la résistance était très forte, surtout du côté de la flexion. Les membres inférieurs n'ont pas été examinés en détail, mais nous savons que la malade marchait sans aide, sans soutien, mais était incapable de se tenir debout. Abrutissement intellectuel assez prononcé, la malade ne répondant que par oui ou par non, et ne prononçant spontanément que quelques plaintes ou cris inarticulés. Cependant elle appelait par son nom la personne qui lui donnait ses soins, = Amaigrissement très accentué. Les sœurs ont remarqué que depuis 9.9. Temps la malade était beaucoup plus raide, et qu'on ne pouvait pas l'asseoir sur son lit.	

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

4ème Service N° 117 — Autopsie — Catherine Cottaz Savoyarde

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
5 7bre 81	La dure mère est adhérente au crane à la partie supérieure et médiane — En incisant la dure-mère il s'écoule une assez grande quantité de liquide. On trouve du coté droit une pachyméningite qui s'étend en tout l'hémisphère mais avec predominance au niveau de la partie moyenne, puis de la partie postérieure. C'est en avant que la néo-membrane est la plus épaisse. Dans les autres parties elle est plus épaisse et présente de, taches d'un rouge noirâtre plus ou moins foncé, plus ou moins etendue qui sont dues à de petits épanchements situés dans la néo membrane —; celle-ci peut être complètement détachée de la dure-mère. L'incision en ces points montre un peu de sang noir coagulé mais il n'existe pas de foyer ocreux. — La surface interne de la dure-mère correspondante à cette hémisphère gauche ne présente aucun lambeau de néo-membrane. — Un peu d'oedème des meninges, qui à la partie supérieure et moyenne de chaque coté est un aspect lactescent. Du coté gauche même il y a un peu de suffusion sanguine sous-meningée, à la partie moyenne du tiers antérieur et du 2 derniers tiers postérieurs de la 1ère circonvolution frontale sur une étendue de 3 ou 4 centimètres. — Rien de particulier, sous la voute de la base du crane. — Les artères de la base sont généralement saines — à peine ci et là un ou deux troncs pauvres taches blanchâtres. (Anomalie artérielle — Le cérébrale postérieure droite est formée par le système il n'existe qu'une mince communication avec la thère basilaire et on voit elle se bifurquer au moment ou elle arrive sur la thère basilaire. D'autre part il y a 2 communicants parallèles entre le système gauche et le cérébrale postérieure du même coté.)	



A — Trone basilaire
B — cerebrale postérieure droite.
C — gauche.
S — sylvienne.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Hemisphere droit ne trouve pas d'oblitération artérielle —	
	— Ce membranes meningées s'enlèvent très facilement — On découvre un	
	point de ramollissement sur l'hémisphère droit à la partie postérieure	
	dans la première circ. temporo sphénoïdale, à la partie postérieure	
	de la face en rapport avec la scissure de Sylvius sur une	
	étendue de 3 ou 4 centimètres. C'est une plaque jaune pâle, un	
	peu diffluente.	
	Il existe aussi d'autres plaques jaunes en arrière de celle	
	au fond de la partie supéro-postérieure du sillon parallèle, plus	
	plus en arrière dans le fond de ce pli qui sépare le lobe pariétal	
	du lobe occipital ainsi que dans le fond des plis supérieur et inférieur	
	du lobe occipital. Au premier abord ce ramollissement n'atteint pas	
	l'substance jaune qu'il n'atteint que le fond de plis et la base des	
	circonvolutions, mais en écartant les circonvolutions on s'en rend facilement	
	compte. En outre elle, — ci sont déprimés et comme atrophiés au niveau	
	points ramollis	
	— Coupe pédicule-frontale — Il existe un petit foyer de ramollissement	
	au niveau de la portion externe du noyau lenticulaire de la longueur d'une	
	noisette.	
	— Sur la coupe frontale le petit foyer se continue sur le noyau lenticulaire	
	à sa partie inférieure et externe atteignant le pli de la capsule interne	
	dans la moitié externe de son épaisseur	
	— Sur la coupe pariétale le ramollissement atteint encore très légèrement la	
	portion externe sous forme d'une altération linéaire verticale	
	— Rien sur la coupe pédicule-pariétale. Il en est	
	— Sur une coupe à 1 centimètre en arrière on trouve le ramollissement superficiel	
	de la 1re circonvolution temporo-sphénoïdale —	
	— Sur la coupe pariéto-occipitale on trouve un foyer de plus ramolli	
	mais sur ce point comme plus en arrière le ramollissement est tout à fait	
	superficiel —	

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

N° 18[17] — Autopsie — Suite —

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	— Hémisphère gauche — Sur la coupe pointue on trouve un peu de ramollissement situé à la partie inférieure du noyau caudé. Sur la coupe frontale le ramollissement occupe la partie inférieure du noyau lenticulaire et le noyau caudé ainsi que la portion de la capsule interne qui le sépare. C'est un ramollissement adhérent à la production de liquide. A Pas d'autre trouble dans cet hémisphère. Rien du côté du cervelet ni de l'isthme. — Les autres organes n'ont pas été examinés —	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

DATES	4ff. - 117 Catherine Saulnard. HISTOIRE PATHOLOGIQUE Ramollt. sur le deux hémisphères Pachyméningite hémorragique du côté droit.	PRESCRIPTIONS

Réflexions. Pendant la vie nous avions pensé que le ramollissement cérébral de cause devait siéger sur les deux hémisphères, principalement vers les lobes occipitaux et seulement avec des lésions peu étendues et disséminées sur les autres régions de l'encéphale ou sur la partie centrale. Ce diagnostic était basé sur la légère degré de la paralysie, sur la sensation de mouvements communiqués à chaque côté avec prédominance du côté aussi paralysé, sur l'augmentation presque de cette sensation ainsi que des phénomènes de démence. Ce diagnostic s'est réalisé, sauf qu'il existait en plus la pachyméningite du côté droit, à laquelle il faut très-probablement rapporter l'augmentation des phénomènes de paralysie et de contracture du même côté qu'on avait remarqués dans les derniers temps.

La première attaque de paralysie du côté droit doit très-vraisemblablement être rapportée à la lésion de l'hémisph. g. qui atteignait le corps strié et la capsule interne. Si ces mouvements étaient en partie restaurés c'est que la lésion était assez limitée. La seconde attaque a dû se produire sous l'influence de lésions de l'hémisphère droit. On n'a observé à la vérité aucune paralysie, mais seulement un notable trouble de la parole. Quelques petites lésions siégeant sur les portions postérieures de l'hémisphère, ont dû certainement moins donner lieu à des phénomènes de paralysie qu'il existait déjà des lésions dans l'hémisphère gauche. Il est donc probable qu'il n'y a pas eu de paralysie du côté gauche ou qu'elle a été assez légère pour passer inaperçue. On a remarqué seulement quelques troubles de la parole soit parce que la paralysie aurait été plus prononcée du côté droit de la langue, soit parce que les lésions doubles de l'hémisphère gauche devaient plutôt se traduire ? Enfin la pachyméningite survenant lentement sans production de fausses hémorragies abondantes

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	avoit simplement donné lieu à deux symptômes des phénomènes, à contracture siguelés du côté droit principalement, à savoir aussi du côté gauche à un certain degré (je dis seulement à l'augmentation, car les lésions trouvées sur les deux hémisphères suffisoient à expliquer leur production). Il est difficile toutefois, de décider si les troubles signalés du côté de la face étoient dus à une paresie du côté gauche avec contracture ou si cette dernière contracture suffisoit à expliquer les symptômes observés. Seulement y avoit-il des phénomènes de paresie des deux côtés avec contracture seulement du côté droit ?-	
	La sensibilité n'avoit pas paru atteinte, autant qu'il on peut juger dans ces cas, puisqu'il était impossible d'être renseigné sur l'effet produit par un simple contact de la tête d'épingle, sur l'état mental de la malade, mais les mouvements piqures étaient parfaitement perçus partout. Dans aucun que les choses se passent dans les cas de démence suivie soit paresie il existe des lésions dans les deux hémisphères, tout entier soit à soit paresie les deux hémisphères, devenus par le fait de l'altération lésés, dans l'ensemble de façon bien à des troubles prononcés de la sensibilité, et d'autant moins encore qu'on peut faire intervenir aussi en même temps la première hypothèse.	

SCD Lyon 1

Modèle N° 61.

Nom Gilibert Dominique Salle St Charles N° 91

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
95	210	34.0 42,5											
90	200	33,6 42,0											
	190	33,2 41,5											
80	180	32,8 41,0											
	170	32,4 40,5											
70	160	32,0 40,0											
	150	31,6 39,5											
60	140	31,2 39,0											
	130	30,8 38,5											
50	120	30,4 38,0											
	110	30,0 37,5			? ?								
40	100	29,6 37,0											
	90	29,2 36,5											
30	80	28,8 36,0											
	70	28,4 35,5											
20	60	28,0 35,0											
	50	27,6 34,5											
10	40	27,2 34,0											
	30	33,5											

le malade refuse de laisser prendre sa température
la température est prise dans l'aisselle.

SCD Lyon 1



SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — Salle St Charles N° 91

Nom Gilbert Charles

né à

demeurant à

profession Cordonnier puis chapelier depuis ces ans

âge 53 ans

tempérament

constitution

entré le 16 Dec 75

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Contusion brachiale
Emphysème pulmonaire
Asthme actuel
Hypertrophie du cœur
Bronchite chronique
avec [illegible] hémoptysie
Pleurésie du côté
droit dans la portion
correspondante à la partie
moyenne de l'hémithorax.
Hémiplégie incomplète du
côté droit (Rappel d'une
ancienne hémiplégie du côté)

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas de maladies jusqu'à l'année dernière
où il fut le sujet de chagrins. Pendant
cet hiver il a été beaucoup de journées
du mois de nov. 1874 il ne put se tenir
debout sans [illegible] et il était
oppressé en faisant effort. Le mois d'avril
il fut un jour de 24 jours Salle St Charles,
chez Mr Grignon. Il sortit au mois de mai,
travailla ainsi et était toujours essoufflé.
Le 4 juin vers 4 heures l'effet une
fracture de côte et entra dans sa cour.
Il entra dans la cour de Mr Petrequin
puis alla à Bourgoin, Lundi revint
à Lyon et plus malade mais l'appareil qui
avait dimini persistait encore
C'était que depuis le commencement
de novembre qu'il était mis à tousser
de manière à [illegible] l'appareil a
augmenté. Le mois temps les
jours demeurent, et pendant peu

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	à jeun l'appétit et depuis 8 jours avant son entrée dernier atteint de dyspnée avec [illegible] ne mangeait presque plus. et comme cela à être entouré. Il a fait y a quelques [illegible] avait souvent de l'asystolie, et a les attaques très [illegible]	
	Il a des quintes de toux fréquentes avec salives et de suffocation. et reprise avec une crachats abondants verdâtres sans nulles une revalé purulente.	certaine jour des suivant dans
	A l'auscultation : énormes ronflements sonores, respiration très courte expiration prolongée. Râles sous crépitants et autres râles sonores [illegible] Puis et gros (Cœur sont très mobiles) Il entend plus nombreux qu'en arrière des foyers très plus distincts.	
	En avant sur hypogastre sous le diaphragme L'inspiration est soufflante vers les parties supérieures L'expiration se distend presque jusqu'à [illegible] prolongée. A droite l'inspiration est plus obscure et on trouve des râles sous-crépitants en arrière. L'expiration est toujours prolongée dans les cas.	
20 déc	60 respirations par minute. Pouls fréquent entendu à distance Impulsion du cœur [illegible] et plus diffuse à percevoir à cause de la [illegible] des seins. respiration) Toutefois dans certains cas, au-dessus du sein gauche on perçoit le mouvement des battements du cœur le [illegible] qui lui est [illegible]	
	L'auscultation du cœur est toujours très difficile par battements respiratoires. Il ne paraît pas y avoir de bruit anormal. Les battements sont [illegible]. P=104 Les battements perçus à l'épigastre sont [illegible] [illegible] à la radiale.	
	Les [illegible] sont [illegible] Veines du cou [illegible] et ne paraît pas y avoir de pouls [illegible] La langue est [illegible] Pas d'œdème des membres inférieurs. Pas d'albumine. = Crachats [illegible]	
21 déc	= Hier dans l'après midi [illegible] Mobile des membres de [illegible] [illegible] Mort. de la mère [illegible] de [illegible] [illegible] Il a depuis 4 ans une [illegible] qui a duré 5 semaines. [illegible] et [illegible]	

Lyon. Impr. A. Bonnavial, rue Ste-Catherine, 13.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

4 Commencement de Mars. état est un peu abattu. Il a de la peine à garder les yeux ouverts. Il aime à rester couché à l'air. Expectoration. Etant plus encombré hier. Les pupilles sont resserrées. Le malade dit qu'il entend après s'être efforcé de se parler à lui. Il croit un bourdonnement d'oreilles de la gauche. Bien dans la chambre intérieure. Il a été tout hébété un instant et rendait des glaires. C'est après qu'il était efforcé de se parler à lui. Intelligence intacte.

Le mal est retenu en partie dans les muscles de l'avant bras et de la main droite.

Le malade s'affaiblit de plus en plus. La respiration est très fréquente (60). Les mains et les lèvres sont légèrement cyanosées — Pouls petit - 120 — Toux fréquente, pénible : expectoration difficile mais abondante — Les crachats sont toujours muco purulents. Il a les mouvements étaient un peu revenus dans la main droite, mais aujourd'hui le malade ne peut plus les produire : la contracture de droite des lèvres est toujours légèrement abaissée — Pupilles anciennes les yeux paraissent convergent dans les orbites — Les mouvements persistent dans le membre inférieur qui ne présente pas d'œdème.

Mort dans la soirée.

Autopsie. — Poumons très emphysémateux avec adhérences pleurales nombreuses. En quelques points de la surface des deux lobes supérieurs, dépression avec induration sous-jacente. Adhérences pleurales plus fortes à ces endroits. Ces altérations sont dues à la tuberculose. Les ganglions trachéo-bronchiques sont indurés et caséeux. Quelques noyaux caséeux dans le poumon droit. Bronchite chronique et emphysème pulmonaire sont les lésions les plus importantes. — Cœur un peu plus volumineux qu'à l'état normal, en raison de la dilatation avec hypertrophie du ventricule droit surtout, car le cœur gauche n'est guère hypertrophié. Quelques plaques athéromateuses sur la surface interne de l'aorte. Quelques plaques calcaires à la partie inférieure de la coronaire. — Foie, reins, rate normaux.

Après avoir enlevé la calotte crânienne, on remarque sur la dure mère dans la portion correspondante à la partie moyenne de l'hémisphère droit quelques nodules d'une couleur blanc jaunâtre opaque faisant une saillie manifeste

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* 1re Femmes — N° 142

Nom Blattmer Irène

né à Niederwil (Suisse)

demeurant à Lyon

profession Lingère

âge 23 ans

tempérament

constitution

entré le 12 juillet 1880

Sorti le 19 juillet 1880

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Pachyméningite avec hématome de la dure mère

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

D'après les renseignements qui lui ont donnés par une personne chez laquelle elle loge depuis 8 ans = la malade ne présentait habituellement rien de bien = L'affection pour laquelle elle vient à l'hôpital date d'hier à onze heures du soir = La chose s'est passée de la façon suivante : Vers 6 heures la malade a été vue par une personne qui ne trouvait rien d'anormal en elle, si ce n'est une déviation très marquée de la face, qui se portait fortement à droite, contrairement à l'état habituel (renseignement donné par la personne donnant les renseignements) = La femme sortant de la boucherie ayant de la peine à se maintenir debout monte en bâtissant péniblement et s'appuyant sur le fauteuil absolument rien aux questions qu'on lui faisait = On la met au lit immédiatement après elle s'endort = Mais depuis lors elle n'a pas prononcé une seule parole =

= Actuellement malade se présente à la visite du 19 juillet

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Dans l'état suivant =	
	Elle ne peut absolument bien dire	et n'a fait aucun signe
de vive qu'elle	Comprend bien ce qu'on lui dit =	
	= Pour tout ce qui concerne la sensibilité de la face, elle accuse de toutes parts de nombreux points douloureux	
	Et tactile = Quand elle ferme les yeux on remarque qu'elle a tout à fait perdu de mouvement sur son lit, tout le	
	= Yeux : on ne note pas de déviation appréciable de l'un	
	ni de l'autre particulier du côté droit = Malade ne peut pas	
	tirer la langue hors de la bouche = Quand la bouche étant ouverte	
	on pique la langue, on la voit se contracter surtout à gauche	
	= Membres : L'affaissement de la face	paraît porter sur le mem
	Sup. droit = Malade le bouge,	Remue aussi un peu les doigts
	mais on s'en sert plus que par =	
	Le membre inf. droit paraît peu affaibli	
	= Pas de paralysie pour le membre sup. droit Cette diminution de sensibilité	
	Se trouve aussi manifestement communiquée, mais surtout dans le pli	
	du bicep = pour le membre sup. gauche, diminution moindre, mais	
	dans ce cas, mais surtout dans le pli du bicep =	
	= Pour les membres inf. un peu de diminution aussi dans les deux mais surtout des fléchisseurs de la cuisse	
	= Sensibilité : Les piqures paraissent moins bien perçues surtout le côté droit =	
	= Reflexes : conservés = normaux	
	= pas de trépidation =	
	= Malade ne peut rien faire pour uriner et aller à la selle	
	Pneumon : rien	
	= Coeur : Battements réguliers = Pas de bruit de souffle	
	au niveau aucun pas le claquement, mais pas tempo avec maximum dans le 3e espace intercostal, pas	
	de bruit de souffle = mais pas également	
	tout bon droit = on ne le retrouve pas manifestement dans les vaisseaux du cou =	

SCD Lyon 1

Jean = N° 142 = 2

N° 21 bis.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
18 juillet	Vers à une heure de l'après-midi, la malade a pris une crise qui a duré 5 minutes = La respiration s'est rétablie ; la face, tout à fait noire, tout à fait gonflée (?) et les battements du globe oculaire dans l'orbite = Le nez lui-même était plus ou moins dévié = La crise s'est terminée par la perte de la connaissance = Deux centimètres cubes d'huile camphrée =	
	Portant au niveau de la commissure droite =	
	½ heure plus tard, la malade avait une nouvelle crise semblable à la précédente et de même durée =	
19	Rien de nouveau depuis hier = Malade a mal à la tête, surtout du côté droit ; pupilles égales et toujours réactives à la lumière ; elle peut ouvrir les doigts =	
19 juillet	Vers 8 heures ½ du matin a pris une crise semblable aux précédentes ; puis on lui a fait une piqûre de caféine ; puis au moment de la visite, elle a pris le renseignement, fourni par les voisins, qu'elle avait eu une crise à 4 heures du matin = Nous avons constaté les symptômes suivants :	
	Au moment de la visite. Nous avons constaté plusieurs crises. Le plus souvent voici ce que l'on constate : La malade est assise sur son lit, ayant l'air de s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle, regardant d'un côté et de l'autre, remuant les extrémités pour se couvrir, chassant les mouches, lorsque tout d'un coup la face devient immobile et l'on voit survenir de petites contractions fibrillaires, tout d'abord au niveau de la lèvre supérieure gauche, qui est un peu entr'ouverte, puis au niveau de la commissure droite ; puis les deux côtés en même temps = La malade pousse aussi un petit gémissement sourd et rauque pendant tout le temps que dure la crise, qui peut durer 5 à 6 secondes = Ainsi que le plus souvent on constate un peu de convulsions de tous les muscles de la face et du cou	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Du côté Droit = On voit du effort après la commissure labiale droite, Nasbord labio-alaire des Sympt. que contracte également du côté gauche le muscle du nez, de la joue et du front = La joue alors grimace par suite de contractions spasmodiques du côté Droit que dure la face du côté = Les convulsions envahissent tout hémilabio-alaire droit; mais la commissure Droite est toujours tirée à Droite et en haut = Les muscles du menton et le peaucier du cou sont également affectés = Les yeux sont également fixes à la partie antérieure N'entraînent presque pas la tête en arrière = N'entraînent pas la tête, mais également alors c'est au début de la crise =	Ce convulsions envahissent Nasbord labio-alaire droit également du côté gauche = Les convulsions n'envahissent pas le menton =
	peu accentué et dure peu = Cette déviation se produit à gauche avant la fin de la crise, puis l'œil revient à la partie médiane, à gauche tout à fait à la fin =	Cette déviation est très marquée
	Pendant chaque crise ou toujours à la première contraction ou à l'allongement de la face qui accompagne les convulsions =	Immédiatement après la
	Au moment de la crise on constate toujours un peu de dilatation des deux pupilles également =	
	La coloration de la face ne change pas notablement au moment de la crise =	
	Contrairement à ce que l'on observe chez le malade à ce moment = toutefois elle ne change pas de physionomie et porte la main gauche à la face lorsque la convulsion commence à se produire = Il est à noter que la crise a cessé lorsque le malade regarde du côté droit et d'autre part ne présente jamais de	état de connaissance de la

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Et comme hier elle lui était bien arrivé =	
=	La durée de la crise 30 à 40 secondes à une minute =	
	Nous assistons le matin à une dizaine de crises =	
=	Dans les crises, qui sont précédé de vertiges, dîgts ou 6 chocs	
	au même temps que la face, le bras droit, et aussi	
	le membre inf. du même côté étaient agités par des secousses	
	convulsives, prédominantes au membre sup, qui était	
	d'abord clônique et roide et était saisi le siège de mouvements cloniques	
=	Actuellement Lengren on constate l'aphasie complète. Lorsqu'elle	
	ne prononçait pas un seul mot = Elle ne paraît pas	
	davantage comprendre ce que on lui dit, lorsqu'on lui	
	demande de tirer la langue = il faut répéter souvent la question	
	et souvent sans résultat = d'autres fois elle ouvre facilement la	
	bouche. Lorsqu'elle tire la langue elle est un	
	peu déviée à droite =	
=	Elle donne la main droite mais quand elle	
	tâte le pouls = elle ne voyons le serrer actuellement	
	surtout de la main gauche, pour tâter le pouls etc.	
=	Mais si on maintient le membre gauche immobile, elle le	
	sent du membre droit qu'elle étire parfaitement = Mais	
	tous les mouvements des doigts sont très restreints =	
	Les mouvements persistent dans le membre inf. et on	
	trouve de la contracture et de la faiblesse des membres	
	comme précédemment =	
	On constate bien aujourd'hui les troubles de la sensibilité	
	qui sont très manifestes. Lorsqu'on dépose la tête d'épingle	
	sur la conjonctive droite, elle cligne à peine ou ne cligne pas	
	du tout du côté droit = tandis que du côté gauche	
	il impossible de placer la tête de l'épingle sur la cornée	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Ce malade pleurant alors le dit très vivement = Il a très peur de l'eau. Interrogé sur la manière dont la douche est prise = Il dit que les petites piqures aux fesses cependant sont peu de chose lorsque le piqueur reste peu de temps au point piqué laissant la malade indifférente quand elles sont faites de côté droit, tandis que elle dit de la douche piqure du côté gauche = La différence des piqures des doigts est aussi très manifeste = Les fesses volumineuses étant appliquées contre l'ouate et les piqures légères des doigts, on sent quelle retire la main gauche, la droite restant immobile — Toutefois si les piqures sont plus fortes elle retire aussi la main droite =	immédiatement lorsque
	= Il existe aussi une diminution de la sens. de côté du côté droit inf. droit et les réflexes plantaires sont diminués du côté droit =	
	Au trou, la diminution de la sens. de côté droit sens. de la douche du côté droit même, la sens. de côté droit est très vive = = Lorsque la piqure vient, la figure qui est habituellement immob. devient un peu grimaçante du côté gauche, tandis que la comm. droite reste immobile =	
	On fait aussi pleurer — =	Elle nous montre la main
	gauche de dessus Oyez = Pendant la crise non seulement elle n'entend pas la parole mais aussi elle mord la toile qu'on tend	
	= Pendant qu'on écrit cette note, la malade a pris	prot. bro 2 gr
	10 crises — =	
	= Pierre malade a dormi toute la journée = Elle n'a pas continué réveillé pendant toute la durée de ces crises —	
	= Mises examinées par Mr de Pitres et la malade n'ont pas donné de précipité albumineux existant =	

SCD Lyon 1

4 Jeun = 1912

4

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
20 juillet	Nous trouvons ce matin la malade avec un air plus hébété que la veille = Depuis la visite d'hier matin la voisine a compté 28 crises = A l'exception de 3, toutes ont été limitées à la face = Dans trois crises, deux ont occupé la face et le bras droit = Sur les 3 crises, la dernière que la malade dit avoir eue ce matin, a duré plus longtemps que les autres, 3 à 4 minutes, elle s'est généralisée à tous les membres ainsi pendant la crise, la face, les membres, étaient agités par des mouvements convulsifs =	
	Malade se lève toujours pour aller à la selle = se lève aussi pour ramasser un objet qu'elle laisse tomber, parex. = Elle se sert toujours toujours moins du bras droit que du bras gauche =	
21 juillet	Malade n'a pas pu se dire depuis hier matin avant la crise = Elle est beaucoup plus triste, comprend très bien ce qu'on lui dit, comprend tout cependant = Elle peut aussi dire quelques mots = Elle répond assez bien quand la demande ne comporte qu'une réponse d'un mot = Mais dès qu'elle faut dire plus, elle s'embrouille et ne peut plus bien comprendre =	
	Elle peut manger aussi bien les objets qu'on lui présente tout en lui mais il lui arrive d'être plus en moins de temps ; a pu dire aussi aussi facilement un mot pour une autre = Malade peut lire très bien la langue qui lui présente aucune déviation =	
	= Le contact ne a diminué beaucoup à droite par rapport à gauche = Sensibilité à la piqûre est la même =	
	Pour le membre sup. gauche, pas de sensibilité au toucher. Commence à avoir un peu de sensibilité à la piqûre des doigts =	
	= Malade continue à se lever pour aller à la selle, urine,	
	At	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
24 juillet	Malade n'a rien rendu par la bouche depuis hier soir jusqu'à ce matin, sans que la malade paraisse plus mal à son aise =	Mauvaise Chose = Etat qui a été noté le 24 juillet
25 juillet	Hier dans la journée la malade n'a pris aucun aliment par la bouche, le fait est qu'elle avait pris très peu jusqu'à présent = Elle s'est levée plusieurs fois dans son lit et a eu des involontaires et des matières fécales =	
	Dans la nuit, à 2 heures du matin, elle a pris une Chose et elle tenait dans son lit = Revue au lit elle est restée dans l'immobilité la plus complète, était dans le même état que la trouve ce matin =	
	Actuellement elle est tout à fait immobile, la prunelle dilatée mais avec une respiration naturelle = Face sans expression à gauche, l'angle droit est légèrement abaissé = Les paupières sont fermées, mais lorsque on approche une lumière de chaque côté on sent nettement et la paupière supérieure plus marquée à droite = Les mouvements respiratoires de la narine, l'œil droit et à droite à gauche plus dilatée que l'œil gauche n'accentuer davantage =	
	La malade ne répond pas aux questions, impossible d'obtenir le moindre mouvement pour ouvrir la bouche, on tire la langue et — —	
	Paralysie complète du membre sup. droit, il retombe mollement vers la fin de la chute, en conservant une certaine souplesse = Tandis que du côté gauche, le membre conserve un bon degré de force musculaire tout à fait inerte = Le membre sup. de ce côté gauche présente en effet une paralysie	

SCD Lyon 1

Le Jeune n° 42 — 5

N° 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
15 Juillet Visite	Complète ara plaidite = Dans le mouvement communiqué, on ne trouve aucune résistance ; cependant on a pu trouver encore une légère résistance dès le départ du triceps de la Membre au Raisonnement on le membre dans toute la long. du mouvement reflexe. = Paralysie flasque du membre inf. du même côté = Le Membre inf. était présenté constamment au Mouv. communiqués une résistance dans les deux sens, mais prédominante notable du côté des Biceps. = Pas de résistance dans le membre inf. qui est épendant flasque dans tous les mouvements opposé = La recherche de la sensibilité au toucher est impossible, ne l'étant Obtenue à l'obtenir que par les Piqûres, Lorsqu'on pique légèrement les différentes parties du côté droit et du côté gauche, on ne détermine pas de mouvements ou bien lorsque ceux-ci se produisent, c'est toujours plus rapidement et plus vivement dans l'un que dans les piqûres du côté gauche = La titillation du bord du pavillon parle toujours pendant les contractions de l'orbiculaire du côté gauche et non à droite = toutefois la tête n'éprouve de changement sur la conjonctive, elle ne donne lieu à aucun mouvement = Les piqûres du côté droit légèrement, n'obtiennent bien ou bien un léger mouv. du membre sup. droit ; par fois aussi un mouv. du membre inf. du même côté = Lorsque la piqûre est forte, les mouv. du membre du côté droit sont plus prononcés, notamment au niveau du membre inf. qui est agité de secousses = Il n'en observe en même temps des mouv. dans les membres gauches, notamment dans le membre sup. Parfois aussi le membre sup. droit donne un	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Mouv. intestinaux et la main se porte vers le point [illegible] mais à cause [illegible] du mouvement de la face = La piqûre de la main du côté droit diminue les mouv. intestinaux que la face et le Mouv. commencent [illegible] membre et tout également plus marqué à la membre. = Au membre inf. Il y a une diminution du reflexe = Lorsqu'on pique le côté gauche de la face on ne produit [illegible] mouv. à la face + mais au legs mouv. du membre sup. [illegible] et au mouv. plus accentués du membre du côté droit [illegible] du membre sup. = Lorsque la piqûre est faite, on produit [illegible] des mouv. plus accentués et généralisés aux 4 membres et au tronc avec secousses [illegible] membres du côté droit, surtout du membre sup. = On produit aussi des mouv. intestinaux = Tous ces mouvements, même ceux du côté droit, sont toujours plus accusés quand ils sont provoqués par la piqûre du côté gauche, que par celle du côté droit = Les reflexes du membre inf. gauche sont bien plus accusés que ceux du côté droit = 1° Par de tripidation = 2° Par secousses = Sensibilité [illegible] Diminuée du [illegible] = Respiration : 19 insp. par m. = pouls : 92 = Les urines examinées par la chaleur et l'acide nitrique donnent un précipité abondant [illegible] =
25 juillet (1912)	= Même état que ce matin = Respiration : 17 insp. par m. pouls = 80 Température 38°5	

SCD Lyon 1

1. Jan 2e 1882 -

No 21 *bis*.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
26 juillet	La malade n'a pas bu de Naucelle chez : ce matin elle est dans un état à peu près comateux = La figure colorée avec la respiration. Les barrettes = 48 inspirations par minute Aucune expiration pénible accompagnée d'un certain effort est constatée Lorsque la malade est interpellée vivement, elle répond en nous disant qu'elle paraît bien et nous tire la langue à la grimace ordinaire = Les pupilles sont obstruées en ce moment toutes deux = Les yeux occupent la ligne médiane ou sont un peu déviés à droite — Sous l'influence de cette excitation la déviation s'accentue encore de ce côté = Les pupilles toujours rétrécies : Elles se contractent comme hier sous l'influence de la lumière Les membres supérieurs et inférieurs sont inertes = Cependant ce phénomène est plus marqué du côté gauche La carotide droite bat fort = Les mouvements automatiques de côté droit = qui paraissent surtout en rapport avec les mouvements de la respiration semble être plus gênés = Il paraît en être de même pour les mouvements réflexes qui sont obligués à leur minimum dans l'état actuel Sous l'influence des piqûres la malade réagit toujours plus vivement, plus rapidement à la piqûre du côté gauche = Toutefois les réflexes plantaires sont égaux des deux côtés et très marqués Le siège principal des piqûres porte du moyen côté de la face et de l'extrémité des mains. Les membres et surtout les membres sup. ont prédominé en siège du côté piqué (toujours quand il s'agit du côté droit = Moins fréquemment quand il est question du côté gauche) = Les piqûres de la face déterminent encore parfois encore des secousses de la main droite = Sous l'influence des piqûres	Naucelle chez : ce matin Injection 48 inspirations par minute accompagnée d'un certain effort est vivement, elle répond en bien et nous tire la langue à la grimace ouvertes = Les yeux un peu déviés à cette excitation la déviation rétrécies : Elles se contractent comme hier sous inertes = Cependant ce côté gauche droit en rapport avec les mouvements de semble être plus gênés = Il paraît en être côté gauche (mêmes dans l'état actuel piqûre du côté gauche plantaires sont côté de la face côté piqué (toujours moins fréquemment quand il est encore parfois encore des piqûres

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	ou l'intensité de la tuméfaction n'est pas allée en croissant. Urine ordinaire. Le liquide ordinaire de la plèvre. Membre sup. gauche. Même état. Membre sup. droit. Même état. Même état des deux membres inférieurs.	Bouillon. Même diète. Même prescription. Même traitement dans les deux membres supérieurs. Même état.
27 Juillet	La malade a eu dans la journée plusieurs vomissements à la suite d'un lavement. Dans la nuit on a commencé à remarquer que le malade ne pouvait plus avaler et que même quand les dents étaient serrées et empêchaient l'introduction du liquide dans la bouche. Cependant pas de vomissements. Actuellement même état. Coloration générale. Respiration complète de tout le côté. Respiration immobilité complète de la joue. Même état. Sensibilité des paupières et trismus des globes oculaires à la partie inférieure. Le pouls devient plus fort. Même état. Même état. Quelques oscillations dans le sens vertical. Le pouls tantôt contracté, quelquefois, cependant on remarque encore le liquide mais moins abondant. Même état. Même état. Même état

alyse flexogyre complète des m. gauches.
ventaires d'une légère ventaire inférieure à droite -
inuation de la ventilateur plus marquée à droite.
plexures faites du deux côté d'abord celui à
mouvements du côté droit et plus rapides et moins
du mouvements du côté gauche.
les mouvements sont toujours plus accentués à droite
sous l'influence des plexures du côté gauche -
Réflexes plantaires ℨ. plus accentués que ceux du côté droit.
Réactions d'inexcitation -
Le contenance d'urine des matières fécales - Sans albumine
Respiration lente - Pouls 80 - T. 38,5 -
Jour 10e jour. Etat comateux persistant -
Respiration stertoreuse -
Le malade répond par onomatopées, mais indistinctement et par courtes
Yeux en bas légère déviation ou un peu déviés à droite - Déviation
augmentant sous l'influence des excitations.
Les membres inertes surtout du côté gauche -
Les mouvements automatiques des m. sup. droit surtout longue
La respiration semble la plus gênée et aussi légère m. s. gauche
comme dans l'alitement -
Réaction toujours plus vive sous l'influence des piqûres du
côté gauche -
Réflexes plantaires égaux des 2 côtés à tiq-marqués -
Les piqûres de face. d'amener des mouvements des 4 membres
surtout des m. sup. avec prédominance du côté piqûré
(toujours quand il s'agit du côté droit, moins marqué du côté gauche)
pas dire : non de même -
Existence légère raideur sup. flexibilité des m. inf.
du 11e jour - Résolution complète, réagit à tiq-piqûres et aux
piqûres douloureuses, yeux à peu près immobiles à la partie médiane
pupilles peut être moins rétrécies absolument immobiles -
Les membres sont flasques surtout les gauches -
immobilité absolue - Cependant sous l'influence des piqûres et surtout de la main gauche
légère mouvements de redressement -
T. lire matin 34,2, soir 40,2 à aujourd'hui 40,6 - mort -

SCD Lyon 1

— Début brusque par irradiation de la paralysie des membres gauches
— Le lendemain par irradiation de la paralysie des yeux
— Ne peut pas tirer la langue qui se contracte violemment du côté
— affaiblissement des mouv. droit dans tous les mouvements tout possible à M. sup. peu affaibli
— Résistance aux mouvements dans les 4 membres, surtout dans les m. sup., principalement du côté droit pour le côté droit et du côté gauche pour le côté gauche pour les m. inf. la résistance est plus marquée dans la flexion.
— Diminution de la sensibilité du côté droit —
— Réflexes normaux —
— Pas de trépidation —
— Cœur : léger souffle systolique à la base
— Le lendemain de l'attaque 2 crises convulsives —
— jusqu'au surlendemain 24 crises.
— celles-ci siègent du côté droit, soit seules ou suivies de la face soit ou suivies de la face et du m. sup. droit
— toujours affaiblissement de la sensibilité du côté droit
— Diminution notable de la sensibilité du côté droit
— Vaguelle dilatation suivant ou suivant les crises —
— un jour après, 28 crises en plus de la crise générale
— 2e jour plus de crises — aphasie moins complète —
— Diminution de la résistance des m. sup. aux mouvements
— au 3e jour après amélioration notable dans l'état — Retour à la chute de tonicité à l'état normal —
— immobilité de face sous toutes expressions —
— Langue toujours tremblante
— œil g. dévié à gauche, œil droit à la partie médiane paupière renversée paraît un peu plus à droite — sous l'influence de la lumière l'œil est sensible — sous le jet de la lumière l'œil droit se dévie aussi à g. la déviation de l'œil g. s'accentue davantage —
— aucune réponse aux questions

SCD Lyon 1

1re Femme — N° 112

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
21 juillet	Le crâne ayant été scié à la manière ordinaire et la portion osseuse enlevée, on incise la dure-mère : à gauche, cette incision laisse échapper un peu de sang noirâtre. = De plus on peut constater qu'il existe encore un caillot considérable, étalé à la surface de tout l'hémisphère gauche : région frontale, région pariétale ; mais c'est surtout sur la circonvolution pariétale ascendante que son épaisseur est la plus grande : au niveau du pli courbe et du lobule du pli courbe, l'épaisseur de ce caillot atteint 2 centimètres = Après lavement des circonvolutions du lobule pariétal inférieur = On est donc en présence d'une pachyméningite avec hématome de la dure-mère = A la surface interne de la dure-mère, on trouve de nombreuses fausses membranes très minces et rougeâtres = La dure-mère ne se détache pas aussi facilement que de coutume ; elle est comme agglutinée aux autres méninges et la surface interne donne au doigt la sensation d'une surface pointillée =	
=	Le cerveau enlevé de sa boîte osseuse, quand on veut détacher les méninges et mettre à nu la substance cérébrale, on éprouve une certaine résistance ; pourtant on peut le faire partout sans déchirer la substance cérébrale =	
=	On remarque qu'à gauche toute la surface de circonvolution de cet hémisphère présente une teinte rosée. Les différentes coupes pratiquées sur les deux hémisphères ne laissent rien voir d'anormal =	
=	Rien de particulier non plus dans le cervelet = le protubérance le bulbe = les nerfs =	
=	Les artères cérébrales ne présentent, pas d'oblitération, ni plaques athéromateuses =	
=	Cœur : de volume normal = un peu flasque et recouvert de graisse = n'offre pas de lésion d'orifice =	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Aorte présente de nombreuses plaques athéromateuses, par elle est un peu dilatée immédiatement au dessus orifice aortique = Le reste de l'aorte ainsi que son origine ses premières branches de la portion descendante, l'aorte a sa part postéro-interne présente une petite dilatation anévrysmale peu profonde + et communiquant largement avec la cavité de l'artère = ovoïde ressemble à la tête d'un fœtus à terme un demi centimètre de haut = Cette dilatation contient un caillot stratifié remplissant à moitié =	
	Pas d'épanchement pleural = Les deux poumons, surtout le droit présente qq qq adhérences =	
	Les deux poumons ont une cicatrice à leur sommet = mais au outre au dessous de la cicatrice du sommet on trouve un noyau tuberculeux du volume de noisette. =	
	La base du poumon gauche est très congestionnée ; pas d'hépatisation = La crépitation existe partout partout Reins : de volume normal = Les deux substances sont bien la substance corticale a un aspect un peu graisseux Rate = foie = Rien	

SCD Lyon 1

1

HOTEL-DIEU. — Salle 4 ff — N° 142

Nom Blattmann V.

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Pachyméningite - Hémorrhagie de la dure mère

Réflexions - Pendant la vie nous avions affaire à une petite hémorrhagie située dans une des circonvolutions de l'hémisphère gauche et à un grand foyer ayant détruit une grande partie de l'hémisphère droit. - L'autopsie a prouvé que les hémisphères étaient intacts ou tout au moins qu'ils n'étaient que secondairement affectés par les lésions des méninges très légères à droite et considérables à gauche. - On peut d'abord se demander si dans un cas analogue le diagnostic pourrait être établi avec quelque probabilité?

HISTOIRE PATHOLOGIQUE.

Or, nous devons reconnaître que les symptômes observés sont parfaitement ceux auxquels pourrait donner lieu des hémorrhagies cérébrales, d'où la conclusion à un pic inévitable, étant donné la fréquence beaucoup plus grande des hémorrhagies. Un seul symptôme pourrait peut être mettre sur la voie du diagnostic, c'est la perte de réflexes constatés dans notre observation, tandis que dans l'hémorrhagie cérébrale ils sont ordinairement plus ou moins affaiblis. C'est un fait à vérifier sur d'autres cas. - En outre nous signalerons comme se rapportant particulièrement à la pachyméningite hémorrhagique la douleur survenue des 2 côtés à un certain intervalle

Si l'on cherche ensuite à se rendre compte des relations qui existent entre les symptômes observés et les lésions révélées par l'autopsie, on éprouve de grandes difficultés à se faire une opinion en raison de la multiplicité des lésions existant de chaque côté sur les deux hémisphères.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Il est à peu près certain que la perte de la sensibilité observée du côté droit est due à la pachyméningite de l'hémisphère gauche, d'autant qu'il y avait de l'aphasie. Mais ce qui est difficile à expliquer c'est l'hémiplégie complète et l'état comateux. Doit-on mettre ces derniers phénomènes sur le compte de la pachyméningite de l'hémisphère droit ou bien faut-il les attribuer à l'hématome du côté gauche? Les auteurs qui veulent toujours voir dans les manifestations de lésions cérébrales, que les derniers accidents observés à l'attération également plus récente de l'hémisphère droit. Toutefois, il faut remarquer que cette attération était tellement légère qu'elle avait pu passer inaperçue sans une observation attentive; et qu'il est bien étonnant qu'elle ait donné lieu à une paralysie complète du côté gauche, alors que des lésions considérables de l'hémisphère gauche n'avaient produit que des troubles relativement très-légers du côté droit. On peut, il est vrai, objecter que ces lésions légères suffisent à produire des troubles profonds précisément parce que l'autre hémisphère était déjà gravement affecté. Ce n'est pas ainsi, tout au moins, que les choses se passent lorsqu'il s'agit de lésions cérébrales proprement dites, car nous avons vu au contraire que lorsqu'il existait chez un hémiplégique des troubles du côté sain, ceux-ci se bornaient pas à disparaître bien que fussent produits par des lésions aussi considérables que celles de l'autre hémisphère qui tenaient sous leur dépendance les symptômes persistants. Il faut en effet des lésions considérables pour donner lieu à une seconde hémiplégie persistante du côté sain après entraînement rapide alors la mort du malade. C'était précisément la supposition que nous avions faite pendant la vie.	

SCD Lyon 1

2

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4 ff — N° 142

Nom Blattner

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Parchypunningite - Hématome de la dure-mère

Réflexions (suite) - Il faut encore reconnaître qu'ici il ne s'agit pas de lésions cérébrales proprement dites, mais seulement de lésions des méninges dont les effets [sur la localisation de la paralysie] ressemblent à ceux différents de l'hémorragie ou du ramollissement du hémisphère. C'est une question à étudier. — D'autre part on peut supposer que les premiers troubles du côté droit dépendaient de la parchypunningite gauche et que les phénomènes de paralysie survenus ultérieurement du côté gauche provenaient de la production de l'hématome du même côté.

Beaucoup d'auteurs, en effet, soutiennent que l'hématome produit des phénomènes de paralysie du même côté. Nous croyons avoir aussi observé des faits en faveur de cette opinion. Nous a-t-on toujours tenu compte des lésions minimes et en apparence peu importantes qui pouvaient exister sur l'hémisphère du côté opposé ? de nouvelles recherches sont nécessaires pour trancher la question ; car dans les deux cas que nous avons observés il y avait aussi des lésions doubles, et nous ne pouvons pas répondre à nos premiers examens. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'on peut soutenir l'une et l'autre opinion, mais que les preuves convaincantes font défaut pour avoir une solution positive qui ne puisse pas manquer de se produire par l'observation des faits en tenant compte de nos remarques. — Il est très-remarquable de voir les réflexes diminués du côté droit alors que les phénomènes d'excitation dominent

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	tendu, qu'ils étoient très-marqués à gauche, lorsque les phénomènes de compression se sont produits.	
	Il est très-curieux aussi que le trouble de la sensibilité ait persisté du côté droit incomplètement paralysé et que la sensibilité ait persisté du côté gauche complètement paralysé. Est-ce parceque le côté droit avoit été le siège de convulsions répétées? Du reste, nous avons déjà vu dans les cas d'hémiplégies, que les lésions survenues en second lieu ne produisoient pas le trouble de la sensibilité. C'est un point curieux à éclaircir, qui mériteroit d'être vérifié expérimentalement. Cette persistance de l'anesthésie du côté droit et la conservation de la sensibilité du côté gauche complètement paralysé, seroit d'après notre remarque favorable à l'hypothèse de lésions ~~doubles~~ correspondant aux troubles des deux côtés. Toutefois c'est encore un point à éclaircir et à soumettre à un nouvel examen avec soin lorsque de nouveaux cas se présenteront. — Nous avons vu que la déviation de la tête étoit très-manifeste à gauche lorsque le malade a pris la paralysie du côté gauche. Nous avons déjà constaté cette déviation dans une seconde attaque du côté de la première lésion (autre fois en faveur de l'influence de la lésion double). Puis la tendance à la déviation avoit lieu à droite, signe pronostique encore fâcheux avec les lésions constatées comme dans le cas d'hémorrhagie ordinairement. —	
	— Un autre signe pronostique fâcheux c'est la disparition de la sensibilité des membres inférieurs alors qu'elle existe dans le corps, comme nous l'avons constaté dans ce cas et avec d'autres lésions. —	
	— L'état de paralysie des yeux pourroit peut-être aider à faire le diagnostic?	
	— L'élévation de la température sans complication pulmonaire ou autre étoit en rapport avec l'hémorrhagie méningée comme dans le cas d'hémorrhagie cérébrale. Elle indiqueroit aussi un pronostic fatal. Quant à la cause des lésions dans ce cas, elle paroît à peu près écartée. Peut-on faire l'hypothèse de lésions artérielles des méninges, en raison de celles des vaisseaux? —	

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 1re Jeanne N° 14.

Nom Emmanuel Petit

né à

demeurant à

profession sans profession.

âge 75 ans.

tempérament

constitution

entré le 4 janvier 1882.

~~*sorti le*~~

mort le 13 janvier à 1 heure du matin

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Cachexie cérébrale

Hémiatrophie droite avec hémi-anesthésie.

Autopsie.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Ce malade est amené dans l'état indiqué ci-dessus.

Obnubilation intellectuelle considérable, il répond à peine aux questions d'une façon très-irrégulière et presque toujours par ces deux mots ((Eh, oui ;)) =

La motilité est abolie d'une façon complète dans les membres du côté droit, avec contracture, un peu de résistance du côté du biceps brachial =

La sensibilité est diminuée, les piqûres sont perçues cependant. = A peine de la main droite pas de trépidation.

Du côté de la face on trouve une déviation ou plutôt une déformation assez marquée des traits ; la ~~bouche~~ aux repos, la lèvre supérieure (partie gauche) est un peu relevée.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	le sillon naso-labial est plus marqué à gauche que à droite ; du côté droit la commissure des lèvres est effacée, les plis Nasillons moins marqués ; les traits moins mobiles et voilés par plaques. = Rien du côté de gencives ou des paupières. = Langue (dans la bouche) non déviée la sensibilité faciale existe. = Tremblement de la tête : Incontinence d'urine et des matières fécales. = Rien à noter Bruit de souffle très limité à la pointe du cœur. Voici les renseignements fournis par les parents ; Le malade est alcoolique. = Depuis 3 ans il a un tremblement de tête que l'on observe actuellement ; il serait survenu après une fièvre grave = Il y a 12 ans qu'il aurait commencé à se plaindre de maux de tête, et qu'il aurait eu de l'affaiblissement intellectuel (sous l'influence d'émotions morales) Il aurait pris très souvent — il serait tombé fréquemment connaissance ; depuis de cauchemars par de paralysie ; chacune de ces attaques était accompagnée d'incontinence d'urine ; elles se répétaient dans ces intervalles. = Depuis 3 ans son état intellectuel s'est singulièrement affaibli ; il ne connaissait que 2 ou 3 personnes, tenait une conversation de moins en moins intelligente, et surtout des moins suivies, répondait très mal aux questions. = Depuis deux mois il tombait plus souvent ; perdait la mémoire, ne répondait que par des oui, non, aux questions qu'on lui posait. = Depuis 3 semaines, incontinence d'urine et incontinence fécale, c'est à ce moment que sa femme aurait remarqué pour la première fois sa paralysie à droite. = Droitier. = Pas de modification. Arc sénile très marqué. =	à droite ; les traits Rien du côté Langue (dans la bouche) non déviée Rien à noter pour

Il a eu [illegible] De l'incontinence [illegible]

SCD Lyon 1

N° 21 *bis*.

N° 14. A. Leroux — E. Delt.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
12 janvier	~~Le sujet~~ Garçon en visite de midi. ~~Le malade~~ à 2 heures j'ai ~~immédiatement~~ ~~aussitôt~~ après, qu'il a été dans le	
	Le malade est dans l'état suivant : = comme	
	Hémiplégie absolue de tout le côté droit ; pas de raideur ; ~~Ce dernier~~ Un frottement ni de bruit en ~~le~~ ni avant ni arrière résistance remarquable de ~~côté droit~~ ; pour	
	le membre inférieur par la résistance est surtout	
	marqué pour les fléchisseurs ; pour le membre supérieur (non remarqué) la résistance existe dans les deux sens.	
	Pouls 120. T. R. 40, 3/10. Respiration 36.	
	Sensibilité abolie dans tout le côté droit.	
	Les pupilles (du membre supérieur) droit sont très-profondes ne donnent bien qu'à de très-légers mouvements du côté opposé ; elles ne sont pas toujours.	
	Les pupilles du membre inférieur droit (réduisent si) elles sont très-profondes un léger (recontact) ~~mouvement~~ du ~~membre~~ gris, du malade et de la cuisse	
	excité, et un mouvement (automatique) ~~complet~~ ~~fait~~ droit du	
	membre ~~inférieur~~ du côté opposé. =	
	Les pupilles sont égales et ~~parfaites~~ réagissent même des mouvements défensifs. —	
	La face est un peu (contracturée surtout dans les parties supérieures) ; la face est un peu crispée, sans déviation bien accentuée des traits ; le malade ~~est~~ la respiration stertoreuse, la bouche largement ouverte. :	
	Les yeux présentent une déviation à droite, ~~un~~ une légère nystagmus horizontal. = Les pupilles sont contractiles ; pas de dilatation. —	
	Rien du côté des poumons. = Pas de trouble fonctionnel ni d'échos.	
	Etat normal (du) côté	
13 janvier	= Le soir, pas de changement dans son état.	
	T. R. 41°, 1/10. Les yeux sont toujours déviés du même côté ; les pupilles restent égales et réagissent.	
	pas de changement dans l'état du membre.	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle Ste Jeanne N° 14

Nom Emmanuel Petit

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

— Autopsie le 14 Janvier 82 — Les parois du crane sont très épaisses et très denses — La dure mère est adhérente fortement à toute la voute crânienne et en enlevant celle-ci, on déchire la dure-mère et on donne lieu à un écoulement sanguin qui peut s'élever à 150 ou 200 grammes. La dure-mère est très fortement adhérente en certains points et particulièrement à la partie supérieure médiane qu'on ne peut l'enlever complètement. On voit qu'il existe à la face interne de la dure mère, de la pachyméningite des deux côtés, pachyméningite occupant toute la surface de la dure-mère y compris la voute du crâne. L'épaississement sanguin ci-dessus précédemment a été produit par la déchirure de néo-membranes du côté gauche où le tissu néomorphe occupant la région fronto-pariétale. Il existe du côté droit une autre formation sanguine moins volumineuse au niveau de la partie moyenne de la région frontale et qui peut contenir 50 à 60 grammes de sang ; toutefois les néo-membranes s'étendent de chaque côté en bas,

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

partout tout à fait symétriques se basant l'ancienneté des poches à bière les hématomes pachyméningitiques des 2 côtés, c.a.d. que on trouve dans les néo-membranes du sang noir ou coagulé sous forme de caillots — Néanmoins du côté gauche les néo-membranes ont une teinte moins noire et tirent plutôt sur la couleur chocolat, elles sont plus épaisses et évidemment plus anciennes — Sur la paroi du crâne il n'existe que quelques néo-membranes noirâtres et de petits caillots noirs irrégulièrement disséminés. Les hématomes ont produit des phénomènes de compression qui ont déterminé une déformation de la surface des hémisphères, beaucoup plus considérable du côté gauche que du côté droit. — A gauche — Le refoulement et l'aplatissement des circonvolutions cérébrales est surtout très prononcé sur la région frontale et pariétale du côté droit que le bord supérieur de l'hémisphère est aminci à la vue et que la portion au lieu de former une surface convexe dans la région antérieure précédemment on a une surface légèrement concave qui est divisée en deux parties par l'aplatissement un peu moins considérable de la partie moyenne des circonvolutions frontale et pariétale ascendante, d'où une légère ondulation de cette surface — L'aplatissement a peu limites : en avant la 3e circonvolution frontale qui fait une saillie en dehors par le fait du refoulement de la portion interne, et à la partie postérieure le pied des circonvolutions frontales qui se trouve dans les mêmes conditions — L'aplatissement de la partie postérieure est limité par une ligne passant à un centimètre 1/2 en arrière du sillon parallèle

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Les membres sont tendus de long ainsi que les circonvolutions sans cependant toutefois à la partie postérieure de la région pariétale et au niveau de la région occipitale. De même l'aplatissement paraît avoir lieu d'avant en arrière de cette côté que les circonvolutions sont refoulées d'arrière en avant et de dehors en dedans et de cette sorte aussi que la partie supérieure du lobule de Rolando semble être à une certaine plus en arrière que celui du côté opposé — Sur l'hémisphère droit il y a aussi un liquide sous arachnoïdien des méninges et de la substance cérébrale au niveau de la pariétale ascendante du pied de la 2e pariétale et de la partie moyenne de la pariétale ascendante

— Les artères de la base ne sont pas athéromateuses, il paraît quelques petites taches noires sur la tunique carotidienne et la sylvienne gauche.

— Sur l'hémisphère gauche les coupes n'offrent rien de particulier et l'on peut même remarquer que la partie comprimée ne diffère en rien dans la consistance et la coloration des parties avec la partie non comprimée.

— Rien de particulier sur l'hémisphère droit et les coupes que l'on y pratiquées

— Rien sur le cervelet.

— Rien dans l'isthme.

— Rien dans les sinus.

— Nota — Sur la dure mère du côté gauche la caillotte est plutôt la teinte chocolat et on en trouve très peu qui avait la teinte noire, tandis que ceux du côté droit ont plutôt la teinte noire.

— Cavité volumineuse, hypostatique d'une manière générale, mais surtout du côté gauche. L'aorte est dilatée, les plèvres épaissies avec de petites adhérences, plaques jaunes, à droite un dépôt calculeux à la base adhérente à celle du côté opposé ce qui ne peut se relever qu'avec peine, d'où un léger relâchement de l'esprit.

Rien de particulier au niveau des autres organes, ni dans la cavité.

— Les poumons sont volumineux, la gauche recouvre la partie droite d'une hypostatique à la partie antéro-supérieure. Du côté droit adhérences pleurales anciennes et du côté gauche un peu d'engouement sur une épaisseur d'un à deux centimètres sur la partie inférieure du lobe supérieur.

— Le cœur est à la partie médiane. Légèrement hypertrophié surtout pour ventricule droit que du côté droit et même pour le membre supérieur droit il n'existait guère que sur peu de cadavre du côté de l'épaule.

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle 1re femme* N° 14

Nom Emmanuel Petit

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Réflexions. — L'état du malade à son entrée à l'hôpital, ainsi que les renseignements fournis par sa femme sur le début et la marche de la maladie semblaient favorables au diagnostic de paralysie générale : toutefois il nous restait beaucoup de doute à ce sujet, surtout en raison de l'hémiplégie complète et presque flasque du côté droit avec hémianesthésie notable, et aussi parce que le trouble de la parole était toujours le même : à peine si le malade prononçait quelques mots, il ne présentait jamais le tremblement de la lèvre inférieure qui est en quelque sorte caractéristique de la paralysie générale.

Nous pensions donc à une lésion en foyer de l'hémisphère gauche, mais sans pouvoir préciser davantage notre diagnostic. — Lorsque survinrent les accidents consécutifs à une hémorrhagie cérébrale en raison de la paralysie plus complète du côté droit avec réflexes notablement diminués, de phénomènes de sensations anormales du côté gauche, en même temps que la température s'élevait considérablement. — Ces derniers accidents — comme cause de paralysie du côté droit observés 3 semaines auparavant étaient évidemment dus à des hémorrhagies dans les anfractuosités de la pachyméningite : à la rigueur il faut rapporter tous les symptômes actuels, on peut croire-nous, explicables de la manière suivante les relations qui doivent exister entre les lésions et les symptômes :

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Il s'agissait d'un alcoolique qui fut d'abord atteint de pachyméningite de la convexité donnant lieu à des troubles de l'intelligence de la parole des phénomènes d'affaiblissement général sur le compte desquels il est impossible d'avoir de détails.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	C'est aux phénomènes d'irritation des centres nerveux produits par ces lésions à l'occasion d'un accroissement de mouvements ou de petites hémorrhagies, qu'il faut attribuer les vertiges apoplectiformes et ponctiformes auxquels il était sujet. — La paralysie du côté droit survenue trois semaines avant l'entrée du malade à l'hôpital ne paraît avoir été apportée qu'à la longue par l'examen de l'hémisphère cérébral gauche pour l'hématome qui existait du côté droit. Le début de cette paralysie n'a pas été remarqué par sa femme, soit qu'il ait été masqué par une de ses chutes habituelles, soit que la paralysie soit survenue progressivement. Cette paralysie était remarquable par son intensité par l'absence de contracture et d'exagération, par la double insensibilité qui l'accompagnait. Chez un homme dont la plupart des cas d'hémiplégie dépendaient principalement du ramollissement du membre supérieur et de la force de la face, la langue était aussi particulièrement atteinte. Enfin il y avait une incontinence de l'urine et des matières fécales, sans eschare au moment de l'entrée du malade à l'hôpital, on n'a rien noté pour le côté gauche ; mais il serait impossible de rien affirmer au sujet d'une hémiplégie gauche, nous sommes certain qu'il n'existait pas une contracture intense, comme elle que nous avons observée lors de derniers accidents. Cependant reconnaissant probablement pour cause l'hématome du côté droit qui était moins considérable que celui du côté gauche, il n'a pas pu produire une hémiplégie gauche et a simplement déterminé l'aggravation de tous les symptômes précédemment observés avec des phénomènes de contracture du côté droit, ainsi que du côté des parties supérieures de la face qui précédemment n'étaient pas paralysés. Enfin c'est pour cela aussi que les yeux étaient déviés du côté droit. On pourrait aussi poser l'hypothèse d'un hématome double plus volumineux à gauche depuis 3 semaines, et qui en devenant lui aussi encore augmenté, mais autre que le mode de production des symptômes s'accorderait mieux avec cette hypothèse, les caractères de coma y paraissent qu'elle n'est pas soutenable. En considérant que dans certains cas la pachyméningite produit de paralysie du même côté que la lésion, on pourrait être tenté qu'au moment de l'affection a commencé à prédominer à gauche il n'y eût pas eu de paralysie de ce côté ? Nous avons déjà remarqué dans d'autres circonstances que longue paralysie se produisait du même côté que la pachyméningite et l'hypothèse cette affection paraissait avoir pour existence ; ici il y avait pas eu pas d'hématome ; toutefois lorsque celui-ci devenait considérable il donnait lieu au développement de la compression d'une partie plus ou moins étendue d'un hémisphère cérébral et à une paralysie	

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Fournel Salle 4e Femmes Lit N° 39 F°

Prénoms Marie

Age 70

Profession

Né à

Demeurant à

Entré le 23 Août 84

Sorti le

Morte le 9 Sept 84.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Athérome artériel. Ramollissement de la partie moyenne postérieure et inférieure de l'hémisphère cérébral droit. Pachyméningite récente. Reins sains. Surcharge graisseuse des organes et du cœur. Petite végétation récente sur la mitrale. Infarctus suppuré du lobe inf. du poumon droit. Pleurésie dans région correspondante.

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Cette malade est amenée par une voisine qui donne sur elle les renseignements suivants :

Il y a un an, elle serait tombée dans la rue. Aurait eu une crise présentant les caractères d'une crise d'épilepsie : convulsions, morsures, puis stupeur. Elle croit qu'antérieurement elle n'avait jamais éprouvé de crises semblables.

Il y a 6 à 8 mois, dit toujours la voisine, elle serait tombée accidentellement. Elle n'était pas paralysée mais elle riait, pleurait à chaque instant, et semblait un peu avoir perdu la raison.

Il y a 3 jours, brusquement, elle est tombée et n'a plus pu marcher, actuellement il faut la soutenir pour la faire asseoir quelques pas ; elle mangeait encore, mais se donnait peu et parlait à chaque instant, comme on l'observe actuellement encore.

Si l'on examine les jambes et surtout on les trouve couvertes

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000.

Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

de nombreux ecchymoses, provenant de ce que le malade reste, à cause de son lit continuellement, et malgré lui toujours se lever et marcher, on constate notamment une large ecchymose, vineuse, au niveau de l'épine iliaque antérieure supérieure gauche, et une autre plus petite, au niveau de l'arcade crurale gauche.

Le genou gauche, est un peu déformé, il aurait été atteint d'une affection ancienne.

L'on ne trouve pas de rétractions tendineuses, ni de reflexes plantaires, la sensibilité paraît très diminuée. Il faut enfoncer une épingle profondément dans la plante du pied, pour la voir retirer son pied et se plaindre.

Si on la fait lever, on remarque qu'elle se tient mieux à droite qu'à gauche, la jambe gauche le membre inférieur gauche semble être plus raide que le membre correspondant.

La langue n'est pas déviée, on ne trouve rien d'anormal de ce côté de la face.

Le membre supérieur gauche, semble aussi être plus raide que l'inférieur droit, il offre plus de résistance à la flexion; mais en somme de chaque côté on a de la résistance à mouvoir le membre avec variation, suivant l'agitation du malade

l'on ne trouve rien à signaler du côté du poumon.

La malade, ne peut rester une minute tranquille, elle se lève sur son lit, parle, et se jette par terre, une fois tombée, elle demande qu'on la relève pour marcher, ~~toutes désirs~~

91 La malade se tient toujours dans le même état que la veille, mais elle est affaiblie. La langue est blanche et présente un enduit saburral épais. On trouve encore à la base un peu de diminution de la sonorité des 2 côtés mais cependant moins accentuée qu'hier, la respiration est de caractère un peu tympanique.

obscure de chaque côté mais dans le côté droit elle est un peu soufflée avec quelques râles muqueux. Au moment où la malade parle la voix est très manifestement altérée à droite, tandis qu'à gauche on constate de la diminution de vibration. Sonorité normale en avant des 2 côtés. Temp. 39°1. La malade se repose pendant quelques instants, on est obligé de lui faire des injections de morphine pour la calmer

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

9 Sept — La malade est toujours de plus en plus faible

4 Sept — La malade est toujours agitée, on remarque que le mouvement de rotation très violent existait dans les deux côtés gauche (c'est le phénomène dominant dans le reste depuis l'entrée de la malade) elle agite surtout les membres supérieurs particulièrement le membre droit, les mouvements du membre gauche sont bien à l'avant bras et à la main, on n'obtient presque pas de mouvements à la racine du membre, lorsqu'on soulève le bras gauche, il retombe immédiatement

on trouve toujours une résistance variable des différents mouvements communiqués

membre supérieur environ gauche

la malade est plus agitée

Vandrigue le membre supérieur droit peut être élevé plus ou moins longtemps

la vue est habituellement intacte à droite la face plutôt dirigée du côté Vandrigue le gauche, on plutôt dirigée à gauche, surtout l'œil gauche

les yeux oscillent entre le côté gauche et la partie médiane, cependant l'œil droit arrive à rapporter un peu à droite tandis que l'œil gauche reste à

gauche les paupières sont ordinairement demi-closes dans les moments d'agitation la malade répète toujours la même note ou même de syllabes incompréhensibles, l'agitation alterne avec des moments d'assoupissement qui sont plus longs que précédemment.

On ne trouve pas de paralysie manifeste au niveau de la face, bien que le côté droit semble soit plus accentué.

Les pupilles sont toujours dilatées pareillement

La déglutition même des liquides est très difficile, incontinence de l'urine et des matières fécales.

On trouve toujours de la matité à la base droite en arrière, poumons ne semblent pas être atteints

Sept — L'état de la malade est le même, rien de plus ni de moins, toujours la même opacité de l'épiderme des sens obturateur droit gauche, on il y a une petite tache de 1 à 2 cm de diamètre

7 Sept — La malade est dans la résolution complète avec respiration stertoreuse 40 par minute

Hyperesthésie de tout le côté droit, surtout des membres inférieurs, et du front.

La face est toujours inclinée du côté droit les paupières presque closes, les yeux dirigés à droite surtout l'œil droit les globes oculaires sont le siège de mouvements

les membres ne présentent pas la moindre rigidité

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Ce pigûre profonde et répétée de la paume des pieds s'accompagne par
produire un reflexe légère plus marqué à gauche qu'à droite, exagéré la
faculté du reflexe a épuisé et il faut piquer plus longtemps pour en
avoir un autre. Les pigûres des autres parties du corps, y compris la pigûre
de la face ne produisent aucun mouvement mais en passant la tête
de l'épingle entre la paupière on a un léger clignement de la paupière droite
qui fait complètement défaut à gauche. Les battements du cœur sont sourds
au nombre de 108, le 2e bruit est à peine perceptible. On ne perçoit pas
le battement de radial, mais on perçoit encore des battements
Les battements du cœur ne diminuent pas le moindre trace du bruit
de galop, la respiration est bruyante, l'expiration plus longue
avec soulèvement de l'épigastre, expiration bruyante prolongée
Au contact on change de la malade, qui elle remue de matière
fécale, et à un large selle. surtout la fesse gauche
½ heure après l'examen, le pouls revient graduellement à la partie meilleure
de pigûre, respiration, la mal... aurait

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Fournel Salle 4e femmes Lit No 39 Fo

Prénoms Marie

Age

Profession

Né à

Demeurant à

Entré le

Sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Autopsie du 10 Sept. 84

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

Les parois du crâne sont minces et friables.

La dure mère adhère en avant à la partie supérieure, cependant en arrière elle se détache assez facilement, en ouvrant la dure mère il s'écoule une assez grande quantité de liquide séreux.

On trouve sur la face interne de la dure mère du côté droit, des petites taches rouges irrégulières, disséminées surtout dans la partie supérieure près de la faux, et au niveau même de la faux il existe en effet à ce niveau des néo-membranes très vieilles contenant un peu de sang extravasé formant de petites taches et même de petits caillots de la grosseur d'une tête d'épingle. Cette pachyméningite paraît très ancienne.

On trouve aussi une pachyméningite à grande surface partie hémorragique mais d'un très léger degré, elle est constituée par de légères néo-membranes transparentes dans lesquelles se trouve aussi un petit point de démarcation. Ces lésions sont toutes à fait peu marquées. D'autre part les méninges sont épaissies, d'aspect lactescent et infiltrées de sérosité.

Les circonvolutions de la base présentent des taches jaunes résultat d'atrophie

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

épaississement des parois. ces lésions sont surtout marquées sur la sylvienne, elles sont moins marquées sur la basilaire et la cérébrale postérieure.

On remarque aussi de l'épaississement des méninges de la base qui rendent adhérents les organes, et qui rendent difficile la séparation de la scissure de Sylvius et des lobes frontaux.

Hémisphère droit. L'artère sylvienne gauche présentant plusieurs points athéromateux on explique qu'un coagulum vient, les méninges s'enflamment facilement.

On découvre un foyer de ramollissement au niveau de la partie basilaire postérieure de la scissure de Sylvius au niveau du pied des circonvolutions qui forment le fond de cette scissure. c'est à dire de la 1re circon. Sylvienne et des lobules pariétal inférieur et de la temporale ascendante, mais ces circonvolutions ne sont pas les plus profondes. superficiellement elles paraissent saines.

On trouve d'autre part un ramollissement au niveau de la partie postérieure du lobule paracentral et sur sa moitié postérieure, l'altération descend à ce niveau jusque sur la circonvolution du corps calleux, et dans le sillon calloso-marginal.

Sur la coupe pariétale on trouve le ramollissement du lobule paracentral et on constate qu'il envahit la substance blanche, correspondante.

Sur la coupe pédiculo-pariétale on voit que le ramollissement de la scissure de Sylvius se continue le ramollissement pariétal, et que toute la substance blanche intermédiaire est atteinte. Quoique les lobules pariétaux ne soient pas atteints ils paraissent atrophiés en raison des lésions dont ils sont le siège. Le foyer principal de ramollissement jaune se trouve dans le fond de la scissure au niveau du pied de la couronne rayonnante à ce niveau on a une cavité à parois jaunes, de telle sorte que le pied de la couronne rayonnante est entouré par ce ramollissement qui continue jusqu'à la partie interne de l'hémisphère.

Ces lésions s'étendent en arrière au niveau de la coupe précédente.

Hémisphère gauche. On trouve que les artères sont athéromateuses, les méninges épaissies, on constate aussi un ramollissement ancien au niveau de la face interne et du bord supérieur du lobe occipital, les lésions présentant leur maximum d'intensité dans le sillon perpendiculaire interne qui est considérablement élargi et déprimé par les circonvolutions qui circonscrivent ce sillon.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

Feuille 3

Sur la coupe frontale on trouve un foyer de ramollissement gélatineux de la substance blanche, occupant le fond de la circonvolution bien entendu la substance grise de sorte que tout d'abord on ne pouvait diagnostiquer ce foyer.

Sur la coupe précédente on trouve déjà à l'état rudimentaire du ramollissement de la substance blanche, le ramollissement se continue en arrière à ce niveau jusqu'à l'extrémité du lobe occipital.

Les gros artères ouvertes sur les 2 hémisphères ne présentent aucune altération.

Rien du côté des cervelet, ni du côté de l'isthme de l'Encéphale

Droit 90 Reins
R. Gauche 90

Rate

Foie.

Utérus.

Reins peu volumineux, un peu congestionnés. Ils entrent la capsule, la substance corticale est amincie, rétractée vers la coupe, sur l'un des reins. Il y a un petit foyer
Elle est diminuée de volume. Poids 70 gr.

Poids 920 gr.

Est atrophié, on trouve du liquide dans la cavité du corps.

Coeur

P. 320 gr.

On trouve de la surcharge graisseuse du péricarde, et du cœur, qui est élargi, flasque, une tache laiteuse sur le ventricule droit, et une autre plus petite sur le ventricule gauche au dessus de la pointe.

Les cavités du cœur sont plutôt agrandies et l'épaisseur des parois est peu marquée : Tous les orifices sont suffisants : seulement les valvules mitrale et aortique sont épaissies, encroûtées, et on trouve au dessus de la partie médiane du bord de la valve interne de la mitrale une végétation du volume d'un petit haricot d'aspect muriforme, qui est assez solidement implantée. Aucun caillot ancien dans les oreillettes, ni dans les ventricules.

Poumons

La surface externe de l'aorte est jaune et présente qq plaques jaunes non ulcérées.

Du côté droit on trouve du sérosité à la base un peu de liquide et une adhérence de la base avec le diaphragme au moyen d'exsudats épais et récents. On trouve la partie supérieure du lobe inférieur au niveau de la surface inter lobaire une surface grisâtre déprimée, qui correspond à un foyer purulent au centre duquel on trouve encore un débris de veine pulmonaire adhérent à la plèvre ; ce foyer était mou et nettement limité ; sur la partie correspondante de la surface inter lobaire du lobe moyen on trouve aussi

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

une surface grise correspondant à un foyer de même nature, mais moins étendu. La partie inférieure et postérieure du lobe inférieur est tout à fait atélectasiée et est couverte d'excavations filiformes infiltrées d'un peu de sang sur certains points. Ces anfractuosités correspondent à ce lobe contiennent des caillots cruoriques qui se continuent avec les 2 branches de l'artère pulmonaire.

Concrétion calcaire du volume d'une aveline à la base du lobe supérieur droit. Plèvre un peu épaissie au sommet superficiellement.

Du côté droit, on a une petite cicatrice au sommet, et un peu d'atélectasie de la partie postérieure du lobe inférieur. Le lobe supérieur des 2 côtés est emphysémateux, muqueux purulentes épaisses dans les bronches.

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

Nom Napoly Salle 1e Jeanne Lit N° 21 F°

Prénoms Henri

Age 49 ans.

Profession comptable

Né à Pommiers (Rhône).

Demeurant à la Tour du Pin

Entré le 4 Décemb 84

Sorti le 18 Novemb 85 (Longchêne).

Rentré le 23 aout 86.

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Paralysie générale

Mort à la suite de pachyméningite hémorragique.

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

de poitrine.

Père mort à 83 ans après une maladie très longue ; il buvait beaucoup

Dans les derniers mois de sa vie il éprouva des troubles de la parole, sans que cela l'empêchât complètement de se faire comprendre — Un oncle du malade aurait eu une maladie semblable — Mère vit encore —

Bonne santé habituelle ; constitution robuste — A fait campagne de 14 ans en Algérie comme soldat, n'y a contracté aucune maladie — Accès alcooliques qui ont cessé depuis 10 ans environ —

Depuis 20 ans le malade éprouve des fourmillements dans les membres inférieurs, accompagnés fréquemment de secousses musculaires sans tremblements, le malade restait bien droit quand il marchait —

En avril 83 après une vive émotion le malade éprouva pendant 1/4 heure environ, sans perte de connaissance, des mouvements désordonnés, involontaires, très étendus dans le membre supérieur droit ; le même jour 24 heures après les personnes de son entourage remarquèrent un certain bégayement, un certain hésitation de la parole non

faunts bien portants.

mort à 7 semaines

de choléra.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

suivi de tremblement des lèvres et de la langue avec intégrité absolue de l'intelligence. — Ces symptômes furent les seuls que le malade présenta pendant plus d'un an, à partir de cette époque, l'embarras de la parole devint plus accusé et actuellement il se présente dans l'état suivant :

L'état général est très bon — Les fonctions digestives s'accomplissent bien. Rien au cœur ni aux poumons —

Les membres du côté droit ne sont pas atrophiés — Le membre supérieur présente un tremblement plus prononcé le matin que le soir ; ce tremblement n'augmente pas pendant les mouvements volontaires — aucun muscle ne paraît paralysé, aucune contracture. — A l'état de repos complet on voit, ou voit surtout dans la main des mouvements fibrillaires — Pas d'ataxie — Pas de trouble de la sensibilité — Quand on prend la main on sent une série de contractions rapides des muscles — Le malade serre mais bien de ce côté que du côté gauche, il a toujours été droitier. Du côté du membre supérieur on constate un certain degré de faiblesse et le matin seulement le même tremblement que siège au membre supérieur — Abolition complète du reflexe rotulien —

Quand le malade veut parler il ouvre la bouche ; il y a un tremblement des lèvres et il prononce lentement les mots, d'une voix faible en détachant chaque syllabe — A l'état de repos les lèvres ne paraissent pas tremblotter ni être contractées ne paraît pas paralysée la langue est agitée de légères contractions — Il existe un certain degré d'anesthésie du voile du palais ; après piqûre ; quand on excite directement ces organes, il se contractent mais assez faiblement.

Depuis quelque temps le malade dit avoir perdu la mémoire — Son écriture est à peu près illisible, il n'y a pas cependant de traces de mouvements désordonnés, les lettres sont formées de lignes tracées à petite amplitude.

Rien du côté de la vue.

Il y a 2 mois le malade a eu un éblouissement, un vertige prolongé.

a l'état de repos, la commissure droite est tirée et tous les temps entre temps, irrégulièrement par les contractions des muscles qui s'y insèrent.

L'aile nasale droite est un peu moins accusée que l'autre.

SCD Lyon 1

Nom Salle Ste Jeanne Lit N° 2. F°

Changement de caractère, devenu irascible, s'impatientait pour un rien. Depuis le début des autres accidents.
Ne travaille plus depuis 6 mois —
Quand on dit au malade de frapper un nombre déterminé de fois dans la main, il se trompe — Rien aux pupilles —
Le malade n'aurait pas eu de rapports sexuels depuis 2 ans, les désirs sexuels depuis cet temps, il n'aurait pas eu d'érection.

6 — Cette nuit le malade s'est levé en proie à l'envie d'étrangler ses voisins — ce matin localisation est exacte

15 — Les mouvements s'effectuent presque complètement dans le membre supérieur à l'état de repos on relâche
Pas d'inégalité pupillaire —

22 — Ecriture du malade : [illegible]
Quand on ne le regarde pas, il écrit plus lisiblement

19 Janvier — Hier 2 fois, en mangeant de la soupe, le malade a été pris de suffocation, les légères ont été fortes et répétées

21 — Ce matin nouvel accès de suffocation en mangeant de la viande

10 Février — Le malade a eu ce matin une crise qui a fait cette fois une sorte de vomissement en avant la gorge remonte entièrement. Le malade tousse toujours un peu depuis quelques jours

12 Février — Retour des mêmes accidents que précédemment

21 — Une crise de suffocation cette nuit.

26 id. — Le malade a pris cette nuit une crise dans l'espace de cinq minutes environ

27 Février — Le malade cette fois cyanosé. La nuit dernière est à peu près semblable aux crises de suffocation

6 Mars — Cette nuit a eu lieu une nouvelle crise, elle a duré toujours la même durée un quart d'heure environ pendant lequel il était suffoqué. Il ne peut pas commencer mais après la crise il est complètement

14 Mars — Il [illegible] crise cyanotique avec effet de commissure à 5 minutes

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, Intercalaires. — 11.82. — 10.000. Impr. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F°

14 Mai	Cette nuit à la nuit précédente – rien par. le malade n'est venu s'en apercevoir.
23 Sept.	Le Malade a dormi sur son lit de selle continuelle composée de plaques de sang. Il va dans son lit – Il fait beaucoup de mouvements. Ventre douloureux
2 Oct.	Ventre de ballonné abdominale – Langue humide Anorexie complète
24 S.	Les selles contiennent de matières sont moins fr
29 S.	Etat stationnaire – Selles involontaires – Le Mal fréquente beaucoup plus
29 S.	Les selles contiennent des matières – Il pourtant selles involontaires persistent – L'affaiblissement général augmente – Le Malade ne peut plus se te debout
2 Oct.	Les selles sont meilleures toutefois encore involon grd affaiblissement – Anorexie complète – Langue saburrale
1 Oct.	Le Malade ne va pas sous lui depuis 2 jours – Il commence à s'alimenter

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

ne marche pas

4 Mars 1885

Réveillé subitement à 10 ½
j'ai été pris par une crise
j'étouffais et avais beaucoup
de peine à avoir mon souffle, cela
a duré 20 m^n^ après j'ai pris
un tremblement dans les mains
mains, les dents me claquaient

SCD Lyon 1

Monsieur Crépier

vous m'avez demandé, vous
exer le début de ma
aladie

25 août 83 - Je produisit
les signes de l'embarras de
parole j'avais eu une crise
veuse. Je consultais le doct
r Clavel, de Eatours du pin,
y habitais, faisant la com
tabilité de M" Jules Bourgade
de papiers. Je rentrais le
x 1er 83 chez M" Chevenon
f" de papiers a St victor de
eux Jane comme comptable
ais bien, mais parlais
difficilement j'suis resté

jusqu'à son dernier suicide
après l'avoir soigné, j'ai
pris une crise, et j'ai
tombé perdant, je suis
une heure et demie, je
revenu habiter à la Tour
où ma femme fait la
soupe.

Voici les Docteurs que
consulté

Mr Chavel à la Tour
Mr Gauthier de Villefranche
dont j'ai joint la consultation
Puis Mr Dage à la Tour
c'est lui qui après 2 mois
de traitement m'a engagé
venir à l'hopital.

SCD Lyon 1

pendant mon séjour chez
Thevenon que ma mâchoir
réellement le fond de progrès
tremblé se manifesta dans
face et la machoire, depuis
catastrophe de Thevenon
cela s'est toujours graduellement
nuire

Voirge Dewore)

Morgat

suis constipé.
la respiration nasal
ne se fait pas

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

ria fermer vient
urdi elle vous
donnera les
explications

à la main gauche. Le
29 Janvier 85

SCD Lyon 1

Lyon le 25 juillet 85

Monsieur Crozier

ou bien souffert de mes
oulaires, deux doux
ombos, depuis les huit
ubiquaux traumates.
ommez moi une fracture
ne dois nous quitter
Notre bien respectueux

SCD Lyon 1

L 31 Janvier 85



(mains froides).

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

préjudice père et fils Fauve et Cesnel
liers, une certaine quantité de
numéraire et de provisions de bouche
vec les circonstances aggravantes
'escalade et d'effraction.

Le jury rapporte un verdict affir
matif admettant de circonstances
tténuantes.

Ambon est condamné à 5 ans
e réclusion, Cavalla et Bossa
10 ans de réclusion.

Crime suivi de suicide

Paris, 3 9bre, 7 h. 1/2 soir. Un crime af
reux vient de plonger dans le deuil
ne famille très connue et très estimée
ans le notariat parisien.

- M. Alfred de la Paluelle, ancien
notaire, ancien président de la chambre
es notaires, se trouvait à table hier
oir, à huit heures, entouré de sa
lle et de plusieurs personnes de sa
amille. Quand un de ses domestiques
ntoine Souvestre, entrant brusquement
ans la salle à manger, traça sur
a serviette sur lui, fit feu et sortit aussitôt.

SCD Lyon 1

Atteint à la poitrine et grièvement blessé, M^r de la Palme eut néanmoins la force de se lever et de faire feu lui-même sur son fils.

A ce moment, Antoine Fouilliot, rentrant par une autre porte, fit feu une seconde fois sur sa victime.

M^r de la Palme, gravement blessé à la cuisse s'affaissa alors, et rendit bientôt après le dernier soupir dans les bras de ses parents et de ses amis.

Le meurtrier, poursuivi par quelques personnes courageuses tira encore un coup de revolver sur un de ses camarades, nommé Pouloux, qui tentait de le désarmer, et le blessa légèrement.

Enfin, arrivé dans le jardin, il se fit justice en se faisant sauter la cervelle.

Voir mon exemplaire au 3 G. 84

SCD Lyon 1

Salle Lit N° F°

84

20 Avril. Le malade est un peu abattu ce matin – T.R.M. 34,5 – rien dans les poumons –

Du Avril. Pendant toute la journée d'hier il a été tranquille, n'a rien dit de particulier à ce qui se passait autour de lui. Ce matin, il a eu un moment de délire, puis est bientôt revenu au même état. Rien remarquable dans l'état ou mouvement de la tête.

Le ventre est très distendu, il urine par regorgement –

22 Avril. Le malade n'a pas uriné aujourd'hui depuis hier – la figure est immobile, les yeux entr'ouverts – Sous le sternum battement de la tête du côté droit.

Les yeux tout peu mobiles, restent à peu près à la partie médiane – Les pupilles moyennement et également dilatées.

Bouche entr'ouverte, langue sèche recouverte d'un enduit noirâtre – Mucosités dans toute la bouche –

Si le malade tousse, il rejette par la bouche les liens, les yeux, avec de l'enduit noirâtre en même temps –

Les membres thor. et inf. sont flasques et restent aux mouvements communiqués tantôt à droite, tantôt à gauche. Les mouvements sont lents et peu étendus. Le ventre, sans doute la pression des excréments fécaloïdes durcis tendent du côté droit

T.R.M. 40,4. P. 112. R. 36.

La respiration est très obscure dans les parties inférieures surtout en arrière et à droite où l'on a aussi un peu de diminution de la sonorité.

Rien au cœur.

Déglutition difficile provoquant la toux.

Pas de selles ni d'urine depuis hier. Le ventre paraît cependant peu distendu.

Pas de vomissements ni d'hoquets –

La nuit dernière, transpiration abondante.

23 Avril. T.R.M. 40,9. – P. 140 – R. 40

Ce matin le malade est beaucoup plus affaissé – Les membres tremblent en flexion et rotation de la tête à droite.

Les yeux ne bougent pas – Les pupilles sont beaucoup moins dilatées qu'hier et la peau est presque constamment le siège de contractions fibrillaires qui par moments se généralisent et s'accompagnent beaucoup.

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

L'état général ne paraît pas sensiblement modifié à la suite de l'examen et ce qui est arrivé ce matin pendant cinq longtemps au lit de la douleur.
La langue est habituellement saburrale et les mouvements vibratoires de la langue persistent. Muqueuses rouges, sèches. La main et l'avant bras droits sont animés de tremblements fibrillaires ascendants, et les excursions des mouvements de flexion et d'extension s'accomplissent plus rapidement des muscles qui président au tremblement.
Le membre droit est le siège aux mouvements communiqués un peu de raideur musculaire, notamment au membre inférieur droit quand on veut l'étendre.
Pas de réflexes rotuliens. Pas de trépidations plantaires. Les réflexes cutanés sont également diminués.
Les membres gauches ne paraissent pas participer aux mouvements, surtout le membre inférieur est le siège d'une raideur d'une certaine fixité quand on veut imprimer des mouvements.
Les réflexes cutanés sont peu marqués également à droite, mais les réflexes tendineux sont également très faibles.
Les respirations ne sont pas d'amplitude et on entend encore à gauche, à la base droite en arrière, obscurité très grande avec matité dans la moitié inférieure.
Déglutition toujours difficile.
Il n'a pas rejeté complètement depuis hier.
La contraction de la face est moins prononcée. Pas de rougeur et peu d'hémi.
Rétention de l'urine et de matières fécales.

SCD Lyon 1

m Napoly henri Salle ~~6 me femmes~~ Ste Jeanne Lit N° 21 F°

7 Avril Autopsie.

A l'ouverture de la boîte crânienne, on voit de la fluctuation sous-méningée. On trouve de chaque côté une variété temporale. Les environ 150 gr. à 200 gr. de liquide hémorragique.

La faux est soutenue d'une ~~pseudo-membrane~~ cavité limitée par 2 feuillets pseudo-membraneux, dont l'un est appliqué d'ordinaire à la face interne de la dure-mère, l'autre sur l'hémisphère ~~correspondant de la faux~~

Ce dernier, quoique mince est plus épais que le 1er. Sur la face sur la face, bien homogène et quoique parcourue de fins vaisseaux, est de formation récente; il ne présente en effet aucun foyer ancien de coloration sereuse.

Les vaisseaux sanguins sont plus ou moins épais.

Le feuillet pseudo-membraneux qui tapisse la face interne de la dure-mère est aussi épais.

Les méninges sont épaissies et plus denses que normalement. Les organes de la base, sont atteints par les méninges qui les recouvrent - Les artères sont saines.

Les circonvolutions pariétales, mais surtout frontales sont considérablement aplaties à gauche.

Au niveau de la corne frontale, la méninge ~~gauche~~ est épaissie, adhérente à la dure-mère.

D'autre part en se rapprochant de la région, on détache de la matière cérébrale plus ou moins difficilement surtout à l'abdominité ant.re des 1ères frontales - Le pied de la 3e frontale également sous l'action de la gravité, mais très-limitée.

De même sur le lobe sphénoïdal et en particulier sur les 1ères temporales (lésions très-limitées).

Adhérente, mêmes lésions, mais plus légères et plus délimitées,

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

mais toujours avec un rentrement au niveau de l'é
antérieure des frontaux et surtout à leur face ex
l'angle très net de la voûte crânienne.

Ordinairement bombée, on entrevoit un peu de la bosse
pariétale, mais les dépressions sont moins profondes qu'à
Sur cet hémisphère, comme à gauche, les vaisseaux
un peu épaissis, et partout peu adhérents à l'os
à détacher qu'à l'ordinaire.

Rien aux coupes de Pitres.

Rien au cervelet. Rien d'apparent au bulbe et à la
protubérance.

Poumons. Adhérents, engouement de peu de développement
mais pas d'augmentation sensible de volume.

Les 2 côtés du cœur sont un peu dans la même
coupe — Il dans le siège de Gruche. Poumons, id. Rien
points pendus. Vaisseaux sont très pleins. La base du cœur
supérieure commence à se pendre un peu, on y trouve
les coagulums ordinaires.

Au sommet, sur une hauteur de 2 travers de doigt, on
un assez grand nombre de tubercules de consistance fibreuse
avec quelques points caséeux entourés ou non d'une coque fibreuse
La Coupe du poumon gauche présente des traces de
chapelonnage commençante avec les mêmes caractères
droite.

Poids. Rein = 110
110.
Rate = 100
Foie = 1190
Cœur = 300
Rien de particulier.

Pas d'altération de l'aorte.

SCD Lyon 1

…ère générale —
…nue 25 jours qui ont précédé la mort —

Modèle N° 61.

Nom Napoly. 1re Journée 21

Resp.	Pouls	Chaleur R. C.	20	21	22	23
95	210	34,0 42,5	Avril 86			Mardi
90	200	33,6 42,0				
	190	33,2 41,5				
80	180	32,8 41,0				
	170	32,4 40,5				
70	160	32,0 40,0				
	150	31,6 39,5				
60	140	31,2 39,0				
	130	30,8 38,5				
50	120	30,4 38,0				
	110	30,0 37,5				
40	100	29,6 37,0				
	90	29,2 36,5				
30	80	28,8 36,0				
	70	28,4 35,5				
20	60	28,0 35,0				
	50	27,6 34,5				
10	40	27,2 34,0				
	30	35,5				

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

HOSPICES CIVILS DE LYON

HOTEL-DIEU

m Cerreguette Salle 2e femmes Lit N° 10 F°

énoms Augustine

ge 56 ans

ofession journalière

é à Pura (Isère)

meurant à

ntré le 25 Janvier 84

rti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Tumeur de la base d'abord il y a 9 ans

Etat cachectique, troubles digestifs

Généralisation probable du côté de la colonne vertébrale (région lombaire)

Hémorrhagie sous arachnoïdienne

Chef du Service, M.

OBSERVATION CLINIQUE

Élève interne, M.

La malade est entrée le 25 Janvier 84 — Mais son observation ayant été égarée, on la reprend à la date du 13 Mai

La malade parle fort mal le Français. Elle est célibataire et n'a jamais eu d'enfants. Elle serait malade depuis 2 ans environ. Elle serait malade depuis le mois de septembre 83. Elle se serait mise à dépérir, à perdre ses forces et l'appétit. Auparavant elle jouissait d'une bonne santé; il y a 9 ans, on l'opéra à St Paul d'une tumeur grosse comme une noix, saignant facilement, qui serait débuté deux ou trois ans auparavant.

Quand elle entra aux 4e femmes, en janvier 84, elle se plaignait de faiblesse, d'anorexie, et de douleurs dans le dos, au niveau des dernières lombaires et du sacrum et dans la cuisse droite. Elle avait déjà eu de l'œdème aux jambes, et plusieurs ponctions

H. H. — S. G. — Feuilles d'Observations, A. — 11-82. — 10.000. Imprc. Alf. Louis Perrin.

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

Actuellement, ce qui frappe le plus la malade
c'est cette douleur lombaire et crurale droite, qui
rend la marche très difficile. La pression des trois
derniers lombaires, ainsi que du triceps crural et
des muscles du mollet à droite est très douloureuse.
Cette douleur est assez vive pour l'empêcher de
dormir. — La sensibilité superficielle et la sensibilité profonde sont conservées dans
les membres inférieurs.
Elle mange peu, mais ne vomit jamais. — Un peu de diarrhée.
L'aspect est cachectique, la teinte jaune paille.
Les malléoles œdématiées.
Pas de dilatation de l'estomac.
Le foie est volumineux; il déborde les fausses côtes
, dépasse l'ombilic de trois travers de doigt, et on sent
son bord tranchant normal, à 3 travers de doigt
au dessus de l'arcade crurale. On ne sent pas de
tumeurs. La rate est douloureuse à la pression
et est mobile.
— Le toucher vaginal est négatif.
Rien au cœur.
Rien aux poumons.

SCD Lyon 1

Salle Lit N° F°

Hier soir, à la contre visite, la malade est immobile, les yeux ouverts, dépressés, et on ne peut lui arracher que deux ou trois mots.

Cet état n'a fait que s'accentuer, et ce matin on la trouve dans l'état suivant :

Elle est à peu près immobile dans son lit ; toutefois on remarque des mouvements des paupières, des yeux, et des mouvements automatiques des membres gauches.

La face est le plus souvent immobile, la paupière droite un peu plus abaissée que la gauche ; le pli du sourcil droit est également un peu abaissé, tandis que la partie correspondante du sourcil gauche est plutôt élevée, avec des plis qui la surmontent. La commissure droite est abaissée un peu effilée ; on ne peut pas juger de l'état en la comparant avec la gauche, en raison de l'immobilité.

Lorsqu'on fait tirer la malade sur la ligne médiane, il se produit des mouvements des deux côtés de la face, mais plus accentués à gauche qu'à droite.

Les globes oculaires oscillent de la partie médiane à gauche et sont rarement ramenés à droite, sauf peut-être lorsqu'elle est dans le repos absolu. Lorsqu'on l'excite, on voit les yeux se porter plutôt à gauche.

Elle est incapable de lui faire tirer la langue, ni de lui arracher un mot ni un signe ; elle a pourtant compris ce qu'on lui a dit, et ne profère aucune parole spontanément.

La tête n'est pas déviée.

Le membre supérieur droit est immobile le long du corps ; lorsqu'on le soulève, il retombe lentement, fondamentalement il n'est le siège d'aucun mouvement spontané, tandis que le membre supérieur gauche saute en écartant dans cette position, et que le malade exécute des mouvements spontanés de la main : enfin

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° 28 F° _____

12 Mars — Sas d'allemine

18 Mai — Hier soir, la malade s'est trouvée mal subitement
à peu près comme hier soir. Revenue à elle elle
s'est mise à vomir abondamment, et a eu de la
diarrhée. Elle a conservé de la céphalalgie et de l'ascalbe

19 — La malade a mieux vu des vomissements alimentaires,
elle est tout endormie. Le ventre est souple
sans douleurs. La malade se plaint vivement
de la tête, région frontale et sincipitale

20 — Hier soir 38.2 Pouls, céphalalgie
On cherche vainement au cou des ganglions,
rapport avec son ancienne tumeur de la bouche : à gauche
traces, à gauche deux ganglions comme des pois,
sur la partie latérale du cou

21 — Pas de vomissements. Pas de rapports. Mais toujours vive
céphalalgie frontale. Elle prétend que de l'œil gauche elle
voit les objets à travers un brouillard. Mais elle compte
bien les doigts qu'on lui présente.
La malade trouve qu'elle souffre moins des reins
depuis qu'elle souffre de la tête.

22 — La malade a eu une bonne nuit, et a
mangé

23 — Céphalalgie, sans avoir eu de nouveaux
vertiges. Elle marche, et va seule aux cabinets.
Elle ne boit que du lait, et vomit tout le
reste

25 — Hier soir matin, la malade ne pressentait d'autre
trouble que la céphalalgie endiguée frontale, mais en
travaillant de la mâchoire et de la matinée, elle avait
allez seule aux cabinets. Tantôt on avait remarqué
que elle avait de la tendance à la somnolence
depuis deux jours. Mais aussitôt éveillée elle répond
bien bien à toutes les questions

SCD Lyon 1

quand on lui pique le visage, elle y porte la main gauche
jamais la droite — Les deux membres supér. présentent de la résistance aux mouvements
communiqués au niveau du coude dans les deux sens, c'est plus marqué à gauche —
Le membre inférieur gauche est le plus souvent fléchi, tandis que
le droit est étendu — Le dernier n'est le siège d'aucun
mouvement spontané, tandis que le gauche présente des mouvements
automatiques, surtout le mouvement de flexion lorsqu'on l'a
étendu
Les mouvements communiqués aux membres inférieurs ne rencontrent pas
de résistance notable, sauf un peu à gauche du côté de la
flexion — Aucune trace de reflexe tendineux, plantaire, patellaire,
aucune trépidation —
La sensibilité générale est très altérée; le piqûre les plus vives
ne déterminent aucune plainte, mais provoquent des mouvements
au niveau des parties piquées, plus accentués à gauche,
et même des mouvements à gauche lorsqu'on pique fortement
le côté droit — Les mouvements provoqués sont peu accentués sur
la face, sur le membre supérieur et sur le tronc — Ils sont plus
nets au niveau du pied lorsqu'on pique la région
plantaire; les mouvements ainsi provoqués sont brusques
rapides, et cessent rapidement à droite, tandis que les mouvements
provoqués à gauche s'accompagnent d'une contracture
musculaire ± prolongée
Les battements du cœur sont réguliers (80), sans signes
d'hypertrophie. Persistance du bruit de souffle systolique
perçu sur toute la région précordiale, avec maximum
d'intensité dans le 3e espace intercostal gauche près du
sternum, ne se propageant pas dans les vaisseaux du cou
ni dans l'aisselle — Pouls veineux sensible dans
les deux jugulaires, internes restant à droite, et restant dans
la jugulaire externe droite; il manque dans la jugulaire

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

extrémité gauche, qui est légèrement tuméfiée
— Le remplissage de la veine se fait de bas en haut;
précède le systole, cardiaque, et présente un maximum d'impulsion
au niveau de cette systole — Elle est suivi d'un collabement
rapide de la colonne sanguine, qui reparaît ensuite
En comprimant sur la veine en haut ou en bas, on a le phénomène
habituel —

La respiration est calme (24)

Evacuation abondante de matières fécales et d'urine dans
la matinée

Pas de vomissements depuis hier

La veine paraît plus développée, mais le ventre paraît ballonné
et on y voit nettement quelques anses intestinales qui font saillie à la partie inférieure de l'abdomen

La peau a une teinte jaunâtre

§ ½ du soir — Le malade est encore plus abattue, elle est dans somnolence, paisible, d'où elle sort sans l'influence de excitations que pour lever lentement les paupières au moment, puis le regarder
Pouls et respiration comme ce matin

Le bras droit paraît être plus paralysé, et retombe absolument inerte
La jambe droite est toujours étendue, immobile
Si la paresse a augmenté à droite, l'élément contracture a augmenté à gauche — La joue du sourcil gauche est plus relevée, la commissure gauche de la bouche est tirée à gauche, et le sillon nasolabial très accentué, tandis qu'il est effacé à droite — Le bras offre plus de résistance aux mouvements qu'on lui imprime

Rétention d'urine (une cuillerée ½) Sa. d'albumine
L'état général est plus affaissé. Quand on fait la face de la malade sur la ligne médiane, elle n'y reste plus le bras gauche comme ce matin

SCD Lyon 1

Salle _____ Lit N° _____ F° _____

27 Le malade est toujours dans le coma ; selles et sondes
Rien, point ce matin — Il faut toujours sonder le malade
Pouls 116 — Resp. 44 —
Q. q. mouvements automatiques dans le bras gauche
Elle n'avale toujours pas
Pas d'albumine dans l'urine

28 Toujours dans le coma — Un peu de diarrhée — Le
malade n'urine pas — Le malade a toujours la tête
tournée vers le côté droit ; les yeux se dévient aussi un peu à droite
A la base droite, matité avec souffle et gros râles métalliques —
Les traits sont tirés — Mêmes mouvements automatiques
Du côté gauche, mêmes paralysies — Mais l'affaissement
général et l'affaiblissement de la sensibilité sont
augmentés — La face est encore plus déviée à
droite —
Depuis hier, on remarque un peu de tremblement dans
membre supérieur gauche —

29 Morte hier soir, avec une raideur de la nuque, empêchant
les mouvements de flexion et d'extension

Autopsie — Après avoir enlevé le crâne, on observe sur la dure-mère de chaque côté à 1 cm 1/2 de la ligne médiane de petites saillies d'une tête d'épingle à celle d'un pois blanchâtres, molles, vascularisées. Ces petites tumeurs agglomérées ressemblent aux granulations de Lanugo, sont encore plus volumineuses et plus molles — Elles sont à la face interne de la dure-mère et dirigent directement vers la base du crâne. La dure-mère en adhérent avec facilité aux parties sous-jacentes au niveau de ces petites tumeurs ; elles n'ont pas de granulations de Lanugo. Le crâne présente de dépressions au niveau des tumeurs.

Impr. Alf. Louis Poerin

SCD Lyon 1

Nom _____ Salle _____ Lit N° _____ F° _____

26 Le malade est à peu près dans le même état, sauf que les phénomènes paralytiques à droite sont plus accusés — Le bras droit et la jambe droite retombent absolument inertes, et la ½ droite de la face ne se contracte pas sous l'influence des grimaces. Sur les réflexes et la sensibilité des yeux, rien de changé, sauf que la sensibilité générale est encore plus altérée.

Le malade est allé du ventre, mais n'a pas uriné — La vessie ne paraît pas contenir d'urine. Quand on la fait vider, le liquide sort en partie par la sonde, et n'amène pas, il y a pas ensuite de déglutition suivis de quintes de toux violentes.

Après ces phénomènes d'excitation on voit nettement la contraction de la moitié gauche de la face qui contraste avec l'immobilité de la moitié droite. En même temps les yeux se tournent à gauche, tandis que la tête, au repos, l'œil gauche est médian, et le droit légèrement dévié à droite.

La tête est inclinée et la face est dévisée à droite.

Les membres supérieurs du côté droit ne présentent plus de mouvements communiqués, tandis qu'à gauche il persiste toujours. Quant aux membres inférieurs, le droit ne remue pas du tout, le gauche presque pas.

Pouls 100 — Respiration 28

Immédiatement après, il faut de nouveau vider la vessie pour le tirer de sa torpeur; et pendant ce temps, les pupilles étant habituellement dilatées, la pupille droite se rétrécit encore moins bien qu'à l'état normal sous l'influence des excitations.

Aucune parole, aucun cri

SCD Lyon 1

Salle Lit N° F°

Après avoir enlevé la dure-mère on constate sur la face externe de l'hémisphère droit un épanchement sanguin qui existe aussi épanché dans les 2 hémisphères, mais plus marqué autour [illegible] en certains endroits sans localisation spéciale —

La même altération se retrouve sur le cervelet plus marquée à droite —

Sur l'hémisphère gauche on trouve un épanchement plus abondant — Celui-ci est très abondant au niveau de la face externe du lobe frontal gauche. A ce niveau il y a un caillot de la grosseur d'une amande — intimement adhérent aux 2 frontales ant., surtout à celle du côté droit — adhérence d'autre part à la substance cérébrale dans la portion correspondante à ce niveau sans perte d'imbibition ni de ramollissement de la substance cérébrale —

Aucune autre lésion de l'encéphale —

Rien de particulier du côté des reins et des uretères —

Le cœur est très friable présente à sa partie latérale au niveau de la 5e côte gauche une tumeur molle, diffluente, blanchâtre — dans la coupe des corps vertébraux on remarque que cette même vertèbre offre à son centre une tumeur semblable, en partie ramollie — des lamelles osseuses persistantes sont très friables

La moelle ne présente rien de particulier dans ses parcours —

SCD Lyon 1

Nom Salle Lit N° F°

L'estomac ne présente aucune altération appréciable à l'œil nu.

L'utérus et les organes génitaux n'offrent rien de particulier.

Le rein droit présente à sa partie inf.re une tumeur de la grosseur d'une mandarine blanchâtre, ramollie, cireuse en grande partie s'enfonçant au niveau de la portion corticale. Les parties périphériques des vaisseaux sont adhérentes au tissu environnant. Dans le reste du rein on trouve de petites tumeurs de la grosseur d'un pois.

Dans le rein du côté gauche quelques tumeurs semblables.

La rate présente à sa surface de petites tumeurs blanchâtres de la grosseur d'un pois, pour une rate du poids au premier abord pour des tumeurs semblables à celles du rein, étant constituée par une coque renfermant une masse jaune analogue à du mastic.

Le foie présente de petites tumeurs blanches en hypnis comme celles de la rate.

Dans le rein on trouve aussi de petites tumeurs en hypnis comme celles de la rate en outre des tumeurs déjà décrites.

Un peu de pneumonie hypostatique à la base du lobe inf.r droit avec emphysème de chaque côté.

Cœur augmenté de volume surtout aux dépens du cœur gauche sans lésion des valvules d'orifices sur l'aorte quelques jaunes d'athérome.

SCD Lyon 1

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — Salle 4e femmes N° 155

Nom Julie Revol

né à

demeurant à

profession cuisinière.

âge 59 ans

tempérament

constitution

entré le 3 janvier 1882

~~*sorti le*~~ morte le 4 janvier à 2 heures (après midi.)

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Athérome (dilatation anévrysmale de la carotide cérébrale antérieure gauche.

Hémorrhagie cérébrale.

Autopsie. Hémorrhagie du corps calleux

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

4 janvier. — Cette malade est apportée dans ce service ne parlant pas, et ouvrant à peine les yeux : un examen rapide permet de constater quelque heures après son entrée, absence complète de paralysie bien nette : soit du côté des membres, soit du côté de la face et des yeux. —

Aujourd'hui, voici les renseignements fournis par les parents sur l'état antérieur de notre malade. — Depuis longtemps elle souffrait de maux de tête, et avait de temps à autre des vertiges et des étourdissements. — Constitution habituelle — Il y a deux ans, elle avait eu une paralysie du bras droit, accompagnée d'un trouble de la parole, et d'une déviation de la face. — Depuis cette paralysie et les

SCD Lyon 1

2/

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	A les symptômes qui l'accompagnaient, avaient disparu sans accidents (du jour au lendemain). = Elle s'habitait comme d'habitude un peu de physique et intellectuel. Quelquefois elle ressentait parfois une certaine lourdeur de tête, avec tendance aux vertiges. = Elle avait aussi d'un caractère un peu exalté. = Hier pendant le dîner elle est tombée brusquement à la renverse comme. Droite = Vacillements de la vue. = Ne tarissait pas. Actuellement on note les signes suivants : La motilité est partout conservée ; La malade remue les bras, les jambes lorsqu'on lui dit. donne l'ordre : elle tire la langue, sait dire yeux une bouge et peut écrit parvient comprendre ce qu'on lui demande de faire. = L'intelligence intellect = Il n'y a pas de régression. = On note une résistance notable du côté du bras droit, pour les 2 membres supérieurs, et droite des membres postérieurs de la cuisse pour les membres inférieurs. = La sensibilité paraît diminuée sur les différents membres, toutefois les piqures sont nettement perçues. = Du côté de la face : pas de paralysie marquée ; la bouche est un peu déviée à droite. Les traits ne sont pas non plus absolument symétriques ; cela tiendrait à ce que la déviation de la face qui elle avait eu il y a 2 ans, n'a pas entièrement disparu? = Ophtalmoscopie intellectuelle, tout près la malade reconnaît ses parents. = Rien aux poumons. = Rien au cœur = Un petit accident à gauche en arrière de l'angle de la mâchoire	

Pouls aux pieds = 84. régulier.
Pupilles un peu dilatées.

SCD Lyon 1

15e salle — Julie Revol. —

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Douleur de tête. Tournoiements depuis longtemps, vertiges. Il tombait très — pendant le dîner — déviation de la face. Paralysie du bras droit et de la jambe droite depuis longtemps toute seule, puis affaiblissement avec gêne de la parole et de l'intelligence. — Exostose. Droitier.	
5 janvier	Depuis elle parlait Bouillement. Quelquefois en bredouillant un peu, souvent elle se trompe dans les mots. — Lorsque la malade est un peu réveillée elle paraît un peu s'occuper de ce qui se passe autour d'elle et lorsqu'on lui demande de quel côté elle souffre, elle montre la région frontale de la tête —	
6 janvier	— La malade est plus assoupie et plus somnolente que hier, mais il n'y a toujours pas de rigidité, la paralysie, toujours un peu tremblante et tirante que précédemment. Les yeux dirigés en dedans, l'œil droit regarde un peu en dehors; la pupille droite est plus dilatée que la gauche, mais elles se contractent toutes les deux sous l'influence de la lumière. — Les mouvements persistent moins à gauche qu'à droite — Il paraît exister un peu de contracture du côté droit — La sensibilité au piqûre est conservée — La parole est toujours tremblante — Les aliments liquides qu'on lui a administrés n'ont pas provoqué d'accès et ont été rendus involontairement —	
7 janvier	— Pouls = 152 — Respirations = 48 — La température axillaire = 42°,1 — La respiration est régulière, un peu plus longue que l'expiration.	

Pour ce qui concerne la parole elle se manifeste dans la malade comme la cataplasie, pendant un accès elle ne peut articuler aucun mot, mais elle comprend ce qu'on lui dit et répond par des mouvements de la tête ou des yeux.

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* _____ *N°* _____

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

La malade est actuellement dans un état cachectique profond avec résolution complète des membres, immobilité de la face et des paupières qui sont tombantes et presque closes.

L'œil droit est attiré à la partie interne et l'œil gauche dévié légèrement à gauche. Les globes oculaires sont le siège d'un très léger nystagmus latéral. = Pupilles rétrécies, peu ou pas mobiles. = Cœur très chancelant avec matité exagérée du niveau du thorax et des membres supérieurs. =

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

On ne remarque plus la résistance indiquée précédemment pour les mouvements communiqués aux membres supérieurs. C'est ainsi que du côté gauche on en trouve un peu au niveau du coude, dans les deux sens, et un peu aussi en relevant les doigts qui sont fléchis. À droite ce n'est que de temps en temps qu'on perçoit un peu de résistance du côté du triceps et plutôt du biceps et surtout lorsque la recherche est faite après un instant de repos; mais si on répète les mouvements, on trouve une laxité complète. = Du côté de la main, les doigts sont fléchis, mais ne présentent pas de résistance notable, et on relevant légèrement la main, on a une légère trépidation. = Dans les membres inférieurs, on ne peut pas produire la trépidation du pied ~~en relevant~~ en relevant la pointe du pied, ébranlée dans le repos.

SCD Lyon 1

5/ 185.

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

On éprouve seulement une résistance brusque qui donne lieu à une contraction musculaire dans les muscles des régions antérieure et interne de la cuisse du même côté, et à un plus léger degré dans les muscles lombaires du côté opposé, mais aucune à une contraction des muscles de la région antérieure et externe de la jambe, qui imprime à la pointe du pied plusieurs oscillations comme s'il s'agissait d'exécuter la grenue d'un cavalier (et un peu plus légère légère flexion des orteils). On répète le mouvement, on obtient presque chaque fois les phénomènes indiqués précédemment, cependant après en avoir constaté cette occasion ces phénomènes se produisent avec moins d'intensité et ne répondent pas à toutes les excitations. Il faut encore remarquer qu'après un moment de repos, on le produit plus aisément. et souvent le mouvement de latéralité du pied se produit dans le pied excité. Il suffit même parfois de soulever ce pied, en le tenant par la pointe, pour voir le mouvement de latéralité dans le pied soulevé, c'est qu'alors on tire un peu sur le triceps (ce dernier phénomène ne se produit que quand il y a eu un moment de repos. =

Ces différents phénomènes se produisent à peu près également quand on excite le pied droit ou le pied gauche. On donne bien aux mêmes phénomènes en abaissant la pointe du pied et en portant le bord externe en dedans, de manière à tirer sur les muscles de la région antéro-externe : on obtient alors une trépidation de ces muscles en même temps que les contractions indiquées précédemment

SCD Lyon 1

6

MODÈLE N° 21.

HOTEL-DIEU. — *Salle* N°

Nom

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Dans les mouvements de flexion et de rotation de la jambe du côté opposé (toutefois l'excitation est plus marquée dans le membre excité, surtout à droite), comme on répétait souvent l'examen, on produisait toujours cette trépidation par l'excitation directe et prompte environnement les phénomènes du côté opposé comme lorsqu'on tire sur le triceps. — Le tendon ~~rotulien~~ En abaissant la rotule, d'emblée ou de l'autre, on n'a pas de trépidation, mais une sensation d'arrêt brusque après un léger temps de

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

résistance et presque chaque fois on voit se produire au niveau du pied du côté opposé le phénomène de la queue de ~~[illegible]~~ canard ; il se produit presque aussi du même côté mais à un moindre degré, (en dernier lieu à peu près également des deux côtés, presque plus marqués du côté excité, surtout à droite. On remarque aussi dans les mêmes conditions des mouvements de la main, comme pour les excitations indirectes précédentes.

Le phénomène analogue à celui qu'on trouve dans l'hémiplégie d'origine cérébrale ! La plupart du temps, il n'y a aucune réaction, soit en fronçant un pli de la peau, soit en piquant le gland. Quelquefois dans ce dernier cas, on a pu voir seulement un léger mouvement de flexion des orteils et de la plante du pied ~~[illegible]~~ du côté droit. — Pas de nausées dans les mouvements de flexion des membres pelvi-

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	4ff. n° 122 — Hémorrhagie cérébrale — Julie Revol —	
	Autopsie. Le 8 janvier 1882 à 5h. (25h. après la mort)	
	Rigidité cadavérique très-prononcée des deux côtés. —	
	L'incision de la dure-mère ne donne issue qu'à quelques gouttes de liquide céphalo-rachidien, et il ne s'en écoule pas davantage sous l'influence de l'ablation de l'encéphale. — Rien de particulier du côté de la dure-mère; pas la moindre	
	Cependant la surface des hémisphères présente une teinte rouge très-prononcée au niveau de la moitié	
	sur les lobes occipitaux ainsi que sur les parties antérieures des lobes frontaux,	
	et inférieures des hémisphères. C'est surtout à la base	
	que cette coloration est prononcée. Elle est produite par un épanchement sous-arachnoïdien, d'autant plus intense qu'on l'examine vers les parties	
	supérieures, et d'autant plus épais qu'on se trouve vers les parties déclives. C'est ainsi que toute la base, y compris la protubérance, présente un épaississement de l'arachnoïde	
	caillots noirs, offrant l'aspect	
	des mêmes caillots. La même couche se remarque	
	à la partie postérieure du bulbe et sur les parties déclives du cervelet.	
	Lorsqu'on cherche à enlever ces caillots, on a une certaine difficulté en raison de leur situation dans la trame celluleuse	
	sous-arachnoïdien qui présente une certaine résistance. Dans	
	les points où les méninges sont pâles, à enlever sur le lambeau	
	jaune; on voit qu'en enlevant les méninges, on emporte en	
	même temps les caillots, ou le sang épanché. — L'examen	
	des artères est rendu difficile, non seulement par la présence	
	des caillots, difficiles à enlever au niveau de la base et des scissures de Sylvius; mais encore par l'état anormal des méninges	
	qui revêt ainsi d'une façon anormale les vaisseaux aux	
	organes voisins. Cependant on finit par isoler l'hémisphère	
	de Willis à l'exception des cérébrales antérieures. Ce n'est que	
	caillots deviennent plus épais et plus	
	qu'on cherche à dégager complètement la scissure interhémisphérique.	
	On remarque seulement que les artères cérébrales découvertes sont	
	très-athéromateuses (carotides, sylviennes, cérébrales antérieures, cérébrale postérieure); mais elles ne	
	présentent aucune altération. —	

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Après avoir enlevé l'estomac, on ouvre le [illegible] On voit alors que les ventricules sont remplis de caillots noirs à peu près également d'un côté et de l'autre, qu'en certains points du ventricule latéral antérieur droit le sang est mélangé à la substance cérébrale en bouillie, que la plus grande partie du corps calleux, à partir de la ligne médiane jusqu'à 6 pouces en dehors, est transformé de la même sorte en une matière rougeâtre en bouillie mélangée avec des caillots sanguins. Après avoir soumis cette région à l'action d'un courant d'eau on voit que la partie antérieure du corps calleux, jusqu'à la ligne médiane, jusqu'à la partie supérieure de la corne à 2 pouces environ en arrière, a été en grande partie détruite. Il ne reste à la partie antérieure qu'une mince couche de fibres supérieures du corps calleux, en rapport avec des caillots adhérents au fond de la partie détruite du corps calleux. A la destruction est de même, plus profonde à mesure qu'on s'éloigne de la partie antérieure, jusque à la limite du tiers antérieur environ où le corps calleux redevient normal. L'altération est à peu près aussi prononcée d'un côté que de l'autre, un peu plus du côté gauche. En cherchant ce que sont devenues les artères cérébrales antérieures on voit que c'est la cérébrale antérieure gauche qui fournit les branches de l'artère interne de chaque hémisphère, depuis son origine à la bifurcation, c'est à dire à douze millimètres de son origine elle présente un anévrysme. Le sac anévrysmal a la grosseur d'un petit pois. Il en résulte que les deux branches partent de l'anévrysme. Il n'y a pas de communicante antérieure, on trouve seulement un petit rameau artériel filiforme qui monte de la carotide interne droite qui aboutit au sac à l'anévrysme. Celui-ci a été divisé par la coupe destinée à séparer les deux hémisphères. Il ne contient pas le moindre caillot et n'offre aucune trace de rupture. — Ce sont les rameaux des artères cérébrales antérieures qui plongent dans la fente du corps calleux et qui entraînent des caillots. Après les avoir laissé dans l'eau pendant deux jours, et après l'action d'un filet d'eau qui déchire et détache les caillots, on finit par voir qu'il existe de petits troncs, de forme variqueuse, qui appartiennent aux branches les plus délicates de la carotide antérieure droite. Le plus volumineux appartient à une petite artériole qui a son origine sur cette artère à 2 ou 3 centimètres de l'origine de la première dont il semble que ce soit une branche. Mais après un lavage convenable et un examen attentif, il est facile de voir qu'il est formé d'une membrane fibrineuse étalée en forme ovalaire et auprès de laquelle se trouve deux petits	Réinjection par la carotide interne droite. Les ventricules sont remplis de caillots noirs et mous, qu'on retire avec de l'eau, dans laquelle le sang est mélangé à de la matière rougeâtre. Une grande partie du corps calleux est transformée de la même sorte en une matière rougeâtre en bouillie mélangée avec des caillots sanguins. Après avoir soumis cette région à l'action d'un courant d'eau on voit que la partie antérieure du corps calleux, jusqu'à la ligne médiane, jusqu'à la partie supérieure de la corne à 2 pouces environ en arrière, a été en grande partie détruite. Il ne reste à la partie antérieure qu'une mince couche de fibres supérieures du corps calleux, en rapport avec des caillots adhérents au fond de la partie détruite du corps calleux. A la destruction est de même, plus profonde à mesure qu'on s'éloigne de la partie antérieure, jusque à la limite du tiers antérieur environ où le corps calleux redevient normal. L'altération est à peu près aussi prononcée d'un côté que de l'autre, un peu plus du côté gauche. En cherchant ce que sont devenues les artères cérébrales antérieures on voit que c'est la cérébrale antérieure gauche qui fournit les branches de l'artère interne de chaque hémisphère, depuis son origine à la bifurcation, c'est à dire à douze millimètres de son origine elle présente un anévrysme. Le sac anévrysmal a la grosseur d'un petit pois. Il en résulte que les deux branches partent de l'anévrysme. Il n'y a pas de communicante antérieure, on trouve seulement un petit rameau artériel filiforme qui monte de la carotide interne droite qui aboutit au sac à l'anévrysme. Celui-ci a été divisé par la coupe destinée à séparer les deux hémisphères. Il ne contient pas le moindre caillot et n'offre aucune trace de rupture. — Ce sont les rameaux des artères cérébrales antérieures qui plongent dans la fente du corps calleux et qui entraînent des caillots. Après les avoir laissé dans l'eau pendant deux jours, et après l'action d'un filet d'eau qui déchire et détache les caillots, on finit par voir qu'il existe de petits troncs, de forme variqueuse, qui appartiennent aux branches les plus délicates de la carotide antérieure droite. Le plus volumineux appartient à une petite artériole qui a son origine sur cette artère à 2 ou 3 centimètres de l'origine de la première dont il semble que ce soit une branche. Mais après un lavage convenable et un examen attentif, il est facile de voir qu'il est formé d'une membrane fibrineuse étalée en forme ovalaire et auprès de laquelle se trouve deux petits



SCD Lyon 1

DATES	4e Sf. — N° 155 — Hémorrhagie cérébrale. Julie Revol. HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

tumeurs qui sont comme surajoutées à l'une indiquée. L'autre face est bien rougeâtre tomenteuse. En cherchant à accoler ces bords on voit très d'un petit kyste fibrineux dela grosseur a été fendu dans le sens de sa longueur suivant façon plus irrégulière vers l'extremité près delaquelle à la surface interne de ce kyste se trouve deux gros a la réunion d'un petit tube d'épingle et présente deux à un pedoncule fibrineux qui paraît s'engager La surface externe est tomenteuse et tout à deux autres petites tumeurs qui lui sont de grosseur de lentille. Ces petites tumeurs paraissent à un pédicule pour la cavité manifeste. à l'une des extremités de ces tumeurs à d'autres vaisseaux plus fins extremité. Enfin ces différentes parties sont à un pas pouvoir être séparées sans déchirures. antérieure nouvaient un peu plus bien. remarque sur l'une trois petites tumeurs sont à peu près semblables à celle dont (fig. B & C) on dernier lieu. Ces petites tumeurs sont, grosseur et forme ovoïde ou sphéroïde, avec un peu d'aplatissement sur les parois contiguës. La surface est rouge tomenteuse, comme ecchymotique. Ces tumeurs sont manifestement de nature fibrineuse il semble par qu'elles aient un accroissement unitaire à leur centre il ressemblait plutôt qu'il s'agit d'une tumeur formée simplement par des couches fibrineuses concentriques dans la gaine lymphatique d'un vaisseau.

Sur la coupe de chacun hémisphère on peut remarquer la perte de substance subie par le corps calleux dans son tiers antérieur et notamment au niveau du genou. La cavité des ventricules latéraux en est comme agrandie, un peu plus du côté gauche que du côté droit. Toutefois, c'est bien à la portion médiane de la perte de substance que l'altération est le plus prononcée.

L'hémisphère gauche est en outre le siège d'une ancienne lésion. En effet, sur la coupe pariétale, on trouve sur la limite externe de la substance du noyau lenticulaire une petite cavité anfractueuse ce noyau dont l'examen dans le sens transversal est tout à fait de 3 millim. et qui présente 1 cent 1/2 environ soit dans le sens vertical, soit dans le sens antéro-postérieur.

de façon à la membrane précédente bords sont blanchâtres manifestement qu'il s'agit d'un grain d'orge (fig. A') qui suivant une ligne droite à d'une petits caillots blancs dont le plus présente un certain volume à fait semblable à celle des qui ont le volume primitivement composés de fibrine vaisseaux déjà obsolescents se remarque à l'autre elle, de manière enfin une dizaine toujours sur la C.A.D. et sur l'autre deux, qui il vient d'être ponctionné, un effet de la même

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	Sa surface interne de petit Kyste est lisse, tapissée par une membrane cellulaire extrêmement fine, humectée d'un liquide incolore. La coupe a présenté à la vision une résistance caractéristique d'un tissu cicatriciel. Il s'agit bien évidemment d'un ancien foyer hémorragique. — Aucune autre lésion des hémisphères dont la substance blanche est ferme à la présente pas même un petit ramollissement. La protubérance, le bulbe et le cervelet ne présentent aucune altération au niveau des coupes. On remarque seulement que le Vº ventricule est complètement rempli par un caillot noirâtre analogue à du ramolli et semblable à ceux qui se trouvent dans les autres cavités ventriculaires. Cœur normal. — Toutefois, l'aorte est un peu épaissie et athéromateuse. Rien de particulier du côté des poumons. — Les autres organes n'ont pas été examinés. —	

A — Petit Kyste fibrineux ouvert dans l'intérieur duquel s'trouve deux petits caillots blancs, dont un plus volumineux et qui tient étroitement adhérent à la paroi par un pédicule filiforme probablement constitué par un prolongement de fibrine s'engageant dans un vaisseau. Deux petits tentacules sont accolés à la plus grosse.

A' Le même Kyste fermé mais ouvert par un pédicule à la partie inférieure.

B-C — Petites tumeurs semblables aux précédentes, appendues aux parois d'autres petits vaisseaux provenant comme les précédents de la Cérébrale antérieure droite.

1, 2, 3, 4. = C.A.D.

SCD Lyon 1

1

HOTEL-DIEU. — Salle 4me ff. N° 155

Nom Julie Revol

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUMÉ

Hémorrhagie cérébrale

Réflexions — Les nausées, la stupeur, le vertige, le tintouinnement que la malade ressentait depuis longtemps, et qui peuvent être, comme nous l'avons vu souvent, les prodromes de l'hémorrhagie aussi bien que du ramollissement, doivent être rapportés aux lésions artérielles, et notamment au petit anévrysme que nous n'avons pas manqué de trouver dans la tête de la malade. Nous ne pouvons pas savoir si cet anévrysme était capable de donner lieu à un bruit de souffle. Cette ignorance est d'autant plus regrettable que la question n'est pas résolue et qu'il n'existe aucune observation qui permette de dire si les anévrysmes de la gêne que l'on rencontre sur les artères cérébrales sont capables de produire un bruit de souffle.

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

A l'avenir, les symptômes analogues aux prodromes que cette femme devrait atteint notre attention sur ce point. Nous avons retrouvé la lésion qui avait produit la première attaque deux ans auparavant. Les personnes intelligentes chez lesquelles la malade était domestique et qui nous ont fourni de nombreux renseignements sur ses antécédents pathologiques, nous ont dit que cette paralysie avait été limitée à la jambe, à la langue et au membre supérieur. En tout cas si le membre inférieur avait été pris, c'était à un très-léger degré, puisque il avait repris son indemnité à ses fonctions. Il ne s'agissait pas d'une lésion cortical! Il est venu à remarquer que la paralysie avait disparu du jour au lendemain, de telle sorte que la malade avait pu reprendre immédiatement son travail; bien que la lésion ait dû mettre un temps assez long pour se cicatriser. L'ictus avait certainement joué le principal rôle dans la production de la paralysie; mais on ne peut cependant pas conclure au retour complet de l'état normal, puisque nous n'avions pas vu la malade avant la première attaque. Le retour à l'état normal est, en effet, assez rare, ou plutôt le cerveau n'offre pas en général à subir toute la guérison désirable. D'après cette

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	j'ai observé jusqu'à ce jour, je crois cependant paralysies qui ne laissent aucune trace ? lésions situées dans la même région que dans des lésions des couches corticales qui laissent traces de paralysie surtout lorsqu'il s'agit dite motrice, car dans les cas de lésions situées on peut aussi rencontrer des paralysies aucune trace appréciable de paralysie. Sur marche de la maladie ainsi que permettent de croire que l'hémorrhagie a la partie antérieure et moyenne du corps gagné peu à peu la protubérance et l'encéphale il est très-probable, en effet, que si l'hémorrhagie considérable dès le début la maladie serait restée dans l'état comateux; à elle suffisamment pour reconnaître la voix, pour leur parler, en redoublant des cris et en rapportant aux questions Mouvoir les membres, lorsque on les faire des mouvements intentionnels. — Les l'attaque sont intéressants à noter en c'est d'abord l'absence de paralysie locale c'est ensuite un état de passivité générale la sensibilité, les organes des sens, etc. La malade était constamment dans en parlant jamais spontanément Ce n'est que lorsque elle était un peu excitée les questions, en la prenant d'assez rapprochée Le 2e jour de notre examen elle répondait elle ne répondait plus du tout dès le 4e jour dans le coma. La figure était immobile expression, aucun mouvement ne répondait et les paupières supérieures, étaient tombantes on plus, bien qu'il n'y eut aucune lésion mobiles dans tous les sens à prononcer un très-léger degré de strabisme interne particularité est peut-être en rapport avec le siège région médiane de l'encéphale. Nous avons déjà observé mais avec prédominance d'un côté dans deux cas de lésions probables de la protubérance (produite par l'autopsie n'a pas été faite).	porté à croire que les paralysies sont produites dans ce cas plutôt que dans dans ce cas plutôt que dans sont en général très-peu prononcées de lésions situées sur la région situées à la périphérie de cette zone très prononcées et ne laissent la lésion, révélée par l'autopsie dû se faire d'abord dans celles et qu'elle a suivi sous-arachnoïdien. l'hémorrhagie ait été suivie d'apoplexie quelques jours elle est revenue les personnes qui venaient l'entrée, quelques jours qui lui étaient faites, pour demander, et enfin pour symptômes constatés après siège de la lésion. lésion a été constaté chaque jour portant sur la motilité intelligence étaient à la fois la prostration de la sensibilité lorsque on répétait qu'on obtenait une réponse. rarement; le 3e jour voulait tout à fait répondait encore aux questions; dès le début d'une paralysie cortical. Les yeux étaient compte en disant à la malade de regarder toutefois ils étaient habituellement cette direction de la lésion sur un point de la déviation des yeux a été notée dans un cas de lésion probable de la protubérance (produite par l'autopsie n'a pas été faite).

SCD Lyon 1

DATES	4ème N. 185 Julie Revol HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Réflexions (suite). Ce qui tendrait à faire croire qu'il en était ainsi dans ce cas, c'est que la ville de la mort devia à droite, et le jour même de la mort l'œil droit devia à gauche. La ouate le jour étaient donc dans le siège d'un tic-douloureux facial. Ce sont des phénomènes qu'on observe souvent lorsque les ventricules sont envahis par une hémorrhagie. Toutefois il n'y avait pas ici une déviation conjuguée complète, puisque les hémisphères étaient intacts. Il est probable que l'hémorrhagie a dû envahir d'abord le ventricule latéral droit en raison des lésions vasculaires trouvées de ce côté et cela a donné lieu d'abord à la déviation de l'œil droit à droite en même temps qu'à une contracture plus marquée des membres supérieur et inférieur de ce côté et à une affaiblissement plus prononcé du côté gauche. Puis l'hémorrhagie a gagné le ventricule latéral gauche d'où la déviation de l'œil gauche à gauche en même temps que le membre supérieur gauche présentait quelques signes de contracture qui finirent par gagner complètement celui à droite. L'envahissement par hémorrhagie des deux ventricules latéraux a produit les phénomènes de résolution qui ont précédé la mort. En somme, en dehors des phénomènes particuliers à chacun côté et qui sont très restreints, les symptômes observés après l'attaque peuvent être attribués à la compression progressive de l'encéphale. C'est ainsi que toutes les fonctions ont été atteintes sans qu'aucune fut annihilée jusqu'au moment de la mort. La sensibilité était profondément émoussée sans être éteinte. Avec un affaiblissement très prononcé des mouvements volontaires, il existait encore des mouvements automatiques, et même intentionnels; nous avons particulièrement remarqué que si l'on touchait les membres supérieurs, le malade retirait un instant dans cette position et ne laissait retomber les membres inférieurs que très lentement. C'était un état se rapprochant de l'état cataleptique. En relation avec l'extrême paresse très limitée, il fallait toujours l'excitation pour déterminer un mouvement. Cependant la vie de relation, nous l'avons vu chercher à revenir par toutes les manifestations de son homme qui avaient été tachées, pour l'examiner. Elle procédait par mouvements très lents, insuffisants, sous que les yeux ou son visage indiquaient son intention. On voit un effort [illegible] qu'elle ne cherchait pas à rendre compte. Nous avons enfin relevé parmi les manifestations de la vie de relation de fréquents bâillements.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
	nous noterons encore l'abaissement du sourcil du côté droit qui joint aux autres symptômes indiquent des lésions étendues des deux côtés.	
	La marche de la maladie, l'état comateux de plus en plus complet en même temps que la disparition des déviations, atténuation progressive amènent la gravité du pronostic. — Avec la résolution générale puis complète, on avait une respiration très accélérée et une température très élevée (42°,1) indiquait la nature de la lésion. La respiration était régulière, un peu plus longue que l'expiration. Il n'y avait donc que des phénomènes de paralysie. Du dernier côté nous avons observé des phénomènes d'excitation analogues dans les autres cas. Nous avons pensé qu'ils pouvaient être dus à la compression rapide de l'encéphale et notamment du bulbe? Toutefois, il est difficile de se faire une opinion à ce sujet avant d'avoir observé d'autres cas analogues. Il faut en effet remarquer que si les réflexes tendineux étaient augmentés pour la suppression de l'action encéphalique, les réflexes cutanés qui avaient été subis eux-mêmes sous l'influence de cette cause première étaient au contraire à peu près éteints. Durant on observe plutôt la diminution des réflexes cutanés dans les cas d'hémorrhagie cérébrale. Il faut encore remarquer que la température qui a été celle qu'on observe habituellement dans les hémorrhagies cérébrales étendues progressives à la vie; mais pour les membres inférieurs la température se produisait dans les muscles qui n'en sont pas le siège habituellement. Nous avons déjà observé la température de ces mêmes muscles dans un cas d'hémorrhagie cérébrale avec hémiplégie du côté gauche. Nous avons également noté la température du côté paralysé en même temps que la température du côté contracturé des deux côtés. Or, chez notre dernier malade, non seulement les phénomènes d'excitation de même côté, soit par celle de l'écorce, soit par celle des faisceaux ou des plaques motrices étaient produits par la paralysie, mais encore l'abaissement de la température. Pendant tout cas l'action de la moelle était incontestable. Mais les phénomènes existaient-ils plutôt dans certains muscles que dans d'autres en raison de leur siège dans tel ou tel segment de la moelle? Dans quel ordre dans le cas actuel les fonctions nerveuses ont été supprimées? C'est ce qu'il nous est impossible de dire actuellement. — Le résultat de l'autopsie est également intéressant au point de vue de la pathogénie de l'hémorrhagie cérébrale. Il est probable que celle-ci avait pour point de départ le petit foyer pédonculaire qui, quant à sa formation doit être analogue à celle des autres petits foyers, foyers qui ont dû être produits par la rupture vasculaire? — Nous avons noté chez cette malade un défaut de développement de la moitié droite de la face, de la bouche, de l'aile du nez, de l'œil, etc. Les attaques, à gauche, étaient toujours précédées de crampes. Il s'agissait plutôt d'hémorrhagie qu'une ramollissement, en tenant compte de la rapidité de la mort. Il faut remarquer encore la rapidité avec laquelle cette malade qui avait présenté un mouvement d'agonie a eu une réaction fébrile avec élévation progressive des membres, parallèlement à des contractures très prononcées. —	

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* 4e femmes N° 120

Nom Virginie Ponsot

né à Orbagna (Jura)

demeurant à

profession Fondeur

âge de 54 ans

tempérament

constitution

entré le 3 7bre 1874

sortie le 21 sept. à 4h. soir (morte)

DIAGNOSTIC ET RÉSUME

Hémorrhagie sous-arachnoïdienne
Thrombose des sinus
Hémiplégie droite, Contracture à suiv.
et Aphasie

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Pas de maladie antérieure.

A été apportée à St Paul le 2 7bre jour de son attaque, avec une aphasie complète

- Ecchymose sur le dos de la main droite (main tendue)
- - de même sur la crête iliaque.

Etat actuel Aphasie complète. La malade ne prononce que qqs mots incompréhensibles. Intelligence très altérée. La malade ne comprend pas ce qu'on lui dit — Si on insiste longtemps pour savoir le dessin, elle finit par répondre Non.

Face Le front se plisse également des 2 côtés. L'œil droit est plus ouvert quand le malade est au repos que quand elle dort. — Pupille droite plus dilatée que la gauche. Réflexion normale des deux.

Commissure labiale droite abaissée. La parole s'accompagne toujours de mouvements à gauche. La jambe droite est flasque.

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS
Mardi	Les mouvements sont conservés - Le degré de mobilité est difficile à apprécier vu l'état intellectuel de la malade - Les mouvements commencés s'effectuent de la résistance des 2 côtés - Les mains sont aussi tremblantes à droite qu'à gauche -	
	La malade ne peut tenir debout - elle a de la tendance à se renverser en arrière -	
	Si on lui dit de tirer la langue, elle sort un peu la pointe de la langue mais la ramène aussitôt en effort pour la sortir derrière les dents	
Mercredi	difficile à apprécier - Il semble que les jambes soient moins raides à gauche - Les allongements légers ne sont pas perçus des 2 côtés -	
	En jetant la pointe de la langue sur la planche du pied, les réflexes sont manifestement + marqués à gauche -	
	La malade en entrant a eu de la dysphagie de la déglutition -	
	Incontinence des urines et des matières fécales.	
Jeudi	La aphasie est toujours très marquée.	La malade a été toujours
	Il y a 4 ans dans la salle St Sacerdos on lui demande le nom de la salle elle dit St Bruno - elle a fini par dire St Sacerdos - Si on prononce le nom de la salle elle dit oui - Si on lui dit l'autre nom elle dit non - Si on prononce le nom et qu'on le lui fait immédiatement répéter elle n'y parvient pas.	Il y a une fracture de jambe - elle était St Sat.
	La malade s'emporte quand elle ne trouve pas.	
Vendredi	Elle crache beaucoup plus qu'hier ; les mots sont bredouillés, même accompagnés. Les troubles intellectuels sont toujours moins grands mais moins qu'hier : cependant elle désigne les objets, après un peu d'hésitation. Elle tire la langue très droite : Elle bouge tous ses membres surtout le gauche, qu'on a attaché. Lorsque la malade parle ou rit, les contractions des muscles de la face se produisent à peu près également des 2 côtés, cependant un peu moins du côté de la commissure droite. Elle bouge beaucoup remue les mains et les bras, bouscule constamment ses draps et ses couvertures. — Les troubles de la sensibilité sont très difficiles à apprécier, étant donnés les troubles intellectuels. Elle tire très abondamment dans le lit.	seulement les mots sont un peu de bégaiement

SCD Lyon 1

DATES	HISTOIRE PATHOLOGIQUE	PRESCRIPTIONS

Virginie Goursot. 4es Femmes 420.

6 7bre — La malade est devenue très loquace elle prononce constamment des phrases incohérentes On comprend ce qu'elle dit bien que beaucoup de ses mots soient bredouillés ou bégayés. — Elle contracture de temps les membres et de roule ses draps — Elle répond aux questions simples qu'on lui pose. donne la main. — tire la langue. — Les pupilles sont + resserrées qu'hier, la gauche toujours un peu plus petite que droite — Les phénomènes de paralysie sont peut-être encore + marqués. La malade bouge les membres — L'intelligence est toujours fortement obnubilée

— L'audition est altérée par l'angle externe de l'œil droit qui reste toujours un peu plus ouvert — L'angle est rouge.

7 7bre — Mêmes phénomènes, mais à un degré moins marqué. A uriné un peu de lait.

8 7bre — Mêmes troubles de la parole et de l'intelligence. Pas d'escare. Elle demande à présent pour aller à la selle et pour uriner. Il y a cependant une petite excoriation sur la partie la + saillante du sacrum.

9 7bre — Toujours loquace, mais bredouillé; répond aux questions simples; a des hallucinations. Pas d'hémiplégie (d'après les parents) Sensibilité générale notablement diminuée Réflexes diminués à droite.

On lui montre plusieurs objets qu'elle désigne. On lui montre des clefs, elle ne peut trouver le mot, dit que ce sont des sécots, dit que c'est pour ouvrir la serrure, mais ne peut dire une clef. Ce n'est que lorsqu'on a prononcé le mot, qu'elle le répète. L'escare sacrée se prononce de plus en plus.

12 7bre — A pris un peu de chloral a dormi cette nuit, est très calme ce matin (2 gram. de chloral pour la journée, et 2 gr pour la nuit).

13 7bre — Persistance du calme

17 7bre — Depuis 995 jours la malade est plus tranquille, mais elle a maigri elle est plus affaissée. Elle parle moins — ses paroles sont toujours aussi incohérentes. Elle répète souvent les mêmes mots. on fait entendre des sons inintelligibles — Elle a toujours des hallucinations

— A la partie postérieure droite du thorax matité avec diminution des vibrations à la partie inférieure. à ce niveau souffle tubaire — Le gros mamelon de l'appareillement de ce côté — L'escare sacrée reste sans modification notablement augmentée — La malade urine par dessous elle souvent aussi sur le bassin; ne prend que des potages

SCD Lyon 1

HOTEL-DIEU. — *Salle* _____ *N°* _____

Nom 19 7^bre

né à

demeurant à

profession

âge

tempérament

constitution

entré le

sorti le

DIAGNOSTIC ET RÉSUME

œdème léger de la face dorsale des pieds. Le souffle augmente et a pris un timbre caverneux.

Mort le 21. — Ni sucre, ni albumine dans l'urine

Autopsie. Cerveau. Sur l'hémisphère gauche, surtout en avant sur les lobes frontal et pariétal, on trouve une hémorrhagie sous-arachnoïdienne diffuse. A la partie supérieure du lobe pariétal, il y a eu rupture de l'arachnoïde, et formation d'un hématome, d'origine récente; le sang en est encore liquide, et il s'est enkysté dans la fibrine, qui s'est condensée en pseudo-membranes très minces, simulant assez bien les membranes de la pachyméningite. Contre les deux courbures de la troisième circonvolut. frontale, épanchement sous-arachnoïdien, qui est diffus ailleurs, s'est collecté en notable quantité. — Sur l'hémisphère droit, la même suffusion sanguine existe, mais moins marquée qu'à gauche: la teinte rouge est plus accusée sur le lobe frontal. — A la base, on ne trouve de suffusion sanguine que aux deux extrémités, antér. et postérieure. — A gauche,

HISTOIRE PATHOLOGIQUE

Sur l'écorce cérébrale, on trouve quelques point jaunes, offrant à eux entre une teinte rouge ± foncé. Ils existent dans les régions suivantes: (a) à deux centim. de la scissure de la frontale ascendante, sur le point qui confine à la 3ème circonvolut. b) sur la première temporale c) sur la 3ème circonvolut. frontale, à 4 ou 5 centim. de son origine, surtout à l'extrémité antérieure. (d) sur la 2ème circonvolut. frontale, on trouve deux points placés de telle sorte qu'ils la divisent en trois parties. — Tous ces points sont jaunes, avec de petites ecchymoses à la surface, et avec des adhérences aux méninges. — Dans le sinus latéral Droit, on trouve un vaste thrombus qui commence, d'un côté, au pressoir d'Hérophile, et se prolonge, de l'autre à un centim. au-delà du golfe de la jugulaire. — La partie inférieure des lobes cérébelleux offre, elle aussi, de l'hémorragie sous-arachnoïdienne: au moment où on enlève l'encéphale, les fosses cérébelleuses se remplissent de sang. Dans la fosse droite, on remarque une petite aspect ovalaire, de volume d'une pièce de 0,50 cent, au niveau duquel la Dure-mère manque complètement, et l'os est à nu, sans offrir la moindre trace d'altération. Sur les bords, la Dure-mère est adhérente à l'os, et un peu épaissie. ~~Ces bords sont à pics, et taillés à l'emporte pièce.~~ Ces bords sont un peu enroulés sur eux-mêmes, et en dehors, et adhérent à l'os. Autres lésions.

Dans les deux sommets du poumon, cicatrices étoilées avec petite masse tuberculeuse ancienne, ayant subi la transformation fibreuse. Le lobe droit du cerveau présente un ramollissement cortical au niveau du point correspondant à l'os dénudé. — La nature de cette lésion aussi bien que des points jaunes ramollis trouvés sur l'hémisphère cérébral gauche est très nettement caractérisé par l'examen microscopique. —

SCD Lyon 1

N. 4e femmes — 120. 54 ans Londres
Entrée le 3 sept. 78 — morte le 21 sept. 78.

Aliénée le 2 sept. 78. — Actuellement, aphasie complète — Malade ne bredouille que quelques mots incompréhensibles, intelligence très affaiblie — ne comprend pas ce qu'on lui dit — Face, le front se plisse également des deux côtés — Œil droit plus ouvert quand la malade est au repos — pupille forte dilatée. — Du même côté, narine aplatie, sillon nasal effacé — commissure abaissée et collée — Langue tirée la malade tient avec les 2 côtés gauche Elle ne peut tirer la langue Mouvements conservés aux membres. Le degré de motilité est difficile à apprécier vu l'état intellectuel de la malade. Les mouvements communiqués déterminent de la résistance des 2 côtés — Les mouvements spontanés semblent plus fréquents et plus étendus à gauche —
La malade ne peut rester debout. Elle a de la tendance à la renverser en arrière —
Sensibilité obtuse des 2 côtés — les piqûres fortes sont mieux senties à gauche — Réflexes plantaires plus marqués à gauche — Hyperglutition gênée — incontinence urinaire et fécale
Mémoire. La malade se rappelle la salle St Sacerdos où elle a été Surveillante autrefois, mais elle ne peut prononcer ce nom, même quand on met de le lui dire, sans l'écrire — Elle s'impatiente.
Elle causa beaucoup plus qu'hier — les mots sont bredouillés, il y a même du bégaiement — Elle désigne les objets, après en avoir demandé le nom. Elle tire la langue très droite —
Elle louche beaucoup et traîne constamment les draps, dessous de la main gauche qu'on a été obligé d'attacher à celles très abondantes dans le lit.
La malade est devenue très bavarde — elle prononce sans cesse des phrases incohérentes en bredouillant et bégayant — beaucoup de mots cependant sont compris — Elle répond aux questions simples, donne la main, tire la langue — Elle continue à baver et à mouiller les draps des propellés

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

A formation d'une hématome d'origine récente - L'autre est encore liquide et il s'est entkysté dans la fibrine, qui s'est condensée en pseudo-membrane très-mince, simulant assez bien les membranes de la pachyméningite - Entre les deux courbures de la 3e circonvolution frontale, l'épanchement sanguin arborisé dont j'ai déjà parlé, s'est collecté en notable quantité - Sur l'hémisphère droit, la même suffusion sanguine existe, mais moins marquée qu'à gauche et en petite quantité sur le lobe frontal - A la base, on retrouve des suffusions sanguines aux deux extrémités, antérieure et postérieure

Sur la convexité cérébrale on trouve plusieurs petits foyers avec des petites échymoses à la surface et des adhérences aux méninges - On en trouve à la partie antérieure de la 3e circonvolution frontale - La 2e circ. frontale présente 2 foyers placés de telle sorte qu'ils la divisent en 3 parties égales - Il en existe un à 2 centimètres du pied de la frontale ascendante - et un autre sur la 1re temporale - L'examen microscopique démontre nettement que ces parties sont le siège de ramollissement - Artères saines - Dans le sinus latéral droit, on trouve un vaste thrombus qui commence à un côté au pressoir d'Hérophile et se prolonge de l'autre à 1 centim. au delà du golfe de la jugulaire.

- La partie inférieure des lobes cérébelleux offre également de l'hémorrhagie sans ramollissement. Dans la fosse cérébelleuse droite on remarque un petit espace ovalaire, mesurant le diamètre d'une pièce de 0f50. sur lequel la dure mère manque, laissant à nu l'os qui n'est pas altéré - Sur les bords, la dure-mère est adhérente à l'os et un peu épaissie. Ces bords sont un peu arrondis sur eux-mêmes - La Colle

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

Foyer du cervelet prétendue ramollissement
symptômes au niveau du point qui correspond à l'os décrit.
Dans les deux sommets des poumons, cicatrices d'abcès
avec une petite masse tuberculeuse au centre ayant
subi la transformation fibreuse

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

toute plus nerveuse qu'hier, pendant la journée – L'intelligence
est toujours parfaitement obnubilée.
Ecoulement des urines par l'orifice vésical droit qui a
augmenté, on constate un peu de rougeur
Pet. mêmes phénomènes, mais à un degré moins marqué –
a sommeil un peu de bile
Petite excoriation sur la partie la plus saillante du sacrum
Elle demande à présent pour aller à la selle et pour uriner –
Toujours logiques, mots bredouillés – Désigne plusieurs objets –
mais ne peut prononcer le mot clef qu'elle épelle parfaitement –
– Elle a des hallucinations – pas d'alcoolisme (d'après les
parents) – Sensibilité générale notablement diminuée
L'escharre sacrée se prononce de plus en plus.
Après un peu de chloral, a dormi cette nuit, est très-abattue
ce matin. (1 gr. de chloral pour la journée et 1 gr. pour la
nuit)
Persistance du coma.
La malade s'affaisse. elle parle moins – ses paroles
sont toujours incohérentes – Elle répète souvent les mêmes
mots ou fait entendre des sons inintelligibles – Les
hallucinations persistent.
L'escharre persiste sans augmenter – La malade urine
parfois dans le lit, souvent aussi elle demande le bassin –
ne prend que des potages – A la base droite matité,
diminution des vibrations et souffle lointain –
Le souffle augmente et a pris une tonalité caverneuse –
Oedème léger de la face dorsale des pieds – pas de
sucre ni d'albumine dans les urines –
Morte le 21.

Autopsie.

Dans l'hémisphère gauche, soulevé en avant, sur
les lobes frontal et pariétal, on trouve une hémorrhagie
sous arachnoïdienne diffuse – A la partie supérieure
du lobe pariétal, il y a eu rupture de l'arachnoïde

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
SECTION SANTÉ
LYON 1

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1