

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

35.303

METHODI MEDENDI,

Seu

INSTITVTIONIS
MEDICINÆ FACIENDÆ

VNA CVM TRACTATV

de curatione febrium,

Libri quatuor.

A V T H O R E

IOANNE SCHYRONIO

in celeberrima Mospeliensi Acade-

mia Cancellario, & Professore

Regio Primario.

QVIBVS ACCESSIT

*Tractatus medicamentorum simplicium & compositorum, una
cum ipsorum dosibus, quibus Medici in praxi vtuntur: in eo-
rum gratiam qui praxim adseunt: opus sane utilissimum &
perne. essarium.*

Editio noua correcta & emendata ab innumeris
quibus priores editiones scatebant.



COLONIÆ ALLOBROGV.M.

Apud Petrum & Jacobum Chouët.

M. DC. XXIII.





MONSPELIENSIS
CELEBERRIMÆ ACA-
demix amantissimis

φιλιάτῳις,

IOANNES BLEZINVS
Schyronius in eadem
Decanus. S. P.



Cio quo animi feruore secre-
tiora & synceriora vestre
facultatis mysteria scrutari
contenditis, (STUDIOSI CHA-
RISSIMI) Pridem testis ego,
ipse Canus celeberrimâ hâc Academix
Decanus, non magis annorum cumulo,
quàm scholastico lassatus puluere, sic enim
vix dum, (vt scitis) cellula meæ limen præ-
tergredior, nisi vestris vestrorum studio-
rum negotiis foràs conuocatus, quorum
quidem cu am citiùs non exuam, quam

* 2.

honor meo me spiritu exuat, ideò non omnino ingratus Academiæ toti, neque Auunculi mei hac in parte defraudator, Opus hoc toties à vobis efflagitatum typis commisi. Quanta sit ipsius & necessitas, & utilitas, imò quam utraq; mira eruditione sit adornata, taceo, neque fidelio rem huiusce rei testem aduoco, quàm sedulam ipsius lectionem, à quâ si meo hortatu integrè non abhorreatis, proculdubio, mecum fatebimini indignum esse tenebris tantum medicine facultatis splendorem: Interim boni consulti & bene censete de hocce meo dicato vobis officio, & in Authoris Auunculi mei memoriâ, me fidelissimum ipsius & nepotem, & vicarium, sæpius in gratis vestris repetite, vt saltem credam meas hæc in re elucubrationes vestris omnino gratis non esse destitutas. Valete & me amate.

Monspelij die 9. mensis

Maij Anni 1608.



INDEX



INDEX EORVM QVÆ
IN HISCE MEDICINÆ
faciendæ libris con-
tinentur.

Numerus paginam indicat.

A.



BSYNTHIVM calorem ventriculi
nonnihil iuuat. 183

Acetum vterum offendit. 116
141.

Acetum in curatione splenis ne-
cessarium. 96

Acetum Hepati non est vtile 97

Acetosa cum radicibus. 70

Acetosæ succus. 71

Adiantos calculum frangit. 55.III

Agaricus non conuenit colicis affectibus 19

Agaricus infensus est stomacho imbecillo.
2

Agaricus vomendi promptis non adhibea-
tur. 87

Agaricus exterius admotus pituitam educit.
183

Aloe senibus non conuenit. 121

I N D E X.

de Alui fluxibus.	284
de <i>Antidotis</i>	235
in <i>Apozemata</i> Prolegomena.	95
Apozema refrigerans & tenuium partium interdum incrassans, & aliqua ex parte purgans biliosa & serosa.	79
Apozema pro affectibus capitis frigidis cal- faciens, extenuans, roborans, & pituitosa expurgans.	65
Apozem. vsus in affectibus <i>Oculorum</i> calidis	66
Apozem. in affectibus oculorum frigidis.	67
Apoz. pro affectibus oculorum frigidis re- calfaciens, vapores & flatus discutiens, pituitosa purgans.	68
Apoz. <i>Cordis</i> .	69
In affectibus cordis calidis.	70
In affectibus cordis frigidis.	72
Apoz. in affectibus cordis frigidis recal- faciens, aperiens obstructions, extenuans & crassa repurgans.	73
Apozemata <i>Thoracis & Pulmonum</i> .	74
In affectibus calidis pectoris & pulmo- num.	76
In affectibus frigidis pectoris & pulmo- num.	79
Apozem. in calidis <i>ventriculi</i> affectib.	84
Apozema in affectibus ventriculi calidis re- frigerans moderatè cum astrictione &	non-

I N D E X.

nonnihil ex iis quæ tenuis sunt essentia. 86

Apozemata in affectibus ventriculi frigidis. 89

Apoz. in affectibus ventriculi frigidis recal-
faciens, astringens, & quadamtenus exte-
nuans, flatusque discutiens, & moderatè
pituitam educens. 89

Apozemata *Hepatis.* 91

Apozema in affectibus hepatis calidis refri-
gerans cum tenuitate partium, leuiter a-
periens, purgans biliola, serosa & adusta.
93

Apoz. in affectibus hepatis frigidis. 95

Apozemata *Splenis.* 95

Apozem. in calidis & frigidis affectibus sple-
nis. 100

Apoz. in affect. *Splenis* frigidis recalfaciens,
extenuans, aperiens, ab infarctu liberans,
nigra deiiciens, serosa, aquas, & pituitam
euacuans. 102

Apozemata *Renum & vesica.* 103

Apozem. in affectibus renum & vesicæ cali-
dis. 105

Apoz. in affectib. calidis renum & vesicæ &
fistulæ vrinariæ, refrigerans, leniens, in-
crassans aliqua ex parte, & nonnihil cum
tenuitate partium, aperiens atque abster-
gens. 108

I N D E X.

Apozem. in affect. renum & vesicæ frig.	110
Apozem. in affectib. renum frigidis moderatè recalfaciens, aperiens obstructions, vrinas mouens, calculos comminuens & abstergens, aquas & serosa subducens.	111
Apozemata <i>Vteri.</i>	113
Apozem. ad affectus vteri frigidos.	119
Apozem <i>articulorum.</i>	121
Apozemata purgantia non sunt danda in affectibus thoracis.	79
Apozem. in morbis calidis coquere, non purgare debent.	57
Apozem. in morbis frigidis coquere & euacuare debent.	58
<i>Apoplegm.</i> quæ pituitam è cerebro educunt.	181
<i>Apij</i> radice conserua obstructions in hepate tollit.	254
<i>Apium visus</i> laudatur pro vesicatorio.	333
<i>Aqua</i> ad varios scopos.	38
<i>Aquæ</i> variis corporis partibus accommodatæ.	152
<i>Aqua Scillatitia</i> ex Faentino maximi vsus in affectibus oculorum frigidis ad clarificandum visum.	200
<i>Aquarum stillatitiarum</i> vsus.	50
<i>Aqua</i> in ardore vrinæ.	138
<i>de Arthritide.</i>	327
<i>ex causa calida.</i>	328
	cx

I N D E X.

ex causa frigida.	329
<i>Arantij mali flores.</i>	74
de <i>Auribus.</i>	194
<i>Auicenna error.</i>	48

B.

B Alneum pro calculo excernendo, emol- liens, relaxans, aperiens & meatus dila- tans.	302
Balneum in naturis biliosis, gracilibus & calidis, post inunctiones, refrigerans & abstergens.	327.
Balneum quod ad educationem foetus con- fert aperiendo vias.	323
<i>Baucia</i> semen & radix.	116
<i>Bibendum</i> non est in accessionum initio.	333

D E B O L O.

<i>Bolus</i> in morbis calidis bilem euacuans, ar- dorem restinguens.	24
<i>Bolus</i> bilem vehementius educens in mor- bis calidis	27
<i>Bolus</i> purgans minuendo in affectibus fri- gidis pituitosis.	ibid.
<i>Bolus</i> ad melancholica & nigra educenda.	28
<i>Bolus</i> purgans bilem in praegnantib.	169
<i>Bolus</i> cardiacus post diem purgationis.	145

I N D E X.

C.

- C**Alculus duplex. 310
Calor naturalis concoctionis author. 47
De Cancro. 243
Caphura in dente perforato utilis. 213
de Capitis affectibus. 64.65.183.192
Cardiaca aduersus lumbricos valent. 176
Cassia potionibus non addenda. 168
Cassuta aperit obstructions & mundificat
 hepar cum caliditate. 97
Castoreum. 180
de Catharro. 210
Catholicon potionibus additur. 186
 Cataplasma in immoderatis alui fluxioni-
 bus ab humore frigido calfaciens, astringens & dolorem sedans. 274
 DE CATAPOTIIS. 148
 Catapotiorum quantitas. 145
 Catapotiorum numerus impar. 150
 Quæ atram & adustam bilem repurgant.
 154
 Catapotia in affectibus *Thoracis* & *pulmonum* frigidis, quæ pituitam sensim & clementer educunt & cerebrum confortant.
 218
 Catapotia in affectibus *Ventriculi* calidis, quæ sensim repurgant clementer cum astringitione, bilem & quædam serosa educunt recrementa, 247

I N D E X.

Catapotia quæ roborant ventriculum & v- terum, & conceptum promouent.	317
Catapotia in doloribus <i>Articularum</i> à ma- teria calida quæ sedant dolorem cum o- pio correcto & bene represso.	327
Catapotia fluxum <i>Hæmorrhoidum</i> promo- uentia.	203
de <i>Catharticis</i> Medicamentis.	143
<i>Chamæmeli</i> flores cur in decoctis non ad- dantur,	60
<i>Citri</i> cortex calore iuuat concoctionem, spiritus instaurat, & astrictione roborat.	88
<i>Cinamomum</i> gratum vtero & menses mouet	200
<i>Clysteris</i> quantitas in pueris.	6
de <i>Conceptu</i> .	319
<i>Conditum</i> in affectibus <i>Thoracis</i> & <i>pulmonum</i> calidis refrigerando leniens & nonnihil corroborans.	220
<i>Conditum</i> in affectibus <i>cordis</i> , vti febribus æstuantibus, refrigerans, confortans.	234
de <i>Confortantibus</i> .	231
de <i>Cordis</i> affectibus.	231
D.	
D E <i>Decoctis</i> .	81
De <i>Dentium</i> dolore.	213
<i>Distamni</i> folia siccitate sua aquas absumunt, propellunt & expurgant.	206

I N D E X.

E.

- D**E *Electuariis* 24
- Electuar. solidum in morbis frigidis puitam euacuans. 25
- Elect. molle* in affectibus *capitis* calidis refrigerans & corroborans. 179
- Elect. molle in affectib. *capitis* frigidis recalfaciens & corroborans. 177
- Elect. solidum in affectibus *Thoracis* & *pulmonum* calidis refrigerans, incrassans & leniens. 224
- Elect. molle pro affectibus *Cordis* calidis refrigerans, omnem venenatam qualitatem propulsans, corroborans. 235
- Elect. molle in affectibus *Ventriculi* calidis refrigerans & corroborans. 249
- Elect. molle in affectibus *ventriculi* frigidis recalfaciens & corroborans. 249
- Elect. solidum in affectibus *ventriculi* frigidis calefaciens & corroborans. 251
- Electuaria pro hepate. 252
- Electuarium molle in affectibus *hepatis* calidis, refrigerans nonnihil, obstructions aperiens & corroborans. 260
- Elect. solidum in *testella* pro affectibus *hepatis* calidis refrigerans, aperiens obstructions & corroborans. 267
- Elect. solidum in affectibus *Splenis* frigidis ab obstructione *natis* recalfaciens, aperiens

I N D E X.

- riens obstructions, corroborans. 275
- Elect. molle in profluuiis *Alui* immoderatis refrigerans, astringens, & omnem pestilentem humoris qualitatem reprimens. 285
- Elect. molle leniens, abstergens & nonnihil laxans in vlceribus *renum & vesica.* 306
- Electuar. molle ad præcautionem & curationem *calculi*, urinæ vias exasperatas leniens, abstergens, & nonnihil paruos calculos frangens. 299
- Electuar. molle recalfaciens, discutiens, corroborans *uterum & ventriculum.* 314
- Elect. molle ad *conceptum* iuuandum. 315
- Electuar. solidum conceptionem iuuans & *mensēs* prouocans. 312
- Eclegma (id est, Lohoch Arabum) in affectibus *Thoracis & Pulmonum* frigidis recalfaciens, tenuans, disseccans & abstergens paululum. 224
- Emplastrum* efficacissimum in destillationibus *capitis*, præsertim à materia frigida, quod vim habet recalfaciendi & resiccandi. 189
- Emplastrum* in affectibus *Ventriculi* calidis refrigerans & confortans. 256
- Emplast.* in affectib. ventriculi frigidis recalfaciens, concoctionem iuuans, corroborans. 257

I N D E X.

- Emplastrum in affectibus *Splenis* ad eius durities emolliendas. 278
- Emplastrum pro strangulatu vteri recalcificans, digerens, emolliens, flatu discutiens. 310
- Emplastrum astringens, refrigerans continens in iis mulieribus, quibus renes & vterus caliditate æstuant, vt de abortu periculum immineat. 320
- Emplastrum ad foetum continendum in mulieribus, quibus renes & vterus ex frigidityate imbecilles sunt recalcificans & astringens. 321
- Emplastrum ad *rupturam*. 326

DE ENEMATIBVS.

- Enema eluens, astringens, & dolorem mitigans. 7
- Enema humiditate largiores alui faeces emolliens. 9
- Enema aluum emolliens. 10
- Enema emolliens & abstergens citra attractionem faeces & humores occurrentes. 11
- Enema refrigerans vel leuiter abstergens, humorem biliosum euacuans. 13
- Enema recalcificans, emolliens & abstergens non mediocriter pituitam educens. 14
- Enema potenter recalcificans, digerens, emolliens. 15

I N D E X.

- molliens, ex alto pituitam trahens ac reu-
uellens, vti in soporiferis affectib. 14
- Enema in colico dolore emolliens, discu-
tiens flatus, sedans dolorem & mediocri-
ter purgans plus pituitam quam bilem.
16
- Enema eluens, corroborans, dolorem se-
dans. 19
- Enula calculos frangit. III
- Epithema pro affectibus cordis refrigerans,
omnem malam putredinem coercens, &
alienum calorem mitigans. 242
- Epithema pro affectibus cordis frigidis, vt
in magna exolutione, recalfaciens, & spi-
rituum substantiam augens & corrobo-
rans. ibidem
- Epithema pro affectibus Hepatis refrigerans,
aperiens obstructions. 277
- Epithema pro affectibus hepatis frigidis re-
calfaciens, aperiens obstructions, & cor-
roborans. ibid.
- Epithema in Peste. 424
- Errhinum in affectibus calidis refrigerans,
abstergens & moderate attrahens, siue
expurgans. 205
- Errhinum in affectibus frigidis recalfaciens,
multum abstergens & attrahens & repur-
gans recrementa in anterioribus cerebri
ventriculis. ibid.

I N D E X.

F.

DE FEBRIBVS.

de Tertiana <i>Proportionali</i> dicta.	356
de Tertiana <i>non exacta</i> .	375
de Tertiana <i>Notha minoris fama</i> .	375
de Febribus <i>continentibus</i> quæ à sanguine proueniunt.	392
de Febribus <i>Phlegmaticis</i> .	398
de <i>Quotidiana</i> phlegmatica.	402
de Febribus à <i>Melancholiâ</i> .	408
<i>Quartanæ</i> febris, quæ ex conuersione alio- rum humorum fit, curatio.	414
De febre <i>Pestilenti</i> .	418
Febris larica maximam conuenientiam cum hectica habet, sunt tamen discrimina.	407
<i>Formula</i> pro affectibus capitis, cerebri & neruorum frigidis, recalcificantes & refri- gerantes.	80
<i>Formula</i> refrigerantes, astringentes, in ca- tharro ab humore acri & salso.	211
<i>Fotus</i> pro affectibus oculorum frigidis re- calcificans, abstergens, & tenuis essentiæ.	
<i>Fotus</i> in affectibus <i>Ventriculi</i> calidis ad re- frigerandum & corroborandum.	254
<i>Fotus</i> in affectibus ventriculi frigidis re- calcificans, roborans, & flatus discutiens, vt in rugitu ventriculi & inflatione. <i>ibid.</i>	
<i>Fotus</i>	

I N D E X.

- Fotus in affectib. *Hepatis* calidis refrigerans
& corroborans 270
- Fotus in affectibus *Splenis* propter diruriam
emolliens, & humores crassos exte-
nuans 277
- Fotus pro *colicis doloribus* in materia calida
moderatè refrigerans & sedans dolorem,
& moderatè recalfaciens propter flatus
qui semper coniuncti sunt in omni dolo-
re 288
- Fotus astringens in procidentia ani 292.
- Fotus qui vim habet siccandi & astringen-
di 325
- Frontale* refrigerans, somnum concilians, &
acrem dolorem mitigans 192
- Frontale* in dolore *Capitis* à materia frigida
vel mixta calfaciens, siccans, dolorem se-
dans & corroborans *ibid.*

G.

- Alli* antiqui decoctum 37
- G** DE GARGARISMIS. 209
- Gargarismus* & oris collutio ad affectus
frigidos *Cerebri* pituitam eliciendo neces-
sarius 182.
- Gargarism.* in affectib. *Oris* partim calidis par-
tim frigidis ex materia mixta repellens &
resolvens

I N D E X,

- Gargarism. in affectibus oris calidis, ut in inflammatione, distillationibus &c. refrigerans, repellens, & non nihil astringens. ibidem
- Gargarismus in affectibus oris frigidis in statu & declinatione anginae ad resoluendum & paululum astringendum 210
- Gargarismus pro doloribus *Dentium* à materia calida excitatis, refrigerans, sedans, refranans & mitigans dolorem 216.
- Gargarism. in doloribus dentium à materia frigida recalescens, abstergens & extenuans crassos humores. ibid.
- de *Glande* 5
- Globuli* in affectibus *Capitis*, refrigerantes & odore iucundi. 207
- Glycyrrhiza* leniendo valet, siccitatem in morbis biliosis retundit, dicta *αδύος* 54

H

- H** *Aemorrhoidum* affectus 292
- de *Hepatis* affectibus 259
- Hepatis* electuaria 260
- Hepatis* praesidia topica 268
- Herba* bili adusta conuenientes 63
- de

I N D E X.

de <i>Hernia</i>	324
<i>Hirci præparati sanguis</i>	299
<i>Hordeum</i> prætermitti non debet in enema	II
<i>Hordeum</i> pituitosis affectibus non conuenit	16
<i>Humores</i> quando turgere dicuntur	43
<i>Humores</i> Apozematis apparandi	50
de <i>Hydrargiro</i>	350
de <i>Hydrargiro</i> pro pueris	353

I

I LLITVS in affectibus <i>Capitis</i> calidis ad repellendum vaporum acium influxum.	191
<i>Illitus</i> in affectibus <i>capitis</i> à frigidâ & mixtâ materiâ obortis, abstergens, resiccans, dolorem sedans	ibid.
<i>Illitus</i> pro affectibus <i>Aurium</i> calidis, refrigerans & mitigans dolorem leniendo	195
<i>Illitus</i> pro affectib. <i>aurium</i> frigidis recalcificans, siccans & abstergens	ibid.
<i>Illitus</i> in affectib. <i>Thoracis</i> & <i>pulmonum</i> frigidis recalcificans, leniens & relaxans	225
<i>Illitus</i> pro calculo <i>Renum</i> & <i>Vesica</i> in	** ij.

I N D E X.

quo inflammatio & ardor coniuncta sunt, leniens & nonnihil refrigerans	304
Illitus in strangulatu <i>uteri</i> calfaciens, digerens	305
<i>Infantes</i> leuioribus & mitioribus medicamenti euacuandi	171
DE INSTAVRANTIBVS	238
de <i>Intestinis</i>	279
Iulapia ad bilis flauæ ferociam & amaritudinem educendam adiuuenta	349

L

L Actuca oculis inimica	67
<i>Lepus</i> marinus	91
Lotio pro affectibus <i>capitis</i> calidis, vt in mania & phrenitide quando cerebrum ad firmitatem terminatur	182
Lotio & balnei vice præsidium in <i>Tenesmo</i> à materia calida refrigerans, astringens & nonnihil sedans dolorem	291
Lotio & balnei vice præsidium in <i>tenesmo</i> à materia frigida, recalfaciens, nonnihil astringens & materiam summouens ibidem.	
<u>Lotium</u> dandum post <u>medicamentum</u>	scam-

I N D E X.

scammoniatum aut aliquod vehemens	
149	
ad <i>Lumbricos</i> enecandos	145
Lumbricis necandis conferunt <i>cardiaca.</i>	
172	

M

M <i>Edicamentum</i> minuens quid sit	3
M Medicamentum minoratiuum	4
Medicamenta minuentia initio semper debent fieri	5
Medicam. quæ per os assumuntur	21
Medicam. minoratiua duplicia	31
Medicamenta Cathartica	143
Medicamenta purgantia varia	144
Medicamenta quædam venenata	145
Medicamenta corroborantia	173
<i>Mel</i> rosatum colatum purgat mucosa & pituitosa	34
de <i>Mensibus</i> suppressis	317
<i>Mina</i> cytoniorum vlcera astringit	8
de <i>Morbo Gallico</i>	328
In eo vinum fugiendum, & quando permit- tendum.	329
Morbus omnis simplex vel compositus	1
Morbi omnes triplici instrumento curantur	2

I N D E X.

N

N <i>Arium</i> remedia	204
ad Narium foetorem globuli	206
ad Narium hæmorrhagiam	ibid.
de <i>Nephritico</i> dolore	295
<i>Noduli</i> contra lumbricos	282

O

O <i>Culorum</i> affectus	196
In affectibus oculorum calidis quando lippitudo acris & inflammatio infestare solent, remedia	199
ad dolores Oculorum sedandos pomum semiputre confert	ibidem
<i>Oleum</i> oculis inimicum	197
Olea non miscenda in lumbricis	10
Olea refrigerantia	256
<i>Oleum Chamameli</i> omnibus ex æquo convenit	12
<i>Oleum ex Gagale</i>	308
<i>Oriza</i> torrefacta vim inspissandi habet	8
<i>Opiata</i> biliosa & serosa repurgans	261
<i>Opiata</i> in affectib. <i>Hepatis</i> frigidis pituitam & crassos melancholicos humores sensim repurgans	ibid.
	<i>Passula</i>

I N D E X.

P

P <i>Assula</i> in Hydrops	107
de <i>Pastis</i>	226
<i>Pandaleon</i> seu <i>Pasta</i> regalis affectib. pulmon. calidis, leniens, humectans, refrigerans & reficiens cum moderata frigiditate & tem- perata qualitate	ibid.
<i>Penidia</i> abstergant & iuuant sputi eductio- nem	80
<i>Pentaphilli</i> radix	93
contra <i>Pestem</i>	237
<i>Pestilentia</i> tempore vehementer soluentia non danda	418. 419
in <i>pestilentia</i> tempore Restaurans	422
in <i>Peste</i> Epithema	ibidem
<i>Pessarium</i> paruum ad nuclei dactyli formam, quod intra uterum iniiciatur recalfaciens, expurgans, confortans uterum ad conce- ptionem iuuandam	316
<i>Pessarium</i> quod menses educit	319
in <i>Phrenitide</i> herbae conuenientes & semi- na	64
<i>Pilulae</i> lucis ad oculos	22
<i>Pilulae</i> ad praecauionem <i>pestilentiae</i>	418
de <i>Pleuritide</i>	230
de POTIONIBVS	158
<i>Potio</i> in affectibus calidis <i>bilem</i> repurgans cum alui immoderatos fluxus a bile & pi-	

I N D E X.

- tuia excitatos purgando, & astringendo
simul necesse est cohibere 159
- Potio purgans pituitam cum scammoniis
medicamentis & decoctione peculiari i-
bidem
- Potio purgans nigra, serosa & adusta sine
scammoniatis medicamentis 164
- Potio purgans bilem prægnantibus omni
tempore 170
- Potio purgando minuens in affectibus cali-
dis biliosis 31
- Potio purgans minuendo bilem educens sed
cum aquis stillatitiis 32
- Potio quæ minuendo purgat pituitosa &
crassa, quæ promouet, purgat, vias ob-
structas aperiendo, & dilatando, & sic-
cando, & pituitam crassam extenuando
33
- Potio purgans minuendo ad pituitam euo-
candam cum aquis stillatitiis 34
- Potio purgans minuendo melancholiam ni-
gram & adustam ex decoctione variorum
medicamentorum 34-35
- Potio in calidis *Capitis* affectibus, refrige-
rando immutat & confortat, vt in phreni-
tide 175
- Potio in frigidis capitis affectibus, vt in apo-
plexia, caro, lethargo &c. recalfaciendo
corroborans 176

Potio

I N D E X.

Potio roborans in affectibus <i>Thoracis & Pulmonum</i> calidis refrigerando leniens	219
Potio roborans, recalfaciens, abstergens & sputi eductionem promouens, vt in asthma	218
Potio in affectibus <i>Cordis</i> calidis refrigerans	232
Potio in affectibus cordis frigidis recalfaciens, & spiritus corroborans,	ibid.
Potio in affectibus <i>Ventriculi</i> calidis refrigerans corroborans, vt in cardiagmo	249
Potio in affectibus ventriculi frigidis calefaciens concoctionem iuuans & roborans.	ibid.
Potio <i>lumbricis enecandis</i> , quando caliditas & febris simul coniuncta sunt	281
Potio <i>lumbricis enecandis</i> accommodata quando nulla caliditas subest	ibid.
Potio in doloris insultu <i>calculum</i> frangens & comminuens	284
Potio alia <i>calculum vesicæ</i> frangens, qui vehementioribus eget præsiidiis	ibid.
Potio quæ <i>fœtum</i> excutere valet & prægnantem roborare	322
Potio <i>somnifera</i>	392
<i>Præparatio</i> quibus morbis conueniat	4
<i>Prægnantibus</i> quæ conueniant	167

I N D E X.

Pulli columbini mirabili sunt artificio in
phrenitidis malo reprimendo 184

D E P V L V E R I B V S.

<i>Pulvis</i> diluendus cum aliquo liquore ad <i>Bilem</i> educendam	37
<i>Pulvis</i> ad <i>Pituitam</i> educendam in morbis frigidis	38
<i>Pulvis</i> serosa adusta & pituitosa repurgans	39
<i>Pulvis</i> pro pueris	172
<i>Pulvis</i> calculos comminuens, aperiens & extenuans crassos humores in vesica & renibus	301
<i>Pulvis</i> in ulceribus <i>Renum</i> & <i>Vesicae</i> abstergens & leniens	306
<i>Pulvis</i> potenter <i>Menses</i> ducens	319
<i>Pulvis</i> ad <i>Conceptum</i> retinendum	320
<i>Pulvis</i> <i>Cicadarum</i> ad dolores & ulcera vesicae valet	306
<i>Pulvis</i> ad <i>Tineas</i>	188
<i>Pulvis</i> <i>CrySTALLI</i>	272
<i>Purgatio</i> fit in motu	58

R

R *Adices* quinque aperitiuae non praescribenda
79
Saccus

I N D E X.

S

S <i>Acculi</i>	241
Sacculus in affectibus <i>Cordis</i> calidis refrigerans, spirituum substantiam augens	ibid.
Sacculus in affectib. cordis frigidis recalcificans & spirituum substantiam augens & recreans	242
Sacculus pro affectibus <i>Ventriculi</i> refrigerans & corroborans	258
Sacculus in affectib. <i>Ventriculi</i> frigidis recalcificans concoctionem iuuans & corroborans	ibid.
Sacculus in affectibus <i>Hepatis</i> calidis refrigerans & corroborans	273
Sacculus in affectib. <i>Hepatis</i> frigidis recalcificans, obstructions tollens, corroborans	ibid.
Saccharum <i>Rubrum</i> abstergit citra caliditatem & nulla tormina parit	146
de <i>Salsa Parigi</i>	347
de <i>Sanguinis missione</i>	40
<i>Scammoniata</i> vim intestinorum dissolvunt	18
<i>Senna vesicæ inimica</i>	107
<i>Senna vtero inimica</i>	116

I N D E X.
DE SERAPIIS

127.

- Serapia* in affectibus *Capitis* calidis refrigerantia, humectantia & adustionem mitigantia ibidem
- Serapia* in affectib. capitis frigidis recalcificientia, extenuantia, & digerentia crassos & lentos humores 128
- Serapia Oculorum* 129
- Serapia* in affectib. oculorum frigidis, quæ recalcificiunt, extenuant & vapores discutunt ibid.
- Serapia* in affectib. *Thoracis & pulmonum* vt in peripneumoniâ, pleuritidè & consimilibus 131
- Serapia* in affectibus *Cordis* calidis, vt in febribus ardentibus & malignis 133
- Serapia* in affectibus cordis frigidis, vt tremore, tristitia, exolutione, syncope cardiaca 134
- Serapia* pro affectibus ventriculi frigidis, vt in magna cruditate, inflatione, & consimilibus 135
- Serapia* in affectibus *Hepatis* calidis vt in inflammatione, æstuatione, psoa & lepra ibi.
- Serapia* in affectibus hepatis frigidis, vt in magnis obstructionibus, cachexia, & hydrope 136
- Serapia*

I N D E X.

- Serapia in affectibus frigidis splenis vt in ob-
structione à limoso & recremento melan-
cholico, duritia, inflatione, tensione, ac i-
cteritia nigra. 137
- Serapia in affectibus frigidis, renum, vesicæ
& viarum vrinæ, vt in phrenitide, calculo
& obstructione 138
- Serapia *Vteri* 139
- Serapia in affectibus vteri frigidis vt in do-
lore à flatibus, hysterico pathemate, vteri
strangulatu ibidem
- Serapia *Articulorum* 140
- Serapia in affectib. articulorum frigidis 141
- de Serapiis *Magistralibus* 262
- Serap. magistrale in affectibus hepatis frigi-
dis, vt in cachexia, hydrope, recalfaciens,
aperiens obstructiones, pituitosa & serosa
educens, & corroborans. 264
- Serap. magistral. ad menses educendos
317
- Sicla* succos aluum mouet 12

DE SINAPISMIS. 183

- Sinapismus pro affectibus capitis frigidis
recalfaciens resiccans & corroborans.
185
- Sinapismus pro affectibus capitis externis in
areis, capillorum casu & ophiasis 187

I N D E X.

de <i>Splene</i>	275
Splen acidis gaudet	96
Quæ Splen iuuent.	275

DE SVFFITIBVS.

Suffitus pro affectibus <i>Aurium</i> calidis, refrigerans & sedans dolorem	194
Suffitus in strangulatu <i>Vteri</i>	309
<i>Syruporum</i> quantitas	62
Syrup. de <i>cardiua</i> compos. phrenitidi non confert	127

T

T <i>Amarindi</i> bilem euacuant	33
<i>Tamaris</i> planta tota ad affectus splenis accommodata	101
de <i>Thoracis</i> affectibus	218
de <i>thoracis</i> affectibus externis	218
<i>Trochisci</i> pro suffitu	315
<i>Triphera persica</i> pestilentiaæ tempore in biliosis danda	419.422
<i>Turpetum</i>	37

V

V <i>Acuationem</i> vacuationi addere periculosum	41
--	----

Vena

I N D E X.

<i>Vena sectio</i> quando instituenda, & in quibus morbis.	41.395.394
de <i>Ventriculo</i>	245
<i>Veruecis</i> cor in alui fluxibus immoderatis singulare præsidium est	284
<i>Vinum</i> epotum post bolum plurimum confert	153
ad <i>Visum</i> clarificandum	202
de <i>Ulcere</i> oris	212
<i>Unguentum</i> in affectibus <i>Oculorum</i> externis, & palpebris à materia frigida, recalcificans moderatè & abstergens	204
<i>Unguentum</i> in affectibus <i>Narium</i> ex ulcere resiccans & abstergens	208
<i>Unguentum</i> in affectibus <i>Thoracis</i> & pulmonum frigidis recalcificans, relaxans, discutiens	229
<i>Unguentum</i> in <i>Carcinomate</i> multum resiccans in mammis	244
<i>Unguentum</i> pro affectibus <i>Hepatis</i> calidis refrigerans, corroborans	271
<i>Unguentum</i> pro lumbricis enecandis, quando caliditas subest	282
<i>Unguentum</i> laxans, aperiens, dilans vias, leniens cum caliditate, <i>calculi</i> excretionem promouens	303
<i>Unguentum</i> ad educationem <i>Fœtus</i> , relaxans, emolliens	323
<i>Unguentum</i> ad <i>ventriculum</i> corroboran-	

I N D E X.

dam	401
Vnguentum in rigore insigni cum frigiditate	384
Vomitum quæ impediãt	161
de <i>Vrina</i> suppressione	301
<i>Urtica</i> semen crassos humores à pectore extenuat & educit	79
de <i>Vtero</i>	307
<i>Vtero</i> conueniunt medicamenta calida	308

Z

Z <i>Edosria</i> puluis omnem aërem pestilentem expellit.	237
<i>Zyzipha</i> sanguinem & spiritum plus æquo frigidum temperant	71.85

F I N I S.





X

INSTITVTIONVM
MEDICINÆ FACIENDÆ,
SEV METHODVS MEDENDI
aduersus plerosq; morbos,
Libri tres.

* *
*

CAPVT PRIMVM.

IN omni morborum curatione
non solum morbi naturam
nosse oportet, sed etiam cau-
sas & signa, quibus in illius co-
gnitionem perueniatur: Nam
omnis morbus aut est simplex & sine mate-
riæ influxu, vt intemperies frigida, humi-
da, calida, & sicca: vel combinatus; vt maras-
mus simplex vel compositus, vt febris hecti-
ca: aut ex materiæ affluxu, qui his notis ab
altero distingui potest, Plenitudine, Ten-
sione, Grauitate, Pulsus inæqualitate: vel
denique ex euentu sanationis, qui fit per e-
uacuantia remedia, dum illi ipsis adhibitis

A

ex humoris excretionē, horum peculiaris materia, morbi causa educitur. Cæterum omnes morbi curantur hoc triplici instrumento, Diæta, Chirurgia, vel Pharmacia. Medicamenta quorum ratio hîc præcipuè examinanda est, aut alterant, aut euacuant antecedentem vel coniunctam causam, minuendo, aut purgatione, aut phlebotomia. Illud enim est præceptum Galeni in arte medicinali, in morbo qui ex influxu materiae contingit omnem primò causam esse tollendam, deinde veniendum ad intemperiam genitam: & ex Hippocrate. 2. aphor. 29. illud semper moliendum circa morborum initia, Si quid videtur mouendum moue. Quæ particula adiecta humoris partem esse detrahendum rectè consulit medicamento minuente, in his præsertim morbis, qui ex sanguinis vbertate consistunt, ne suffocationis impediatur periculum. Item in his qui ex pituita oriuntur, quæ in corpore abundat plus reliquis aliis, vt facilius quod superfuerit euacuetur. Tertio loco melancholia ortis & genitis, cum sit crassa & terræ modo sicca, vna aut altera vice ad excretionē tota submoueri non potest, ideo minuenda & per partes vacuanda. Postremò in morbis à bile natis, quæ cum tenuis sit, & in corpore non multum excedat, non ea eget imminutione, nisi

nisi vel turgeat, vel bilis sit vitellina, & cum huic pituita permista est. Porro minores medicamentum sic definire voluerunt posteriores medici. ut lenitate vim habeat ad educendum. siue per sedem subiiciatur, siue per os assumatur, & ex viis ductuum, nempe ventriculo, intestinis, primis mensenterij venis, non modo feces & alui excrementa. sed etiam humores educere potest; promptos vero sequi, interdum ex longinquis constitutione ad id quod euacuatur excernere valet. Aliud est huiusmodi, ut non solum ex illis alui finitimis viis educat, sed etiam ex remotis & longinquis, vi purgandi maiore: & ob id partem humoris causae antecedentis submoueat.

Distinguitur autem à cathartico, id est vehementer trahente medicamento quod eradicatum barbari appellant, nimirum dosi minore, & propterea quod ex toto morbi causam non auferat. Minuentia itaque medicamenta materias communes & antecedentes exigunt, ut purgantia coniunctas subducunt: sicuti diaphoretica eam quae à venis diffusa est sub cute, & habitu corporis, manet in nervis impacta, & in articularum canis delitescit. Interdum tamen ea in faucibus venarum & arteriarum commota, cathartico euocari poterit. Verum causa coniuncta per

METHODVS.

4
 euacuantiã præsidia detrahitur quod fit per
 propinquam viam & emissarium propin-
 quum, in quo ille humor subsidet, ^{δοτικαιοσις}
 appellat Galen. velut post vniuersalem pur-
 gationem humoris antecedentis in capite,
 per nares, erryna: per palatum apophle-
 gmatismi è propinquo loco deriuant & cau-
 sam continetem tollunt: in thorace, becchi-
 cistussis materia per sputum euacuatur: hu-
 mor noxius In ventriculo, vomitu: In aluo
 glandibus, clisteriis, & ex venis, quæ ada-
 num desinunt, sanguinem melancholicum
 prolicimus: ex renibus & vesica vrinas mo-
 nemus, per vterum menses. In habitu corpo-
 ris vel balneo, vel frictionibus vel aliis præ-
 sidiis materiam continentem vel in halitum
 digerimus, vel sudore euacuamus, addas li-
 cèt venæ sectionem topicam, quæ non ita
 communem materiam antecedentem tollit,
 vt prima, sed particularem, & quæ incisione,
 & scarificatione perficitur, vt in ingenti in-
 flammatione parti suborta, ne gangrena ac-
 cidat, sanguinem è propinquis venis tan-
 quam materiam coniunctam minuimus at-
 que euacuamus.

Quamobrem vt iis omnibus bene vta-
 mur, iam aggrediamur per minuentia me-
 dicamenta, quæ semper initio præscribi de-
 bent. Ea per os assumpta dicimus, quedam
 esse.

M E D E N D I.

esse leuiores, quædam uehementiores: sic glandes paramus tractu vel breuiore vel longiore, quibus aluum irritamus, quando quid aliud dissuadet quominus enema subiiciamus, aut medicamentum per os propinemus, ueluti in peripneumonia, pleuritide, inflammatione interna, quæ præcepit in euacuando auxilium venæ sectionem cum exigant, non satis relinquunt temporis ut huiusmodi præfidiis antea dictis utamur.

C A P V T I I.

De Glande.

GLANDEM igitur subiicies quæ aculeo pungit, longitudine deturbat alui excrementa in propinquo hærentia, abstersione, & acrimonia facultatem expultricem stimulat: ut purgandi, quibusdam medicamentis immixtis, non modò fœces, sed humores reuellit & euacuat, ueluti in apoplexia & aliis affectibus.

℞. pulu. colocyn. hier. pier sal. gemm. ana.
 ℞. s. mell. de spum. ʒ. j. f. glandes, supponatur
 vnus aut alter.

ENEMATA subiiciuntur pro variis scopis, Quaedam enim eiusmodi sunt, quae in alui fluxu vtiliter adhibentur, quorum materia debet esse talis, vt in initio non astringant, sed eluant: in progressu partim eluant partim adstringant, in fine solum adstringant & consolident.

Enema abstergens, leniens & dolorem mitigans, praesertim cum alui fluxus pendet à materia acris & salsa.

℞ decoct. hordei integ. lib. i. non est addenda maior quantitas quàm par sit, ne intestina ab immodico alui fluxu irritata debilitentur, sufficiet in pueris ad quart. ij. aut iij. ad abstergendum virulentum humorem, ne vlcus maius efficiatur, & aluum plus a quo stimulet. Sacchar. rubr. & mellis rosa. colat. an. ℥. j. Olea non sunt addenda, quia plus quàm par sit lubricant, nisi fortè cum studium sigillandi & adstringendi sit, etiamsi adstringant, tamen suo lentore lubricant, ideo non ponenda, vt ex oleo Cytoniorum & Myrtillorum parare interdum expedit, Adde vitellos ouorū, num. ii.

vitelli ouorum mitigant & leniunt, & morsam auferunt. Præterea conferunt vt aliuus tale enema melius retineat, cum vice alimenti sit: idcirco illos probo qui in enematibus fere semper adiiciunt vitellos ouorum vt possit commodius retineri, & sic valentius vires suas exerunt. Medicamenta quæ in enemate sunt addenda progressu fluxus alui & vlcis intestinorum non solum eluentia, sed etiam adstringentia erunt.

Enema eluens, adstringens & dolorem mitigans.

℞. Folior. plantagin. bursæ pastoris & rosar. rubear. an. m. j. fiat omnium decoctio in aqua hordei perfectè cocti, si volueris magis adstringere & eluere: si detergere visum fuerit potius quàm inspissare aluum immodicè fluentem, adde vel leuiter vel mediocriter cocti.

De colatura

℞. Lib. j. in qua dissolue Sacchari rubri vt abstergat & miuæ citonior. vt adstringat. an. ℥. j. adde vitellos ouorum, num. ij. nunquam prætermittenda in eiusmodi affectib. omni tempore morbi, tum ad doloris sedationem, tum ad meliorem retentionem in morbi declinatione dum

alius immoderatè fluit. & vlcus genitum est, omnino adstringentia erunt prescribenda, & ea qua callo obducunt partem vlcere affectam.

*Enema adstringens cicatricemq;
inducens & mitigans.*

℞ Rosarum rubear. p. ij. Balaustior. p. j. Acacię hypocistidos, an. ℥ β. Interdum adde-
re cōuenit oryza torrefacta, quia vim inspissandi
habet & ea torrefactione magis adstringit. Ali-
qui item appositè hordeum torrefactū imponunt
pug. j. ad pug. j. & β. fiat decoctio in aqua
chalibeata. De colatura accipe ℔. j. in qua
dissol. succi vel miuę cydoniorum ℥ iij. cum
plene adstringere volueris vlcera, addes seui
hircini ℥ j. vitel. ouor. numero ij. Misce, fiat
enema, subiiciatur omni hora ante cibum.

In exolutis autem à morbi diuturnitate
& eius pernicie, vt in febribus continuis
& pestilentibus, doloribus clamosis, ali-
qua immoderata euacuatione debilitatis, &
plus æquo exsiccatis, vri à spasmo, ab ina-
nitione, febre hectica, cōsumptis, emaciatis
ab importuno vsu hydrargiri, & vnguentis
calorificis, salutaria sunt enemata, quę le-
uiter leniendo valent, refrigerando & nu-
triendo plurimum possant.

℞. Decoctionis pulli ℔. j. trium
flor.

flor. cordial. hordei mundati aut non mundati *si plus abstergere cupis.* ℞. j. in qua dissoiue sacchari rub. ℥. ij. nam *præterquam abstergit, nutrit addas vitell. ouor. num. ij qui etiam in nutrimentum abeunt & leniunt dolorem.* Misce, fiat enema, subiiciatur mane & sero longè à cibo.

In siccitate alui immoderata, vel ab intemperie morbosa, vel ab intemperie naturali ex insigni hepatis caliditate, quoniam in alui excrementis quod humidius & tenuius omnino absumitur, quod crassum est aduritur; inspissatur & coit non nisi vehementer humidioribus, alius duci potest in seq. modum.

*Enema alui fœces humiditate
emolliens.*

℥ Maluar. altheæ violar. an. m. j. seminis lini *quamuis obsit caliditate, humiditate largiore plus proficit,* quatuor seminum frigidor. maior. leuiter contusorum an. ℥. iiij. hordei integri pug. j. fiat decoctio ex capite Veruecis & eius intestinis. De colatura accipe ℞. j. aut j. & ℞. *quia in his ob siccitatem uberior humiditas iniicienda erit quam in aliis enematis,* addendo olei violacei ℥. iiij. aut iiij. aut olei nymphæ *eodẽ modo & mēsurā: in lū-*

Enema aluum emolliens.

℥. Viol. mal. alth. an. m. j. trium flor. cordial. an. p. j. florum camomæli & meliloti an. p. s. hordei integri. p. j. prunorum dulcium, passularum mundatarum, caricarum pinguium, sebesten. an. paria vj. fiat decoctio. De colatura accipe pro infantibus quartar. ij. pro adultis quartar. iiii. pro grandioribus ad ℥j. In colatura dissolue cassiæ ℥. s. si plus in adultis ad ℥. j. vel ℥. vi. mellis rosati colati tantundem, fiat enema, iniiciatur sero & mane longè à cibo. In aluo ducenda, omni corpori, etati, morbo & ad eam emolliendam citra admistionem medicamentorum purgantium, enemata constare debent ex herbis emollientibus & abstergentibus, floribus rarefacientibus & hordeo, quod in clystere nunquam prætermittitur ob moderatam suam abstergendi facultatem, fructibus lenientibus & abstergentibus simul. Eaque tunc adhibenda erunt, cum vel præcesserit antea alui fluxus & postea cohibitus est, vel cum bene signis animaduersis de alui fluxu instante periculum impendet.

* *

* *

*Enema emolliens & abstergens fœces
& humores occurrentes citra
attractionem.*

¶ *Quinque herbar. emollientium & se
uolueris magis aluum stimulare ultra has mer-
curialis, ciclę an. m. j. trium florum cord. flor.
camæmeli an p. j. hordei integri & furfur.
bene macri. interdum includere expedit in pã-
no raro, quia abstergēs vis quæ tenuis est, sic de-
ponitur, & quod crassū est in linteo detinetur,
an. p. j. Prunorum dulcium, passularum
mundatarum caricarum pinguium an. paria
vj. fiat decoctio ad ℥. j. & β. in colatura dis-
solue sacchari rubri, mellis rosati colati an. ℥.
j. olei Camæmelini, quia temperatum omni-
bus enematis ex æquo conuenit, vel communis
℥. iij. quando plus aluum mouere expedit utili
& prompto remedio, succi mercurialis, vel cy-
clæ ad ℥. j. vel ij. addere poteris.*

*Vt ad morbos enemata quædam subii-
ciuntur quæ emolliunt & leuiter aluum
subducunt: Sic etiam ad immutandum
temperamentum, vel calidum vel frigi-
dum, & tum maxime ad bilem & pituitam
exigendam accommodantur. Enemata quæ
biliosis affectibus adhibentur consistunt iis*

emol-

emollientibus, quæ minori abstersione valeant; & caliditatem vehementiorem non relinquunt, quia aluum emolliendo plus proficiunt: herbæ, flores, & semina quæ refrigerant non sunt prætermittenda, humiditate siccitatem corrigendo plurimum iuant & abstergendo fœcum & humorum excretionem parant. Addenda præterea medicamenta cathartica simplicia & composita, leuiora, & clementiora, quæ bilem & humores acres educant.

Enema refrigerans vel leuiter abstergens: & humorem biliosum euacuans.

℞ maluæ violar. parietar. an. m. j. folior. Lactuæ quamuis inspissare videantur, in superficie abstersionem & remolliendi vim continent, indicio est quotidianus vsus lactucarum in iusculis qui aluum subducit, cucurbitula & rasura eiusdem, quando earum est opportunitas, an. m. ß. trium flor. cordial. & nymphæ an. p. j. quatuor seminum frigidor. maiorum leuiter contusorum, cum refrigerare volumus: si verò abstergere volumus non contundantur.

an. ʒ. ij. prunorum dulcium *si magis emollire intentio fuerit* passularum mundatarum, non sunt addenda carica, quia facile inflāmantur, an. paria vi. vii. vel viii. Tamarindor ʒ. β. fiat decoctio ad ℥. j. & β. In colatura dissolue Cassiæ recenter extractæ & cum saccharo reseruatē ditionibus, non cum melle cum sit calidum facile exardescit. diaprun. simpl. an. ʒ. j. quando bilem vehementius educere studium est augebis modum cassiæ ab ʒ. j. & β. ad ʒ. ij. addes diapruno. solut ʒ. β. solutiuum enim recipit scammonium, ideo fortiter mouet, Si bilis vitellina fuerit loco illius adicies diaphœnici tantundem, quia bilem & pituitam euacuat, Mellis violati ʒ. j. & β. olei violacei & Nymphaeę an. ʒ. ij. Misc. & fiat enema, subiiciatur mane & sero ante cibum.

Enemata quæ calefaciunt vsurpanda in morbis frigidis & à pituita natis, quæ vel in propinquiorebus vel in longinquiorebus delitescit: ex his quædam leuiora, quædam vehementiora præscribi poterunt, à propinquiorebus herbæ remollientes & mediocriter abstergētes detractiōni sufficiant, flores ex caliditate temperati. Semina quæ mediocriter flatus discutiant & pituitam extenuando iuuent, fructus item probè abstergentes, medicamenta purgantia, quæ

mediocritate sua pituitam euocent, olea calore temperata valeant.

*Enema calefaciens, emolliens & abster-
gens mediocriter pituitam non
vehementiori vi purgan-
di educens.*

℞. Omnium herbar. remollitiuarum,
an. m. j. florum Camomæli, meliloti & ro-
sarum an. p. j. seminis anisi, fœniculi & lini
an. ʒ. ij. hordei integri. *Etsi frigidum sit, quia
in frigiditate non excedit, ut inde noceat, abster-
tione tamen sua pituitam sequentem euocat ex
propinquis viis, furfuris benemachi ac in
panno turo ligati, p. j. probè mucosa intestino-
rum excrementa eluit, canicarum pinguium,
passularum mundatarum, prunorum dul-
cium, an. paria vi. seminis chartami le-
uiter contusi, si plus pituitam ducere tentes,
ʒ. j. sin minus, ʒ. ss. addere etiam non alienum
erit, ʒ. ss. agarici, sin minus ʒ. ij. fiat de-
coctio ad ℔. j. vel ss. in colatura dissolue
hieræ picræ Galeni, & electuarij catholici,*

uniuersim in omnibus morbis utiliter adhibetur, an. ℥. β. eadem mensura & diaphen. præscribitur, sacchari rubri, mellis rosati colati, purgat enim lentam pituitam, an. ℥. j. olei camæmelini aut de lilio ℥. iiij. si sopita fuerit vis, salis ℥. ij. adiace. Milce, fiat enema.

Enemata quæ ex longinquis partibus, vti cerebro, nervis, articulis & vtero ad pituitam euocandam vsurpantur sunt ex ea materia vt herbæ emollientes ingrediantur, sed etiam quæ multum calefaciunt, vt extenuandi & digerendi vi qua sunt prædita pituitam crassiorem ad expulsionem promptiorem reddant flores calidi, semina calidiora, quæ pituitam suo naturali impulsu proliciunt, vehementiora validioraque quam prius adhibenda sunt, simul ac olea multum calorifica necessaria erunt, & salis species quæ sopitam vim expultricem validè stimulent.



Enema

*Enema potenter calefaciens, digerens,
emolliens, ex alto pituitam tra-
hens, ac reuellens, vtile in
soporiferis affe-
ctibus.*

℞. Brancæ vrsinæ, parietariæ, siclæ,
mercurialis, ea præsertim adhibenda in vteri
affectibus, an. m. j. centaurei minor. origani,
calamenti, pulegij, an. m. ℞. in affectibus capi-
tis vti spasmo, paralyssi sequentes profunt, Sal-
uia, camepith. sampsuc. an. m. ℞. florum
stecados rorismarini, samplici, florum ca-
momillæ, meliloti, nunquam sunt prætermitt-
tendi, an. p. j. Seminis sceseleos, ligustrici,
anisi & fœniculi, an. ℥. ij. seminis lini, &
fœnugr. an. ℥. ij. hordeum prætermittendum
est in pituitosis affectibus furfuris bene macri
& in panno rato ligati p. ij. caricar. pingu.
par. iij. seminis carthami ℥. j. pulpæ colo-
chintidos, si eam non adhibeas postea in co-
latura dissolue, hieram diacoloclyntid. ab ℥.
℞. ad ℥. vj. fiat decoctio ad ℔. j. ℞. in cola-
tura dissolue hieræ picræ Galeni, si magis
attrahere volueris, hieræ Hermetis vel Lo-
godij. ℥. vj. diaphœnici, ℥. ℞. sacchari rubr.
mellis Anthosati an. ℥. j. olei liliacei, vel iri-
ni, vel rutacci, hæc gradibus valentiora o-

B

lea, cum materia multa est & frigida, posteriora vsurpanda, an. ʒ j. sal. gemm. ʒ j. aur ij. Misce, fiat enema.

Enemata quædam interdum conficimus quæ flatus non solum discutiant, sed etiam expurgent & aluum mediocriter subducant, cum doloris sedatione: constant ex herbis remollientibus & abstergentibus, floribus rarefacientibus, & mitigantibus, flatus discutientibus, fructibus lenientibus & abstergentibus, medicamentis purgantibus plus pituitosa quàm biliosa, moderata caliditate, quæ interim non dissoluant robur partium naturalium adiectis oleis lenientibus & digerentibus.

Enema in Colico dolore emolliens, discutiens flatus, dolorem sedans, & mediocriter purgans plus pituitam, quàm bilem.

℞. malux alth. quia nõ modò aluum emollit, sed etiam pituitam attenuat & dissecat, præsertim radices eius, ideo calculos comminuit, paxietar. branc. vrsinæ an. m. j. centaurei minor. m. ʒ. amarore enim suo ab in farctu liberat & pituitam lentam expurgat. Florum camæmeli, & meliloti an. p. ii. Magna horum quanti-

tas addenda est, quia praterquam quod discutunt, dolorem mitigant, Flor. sambuci p. j. quia resolviendo & calefaciendo plus valet quã dolorem sedando, ideo minor quantitas apponitur. seminis lini, fœnugr. non solum discutunt, sed dolorem etiam sedant an. ʒ. ʒ. seminis anisi & fœniculi an. ʒ. ii. quando potentiùs flatus volueris discutere conueniet admiscere seminis cumini ʒ ii. furfuris bene macri & in panno raro ligati p. ii. caricar. ping. sunt enim accommodata in omni dolore, quia concoquunt & mitigant passul. mandat. an. par. viii. pruna dulcia non erunt addenda, quia plerunque flatus gignunt, nisi eiusdem caloris adscititiij remittendi consilium sit, fiat decoctio ad lb. j. imò ad ʒ ix. ne moles clisteris extendat plus aquo colon intestinum & dolorem augeat. diss. hieræ picæ Galeni à ʒ vi. ad ʒ. j. Si scammeata velles adicere vti hiera diacolocynthidos, diaphenic. aut alia eiusmodi, vim intestinorum dissoluent. Si quando materia multitudo expostulet, & virium robur suadeat, ea minore sunt usurpanda mensura: ab agarico simpl. ex toto abstinendum, quia peculiari quadam inimicitia huic dolori aduersatur. Si enim rationem exquiras ita est, quia agaricus multis filamentis intertextus est, in intestina iniectus circumharet. atque impingitur, ob id distensione quadam dolorem mouet,

Et longiore mora insita vi acri ob purgantem facultatem nervosa & membranosa illa corpora pungit & vellicat sacchar. rub. mellis anthosati, interdum mellis violati an. ℥j. olei rutacei ubi plus calfacere oporteret posteriora injicienda ℥.ij Misce, fiat enema.

Quod si propter doloris acerbicatem aut flatuum copiam & excrementi obstructionem totum vna vice infundi non liceat, in plures vices eodem temporis momento partiri conueniet, ubi volueris in dolore à larga pituita vitrea eademque multa & frigida sanationis auxilium conferre ea subicias quæ vim habent corroborandi & dolorem mitigandi, non in primis dolorum insultibus tentanda, sed quando fœces fuerint subductæ: constat verò ex vino generoso quod & abstergit, corroborat floribus anodinis & fursare, quod expurgandi vim non mediocrem obtinet. Addas licet interdum sola olea mitigatoria dolorémque sedantia.

Enema eluens, corroborans, dolorem sedans.

℥. Vini rubri generosi quart. iij. aut ℔.j. fursaris macri. flor. camæmeli & meliloti an. p. j. fiat decoctio ad consumptionem medietatis

diæ partis. Iniiciatur omni hora, vel sic pareretur ex oleis mitigantibus.

℞. oleor. camæm. & anethini an. ℥. ss. Ex aliis etiam hæc utiliora erunt, cum paulo magis calefacere volueris & sedare dolorem olei nucum, olei cheyrini tantundem.

CAPVT IV.

Eorum quæ per os assumuntur.

Medicamentorum quæ per os assumuntur quædam leuiora sunt, alia paulo vehementiora, vt inde à longinquis partibus humoris antecedentis partem auferant, quæ in varia forma parantur, vt catapotiiis in officinis reseruatis vel pro arbitrio medici interdum confectis, quorum ratio & modus componendi postea tradetur in progressu huius methodi; Materia etiam consistit in electuariis solidis, vel mollibus, ad boli consistentiam paratis, potionibus ex vario medicamentorum genere. In forma catapotiorum ad bilem & pituitam euacuandam, quæ in ventriculo & intestinis detinetur, efficaces pilulæ sequentes erunt, præsertim cum ventriculum corroborare volueris, interim tamen sicut in venæ sectione, humores aliunde distitos consecutione quadam

ad id quod vacuatur euacuamus.

*Catapotia que bilem ac pituitam euacuant
& ventriculum roborant.*

℞. massæ pilularum de hiera simplici ʒ.i.
cum aqu. borrag. & capill. ven. formentur
pilulæ v. Satius enim est cum aquis stillatitiis
catapotia conformare quàm cum Syrupis con-
sistentia crassioribus, qua & maiores & deuo-
rando difficiliore efficit, Capiat post primum
somnia. In minus delicatis in quibus multum
de humore bilioso & pituitoso educere consilium
est, paulo vehementius hac catapotia usurpan-
da erunt.

Catapotia Cholagoga.

℞. massæ pilul. aggregat. tametsi pituitam
quãdantenus euacuent, bilem tamen magis e-
uacuant de quinque generibus myrabolan.
etsi varios humores expurgent, bilem repur-
gando minus tenuem ad fluxionem plus a quo
paratam compefcunt. Misce, cumraq. chicorei
vel endiuix formentur pilulæ v. ex drachmæ
semisse, quas capiat post primum somnum
cum proba victus ratione.

Ad frigidos morbos catapotia.

Ad frigidos morbos catapotia ea paran-

tus

tur quæ paulo vehementiora sunt prioribus, nihilominus constant ex clementioribus vt differant à catapotiiis verè catharticiis, verùm cum pituita vberior colligitur in cerebro & ventriculo, ex hisce partibus illam educunt præcipue: addas licet ea etiam accomodari aliis membris à quibus pituita sequi prompta similiter initio minuenda & auferenda erit, modo dicta catapotia formentur cum aquis quæ vim habeant particularem afficiendi partes ex ea pituita molestas & natas.

Catapotia phlegmagoga.

*℞. massæ pilular. assaiaret qua ab Aui-
cenn. describuntur, qua ex aloe non modo con-
stant, sed etiam ex mirabolanis, si sola exhibean-
tur post leuam coenam in ingressu lecti assumi
debent, quia leuiore purgandi facultate ex cere-
bro nequeunt trahere, nisi longiorem in corpore
trahant moram. Massæ pilul. de agarico qua ex
scammoneo constant, vt potentius educant pi-
tuitam lentam adiungenda sunt. Si verò ex o-
culis deducere voles horū loco addes pilulas lucis
maiores an. ʒ. ʒ. formentur cum aq. beton. Si ex
cerebro & salvia. In paralisi primula veris, ex
oculis cū aq. scenic. Ex thorace & pulmone cum
aq. capil. ven. Ex ventriculo cum aq. absint. aut
mentha. Ex hepate cum aq. endiuia aut cicoreis.*

Ex splene cum aq. scolopend. Ex utero cũ aq. ar-
zimisia, Ex vesica & renibus cum aq. alkekengi
formentur pil. v. quas deglutiatur post primum
somnia recta vitæ lege instituta.

C A P V T V.

De electuariis.

IN forma electuaria solidi, quas ta-
bellas vel tesseras appellant, interdum
minorare conuenit. In his quibus alia me-
dicamentorum forma displicet, vt etiam sint
accommodatiora iis quibus pecuniæ par-
cendum sit, & labori pharmacopœorum, in
officinis semper reseruata; quorum materias
in commentar. de componendor. medica-
mentor. ratione exacte tractatur. Ea autem
veluti catapotia dum in stomacho aliquan-
diu morantur humores non mediocri-
ter euacuant, & maxime quia ex
scammoneo & diagridio &
aliis vehementioribus
medicamentis con-
stant.

Electuarium

*Electuarium solidum in morbis
calidis euacuans & sero-
sa minuens*

℞ electuar. de succo ros. ℥. iij. vel ℥ ss sumat
mane, vel horis quinque ante cibum.

*In morbis frigidis pituitam eua-
cuans.*

℞. elect. diacarthami ℥ iij. vel ℥ ss sumat
mane horis quinque ante cibum.

Ad bilem & pituitam.

℞. elect. de citro solut. ℥ iij. vel ℥ ss su-
mat mane horis v. ante cibum.

C A P V T I V.

De bolo.

Interdum vtiliter præscribuntur in forma
boli medicamenta minorando purgantia.
Ex his quædam leuiora, quædam ve-
hementiora consuluntur. Leuiora optimè
exhibentur in morbis qui in renibus &
vesica existunt, vt in morbis thoracis & pul-

monum: vt plurimum eorum materiae ex
cassia fistulari cum pulpa aliquorum fru-
ctuum constant.

*Bolus in morbis calidis bilem euacuans, ardo-
rem restringens, modo in ventriculo
nulla consistat aqua, pituita &
mucosa, aluiq³ fluxus non
immineat vel præ-
sensus sit.*

*℞. flor. cassiæ recenter extractæ ℥. j. vel ʒ.
x. vt in ardore vrinae, ulcere vesicae, calculo re-
num, vesicae, & affectibus pectoris & pulmonum
à caliditate excitatis, huic addere poteris pulpa
sobesten, vel passularum bene pinguium & dul-
cium, si magis purgare quàm lenire volueris
pulpæ thamarindor. ʒ. ii. Sacchari albissimi
modicum. Misce, fiat bolus quem capiat per
se. Si ex eodem potionem conficere voles, dissolue
in aquis violarum vel capil. ven. sumat per
horam ante cibum.*

Boli ex cassia confecti, accommodati
semper erunt omni ardori, restringendo, si-
mul ac in aliis affectibus, vti diximus, le-
niendo: proderunt tam pueris quàm gran-
dioribus, tum prægnantibus sine vllò incô-
modo vtiliter exhiberi poterunt. Sed quia
cassia ex humiditate sua largiore flatus ge-

nerando ventriculum offendit ac lædit, itaque cum vel imbecilliolem, vel plus æquo humidum reddat. pulueris seminis anisi parum medici vtiliter permiscet, satius tamen cum fumo decoctionis seminis anisi intimam cassiæ pulpam extrahere conduceret. Addunt præterea ad discutiendos flatus, & superfluum eius humiditatem corrigendam, pulueris tartari parum, sed præter rationem, nam etsi eximia siccitate summam humiditatem summoueat, tamen quodam incendio vellicat ventriculum, ad id quod ægri assumere abhorrent. Item quia in ardore vrinæ & lenire & refrigerare studemus, cassiæ pulpam extrahimus cum aqua violarum. Eandem etiam cassiam cum aliis medicamentis purgantibus, pro iis scopis sanationi accommodatis, admiscemus: vt cassiæ ad drach. vi. pulueris rhabarb. electi ad drach. ii. cum bilem educere volumus. Exinde astrictione quadam à rhabarbar. relicto ad confirmandum ventriculi robur, nec non etiam cum pertimescimus de alui quodam imminente fluxu iam concitato. Si verò vuleris biliosa magis expurgare minuendo cassiã ad ʒ. vi. pulueris electuarii è succo ros. ʒ. ii. adiiciemus, sed post assumptionem boli deuorati cibum longius differre expediet ad tres aut saltem quatuor horas, propter scam-

moneati medicamento admixtionem, quæ
 vt in alimentum abeat non est sperandum.
 Manna, mel aereum Græcorum: in locis, in
 quibus colligitur, vt in Italia & apud Allo-
 brogas, Briançon in Delphinatu, & oppidis
 propinquis Prouinciæ, quando situm non
 contraxit, ob eius aëream naturam à putredi-
 dinis vitio vix vindicatur, ideo in purgando
 inefficax, recens vsurpatur in morbis biliosis
 & in affectibus pulmonum, nephritide &
 vesicæ vlceribus ab ʒ j. ꝑ. ad ʒ ij. deuoranda
 & mandenda exhibetur per horam ante ci-
 bum per se vel cum decocto pulli.

*Bolus bilem vehementius educens
 in morbis calidis.*

ʒ. catholic. ʒ vj. *robustioribus* ad ʒ j. ele-
 ctuar. de succo ros. vel de citro solut. *imbecil-*
lioribus ʒ j ꝑ. *robustioribus* ʒ ij. cum saccharo
 per se fiat bolus, vel dissolue in aquis pro affe-
 ctibus ventriculi, portulacæ vel absinthij, nam
 omnia amara colluuiem ventriculi expurgant,
 & sua frigiditate affectui calido obluantur.
 Misce, fiat bolus, sumat mane tribus aut
 quatuor horis ante cibum.

*Bolus qui præscribitur affectibus frigidis
 à pituita natis.*

ʒ. ca-

℥. catholici ℥ss vel ℥. vj. in debilioribus, in robustioribus ℥j. & quibus aluus est admodum tarda diaphœnici ℥j. s. interdum ℥ij. ubi est multa pituita eadeque lenta in lōginquis partibus dissita, agricolis & firmis corporibus ad ℥ij. sed rarū esse debet & cū magna cautione, ne forte ex minuēte catharticū eradicatiuū efficias. Misce, fiat bolus quē capiat per se, vel dissoluēdo in aquis pro affectibus capitis betonica, oculorū fœniculi, pro corde & pulmone borraginis, prassii, hyssopi, tussilaginis, pro ventriculo, menta, absinthij, pro hepate eupatorij, pro spene scolopend. pro renibus & vesica halicacabi pro viero artemisia, nepeta, pro dolore articulorum, qui sæpius à pituita oritur, cum aqua iua artritica.

Bolus ad Melancholica & Nigra educenda interdum necessarius est sed magis diluta potio.

Hunc dare conueniet in his affectibus Melancholicis quos humefacere semper conuenit, constabit tamen hic bolus ex solida materia, vel diluetur vt superiores cum aq. stillatitiis.

Acc. Cathol. ℥ vj. etsi medicamētū ad omnes humores sit destinatū purgandos, tamē præcipue ad crassos & melancholicos adhibetur vel ℥j. vel ℥. x., ex se vel miscetur eadem mensura cum alijs sequentibus medicamentis ab ℥ss. ad ℥ vj.

Confect. hamech ʒ ij *præsertim nigra potenter euacuat*, cum saccharo fiat bolus, quem capiat hoc modo vel dissoluendo, quod longè melius, cum aquis Borrag. & fum. *Ea enim exustum sanguinem eluit scolopend.* Cum *mali origo, in splene consistit*, harum omnium quantum sufficit, misce, sumat de mane quatuor horis ante cibum.

CAPVT VII.

De potionibus.

Propomata seu potiones medicamentose quæ minuendo vel purgando aptæ & accommodatæ sunt in affectibus siccis cum biliosis, tum præsertim melancholicis, utiles erunt: & iis quibus interdum te obsequiosum præstare conuenit, cum ab aliis medicamentorum formis abhorrent. nam ex hipp. facilius est impleri potu quàm cibo, ideo liquida medicamēta facilius & gratius à multis assumuntur, & eo tum magis fuerit necessarium, cum non tam ex longinquis partibus quàm ex propinquiorebus viis humores noxios ducere expedit. Ea ergo medicamenta quæ minorando valent duplicia existunt: quædam leuiora & delicatis familiaria, veluti domi nobiscum nata & parata: quæ velut ex alimenti materia constant & quibusdam medicamentis purgantibus &
leuio-

leuioribus & mediocribus.

*Potio purgans minuendo bilem in propin-
quis viis sequi paratam.*

Acc. decocti pulli recentis ℥. vj. aut viii.
Nam huius decocti quantitatem alienum non
est adaugere quod natura & substantia nostra
sit familiare, vim eluendi & attemperandi ob-
tinet, dissolue Mannæ granatæ & recentis ℥.
ii. In affectib. Thorac. & pulmon. salubre me-
dicamentum. Si paulo magis refrigerare vo-
les, cum ventriculus largiore humiditate e-
xolutus non est, cassiæ pulpam recentem in
eadem colatura dissolues, sed illa plerumque
ingrata est: cum mediocri purgante medica-
mento bilem educere expediet, Rhab. ℥. j. in
pueris & prægnatibus: aliis verò ad ℥ ii. cum
cinamomi vel spic. Nard. momēto ad grana
iii. à ℥. s. Miscebis cum eadem decoctione:
priora exhibeantur per horā ante cibū, poste-
rius medicamētum tribus aut quatuor ante
horis propinare vtile erit; si nō solum biliosa
sed adusta, aquas & pituitam exigere tentes,
incoques cum pullo recēti, polipod. quercini
recent. fol. sennæ oriental. mundat. Medullæ
sem. Carthami an. ℥. s. imbecillioribus, robu-
stioribus à ℥. vi. ad ℥ j. ad corrigendos flatus,
qui excitantur à senna, addere poteris sem.
Anisi ℥. j. aut ℥. iiii. Ex quorum decoctione

ad ℥ viij propinandum dabis tribus horis ante cibum, sic pituitam Mucosam ex pulmonibus, & quædam adusta purgare si voles, *vt in asthma, hoc parabis.* Acc. gallum antiquum diu multumq; antea motum & verberibus fatigatum sine esca & potu per triduum detentum, *vt eo magis nitrosa facultate aluum subiiciendi vim habeat,* postea coques in aqua pluuiali aut altera tenuiori eū prius infarciēdo sequentibus: polipod. Querc. Recent. Medull. Sem. earth. Leuiter contuse an. ℥j Si plus in robustis purgare voles addes ℥j. s. passul. mūd. par. viij. hordei mūd. p. j. decoctio fiat perfecta ex cuius expressione sumas ℥. viij. tribus aut quatuor horis ante cibum.

Portiones medicamentose quę minuendo purgant, fiunt, ex aliis medicamentis paulo vehementioribus, & in officinis reseruatis, quę constant interdum ex varia medicamentorū mixtione, in decoctione: & accommodatis purgantibus, in affectibus calidis, biliosis & in affectibus pituitosis & melancholicis, interdum vt & pharmacopœis parcas & dare promptum sit: sufficiet diluere cum aquis stillatitiis semper in pharmacopœor. Officinis reseruatis.

purgantibus quæ bilem exigunt.

Acc. glycyrrhizæ rasæ & patum contusæ
 ℥. s. Minor modus & mensura esse debet quam in
 decoctis & apozematis, quia una vice medica-
 mentum hoc propinamus, prunor. dulciū, pas-
 sular. mund. an. par. vj. quatuor. sem. frig. ma-
 torum an. ʒ. j. hordei mundati p. s. Tamarind.
 ℥. s. Bilem euacuant clementer citra ullam ca-
 liditatem trium flor. Cord. an. p. j. Omnium
 horum ferè est aqua quantitas, ut in apozema-
 tis, quia vires habent tenues & quæ facile exol-
 ui possunt, nisi eadem mole & quantitate resar-
 cias, fiat decoctio, de colatura cape ʒ. iiii. in
 qua dissol. Cass. recent. extractæ ʒ. vj. diapr.
 sol. ʒ. ii. syrup. rosar. sol. & violacei an. ʒ. s. ca-
 piat mane tribus aut quatuor horis ante ci-
 bum cum probo vitæ regimine.

Potio purgans minuendo, quæ bilem eodem
 modo educere valet vel cum aquis
 stillantibus.

Acc. cass. rec. extrac. ʒ. vi. Cum Rhabarbaricè
 addere volueris, in principio addatur modo non
 sit febris putrida, quæ ex obstructione oritur, nã
 plus obstruit & eo tempore plurimum nocet scic-
 exhibitum in tota substantia. Magis etiam in
 expressione, diluta enim eius portio extracta a-
 stricta retinet seminaria, ideo nõ usurpatur nisi
 cum de magnis obstructionibus suspicio nulla est.

G

hoc modo Rhabarbari optimi infusi in aqua
 end. & pauco vino albo, deinde expressi ʒ. j.
ut infantibus & aliqua occasione exolutis. magis
 robusti ʒ. j. s. spic. nard. vel cinam. eodem
 modo præparati gran. iij. aut iiij. elect. è suc-
 co ros. cum cassia vel rhabarb. addere poteris
 in imbecillioribus à ʒ. j. ad ʒ. j. s. in robustiori-
 b⁹ ad ʒ. iij. aquar. Acetos. & Cichor. an. q. s. Mi-
 sce, fiat potio, quam sumat mane quatuor
 horis ante cibum. cum bono vitæ regimine.

*Potio qua minuendo purgat pituitosa & cras-
 sa cum decoctione ex multis medicamentis
 parata, que promouet, purgat vias obstru-
 ctas aperiendo, dilatando & simul exsic-
 cando, ac pituitam crassam extenuando, vt
 facilis sit euacuando & prompta ex medi-
 camentis phlegmagogis.*

Acc. glycirrhizæ rasæ & parum contusæ,
 rad. enul. camp. hac siquidem amarore valet
 expurgando, vt pituitam in medio venarum &
 arteriarum expurget, poros & vias humorum
 fluxioni aptas aperiat & dilatet an. ʒ. s. passul.
 mund. par. viii. sem. anili & fœnic. pituitam
 extenuando expulsionem facilem reddunt an. ʒ. j.
 medul. sem. carth. ʒ. s. pituitam & aquas cle-
 enenter educit, flor. stœchad. & rorismar. an. p.
 i. vt eandem pituitam à cerebro, in quo multa
 exundat.

exundat, sua vi propria & accommodata reliqua medicamenta purgantia educat, fiat decoctio, de colatura cape ℥.iiij. in qua dissol. cathol. ℥. s. diaphœn. ℥.ij. Syrup. cap. ven. ℥.j. mellis ros. colat. ℥. s. quia semper purgat mucosa & pituitosa, misce, fiat potio quam sumat mane in aurora quatuor horis ante cibum cum bono vitæ regimine.

Potio purgans quæ minuendo valet ad pituitam euocandam cum stillatitiis aquis parata.

Acc. cathol. ℥.vj. diacarth. ℥.ij. vel cum pituitam crassam expurgare voles & bilem vitellinam: nam bilem minus, pituitam magis euacuat. aquar. Beton. & cap. ven. an. ℥.j. s. vt sit quantitas medicatæ potionis an. ℥.ij. si verò arbitrio pharmacopœi an. q. s. quæ eadem hora assumatur.

Potio purgans minuendo melancholiam nigram & adustam, ex decoctione variorum medicamentorum, quæ humori melancholico propria sunt, & spiritus ab omni caligine emendant, status discutunt ex medicamentis melagolis.

Acc. Bugl. & Borræg. cum radicib. an. m. j. passularum mundatarum par. viii. sem. anisi & fœnie. an. ℥.j. s. quia multis flatibus abun-

dant & humor est crassus & terreus, hisce seminib. extenuando ad excretionem promouetur, hordei mundati et si refrigeret, abstergendo tamen proficit & sua humiditate non viscida humores siccos ad expulsionem idoneos efficit p. j. polipod. querc. & fol. sennæ orient. vel Epithimi si sennam non addas an. ʒ. s. trium flor. cor. an. p. j. fiat decoctio: de colatura cape ʒ. iiij. in qua dissol. Cathol. ʒ. vi. confect. hamech ʒ. ii. syrup. de Bugloss. vel Scolop. ʒ. j. vel ʒ. Misce, fiat potio quam sumat in aurora. ante cibum quatuor horis.

*Potio purgans minuendo Melancholiam
nigram & adustam.*

Acc. Cathol. ʒ. vi. confect. hamech. vel diasen. solut. ʒ. ii. aquar. borrag. & scolop. an. ʒ. ii. Misce, fiat potio quam sumat mane quatuor horis ante cibum.

C A P V T V I I I.

De pulueribus.

VT in præparandis prædictis potionibus liquidis & medicamentosis varia aptauimus, eadem vsurpamus ad pulueres parandos. Nam similiter fiunt ex medicamentis proprium humorem educentibus, permixtis alijs quæ vim habeant promouendi a-

ctio-

ctionem purgandi. Delicatis, plerunque talia sumenda, & diluimus cum iusculo pulli, aut decoctione cicerum rubror. vel cum aquis stillatitiis ad varios sanationis scopos accommodatis: sed re vera horum vsus est rarus, nec tantopere necessarius, quia pulueres tenuissimi nō probe per aluum humores exigere valent, sed potius in vrinæ vias illabuntur & perfluunt, ideo Gal. lib. de tuenda valet. cum diacalamynthes compositionem iubet propinari ad aluum subducendam, ait ad eam non admodum conferre, sed ad vrinam ducendam. Cæterum ne officio deesse videamur nihil omitemus quod pertineat ad eas medicamentorum formas præscribendas.

Puluis diluendus cum aliquo liquore ad bilem educendam.

Acc. Rhab. in pulu. reda & .z. ij. non valde tenuem, cum laxando astringere cupis, si verò plus mouere aluum voles, in tenuem magis, spicæ nardi vel cinam. elect. vel stœcados ꝑ. s. Redigantur in pulu. & cum Iusculo pulli vel decoctione cicer. Rubror. ad ꝑ. iiii. Misceantur, de mane tribus aut quatuor horis ante cibū portionem dabis dum morbus magnopere caliditate æstuat. Tamarindi etsi in puluerē redigi non possint, illorum pulpa permisce

bitur cum illis iam dictis liquoribus ab ℥.j. s. ad ℥.ij. addendo pulu. cynam. ℥. s. non tam ad promouendam eius actionem, quam ad saporis gratiam conficiendam, quia tamarindor. pulpa dissoluta magis est ingrata, item myrabol. citreæ præscribi vtiliter poterunt, cum volumus cum astrictione euacuare in morbis à bile natis, hoc modo,

Acc. Mirabol. citrinar. ℥.iiij. vel ℥.s. redigantur in pulu. & cum iusculo pulli excipiantur ad ℥.iiij. dabis mane tribus aut quatuor horis ante cibum.

Porro quidam propinant scammon. aut diagridij grana aliquot in iusculis vel cum pomo exhibita, tamen si illorum vsus sit periculofus, ne dicam temerarius, ideo consulto prætermittendus.

Puluis ad pituitam educendam in morbis frigidis, constat interdum ex leuioribus medicamentis phlegmagogis, interdum ex vehementioribus.

Acc. turpeti electi ℥. i. Quidam audent dare ℥.ij. zinziberis ℥.j. redig. in puluer. qui iusculo pulli excipiat vel in decoctione cicerum rubror. ad ℥. iiij. sumat mane quatuor horis ante cibum. Cæterum quia turpetum

perum non est verum aut legitimum, sed e-
 sulæ quædam species, aut eius loco radicem
 Thapsiæ substituunt, periculosum est dare.
 Eius *artificandi* ad hanc medicinam ex v-
 su esse poterit, agarici in pastillos formati re-
 center ʒ ij. quas iisdem liquoribus solum
 propinare conuenit, cum instantis vomitus
 suspicio nulla est, aut is qui adsumit non est
 ad vomendum facilis: & cum aquis stillati-
 tiis diluere hos pulueres poteris, modò non
 displiceant ægrotò: in morbis calidis cum
 eaduiæ aqua vel cichorii: in lumbricis ene-
 candi cum aqua portulacæ, acetosæ: in mor-
 bis frigidis cum aqua betonicæ, absynthii,
 Artimisiæ, scolopendriæ.

*Puluis qui vtiliter præscribitur iis quibus vo-
 lumus serosa, adusta & pituitosa simul
 repurgare pro familiari me-
 dican. ento.*

Acc. polipod. querc. recent. fol. fennæ o-
 rient. mund. sem. cartham. leuiter cõruti, im-
 becillioribus an. ʒ. ß. robustis ad ʒ. vj. & ʒ. j.
 sem. anisi, fœnic. an. ʒ. j. interdum confert vt
 minuas quantitatem ad ʒ. s. & vt melius pro-
 cedat purgatio, cina. puluerẽ ad ʒ. j. adiciunt,

redigantur omnia in puluerem secundum artem, qui postea excipiatur Iusculo pulli aut decoctione cicerū rubror. vel aquis stillatitiis, mane tribus aut quatuor horis ante cibum. Notandum interdum conferre in affectibus soporiferis, vt in Apoplexia, Lethargo, Caro, Catapotia, ad promptè subduendam eam materiam quæ superabundat, & in mora periculum est, dum à tam longinqua parte euacuare oportet, sed propter obliuionem & mentis hebetudinem deuorare acri non possunt, vel quia os conclusum habent, conducet dicta catapotia, velut pillul. de Agaric. & cochiar. an. ʒ. f. diluere & dissoluerre cum aliquo liquore: vel cum aqua Betocæ, primulæ veris, & eas dissolutas bibendas dare: nam facilius adhibetur, & in ventriculum eorum præterfluunt liberius, ægro etiam non impellente; præterea, hoc modo proficiunt plus & iuant, dissoluta liquidis, quod amarore magis imbuant linguam, & ex hac molestia ægri stupore & sopore obruti excitantur.

CAPVT IX.

De sanguinis missione.

Peracta purgatione quæ minorando initio fit per varia remediõr. genera antea eradisa, cum sanguinem mittendi scopus

eris

erit in diem sequentem, mane hora vj. aut vij. omnibus consentientibus venam secare expediet; vbi epotum fuerit medicamentum euacuans non eadem die venam secare bonum est, vacationem enim vacationi superaddere periculosum: si verò enema fuerit iniectum mane, vt in magna pleuritide & inflammatione interna, etiam à meridie hora tertia eadem die phlebotomiam instituire bonum erit, in talibus enim tardare malum est. Ita phlebotomia erit instituenda in his morbis in quibus est plethora vt in febris Synochis, inflammationibus internis etiam vsque ad largam sanguinis missionem, modò nihil dissuadeat, vt si præsens sit morsus oris ventriculi, vel immoderata aliqua vacuatio præcesserit, quæ vires conuelle potuerit, vel si nocte antecedente largus sudor profusus fuerit per vniuersum corpus à sanguinis missione desistendum erit mane, & erit differendum ad horam tertiam post meridiem, vel in diem sequentem. Cæterum non solum in morbis à sanguinis copia venam tundere expedit, sed & cum ab alio humore excitatur, qui non longè à sanguinis natura recedit, indicio erit vrina perrubra & spissa: secus si fuerit tenuis & citrina, caue ne audentior fueris in sanguine mittendo. Sanguis ergo mittendus erit propter hos sco-

pos, vel ob euacuationem, vt in synocho febre & similibus, vel propter reuulsionē, quæ quædam est euacuatio circa initia inflātionum, fiatq; per distantissima loca & *ῥαδί-ξιν* secundum rectitudinē, item fiat in doloribus, casu ab alto, dū metuspēdet inflātionis, vel ad feruorē sanguinis, aut aliorū humorū, reprimendū, ad euētilationem quoq; vt in febr. tertianis & ardentibus, sed pariori copia, tūc sanguis detrahēdus erit, vsq; ad ʒ iij. ne vberiore euacuato bilis immodicē ferueat, vel ad explorandū & tentandū; vt in elephantiscis & sicut Gal. in melācholicis affectib. fieri præcipit, vt si sanguis qui primò erumpit ruber fuerit & flauus ac tenuis ilico sistatur; quòd si niger & crassus fuerit, tātum sanguinis demēdū esse quātū & vires & morbus postulāt, consulto admonet. Circa verò morborū principia, venæ sectionē non vltra quartū diē morbi administrādā esse permul-ti autumāt, in eo tamen termino præscripto coactē cōsistendū nō est, vbi cūq; enim sanguinis mittendi scopus se obtulerit, vltius etiā post quartū diē sanguinē mittere cōfert ex Hip. imitatione, in pleuritide Anaxionis lib. 3. Epid. Præterea in feb. tertianis intermittentibus, & aliquot affectib. Melanchol. quia & bilis & humor melāch. cum circa primos diēs non sit bene permixtus & confusus

cum

cum sanguine, interuallo postea dierum lō-
 giore lōgè melius cum eo permiscetur, ideo
 facilius euacuatur post quartā diem & quar-
 tã accessionem in tertiana intermittente. In
 biliosis morbis & naturis quibus rara est tex-
 tura vena angusto foramine aperiēda & mi-
 nus de sang. detrahendum, ne ex tenui illorū
 substātia nō exigua fiat spirituum dissipatio,
 & tādē virium deiectio: in crassis & melan-
 cholicis amplius & patentius venæ foramen
 faciendum erit, vt sanguis, qui crassior est, li-
 berius exeat. Nōnunquā cōtingit sanguinē
 nullo modo fluere, vt cum metu percellitur
 æger, vnde circa venę tusę foramē in grumū
 coit, ideo tunc globulū fermenti supra venā
 tusam apponimus, vt recalfaciat & sanguinē
 extenuet, vt amplius foramen pateat. Impe-
 rata motione in horā pomeridianā phlebo-
 tomia differimus, vel in crastinū statim post
 missionē sang. peractā, præsertim in iis quib.
 bilis in ore vētriculi feruere solet, bolum ex
 cōdito rosar. damus à ʒ. ij. ad ʒ. s. vel panis in-
 tinctū in vino mal. gr. acidor. vel in aqua ros.
 maceratū, eo scopo, vt ostiolū vētriculi con-
 firmetur, ne à bilis vapore ad cor delato ani-
 mi deliquia succedant & καρδιον infestet,
 simul ac refrigerādi vi moderata refrenetur
 bilis feruor excitatus à motu & agitatione,
 quæ fit per venæ sectionem antea peractam.

Postquam minuendo purgatio & phlebotomia, vbi opus est, peracta fuerint, exhibenda non sunt medicamenta eradicatoria, nisi præcesserit humorum coctio, vt apparet ex Hip. Concocta medicari & mouere non cruda, nisi turgeant. Ideo si humores turgent sine vlla dilatione & coctione præmissa exhibere oportet medicamenta illa cathartica; turgere autem illos, secundum medicos gracos est, cum humores tenues, seu furiosi de loco in locum impelluntur, vt inde periculum imminet ne in partem aliquam principem ruant, ideò confestim medicamento cathartico euocandi erunt. Postiores autem medici ex rei natura valde bene distinxere, & humorem turgentem variis modis accipi crediderunt; vel propter quantitatem, vel qualitatem, vel loci conditionem: propter quantitatem cum copiosior humor in parte vel toto corpore abundat, vt ex illa offensione, suffocationis & exitii non paruum periculum impendat, vt in Apoplexia & aliquot morbis ex pituita ortis; propter qualitatem, vel euentem vel occultam: euentem, vt cum humor biliosus, eruginosus, seruore & tenuitate multum infestat, in aliquot febribus biliosis, vnde ægri inquieti sunt, & varia iactatione mo-

lēstān-

lestantur, palpitationes, vellicationes & morsus sentientes, tuncque materia excreta plane conquiescunt, sicq; turgere humores omnes afferunt, perspecta humoris qualitate calidiore & feruentiore: propter qualitatem occultam, vt in febribus pestilentib. & epidemiis & venenorum aliquot assumptione, quare nulla interposita mora vomitum prouocamus. Vel propter loci coarctationem, quia illius inflammationis materies eo loco ac parte est coercita & coacta, à qua propter respirationis necessitatem imminet periculum suffocationis: eam ergo ob causam phlebotomiã inflammationis incrementum prohibemus: ac statim sequenti die ex consilio medicorum conducet sine præmissa coctione medicamentum Catharticum eradiciuum exhibere.

C A P V T X I.

IN his ergo morbis in quibus materia non turget, prius est molienda humorum coctio, antequam ad purgationem venias, quæ alterantibus & immutantibus perficitur, de quibus hic quod attinet ad coctionem: & præparationem humorum, dicemus: post purgationum variam speciem & formam scribemus. Porro ex Galen. lib 2. de Arte medica, Coctio est alteratio faciens cessare putredinem remanente substantia

quæ à Gal. in lib. Hippoc. Epideme ^α ^π ^π ^α ^ρ ^α ^ς ^μ ^ε ^ς dicitur: & ex eodem in lib. Hipp. de ratione victus in acutis: ea concoqui dicuntur, quæ euincuntur: & ea concoctio non est in materia laudabili omnino, sed in materia noxia: ideo Arabes posteriores & eorum assectæ partiti sunt in eam quæ fit in iuuatio, aliam in nocituo, de qua hîc. nam ex naturæ actione, imitatione & obseruatione hæc artis præsidia ad coctionem efficiendam sunt deprompta; nam in omni coctione natura dum bene operatur nunquam expellit nisi prius coxerit. Hæc paruo interuallo se inuicem subsequuntur vt omnino fiat coctio, veluti quodam choro & gradatione, & quia in omni coctione separatur purū ab impuro, huic succedit secretio, postremo omniū expulsiō. Ad hæc in iis mutationibus quæ fiunt partim à natura, partim contra naturam, vt in supputationibus videmus inducta quædam accidentia, vt humoris maligni ex arte repressionem, æqualitatem substantiæ, colorem album vel minimam graueolentiam in eo humore qui postea expellitur, qui cum antea esset crudus isitio, huiusmodi qualitatibus & affectionibus non erat præditus, ideo artis præsidio nos quædam præscribimus medicamenta quæ coctionem iuuare possint antequam humor ex toto expurgari

de-

debeat, ea autem à solo calore naturali perficitur, qui huius & aliarum naturæ actionum est opifex. Hæc autem medicamenta serapia decocta quadam consequuntione ad naturalem statum & temperiem, calorem naturalem permutant; vt cum acrior redditur & calidior, Syrupis & apozematis incrassantibus & frigidis ad mediocritatem reducimus; eodem modo vbi calor minor est & languescit, vt frigidus & Crassos in corpore gignat humores, medicamentis calidis & extenuantibus Symmetriam reuocamus: Ideo ea semper coctionis author, calor naturalis existit.

C A P V T XII.

Alij scopi insurgunt à Medicis cognoscendi & exequendi, vt non solum immuter, sed etiam vias & meatus ad excretionem paratos & faciles reddat, aperiendo obstructions, ab infarctu liberando, ne humor lentus & viscidus spiracula corporis præcludat, quod humorum effluxum impedit. Ideo Galenus in aphorism. Hippocratis: in morbis acutis, etsi bilis eorum materies esse soleat, ad obstructions tollendas oxymel & hydromel propinanda iubet, in quibus sunt origanum & similia. In coctione & apparatu, quod crassum est extenuamus,

quod tenue mediocriter incrassamus: ex lib. Gal. constitut. artis circa finem, præter tamen quorundam sententiam: id fit in morbis calidis, à bile scilicet tenui exortis, quia vt Auicenna & eius affectæ censent, humorem tenuem in poris & meatibus partium imbibi & impingi, ideo non est habilis ad expulsionem, nisi incrassetur, qui postea commodius omnino excernitur: idque fieri credibile est, vt non solum bilis & humores tenues fiant idonea obiecta facultatis expultricis ex modo substantiæ; sed etiam vt quidam feruor & humoris qualitas seu exitialis reprimatur; quæ si repressa sit, si quid sit aptum in naturæ substantiam conuerti, membris assimiletur, & reliquum facile & tuto expellatur. In ea enim humorum immutatione, nisi toto genere perniciosi fuerint, semper aliquid est, quod in naturæ usum conuertitur. Ideo Galenus supra dicto loco consulit coctionem esse faciendam, non solum ex medicamentis, sed etiam ex boni succi edulsi, quiete, addit fomenta quæ in præcordiis tempore Galeni adhibebantur, ad tollendas obstructions & forte ad calorem naturalem fouendum. Hippocrates autem priusquam Elleborum propinare volebat præhumectari corpora iusculis, sorbitionibus & bonis pulmentis, Idque ideo

vt Ellebori assumendi siccitas quam relinqueret humectatione compensaret, & sic partes humidiores redderet ac ad exitum humores præpararet: hæc itaque fuit medendi ratio priscorum græcorum. Nos verò eandem aut saltem similem peragimus, & semper, quoad fieri potest, meliorem facimus, vt variis medicamentorum formis humores noxios præparemus, quæ variant pro diuersitate & dissimilitudine humoris crassioris extenuandi, vel ratione membrorum ad quæ deduci debent, vt permisceantur Cephalica, cardiaca, stomachica, hepatica, & similia; hoc enim interdum tibi ex vsu veniet, quod etsi morbus efflagitet propriam immutationem ex Syrupo veluti acetoso alioquin utili, repugnabit tamen materia membri vt pulmones, ventriculus, intestina, vterus, verbi gratia cum tussis est in pleuritide, punctio, morsus & vellicatio in intestinis & ventriculo, præpediet te, ne hoc Syrupo vel Oximelite, aut aliis acidis medicamentis vtaris, morbo tamen & materię accommodatis. Interdum quoq; symptomatis indicatio, vt alui fluxus, dissuadet eiusdem Syrupi vsum: etsi propria morbi species vt intemperies calida & materia biliosa, syrupi viol. vsum exoptulet, quia relaxat & alui ductio- nem citat, si tale symptoma instat vel præ-

D

ſens eſt caue ne præſcribas: variant etiam medicamenta quæ præparant & coquunt humores ratione quantitatis, nam vbi ſunt maiores obſtructiones aperientium medicamentorum ſeries eſt augenda, item medicamento maior vis eſſe debet.

CAPVT XIII.

De paranda Apozematum decoctione.

IN Apozematis & Serapiis cum affectus Iex ſiccitate manant & ad longiores partes eum educi neceſſe eſt, vtile eſt apozematis & decoctis humores potius concoquere & apparare quàm Syrupis & aquis, quæ ob ſublimationem non modo ingrata ſunt, ſed & ventriculum offendunt propter empyrematis ſeminarium quod in ſe continent, ſi tamen aquæ ſtillatitiæ fuerunt in diplomate, vaſe duplici, balneo Mariæ paratæ vtilis eſſent & gratioſores. Apozemata igitur apparanda erunt, cum herbarum eſt copia & ſuo tempore vigent, vere & autumnò: Interdum tamen conueniet eadem parare aliis anni partibus, Ex herbis vel quæ folio vigent, vel loci oportunitas, vel cæli tepor eadem nec flaccidas, nec exinanitas reddit, præſertim dum in promptu ſunt, & radices & ſemina & fructus

fructus in officinis reſeruati, ex quorum materia omni tempore decocta præſcribere tibi liceat. In apozematis autem ordo & præſcribendi, & coquendi, & materia medicamentorum apta, & ſanationi accommodata & quantitas ſingulorum medicamentorum & totius decocti obſeruanda erunt. Radices & cortices, earundem plantarum, initio erunt præſcribendæ, vt & tuo honori conſula ſqui te artificem eſſe oſtendas, & pharmacopœo hæc rectè adminiſtranti, ſimul etiam conſulis: deinde folia herbarum cum ſtipitibus & tenuibus aſparagis & earundem ſummitatibus, tum feminibus & fructibus additis: poſtremo cum purgantia efficere uoles, eadem miſcebis cum floribus, qui magnam non ſuſtinent decoctionem, non modo flores, ſed etiam purgantia medicamenta, quorum vis in calidate & abſterſione ac tenuitate inſidet in ſuperficie, non autem in mole & craſſamento, ideo in fine miſcenda & iniicienda ſunt, vt paulo temporis ſpatio deponant iſtam vim abſtergendi & purgandi, Excepto Polipodio quercino quod propter viſciditatem quam in ſe retinet ſi priore loco cum Radicibus collocetur, non alienum erit. Decoctio ita paratur cum aqua ſimplici, & circa finem nonnunquam ſtillatitijs aquas pro varijs

Scopis effundi iubeas, ne quod coctum est recoquatur. Ideo aliqui in eo peccant quod sine vlla animaduersione simul cum decoctione præcedentium miscent & excoquant, huicque accedit vt ea decoctione a quarum vis euanescat. Saccharum addendum tum in calidis & frigidis affectibus, Non tantum ad saporis gratiam conciliandam, sed etiam ad conseruationem & absterfionem moderatam, vt ab infarctu liberet poros obstructos: Ad leniendum interdum penidias recentes miscemus: ad magis incidendum; vt in affectibus pulmonum à lenta materia & frigida, vel in affectibus renum & vesicæ, propter calculum & vlcera, in quibus colluuius crassa abstergenda est, sacchari candi aliquam quantitatem: in affectibus autem frigidis, vt in paralyfi, spafmo & Epilepsia (modo non æquè dissuadeat ætas florens) loco sacchari mel simplex addes, vel si temperare volueris æquis portionibus sacchari & mellis quantitatem æquam præscribes. Ad sanationem magis aptum erit, quando morbus est multum frigidus & à pituita larga & ea viscida malum oritur, Mel Anthosatum apponeres & clarificandum apozema per colum medicum, ne plus iusto crassius sit, & maximè vt ad omnes corporis partes pertingat, vt

hoc

hoc perficias & circumspicias, quod à multis negligitur in decoctione paranda, vt sit magis diluta & perlucida, nunquam maiora semina, frig. addas, Nec ficus aridas, quia sua viscagine turbulentum reddunt apozema, addas licet in opere administrando, antequam pharmacopœus colet, decoctum id refrigerari sinat: nam calefactum crassum cum tenui permiscetur, ideoque turbulentum redditur & minus lucidum: Aromate suauiora reddimus, vel simplicibus medicamentis, vel pulueribus compositis quæ odoris iucunditate suauiora reddunt, & vt in longiores partes deferantur, tenuitate essentia faciunt. Illi inepti sunt, qui pro aromate interdum immiscent Eboris ramentum, cum nullo odore feriat, vtile tamen esse potest in palpitatione cordis, ad roborandum ventriculum, vterum confirmandum, ad omnes immoderatos fluxus, & fluorem muliebrem. Ad huiusmodi denique apozemata moris est apud nos addere etiam Syrupos in officinis reseruatos pro variis scopis, addimus circa finem citra vllam coctionem eò consilio, vt incuria pharmacopœorum occurramus, quibus interdum non liceat omnia colligere in apozemate præscripta vt vires repleant reliquorum, cum similibus scopis, velut ex auctuario quodam, non

inutiliter Syrupos permiscemus.

CAPVT XIV.

MAteria apozematum qualis esse debeat, ex variis medicamentis & plantarum partibus ex ordine & serie qui constitutus fuit antea in paranda decoctione satis potest intelligi. Porro notum erit, vt in omni decocto tibi nunquam errare liceat, siue in morbis calidis siue frigidis glycyrrizæ radices præscribere. Etsi dulcedine morbis calidis aduersa videatur, humiditate tamen non nimia, quæ non obstruit, sed tenuis est & leniendo valet, siccitatem in morbis biliosis retundit, ^{ad 2. pos} & ideo dicta quòd largiore humiditate sitim restinguat. In affectibus thoracis & pulmonis, renum & vesicæ largior quantitas erit præscribenda vt leniendo sputi eductionem promoueat & in viis vrinæ sabulones expurget, asperatōsque meatus ceu obliniat: & quando in renibus calculi sunt, eosdem minuere potest Borrago, Buglos. Adiantum album nunquam prætermittas, nam temperata aut ad temperatam facultatem cum accedant, ex æquo omnibus affectibus tum calidis tum frigidis conferunt. Quidam sine vilo dio

rismo iisce omnes addunt capillares herbas, vt vocant, cum tamen post adiantum in affectibus calidis & destillationibus ab humore tenui iuuare non possunt, quodam caliditatis gradu maiore & plus satis aperiendo vias; item hordeum mundatum nunquam prætermittunt in omni apoze- mate, sed re vera in morbis multum frigidis & quibus flatuum est copia in ventriculo & partibus naturalibus satius est omittere ob frigiditatem & flatus quos generat; fructus vero omnes, vt isti communes, pruna dulcia, passulæ mundatæ, ziziphæ myxæ seu sebesten & dactili: Ex iis quidam poterunt semper in apoze- matis præscribi vtiliter, vt pruna, quia caliditate non excedunt, sed leniendo valent, in affectibus calidis acida vel acido-dulcia, in frigidis affectibus dulcia: passulæ omnibus morbis accommodari possunt, quia temperata facultate: Cum magis abstergere, & lenire voles, mundare à vinaceis necesse est: Si interdum astrictio quædam mollienda, cum gigartis adii- cias: Ziziphæ in omnibus affectibus præscribi possunt, nisi cum obstructions sunt, nam spissandi vim habent, ideo spiracula corporis præcludunt: sebesten leniunt in affectibus multum calidis, & quibus caput

vaporibus repletum & afficitur, palmæ o-
mittendę sunt, quia insigni dulcedine prom-
ptè in bilem vertuntur, & capitis grauedi-
nem pariunt: ij denique fructus poterunt v-
tiliter dari, & eorum modus in augendus in
affectibus thoracis & pulmonum; tres illi
flor. cord. nunquam omitti debent, quia qua-
litate non excedunt, saltem frigidiore, cali-
diore paululum: sed quæ non abducant à la-
titudine temperamentum.

C A P V T X V.

CÆ T E R V M, materia apozematum à
qualitate varia, pro ratione & scopo
medentis, & ipsa quoque erit: in morbis cali-
dis refrigerans; interdum spissans, si humo-
res plus æ quo tenues sint, & impetu distilla-
tionis irruant, vel aliqua excretio interdum
supprimenda sit; alioqui tenui essentia va-
leat; quia eo scopo post minuens medica-
mentum apozema exhibetur, vt humores ad
expulsionem parentur; & si vim inspissandi
haberent, medicamenta quæ ingrediuntur
omnia, poros & meatus occluderent, qui re-
ferandi sunt vt humorib. expellendis via pa-
reat. In morbis autem frigidis sit qualitas re-
calefaciens, extenuans, aperiens, obstructio-
nes magis vel minus abstergens & discu-
ziens;

tiens; verū si distillationes incumbāt è cerebro in aliquas partes sibi subiectas, vt in pulmones, vel in neruosum genus, vt in paralisi, epilepsia; vel ex multitudine pituitosi humoris in cerebro coerciti, vt in apoplexia & caro, motu & dilatatione viā in neruosum genus sibi sternat, & respirationis organa permultum repleat, ita vt de instante præfocatione periculum immineat, radices quinque aperientes præscribendæ nullo modo erunt.

C A P V T X V I.

IN morbis calidis apozemata magna ex parte tantum alterare & coquere debent, non autem perpurgare, quia in morbis biliosis pauca est materia quæ non egeat partita euacuatione, sed simplici alteratione, ante eradicatiuum medicamentum duplici de causa præscribenda; primo quia ratione humoris & intemperiei, quies est necessaria. In calida natura aquæ potio refrigeratio & quies, ait Hip. Nam coctio fit in quiete, vt purgatio in motu; ideo purgatio quia mouet & exagitat humores, & promptos facit & parat ad incendium, coctio & purgatio simul peragenda non erunt; nisi in morbis calidis, in quibus materia multa est,

& à bile vitellina fiunt, maximèq; omnium, cum fuerit exhibitum Catharticum medicamentum, tum humoris reliquix remanent, & quædam obstructions vt in febribus tertianis nohis, simul coquere, aperire obstructions, & purgare biliosa pituitosa cõueniet. In morbis autem frigidis, & à materia multa, præsertim pituitosa excitatis, cum insignis est Cacochimia, Apozemata non solum concoquant, sed etiam proprium & accomodatum humorem euacuent, Nam vna vice nec altera, interposito temporis intermedio, inter minuens & catharticum medicamentum, humor non potest postea totus educi, nisi per partes fuerit purgatus: Molliendum autem erit, cum febris nulla est continua, sed intermittens, in processu temporis, tempore quietis id faciendum erit. Cauendum tamen in aliis morbis pituitosis, si fluxiones & destillationes fuerint coniunctæ vehementiores, hoc tempore intermedio apozemata purgantia præscribere, sed tantum ea quæ humorem concoquere valent, cum proba abstersione & discussione, moderata extenuatione, vt in paralyfi in principio.

C A P V T X V I I.

De Apozematum quantitate.

Quantitas apozematum in singulis medicamentis ea obseruanda, vt quæ sunt medicamenta calida minori modo addenda, sed in morbis frigidis, vt sufficiant æquanda, omnis enim excessus contrario & æquali est corrigendus. Temperata, vt Borrage. Bugloss. vel æquali mensura sunt præscribenda, vel in augenda, quia semper in melius proficiunt: Ea tamen quæ frigida sunt, vel in augenda mole & mensura aut saltem numero, & serie maiori, quæ quantitatem ponderis expleant: Saltem diligenda ea frigida medicamenta in decoctis, quæ tenuitatem essentiæ habeant, & sic mediocri erit mensura præscribenda: In plantis, vt radic. helenij, Aristoloch. Rad. Cappar. & similibus herbis amaris, vt Absynthij, conisæ, Thimi, foliis Artemis. Sabinae, horum omnium mediam quantitatem sumas, vel tertiam partem: Si conferatur proportio ad reliqua alia medicamenta, vel siglicyriza additur, ad ʒ. j. Rad. Helen. ad ʒ. ʒ. Sufficit si Borrage. & Buglossa

ad m. j. præscribatur, fol. absynth. & Artemis. an m. ß. vel ad tertiam partem, m. j. ne decoctum amarore imbuat, quod ægri postea esset ingratum: Semina autem non ad magnam quantitatem sunt præscribenda, vt dosimaliorum æquent, sed pro tota decocti quantitate & variis sanationis scopis plus minusve adiicienda erunt, sic de fructibus & floribus modum non liceat præscribere, quia si auctior sit, errare non poteris, cum illorum vis sit tenuis, & facile euanescat, ad duplum etiam relinquorum inuagens: Nisi in floribus multum calidis & crassis, vt stœcad. & camomel. temperatis, qui nunquam adhibentur, cum oleosa quadam substantia constant, & vaporoso spiritu, ingratum reddant apozema.

CAPVT XVIII.

*De Medicamentorum purgantium
quantitate.*

Purgantium quantitas esse debet pro humoris vacuandi multitudine, medico circumspecto leuiora & mitiora inuagenda, vehementiora minuenda, si quæ ex iis media sunt, æqualis & moderata sit proportio, chariorum medicamentorum, vt Rhabarbari quantitas, modum nec leuiorum, nec

medio-

mediocrium æquare debet, vt sumptui parcas ægrorum & pharmacopœis aliqua ex parte obsequaris. In decoctione ad conseruationem & saporis gratiam, tantum sacchari & reliquorum dulcium addes quantum in longiores dies recondere licet: si in breuiores dies & pauciores, minus, pro gustantis natura & saporis gratia; in quibus dulcia magis placent, plus; quibus minus, minor sit quantitas: quod si parum in affectu profunt: nihil vel minimum adiiciendum erit: Nam mulieres in histericis pathematis maxime dulcibus offenduntur, ideo nonnunquam in accessionem præfocationis vteri corruunt, ex eorum dulcium vsu. Aromata autem ea quantitate esse debent definita, vt minima sui portione efficacissima sint, atque ne lædant cauendum: in iis quibus ad longiores partes deduci volumus medicamenta & vrinas mouēdas hæc aromata sunt necessaria. In delicatis & generosis quibus talia placent, mensura erit augenda paululum: quibus vero humor in propinquis viis est apparandus, nec ita aperire obstructions conuenit, & quibus destillationes sunt frequentes, & caput tentatur & repletur multis vaporibus, horum aromatum est mensura minuenda, vel interdū, sed raro non nihil de illis erit adiiciendum.

De Syruporum quantitate.

DE Syrupis autem & Oxymelite & aliis
 eiusmodi medicamentis in officinis re-
 seruatis & paratis, quæ adduntur circa finem,
 quantitas & modus ita erit præscribendus, vt
 ab ℥ j. ad ℥ ij. præscribantur iuxta numerum
 dierum, qui requiruntur in assumendo toto
 decocto. Itaq; quantitas totius decocti dum
 vsus erit ad tres dies sufficiet ad ℥ j. β. circa
 finem veris & æstate non maiorem modum
 præscribas quia apozemata corrumpentur,
 autumno circa finem, hyemis & veris initio
 ℥ ij. pro vi. diebus: interdum, sed raro ad ℥.
 ij. β. pro octo parabis.

C A P. X X.

De apozematum vsu in affectibus capitis.

APozemata siue decocta, in affectibus
 capitis siue calidis siue frigidis adhi-
 bentur. Ea autem quæ calidis erunt accom-
 modata, materia omnium medicamentorum
 erit frigida, & interdum incrassans vt in
 phrenitide, mania: Alioqui, nisi quid aliud
 suadeat, incrassantia nulla imponenda erunt.

Cæterum

Cæterum vt vis illorum frigidorum ad caput vsque perueniat, vel minimo modo aliquid de cephalicis medicamentis adiiendum erit.

C A P. X X I.

Apozema refrigerans & tenuium partium, interdum incrassans & aliqua ex parte si voles purgans biliosa & se-rosa.

A Ccipe glycyrrhizę rasę & parũ contusę, ʒ. j. Borrag. Buglos. cum propriis radicibus. *Cauere ne apponas radices aperiētes, nam humores furiosos redderent & ad incendium paratos.* Cichorij endiuiz tenellæ non lotæ, scariolæ, acetosæ: *In affectib. ab adustione bilis ve in mania, sequētes herbas utiliter adicies, quia vapores caliginosos & adustos expurgant & abigunt, summitatum fumar. lupuli, herbarum capill. quia respiciunt humorem melancholicum adustum. Si timeas ne reliqua alia præter adianthum plus satis aperiant & inflammient, ob id relinquant, an. m. j. Cum erit vera phrenitis, fol. Lactuc. ad m. ʒ. addere conuenit, quatuor. semin. frigid. maior. End. & portul. an ʒ. ij. in vera phrenitide semina papaueris albi & Lactuc. an. ʒ. j. hordei mundati. p. j. prunorum dulcium, passular. mundatar. ziziph. & sebesten an. par. x. Cum*

purgans efficere volueris, addes Tamarind.
 polipod. querc. recent. an. ℥. j. Mirabol. ci-
 trinar. & Indarum cum oleo amygdal. dul.
 confricatarum an. ℥. ℞. præter quam quod
 bilem adustam exigunt sua vi stiptica bilis
 feruorem reprimunt & tenuem compescunt,
 & immobilem reddunt, trium flor. cord. &
 nymphææ, an. p. j. vt deferatur vis reliquor.
 ad caput flor. Rorismarini, p. ℞. fiat decoctio
 ad ℞. j. & ℞. In Colatura dissolue sacchari
 albiss. q. j. clarificetur & aromatizetur cum
 pulv. Triasantali & diamargar. frigid. an. ℥. j.
 vel Syru. viol. ℥. iiii. loco sacchari. Misce, pro
 quatuor dosibus, sumat de mane ante cibum.

C A P V T X X I I.

*De usu apozematis, in affectibus capitis
 frigidis.*

A Pozemata in affectibus frigidis capitis
 ex iis medicamentis constabunt, quæ
 præcipue capiti sunt determinata, ea fere
 semper calida sunt & extenuantia, quia ob
 eius temperiem frigidam & humidam frigi-
 dis & pituosis tentatur morbis, ideo calida
 sunt & sicca simul extenuantia, & quia viscus
 est quod toti corpori communem præbet
 actionem, a strictione eget, vt roboretur, id-
 eo nux Moschata, stœchas cephalica sunt
 medi-

medicamenta, quia & calefaciunt, & aliqua parte adstringunt.

Apozema pro affectibus capitis frigidis, calefaciens, extenuans roborans, & si voles pituitam repurgans.

Accipe Rad. Acori vulgaris, calami a Rom. galag Crassæ. Ciperi. Rad. pœon. decrescen-
 re luna collectæ in Epilepsia (non tam supersti-
 tione collectionis vtilis: & necessaria quam quod
 eo tempore humiditas est absumpta. Ideo siccior
 reddita maiorem vim exsiccandi & absumendi
 habet, an ℥. β. glycirrh. ratæ & parum contu-
 sæ ℥. j. Beton. primulæ veris seu herbæ para-
 lytis, ob id in resolutione accommodata, saluiæ
 minutim incitæ, lampfuci. an. m. j. In Epile-
 psia, fol. hyssopi, m. β. vel terris pars vnius
 manipuli, ne maior quâritas redderet amarum
 apozema, Borrâg. Buglossi. cum propriis ra-
 dicibus, cap. ven. an. m. j. β. grana pœoniæ: ut
 in Epilepsia potissimum & aliis nervorum affe-
 ctibus, ℥. β. sem. anisi, fœniculi, liseleos & Li-
 gustici (nam pituitâ extenuando ad expulsionem
 promptam reddunt & potenter resiccant) an. ℥.
 ij. prunorum dulcium, p. Sularum mundata-
 rum. an. par. xii. cum purgans efficere volueris

E.

addes medullæ fem. Carth. & popil. querc. an.
 ℥.j. agaric. recenter thochiscati, ℥.β. flor. stœ-
 cad, Rorismarini, saluæ, sampsuchi, an. p. j.
 rrium florū cordial. p. ij. fiat decoctio, in co-
 latura dissolue ℥.iiii. sacchari, clarificetur &
 Aromatizetur cum pul. nucis Moschatae &
 & diamoschi dulcis, an ℥. β. adde loco sac-
 chari Syrupi conseru. aconi aut stœcados, ℥.
 iiii. Mellis ros. colati, ℥.ii. & si in decoctione
 antea non præscripseris mel anthosatum,
 hic in fine loco mellis rosati tantundem ap-
 pones: Misce, fiat apozema pro quatuor do-
 sibus aut quinque, sumat mane quatuor ho-
 ris ante cibum. In hoc eodem apozemate in-
 terdum ad humoris pituitosi crassi extenua-
 tionem maiorem Ioxymelit. scilliticid. mi-
 norem oxymelit simplic. quantitate ℥.ij. aut
 iiii. addere poteris.

C A P V T X X I I I.

De vsu apozematum in oculo-
rum morbis calidis.

A Pozemata quæ in affectibus oculorum
 præscribuntur, eadem esse debent, vt in
 affectibus capitis calidis, satis magnam quan-
 titatem addendo fum. ad m. j. β. vel ij. Nam
 ex Galeno oculos purgat, per fumum dissol-
 uendo: & si admota valeat, assumpta non est
 inefficax, præsertim cum nullo calore pol-
 leat

leat in iisee affectibus calidis. Caue præscribere lactuæ folia, nam peculiari inimicitia oculis aduersatur & cibi & medicamenti vice, quia valde spiritus visorios incrassat, ideo visum debilitat. Reliquum est vt in eo decocto quod fit pro affectibus calidis, vt reliquorum vis ad easdem partes transferatur: herbæ fœniculi, m. ß. addere vel semen eius ad ʒj. vel ʒj. ß.

C A P V T X X I V.

*De vsu apozematum in oculorum mor-
bis calidis.*

A Pozemata quæ parantur pro affectibus frigidis oculorum, eandem habent materiam quam præ se ferunt apozemata præscripta pro capitis affectibus frigidis. In hoc tamen differunt, quod non adeo calfaciant, nec etiam extenuent, indicatione sumpta à partis natura & loco, quia oculi sunt molles, ideo facile à medicamento immutântur. Præterea non multum à ventriculo distânt, vt cerebrũ & sinus: ad hæc miscenda erunt medicamenta ophthalmica, illis ipsis partibus accommodata, quæ talia esse debent & euidente qualitate prædita, vt vapores & fumos qui spiritum visorium inficiunt probè discutiant.

Apozema pro affectibus frigidis oculorum recalescens, & vapores & flatus discutiens, & si voles pituitam purgans.

Accipe Rad. Enul. Camp. amarore expurgat
 & omnem vaporem discutit, fœniculi, acori gal-
 lang. crasse, & quia, magna ex parte, ventricu-
 lus per consensum oculos afficit, ad roborandum
 ventriculum, & calore eiusdem medicamenti
 discutiendos flatus & vapores, addes Cort. citri
 an. ℥. β. glycirr. rasæ & parum contusæ, ℥. j.
 Euphrasie, herbæ fœniculi, verbenæ, Beto-
 nicæ, salviæ minutæ, summitat. thymi, an. m.
 j. Borrag. Bugloss. cum propriis radicibus
 herbarum Capill. an. m. β. sem. anisi & fœ-
 niculi, an. ʒ. ij. prunorum dulcium, passula-
 rum mundatarum. an. par. x. si purgans reddere
 volueris, addes agarici recenter trochiscati, ℥.
 β. Myrabol. chebul. conficatarum cum o-
 leo amygdal. dulc. ʒ. vi. Medullæ seminis
 cartham. leuiter contusæ, ℥. β. trium flor-
 cord. stæcados & Rorismarini. salviæ, an. p.
 j. fiat decoctio ad ℥. j. s. In colatura dissolue
 sacchari albiss. q. s. Clarificetur & Aroma-
 rizetur, cum puluere nucis moichatæ, ʒ. j.
 puluer. aromatici ros. propter vetriculum cura
 quo consentit. ʒ. β. Addes Syrup. conseru a-

cori vel è stœcade. ℥. iii. Mellis rosati col.
℥. ij. Misce, fiat Apozema pro quatuor do-
sibus, sumat de mane quatuor horis ante
cibum.

C A P V T X X V.

De Apozemate Cordis.

Apozemata quæ cordis affectibus cura
calidis tum frigidis accommodantur,
ex cardiacis medicamentis erunt paranda,
quæ his summis generibus continentur.
Ex Auicen. Quædam sunt eiusmodi, quæ
spirituum substantiam instaurant & au-
gent, vt vinum, & quæ suauem & bonum
odorem effiant, vt Moschus, Ambar. Zibe-
tum. Alia verò sunt quæ spiritus dissolutos
vniunt & confirmant vt succinum & carabe
Arabum, spodium: Alia quæ spiritus impu-
ros mundant & eluunt, & claritatem affe-
runt, vt vniones, Margaritæ: Alia sunt quæ
caliginem, vaporem & humorem exustum
purgant & euacuant, vt lapis Cyaneus, la-
pis Armenius: Alia quæ propria vi & insita
natura cordi auxilium conferunt sine cui-
denti qualitate; vt Bugloss. vel occulta vt
Aurum, gemmæ pretiosæ & legitimæ: Ex iis
quædam calfaciendo Cardiacæ proficiunt, vt
doronicum: Alia refrigerando, vt Caphura
vera, aqua rosar. santali, violæ, rosæ.

*De vsu apozematum in morbis cordis
calidis.*

Apozemata quæ cordis calidis affectibus præscribuntur constare poterunt ex medicamentis cardiacis. Quæ vim refrigerandi habent, & nonnunquam tenuitatem essentia cum leni & moderata absterfione habent, & purgantia quando licet miscenda erunt, quæ clementer & leniter purgare apta sunt; nonnunquam etiam racoma seu Rhabarbarum additur, vt circa finem decocti vel in decocto. Caue ne multum aperientia adicias, quia inflammationem & incendium in spiritibus parant.

Apozema cardiacum refrigerans cum tenuitate Essentia, omnem malam putredinem inhibens, & si voles purgans biliosa.

Accipe Cort. Radic. Bugloss. Etsi Gal. in folia vino iniecta animi latitiam augere scripserit, & ob id vim foliis tribuit. Auic. tamen & posterii efficaciorē facultatem in corticib. radicū accommodarunt & experientia obseruarunt, ℥. ij. Acetosæ cum rad. hac plurimum valet in putred. maligna, vt in pestilentib. febribus simul ac feruidū calorem reprimunt & quada-

dam absterfione valet, vt omnia Lapathi genera ex quorum classe est, & in decoctione aluum emollire certum est: succus tamen eius extractus aluum astringendi facultatem retinet, Lenticulæ aquarum, scariolæ, Endiuix tenellæ, cichor. rostri por. Borrag. Bugl. cap. ven. (quia temperata) adiantos vtriusq; calidis & frigidis utilis esse censetur, an. m. j. sem. Citri, Cardiacum medicamentum, & omnem putiferam labem & putredinem arcet siccitate magis quam villo calore euidenti, End. & portul. quatuor semin. frigid. mai. an. ʒ. ij. hordei munda. p. j. B. granor. Berberis, aciditate omnem putredinem restinguit & tenuitate essentie valet, ʒ. ij. aut iij. prunorū dulciū, passularum mundatarum, ziziphæ, quia sanguinem & spiritū plus a quo ferendum temperant, an. par. x. Tamarindorum, si purgans efficere voles, ʒ. ij. Mirabol. Citr. cū oleo amygdal. dulc. confricatarum, ʒ. j. purgant enim bilem sine vlla caliditate & simul corroborant, interdum si magis purgare voles modo non insignis caliditas dissuadeat, Rhabbarbari optimi crasso modo contriti, ne illius vis euanescat in panno raro ligati, ʒ. ij. aut iij. si plus purgare voles. Vt autē efficacius sit Rhabbarbarum ad euacuandam bilē, satius est circa finem decocti inter clarificandū eius dilutum exprimatur. & spic. nard. gra. iiii. vel iiii. addere vel ʒ. ss. vt scelicem reddas eius opera-

tionem, flor. nymph. & si vigeat tempus, florum mali perfici, rosarum rubrarum, trium flor. cord. an. p. j. fiat decoctio ad ℥. j. Si tantum ad tres dies exhibere velis, vel ad plures, ℥. j. ℥. In colatura dissolue sacchari puriss. q. s. clarificetur & aromatizetur, cum pulv. diamargarit. frig. & triasantali, an. ℥. j. adde Syrup. de succo Aceros si pareretur oxisacchara simpl. vel Syrup. viol. vel Syrup. cap. ven. vel Acetosæ simpl. modo peccus male nō habeat nec ruffis sit coniuncta, ad ℥. j. Si purgās magis efficere voles, prætermisso tamen racomate, Syrup. rosat. sol. recens, vel mediæ ætatis sine Scamm. ad ℥. iiij. vtiliter dare poteris.

C A P V T X X V I I.

De usu apozematū in affectibus cordis frigidis.

Apozemata in affectibus cordis frigidis ut in palpitationibus, exolutionibus à crasso humore procedentibus & melancholicis affectibus quibus cor iuuandum est, ex ea medicamentorum materia constare debent, quæ non modo vim cardiacam præ se ferunt, sed & aperiant obstructions, attenuent lentos humores, & quædam purgantia adiicienda quæ crassos humores euacuent.

Apozema

*Apozema in affectibus frigidis cordis cale-
faciens, obstructions aperiens, ex-
tenuans & repurgans crassa
excrementa.*

Accipe quinque Rad. communium Ape-
ritiuarum in vino albo maceratarum, an.
ʒ. j. rad. enul. camp *hac hilaritatem prestat, &
cardiacum est medicamentum. Item expurgat
& ab infarctu & amarore liberat.* Rad. doro-
nici, *Qua vere est cardiaca* Rad. Been albi
& rubri, *sed quia non sunt legitima quales fue-
re descripta ab Arabibus, satius esset harum loco
substituere radices pastinaca siluest. vel augere
modum aliarum, vel ascribere calami aromati-
ci ʒ. ʒ. Borrag. Bugloss. cum propriis radicib.
herbarum capillarum, lupulorum, Betoni-
cæ, summitatum Thymi & Tamarisci, an.
m. j. Melissophylli, qua non solum est herba ce-
phalica, sed & cardiaca in affectibus frigidis, m.
j. sem. anisi, fœniculi, fiseleos & ligustici,
Nam ista semina discutiunt flatus, extenuant,
& spiritus excitant veluti conculcatos à crassis
humoribus & vaporibus, an. ʒ. ij. Cicerum
rubeorum, p. j. prunorum dulcium passu-
larum mundatarum, an par. xij. Si purgans ef-
ficere voles, polipod. querc. recent. fol. senn.
oriental. mundat. medullæ sem. carth. leui-
ter contulæ, an. ʒ. j. Epithimi recentis. ʒ. ʒ.*

Myrabol. Indar. & Chebul. cū oleo admygd.
 dule. confricat. an ʒ. ii. florum Rorismari-
 ni, sampfuci & trium florum commun. quod
 si esset in his locis in quibus malorum a-
 rantiorum magna copia est, quo tempore
 floribus luxuriant, addes florum eorundem
 mali Arantii, nam sunt cardiaci & aqua illo-
 rum est valde efficax, in Syncope cardiaca,
 siue assumpta, siue admota. an. p. ii. fiat deco-
 ctio ad ℥. j. ꝑ. in colatura dissolue sacchari
 puriss. q. ꝑ. clarificetur & Aromatizetur, cum
 puluerib. diambrae vel diamoschi. dulcis, ʒ. j.
 ꝑ. pul. Cynamomi electi ʒ. ꝑ. *Nam suo ardore
 fragranti gratius reddit apozema, sanguinem
 & spiritus crassiores extenuat & exsuscitat.*
 Addes Syrup. de pomis bene olentibus. ʒ. iiij.
 Si magis purgare velis, Syrup. saporis ex de-
 scriptione Mesuæi tantundem ad ʒ. iiij. rectè
 exhibere poteris, misce pro quatuor dosibus.

CAPVT XXVIII.

De apozemate thoracis & pulmonum.

A Pozemata quæ affectibus thoracis &
 pulmonum, tum calidis tum frigidis
 adhibentur, ex ea materia parari debent
 quæ leniendo valet, & dulcedine abster-
 gendo magna ex parte sputi eiectionem pro-
 moucat,

moueat, interdum tamen aliquando quædam medicamenta amara vsurpare poterimus, quæ pituitam lentam & viscidam expurgent, simul & mediocriter extenuent. Non quæ ficciora sunt & valde acia, quæ à Galeno inprimis interdiciuntur: Nam quod tenue est dissoluunt: quod crassum, topi modo impingunt & relinquunt, ideo Crassus humor qui postea coierit, in pulmonum bronchiis non sine magna virium exolutione è pectore vacuari potest, Item euitanda sunt acia, acida, quia tussim mouent & irritant, & maxime omnium quæ stiptica constant substantia, & tota astringendi facultate præstant, Nam sputi excretionem prohibent & respirationis organa ceu vineta & coarctata detinent: nisi quando hæmoptoicis sanguinis sputum aliter peragendum esse commonstrat, in quo necessaria sunt in immoderato fluxu sanguinis astringentia quidem, non sola: sed quæ lenem aut leniendi, aut leniter abstergendi facultatem præ se ferant vt saccharum ros. Tabellatum, & quæ simul spissandi viribus pollent cum astringendi, glutinandi & leniendi vi pollent, vt Syrupus de zyziphis, addas licet & Syrup. de pap. auxiliari ad sanguinis ex pulmonibus excretionem immodicam & ad destillationes acres à falsis

& serofis humoribus exortas: hæc medicamenta sæpius accommodata sunt affectibus thoracis & pulmonum calidis, & in hæmoptoicis, frequentius in Catharro à pituita falſa & acri humore.

C A P V T X X I X.

De apozemate in affectibus pulmonum calidis.

A Pozemata quæ in affectibus pectoris & pulmonum exhibentur calidis ex huiusmodi materia parari poterunt, vt in expuitione sanguinis & distillatione vehementer tenui, à pituita falſa, acri, vt cum aſtrictione vim abſtergendi habeant, & incraſſandi, in primis omnium leniendi, cum ea frigiditate quæ intus incendium remittat, vt in peripneumonia & inflammatione pulmonum.

*Apozemata frigida pro thorace
& pulmonibus.*

Accipe glycirr. rafæ & parum contufæ, ℥.ij. huius enim modus utiliter augetur quia multum lenit ſputi educationem excitat, Rad. conſolid. mai. quæ utiliter præſcribitur in hæmoptoſi & tabe, & ulcere pulm. à pituita falſa. nam præterquam quod adſtringit, ſimul etiam abſterſionis

stertionis non est expers, ad 3. s. vel 3. j. End. tenellæ, scariol. Borrage. Bugloss. cum propriis radic. myrryd. herbæ, Ea enim ex Dioscoride tabidis utiliter adhibetur, pimp. cap. v. n. non autem alias capillares, cum fluxiones excitent nimis aperiendo, vias dilatando fluxione oportunas reddant, Cichorij, qua tamen parum constringendi vires nec amaroris expers cum frigiditate expurgat, an. m. j. sem. malu. & bōba. multum enim leniunt, quatuor. sem. frig. mal. End. & portul. an. 3. ij. in destillatione acri & importuna, & sanguinis sputo ad humores tenues incrassandos, adde sem. pap. albi Lactuc. an. 3. i. pro prunorum dulcium, passularum mundatarum, iuiubarum & sebesten, an. par. xij. Si tam vehemens caliditas non fuerit, nec capitis dolor, addi poterunt pulpæ & carnes dactylorum numero sex, ficus autem aridæ cum præcessit sanguinis sputum vel instare potest, vtilis nullo modo erunt, nam sanguinis sputum excitant, nimia sua abstergendi facultate. Cæterum purgantia hæc apozemata nunquam efficias, nam alui fluxus periculosus est, præsertim in affectibus pectoris & pulmonum calidis, quia per alium vis non est recta per quam humores in pectore tuto & commodè expurgari valeant. Addas licet quod purgantia medicamenta non modo sputi coctionem impe-

diunt, sed & motu nouam fluxionem è cereb-
bro in pulmones cõcitant, triũ florum cord.
an. p. ii. fiat decoctio in aqua hordei medio-
criter decocti, de cuius colat. cape lb. j. ß. in
qua dissolue sacchari albissimi, q. ß. & in spu-
to sanguinis presente sacchari ros. tabulati, ʒ.
iiii. clarificetur & aromat. cũ pulu. diatraga-
cãti frig. & si sputũ sanguinis sit, vel id ipsum
pertimescas, sine caphura adhibendus erit,
puluer. diamargaritonis frig. ʒ. j. ß. Multũ o-
dorata nõ sunt præscribenda ne multo caput
vapore repleant, vt in tabe ex vlcere pulmo-
num, in qua cerebrũ continuis distillationi-
bus est paratum amandate fluxiones ad pul-
mones ob imbecillitatem vapores susci-
piendi: addes cum magis incrassare quam
lenire consilium erit, Syrup. viol. de bisant.
nec non Syrup. cap. ven. tantundem.

CAPVT XXX.

*De vsu apozomatum in morbis pulmo-
num frigidis.*

Apozemata in thoracis & pulm. affecti-
bus frigid. necessaria erunt in his, me-
dicamenta quæ non solum leniant & abster-
gant, sed & extenuent potenter lentos &
crassos humores.

*Apozema abstergens, leniens crassos humores &
moderatè calefaciens in affectibus frigidis,
thoracis*

thoracis & pulmonum.

Accipe glycirr. rasæ, & parum contusæ ℥. j. s̄ aperientes radices nunquam in his affectib. prescribenda erūt quia fluxiones excitant excepta rad. fœn. qua expurgat & extenuat, radix herbæ fullonum, iuuat enim vt Rogerius scripsit ex Guidone, eos quibus in thorace & pulmonibus fistula sunt admota & iniecta, ideo nos etiam assumptam non sine experientia vtiliter damus in affectibus thoracis & pulmonum, vel ad purulentam colluuiem vel pituitam lentam & crassam potenter expurgandam vt in asthmaticis ℥. j. rad. Enul. Cā. ℥. s̄ prassii, multum expurgat pituitam viscidam & lentam, Tussilaginis cum rad. Borræg. Bugloss. cum rad. herbarum capillarium & Beton. an. m. j. folior. hyslop. non plus addes ne amarore apozema reddatur ingratum, & summitatum Thymi an. m. s̄. sem. n. viticę, crassos humores expectore extenuat & educit, sem. anisi & fœnicule, an. ℥. ij. sem. mal. & Bōbac. nūquā pratermittēda in affectibus his quia leniendo respirationem facile efficiunt & sputi excretionē iuuant, an. ℥. j. s̄. Cicerū rub. p. j. prunorum dulcium, passularum mundatarum. iuiubar. & sebesten. an. par. x. nunquam sunt pratermittēdi isti fructus in malis pulmonum & thoracis. Carnium dactil. par. v. caricar. ping. modo pro-

bē postea clarius reddatur apozema nō officinē,
 quia ha ad sanationē sunt vtilis, paria iii. flor.
 Rosmarini stecados, vt habeat rationem
 membri mandantis, quod est caput pituitam de-
 mittens ad palm. vt iisdem floribus siccare va-
 leas, an. p. j. trium florum cord. an. p. j. semis,
 fiat decoctio, in aqua hordei mediocriter
 cocti, quia minus astringendo valet quam per-
 fectē cocti, & sine hac cum aqua simpl. si perti-
 mescas flatu quos generare poterit, de colatura,
 cape lb. j. β. in qua dissolue sacchari albissimi
 & penidiorum recent. qua abstergunt & iu-
 uunt sputi eductionem, an q. β. interdum vt lo-
 niendo abstergas & extenuas, sacchari Cand. ℥.
 iiii. aut v. adicies: Clar. & Aromatizetur,
 cum pulu. dia ireos simpl. ℥. j. β. & ad saporis
 gratiam conciliandam modo de serosis recre-
 mentis fluxionem immixtam non pertimescas.
 Cinamomi electi, ℥. s. addes cum lenire & ab-
 stergere voles citra insignem qualitātē: horum
 loco Syrup. cap. ven. ℥. iii. Mellis ros. colati ℥.
 ij. cum magis incidere extenuare & expurgare
 voles loco Syrupi cap. ven. Syrup. de glycyrriz.
 Syrup. de hyslop. prassio modo paratum re-
 periat, tantundem. Misce, fiat Apozema
 pro quinque dosibus, sumat de ma-
 ne quatuor horis ante
 cibum.

De vsu apozematum in affectibus ventriculi.

DEcocta siue alia medicamenta ventriculo accommodata illa qualitate prædita esse debent, cum in morbis calidis tum frigidis quæ astrictione robur confirmare valeant, ex actionis modo quem ventriculus à natura habet, facile intelligi potest; vt enim intestina ἀναδυστος, i. distributionis instrumenta sunt, hepar ἀμαρτίστος, sic ventriculus coctionis instrumentum; at cum coctio sine retentione perfici non possit, (vt indicant fluctuationes, quæ ventriculi cōcoctionis imbecillitatem ostendunt,) quæ sine astringentium ope fieri non solet, nam talia astringentia vniunt & firman vndique ventriculi habitum & latera vt chilus ex contactu ventriculi & idonea mora probè conficiatur, idè quæ ventriculo sunt propria & accommodata medicamenta, nunquam astrictionis expertia esse debent, quare vitanda omnia, quæ nimis aperiunt, dissecant, attenuant, ideo aliquot medici aberrant, qui ad coctionem iuuandam solum anisum summis epulis esitari præcipiunt, Nam huiusmodi vī dissecandi coctionem interturbant, quæ retentione perficitur; deinde etiam vitanda acria & quæ yrinas potenter mouent; addas

F

SCD Lyon 1

licet amara vna sui parte rātū officere; quod sapore solo ingrata sunt, ideo a ventriculo arctè amplexari non possunt, nec omnino conficiuntur: Altera tamen plurimum afferunt emolumentū stiptica substantia, qua inter ea sunt constituta quę faciunt ad ventriculum confirmandum & retētionem iuuant, ideo Aloes censetur, interdum *βισοματικη*, interdum *κακασοματικη*. Notandum tamen plurimum lædi ventriculum vsu medicamentorum purgantium continuato, & ex propria vi & natura quorundam medicamentorum, quę verè Cathartica sunt: Calida enim & acria sunt potentia, vt scammonium & scammonata, ideo coctionem turbant & ventriculum infirmant: alia eiusmodi, quę quibusdam naturis ventriculo aduersa esse consueuerunt vel *ιδιοσυκρησια*, i. propria & peculiari natura, velex aliqua ratione euidenti vt cum stomacho & ventriculo sunt imbecillo, & nimis laxo, & leniori occasione ad vomitum concitato, Agaricus præsertim non expressus, nonnunquam insensus esse solet: Sic & quædam alia medicamenta, quę ceu filis quibusdam & constitutione & compage sunt intexta, vt colocynthis, non solum vehementia, sed & ratione substantiæ suæ ceu impingitur ventriculo, & ob id diutius retinetur, & ex longiori mora ex-

dendi

dendi vires in membranoso & nervoso corpore exerit, & sua pernicie subinde magis infestat, sic & ex eorum classe est semen carthami, nisi sit bene contusum, & tenaciter hæret & vomitorium est; sed quando pernicie non æquat Colocynthidem, ideo ventriculo erit innocentius. Quædam etiam alia medicamenta purgantia tum ex illorum propria vi & natura ventriculo officere solent, vt Cassiæ pulpa & psyllium, quæ largiori sua humiditate dissoluunt & relaxant vim & robur ventriculi: & potissimum id fieri certum est in natura ventriculi frigidiore & humidioris & cum humor pituitosus vel aqueus vel mucosus multus influxit ad ventriculum, & in eodẽ coire potuit: Talia medicamenta noxia esse solent, ideò vitanda in morbis frigidis vt lienteria, diarrhœa, cum ex vitio ventriculi origo mali existit.

C A P V T X X X I I.

De usu apozematis in morbis ventriculi calidis.

DEcocta in affectibus ventriculi calidis (qui raro eidem accidunt, frequentius enim ventriculo morbi frigidi accidunt) materia medicamentorum ea esse debet, vt vi refrigerandi polleant, non tamen gradu excellenti, nam eorum vsu plurimum offenduntur omnes partes nervosæ membranosæ & exangues, vt viscerus, ventriculus,

B. 2

præsertim cum sit coctionis instrumentum & coctio calore perficiatur, ideo nimis frigida ventriculum debilitant, & coquendi actionem imbecilliolem reddunt: modice ergo frigida tum assumpta tum admota adhiberi poterunt, quæ simul astringentem coniunctam habeant, & quædam ex illis tenuitatem essentia aliqua ex parte præstabit, quia in præparatione non oportet ex toto astringere, ne humor in eadem parte impingatur & postea sequente medicamento expurganti rebellis fiat expulsionem: præterea vel minimo modo quædam leuiter calida & ventriculo determinata; cuiusmodi est Absinthium, adicienda erunt, vt calorem ventriculi non nihil iuuent; animaduertendum præterea erit, quia medicamenta purgantia adicienda necessario erunt, vt ea ipsa clementiora sint & quadam astringente iuuent confirmando robur ventriculi, ex quorum classe myrobalani vtilis erunt & interdum aliqua rhabarbari per exigua quantitas.

CAPVT XXXIII.

Apozema in Affectionibus calidis ventriculi refrigerans moderatè, cum astringente & non nihil ex iis quæ tenuis sunt essentia, si purgans effeceris ex colagogis clementioribus,

bus & astrictione valentibus.

Acc. glyciirr. rasæ & parum contusæ ʒ. j. a-
setosæ cum rad. borrag. bugl. cum rad. portul.
Nam ventriculi incendium refrenat & miti-
gat & spissandi vi ventriculū & eius actionem
vnire potest ad coctionem melius peragendā; ca-
ue ne ascribas lactucæ folia nec papau. nec in ca-
pite nec in foliis, quia plus æquo refrigerāt quam
portulaca. Ideo exhibita in febris ardentibus
quamuis ingens in toto corpore sit æstiuatio post
assumptionē ad aliquot horas & dies etiam agrī
offensionem in ventriculo sentiunt: ideo in his
decoctis huiusmodi medicamenta vitanda erūt
omnino: rostri porc. lēticulæ aquaticæ, capill.
ven. an. m. j. fol. mentæ tertia pars vnus ma-
nipuli, vt iuuetur coctio ab isto calido vt a-
stringente medicamento, non augendus modus,
ne precipuo sanationis scopo, qui in refrigerando
consistit, incommodet sem. end. & portul. gra-
nor. Berberis an. ʒ. ij. quatuor sem. frig. maio.
an. ʒ. j. hordei mūd. p. j. ziziph. Nā incrassando
vim vniunt, & sua humiditate leniente ardo-
rem reprimunt: prunor. dulc. pass. cum gigar-
tis, vt hoc modo astrictione proficiant ad robor.
ventriculum an. par. x. Si purgans efficere vo-
lueris addes myrabol. citr. cum oleo amyg-
dalar. dulc. confricatar. ʒ. β. aut ʒ. vj. Tama-
rindor. ʒ. j. rhabarbar. opt. & in crassas partes
contusi & in panno raro ligati ʒ. ii. aut iii.

non tã calore officit quã bilẽ euacuando iuuat, ideo euacuata materia refrigerat, & maximè quod astrictione polleat: sic in decoctione positũ, etsi vis eius purgandi quodãmodo euanescat, eã non tã exoptamus, quã aliquã astrictionem sibi insitã qua robur vètriculi confirmat, ideo periti medici in reualescentibus ex febre vel morbo longiore in medicamentis purgantibus Rhabarbari puluerẽ admiscere solent, eo scopo & consilio, vt partes exolutas confirment & roborent, triũ flor. cord. & mali perfici an. p. ij. flo. Nymphæ p. j. non equali mensura cũ aliis adicies ne plus refrigeres quam par sit, fiat decoctio ad lb. j. circa finem addes aquæ absynthii ℥. v. quia bilẽ per urinas educendo valde conferre poterit, in colat. dissol. sacch. ros. q. s. quia refrigerando astringit clarificetur & aromatizetur cũ pul. diamargaritonis frig. & triasantal. an. ℥. j. addes oxysacchar. simpl. nam astantem ventericulum refrigerat & corroborat, syrup. de end. & capill. ven. an. ℥. ij. misce, fiat apozema pro quatuor dosibus, sumat de mane quatuor horis ante cibum.

CAPVT XXXIV.

De vsu apozematũ in morbis vètriculi frigidis.

Apozemata quæ affectib. ventericuli frigidis conferunt, iis medicamentis debent constare, quæ cũ caliditate astrictione magis polleant, quam essentia tenuitate, vt semper

ventriculi robur, quod à frigido exoluitur plurimum, cōfirmare possint. Sed quia interdum humor lentus & viscidus in ea parte cōsistit, vel leuiore vel moderata extenuandi vi prædita erunt, vt ad expulsionem præparetur, & flatus qui à frigiditate in eo plurimi generantur discutiant & moderate resoluant vt ex aliquot seminibus odoratis: nam sæpius flatus materiam dissipant, spiritus naturales qui sunt in ventriculo tantum secundum Actuarium, iuuant & reficiunt, calorem naturalem qui in spiritib. sedem habet augent: cæterum medicamenta purgantia sint leuiora & moderata & astrictione polleant: Agaric. autem & semen carthami vomendi promptis & paratis non adhibeantur, nisi hoc pathema nullam suspicionem præbeat & humor multus aliqua sui parte egeat subductione: racoma etsi bilem primo & per se exigit, pituitam secundario mouet, ideo in his affectibus ventriculi frigidis non leue præsidium & emolumentum affert, simul ac insita astrictione corroborat,

CAPVT XXXV.

Apozema in ventriculi affectib. frigidis calefaciens astringens & quadantenus extenuans, flatusq; discutiens ex phlegmagogis medicamentis vel leniter vel moderatè pituitam seducens.

Acc. cortic. citri sicci calore iuuat coctionem
 cardiaca facultate spiritus instaurat, astricti-
 one roborat glycir. rasæ & parum contusæ ut
 temperet, rad. fœnic. ut discutiat flatu an. ʒ. j.
 rad. enul. camp. ʒ. s. mētæ, balsamitæ, summi-
 rat. thimi, borrag. Buglos. cum propriis rad.
 herbar. capil. an. m. j. fol. absynth. tertia pars
 manipuli vnus, sem. anisi & fœnic. an. ʒ. iij.
 quia discutiunt flatu, pruno. dulc. passul. mūd.
 sebesten. an. par. x. Si purgans efficere expe-
 diat Myrabolan. chebul. oleo amygdal. dulc.
 confricat. ʒ. s. polipod. querni. quia semper se-
 rosa abducit quibus etiam abundat ventriculus
 frigidior effectus ʒ. j. in vomendi non promptis
 medull. sem. carthami leuiter contusæ ʒ. vj.
 agaric. recent. trochiscati ʒ. j. s. rhabarb. opt.
 in panno raro ligati ʒ. iij. trium flor. cord.
 an. p. ij. flor. stœcad. & rorismar. an. p. j. Et si
 Cephalica sint medicamenta, ventriculo tamen
 recte accommodantur, nam è cerebro fluentem
 aut fluxam pituitam resiccant & calore aro-
 matico iuuant ventriculum frigidum, fiat de-
 coctio ad lb. j. s. in colatura dissol. sacchari
 puriss. q. s. Clarific. & aromatis. cum pulu. a-
 romatici. ros. & diarrhod. abbat. an. ʒ. j. addes
 syrupi de mentha. & buglos. vel capill. ven.
 an. ʒ. ij. misce, fiat apoz. pro quatuor dosibus,
 sumat de mane quatuor horis ante cibum.

De usu apozematum in affectibus Hepatis.

Apozemata & reliqua medicamenta quæ hepatis & affectibus eiusdem præscribuntur, ex horum materia constant quæ propriam & peculiarem vim obtinent ad idem mēbrum iuuandum, non minusquam in aliis plurimis vt Gal. aperte demonstraui lib. de Theriac. ad Pisonē ferè statim ab initio, & commentariis de compositione medicamentorū secundū genera à contrariis, rationis momenta & locos probationum instituit: nā vt experientia cōprobatum est, quædā esse quæ peculiarem quandā partem infestent, vt cātharides vesicam exulcerāt, & lepus marinus solos pulmones: sic etiam quædā existunt medicamenta quæ singulares corporis nostri partes iuuāt & afficiunt salutariter vt Bugloss. cor, eupatoriū hepar: etiam endiua non parum cōfert hepatis, præterea ex alia occasione sunt affectibus hepatis accommodata remedia: intellecta natura & constitutione hepatis; quia multis venis & earum osculis intercurrentibus hepar est conditum, ideo facilè laborat obstructionibus & à crassis infarcitur, ex Gal. lib. de compos. med. secundum partes: igitur quæ obstructiones aperiant & ab infarctu liberent, hepatis necessaria erunt medicamenta, qualia plurima sunt amara,

quæ expurgant, & terrea substantia viscus roborant. Porro cum hepar sit generandi sanguinis officina, sedes & domicilium ex omnibusque ibi gignuntur succis, impuritas vel æstuatio contingere solet, vt ex bile quæ ibi generatur; ideo quæ sanguinem emūdāt & ardorem extinguunt, vt in humorum adustione vel incipiēte, vel inueterata, qualis accidit in psora, lepra, elephantiasi, talia medicamenta, vt cichorium, oxylapathum, fumaria & similia accipienda erunt in primis: ac deniq; purgantia medicamenta præscribenda, quæ effreni motu & perniciæ non agant, sed mediocritate in affectibus tum calidis tum frigidis humorem peculiarem noxium exigant: quare rhabarb. à quibusdam hepatis medicina nominatur, nam præterquam quod euacuat, astrictione roborat. Itē vt hæc ipsa omnia medicamenta non modo immutando, sed & purgando melius suas vires exerāt, miscenda erunt aromatica, vt semina quædam odorata, vel alia medicamenta vt spica nard. schoenanthos, cinam. Santali, lignū aloës, vt vel calida aromatica facultate naturalē partitēperiem & spiritū foueant, vel frigida aromatica eodem modo proficient, instaurando spiritus, & quadam astrictione confortādo cuiusmodi sunt omnia santalorū genera & verū spoliū Arabum.

De apozematis in affectibus hepatis calidis.

A Pozemata seu decocta quæ in affectibus hepatis calidis usurpari solent, parantur ex medicamentis quæ refrigerant cum tenuitate partium & leuiter aperiant, & sanguinem calidum mitigent & temperent, ad di poterunt medicamenta purgantia vt rhabbar. in primis vtile, quamuis calidum, vacuata materia calida refrigerat: item quæ bilem exigunt cum frigida qualitate ac temperatura, vt tamarindi, sennæ folia, aut folliculi, quia serosa & adusta repurgant: caue ne præscribas myrabol. cum euident est obstructionum indicium.

Apozema in affectibus calidis hepatis refrigerans cum partium tenuitate leniter aperiens, purgans biliosa, serosa & adusta.

Acc. rad. gram. asparag. & acetosæ, citra calorem manifestum aperiunt obstructiones, glycir. ratæ & parum contusæ an. ʒ j. end. non lotæ præsertim accommodata calidis hepatis affectibus, scariolæ, cichorij. summitat. fum. & lupulor. frigiditate valent & suo amarore purgât, acetosæ, rostri pore. herb. capil. quâuis post adiantum quædam calorem habeât reliquæ capillares, non ita excedunt in aperiendo obstructiones, in affectibus calidis à bile vitellina valde

auxiliantur an. m. j. eupator. quia hepar iuuat,
sed minori mēura propter calorē m. f. quatuor
sem. frig. mai. end. portu. an. z. ij hordei mūd.
p. j. prunor. passul. mund. an. par. x. Si purgans
efficere necesse sit polipod. querni recentis tama-
rindor. an. z. j. fol. sennæ orient. mundatar. z.
vj. & cum sunt aduſta ſanguinis recrementa ex
ſumma hepatis caliditate epithymi recentis z.
f. & ſi robur addere voles cum leniori purgatio-
ne astringente medicamento. myrabol. citrina,
cum oleo amygd. dulc. confricat. z. ij. trium
flor cord. p. ij. fiat decoctio ad ℥ j. β. in colat.
diſſol. ſacchari albiff. q. ſ. vel cum purgationē
maiores efficere voles, in apozemate & bilioſo
& ſeroſo ſubducas, ſyru. roſ. ſolu. z. iiii. aut z. v.
paulo antea ſaccharo adiecto: permiscebis
rhabarb. opt. in panno raro ligati & inter
clarificandum fortiter expreſſi z. ii. cum ad-
dere volueris racoma, detrahas myrabolanos:
ſi plus purgandum foret cum leniore aſtrictione
à medicamento relicta; ſpicæ nard. ℥ ii. pulu.
diarth. abbat. z. j. f. addes ſyrup. de end. ſimpl.
ſi magis aperire conſilium ſit ſyrup. de end.
compoſ. & ſyrup. de ſum. an. z. ii. miſce, fiat
apozema pro quatuor aut quinque doſibus,
ſumat de mane ante cibum.

C A P V T X X X V I I I.

De uſu apozematum in morbis hepatis frigidis.

Apoz. in affectib. frigid. hepatis ex eiuf-
modi

modi medicamentis confici poterunt quæ non tantum calfaciunt, sed & obstructions multum aperiunt; nam omnis frigida intemperies, siue solitaria, siue cum humoris influxu magis, vias hepatis occludit & coarctat venarum spiracula, cum humor præsertim adest, infarcit; ideo quæ potenter obstructions expediunt & vias hepatis liberas reddunt, iis affectibus in primis necessaria erunt; præterea medicamenta purgantia quæ pituitam eliciunt & serosa etiam subducunt præscribenda erunt; Nuaquam prætermittenda tum ea quæ leuiore adstrictione viscus roborant, & quæ cognatione idem membrum iuuant maxime omnium miscenda erunt.

Apoxema in affectibus frigidis hepatis aperiens ab infarctu liberans & lentos humores extenuans ex phlegmagogis & hydragogis pituitosa & serosa repurgans.

Acci. quinque radices communium aperiuiuarum in vino albo maceratarum, ut magis aperiant glycirr. rasæ & parum contusæ ut leniat & temperet, an. ℥. j. rad. Enul. Camp. ab infarctu liberat, rad. Pentaph. mediocrem aperiendi vim habet & astrictionis non est experta, ideo hepar confirmat, an. ℥. l. Eupat. quamuis hæc Mesuæi, Auic. & Pharmac. ab infarctu vias expedit, agrimonix, qua verum est Eupat. Diosc.

& Gal. ideo hepaticæ Gal præcipuè amicam.
 Chamed. Chamepyt. aperiunt enim obstru-
 ctiones Pimpinell. Pilosellæ etiã obstruções
 liberant, ut in febribus à varia materia ortis.
 Quales sunt febres erratica plurimũ conferunt,
 hepaticæ tertettri ex Neotericorũ obseru. plã-
 ta hepaticõmoda censetur herb. Cap. llar. Bor-
 rag. Bugl. cum propriis rad. an. m. j. Endiuia,
 Tenellæ & Cichorij, quia temperant reliqua
 calidiora & hepar iis gaudet imprimis, minori
 modo adhibenda ne præcipuũ sanationis scopum
 impediant, an. m. f. sem. apii petros. potenter. n.
 aperiunt obstruções, anisi & fœniculi, an. ʒ.
 ij. Cicex. rub. p. j. prunorum dulcium par. viij.
 passularũ mundatarũ par. xii. quia carni he-
 patis similes sunt & coquendi virib. valent, ab-
 stergunt & confortat, hepaticæ præsertim auxilia-
 ri, scribit Gal. lib. de compos. medicamentorum,
 secundum locos in probanda & examinanda
 compositione xiphosos, horum ideo dosim hic au-
 gere magis expediet, quam prunorum modum &
 mensuram; Si purgans efficere volueris, adde
 medullæ sem. Cartham. leniter contusæ ʒ. j.
 pituitam enim & aquas educit: Polipod.
 quete. recent. & fol. sem. orient. mund. an. ʒ. l.
 Agaric. recent. trochisc. ʒ. ij. Rhabarbar.
 opt. in crassas partes contusi & in panno ra-
 to ligati, ʒ. j. vel ʒ. iij. quia est medicina he-
 patis & confortat, cuscute, aperit obstruções

*& mundificat hepar cum caliditate, trium
 florum cord. genistæ, & sambuci, an. p. j. fiat
 decoctio ad lb. j. ß. In Colatura dissolue sac-
 chari, q. s. clarificetur & Aromatizetur cum
 puluere Cynamomi electi & diarrhod. ab-
 bar. an. ʒ. j. addes Syrup. de Eupat. si paratum
 inuenias in officinis, sin minus eius loco
 Syrup. de Bysant. ʒ. iij. Mellis rosati colat. ʒ.
 ij. Misce, fiat Apozema pro quinque dosibus,
 sumat de mane quatuor horis ante cibum.*

C A P V T X X X I X.

De apozematis splenis.

A Pozemata reliquave medicamēta quæ
 in splenis tum calidis tum frigidis affe-
 ctibus vsurpantur, quædā peculiaria illi parti
 habere debent, vt Capparim vel eius corti-
 cem, scolopendriam, acerum simplex, vel
 compositum vt Stilliticum, quæ semper aliis
 medicamentis miscenda sunt, vt aperire va-
 leant, vt scripsit Auenzo. Eo scopo vt reli-
 qua medicamenta spleni accommodata ad
 illum ipsum vergant & deducant, nam hoc
 membrum nutritur, seu potius fouetur, &
 voluptate fruitur acidis. Ideoque talem sa-
 poremiā se splen continet: Ex ea familia-
 ritate prompte reliqua alia secum trahit,
 & ob id cum facilitate vttiliora reddit.

alia præsidia. Ideo Auicenna ait acetum, ingredi debere in Curatione affectuum splenis, in causa calida alterando & aperiendo & medicamenta deferendo, vt in frigida præsidia deducendo, incidendo & extenuando; ideo & præterea monet commodius esse vt singula medicamenta adhibita spleni ebibantur cum Syrupo Acetoso, aut cum aceto & vt fiant & parentur ex illis ipsis emplastra commista & temperata cum aceto, Cæterum cauendum ne quantitas horum acidorum exuperet, etsi spleni familiaria iudicentur ab Arabibus quia humorem Melancholicum ob consimile temperamentum, (scilicet quia acetum frigidum & siccum) nimis auerent, vt faciunt ea quæ acida sunt omnia, præsertim dum splenis affectu à frigiditate pendent & oriuntur: splen autem cum eo crasso & limoso infarciatur humore, necessario erunt medicamenta, incidentia & extenuantia & ab infarctu liberantia: ob id Cappar. non solum insita vi spleni auxilium affert, sed & suo amarore meatus liberat & expedit: Cardiaca item medicamenta quæ lætitiâ afferunt vt Borrâg. & Bugloss. vtilia erunt propter humorem melancholicum à quo magna ex parte splen laborare solet: Itaque necesse est distinguas, quomodo discriminentur inter se spleni

spleni accommodata remedia, cum iis ipsis
 quæ hepatis adhibentur: Nam in splene talia
 esse debent, vt magis sint acria, ob id acetum
 non est hepatis vtile, sed spleni amicum & o-
 mnia medicamenta splenitica prædita sint
 oportet vehementiore virium gradu seu a-
 periendo, seu extenuando, seu incidendo &
 expurgando, indicatione sumpta tum ex si-
 tu loci, tum ex humoris conditione: Nam
 splen longius abest quàm vis integra medi-
 camentorum æquè perducì valeat vsque ad
 hunc locum, sicut hepar: ex cõditione dein-
 de & natura humoris melancholici crassio-
 ris, qui superabundat & multum resistit ter-
 rea substantia, & crassiori mole non cedit
 medicamentis, vt alii tenuiores quibus he-
 par plerunq; turget, quam illo limoso recre-
 mento; addas licet in roborantibus medica-
 mentis quæ spleni adhibentur magis neces-
 sarium vsum in hepate, quia nobilius vsu, &
 toto corpori in primis necessarium, eam ob
 causam quæ roborant, vel quæ prædita sunt
 quadam propria vi & astringitione, minus e-
 rant in splene vsurpanda, quum membrum
 sit altero ignobilius: ad hæc quia talia a-
 stringentia obstructions efficiunt, quæ plu-
 rimæ in splene accidere solent, vitanda e-
 runt. Medicamenta autem purgantia melan-
 cholicum humorem educant necesse est, &

quia obstructions interdum non solum ab humore melancholico gignuntur, sed etiam à pituitoso, ideo phlegmagoga conducent. Itaque ante omnia deligenda erunt atram bilem purgantia, & vt cum illis viribus sanguinem atrum & caliginosum emendent, & terosa & adustos humores euacuent.

C A P V T X L.

De apozematis in morbis splenis calidis.

A Pozemata in affectibus splenis consimilia esse debent cum illis ipsis quæ affectibus hepatis præscripta fuerunt, in hoc tamen vel paululum mutare expediet, vt loco Eupatorii, quod adhibebatur hepati amicum, in Apozemate quod in affectu splenis calido conueniet, cæterac. vel scolop. tantundem ad m.ß. adiciet, circa finem permiscendus erit Syrupus acetos. simpl. in loco aliorum ad ʒ. ij vel iij. Nam plerunque quæ aciditate valent, spleni sunt familiaria refrigerando, vt in inflammationibus splenis ardorem & incendium remittit, nec deest extenuandi vis, qua humorem ex inflammatione quadam adustum, ob id crassum disseccare possit. Apozemata quæ in frigidis affectibus splenis accommodantur & à crasso humore natis, ex horum præcipua materia constant,

constant, quæ valenter desiccare & extenuare potentes sunt, obstructions aperiendo, ab infarctu expurgando destinata sunt. Nam hoc limosum recrementum & crassum extenuationem vt mole replet & obstruit, aperiens & expurgantibus eger, siue atrabilis sit, & ex sanguinis fæce crassum & melancholicum, siue pituita, sed raro sola, sed permixta; vas venosum, vel splenis spiracula præcludens; hinc ergo fit vt ex splene suo male officio fungente, vel ad expellendum, vel ad minus probe attrahendum; durities, inflationes, tensiones, ictericia nigra, quartanæ, Elephantiasis, varices, cachexia & plerumque hydropes subsequantur, & ob huiusmodi hydropem non minus quam ex vitio hepatis, strangulato calore naturali, hepar sibi vicinum trahat in consensum, vt ex probo sanguine vel flatu, vel aquas aut pituitam generet ex quadam consecutione, quare in iis apozematis affectuum splenis frigidis miscebimus medicamenta, quæ simul flatu discutere valeant, aquas ducere vel desiccare, adeo vt communia sint cum illis quæ hydropi ab hepate genitæ per

ἰστροπιδία & περτοπιδία præscribi solent.



Apozema in affectibus splenis frigidis recalsciens, extenuans, aperiens, ab infarctu liberans, nigra deijciens, serosa, aquas & pituitam euacuans, vt in hydrope, vel propter splenis vel hepatis vitium accommodatum.

Accipe quinq; rad. com. temperatarum in aceto propter splenem: si vero hydrope impendeat propter primarium hepatis vitium cum vino albo, an. ʒ. j. rad. Enul. Camp. cort. rad. Cappar. praesertim spleni accommodatis, & cort. mediani fraxini & sambuci, potenter enim aperiunt & ab infarctu liberant. Cortic. Rad. tamaris. adhibetur interdum, nã tota haec planta ad splenis affectus est accommodata, an. ʒ. ʒ. summit. tamaris. omnium Capillar. in quibus est scolopendris, filicis, praecipuas vires obtinent ad affectus splenis persanandos Borrag. Bugloss. cum propriis radicib. lupul. cum calore quodam expurgant & sanguinem educunt caliginosum; Chamedrios, Chamepit. amarore expurgant, Pimpinell. Pilosell. obstructions aperiunt, & cum hydrope erit medendum brassicae marinae, nam siccandi facultate aquas absomit, salsa & nitrosa eadem abstergit, an. m. j. summ. fum. quae etsi frigida sit, amarore tamen ab infarctu liberat & temperat *validiora*

*Idiora ne hepar inflammari queat in transitu
 aliorum, Cichorijeodem modo præstat, an. m. ß.
 seminum viticis & rutæ siluestris præcipuè
 affectibus splenis adhibentur, nam valenter hu-
 morem crassum & melancholicum dissecant,
 calore acrimonia & tenuitate partium, an. ʒ. ij.
 seminis apij, petrosel. permultum aperiunt,
 sem. anisi & fœniculi flatu discutunt quibus
 abundant Melancholici, ʒ. j. ß. semin. End. &
 portul. Es si frigida, spleni accommodata, vel
 mediocri vi aperiendi, & aliqua tenui essentia
 prædita, reliqua calidiora remittunt & tempe-
 rant, an. ʒ. j. Cicer. rubeor. vel nig. si inuenian-
 tur, meatu aperiendo, seri & urina excretionem
 promouent, p. ij. prunorum acidorum, aliqua-
 tenus dulcium, eo enim magis spleni conueniunt
 quam omnino dulcia, passularum mundatarū,
 in hydrope præsertim ex affectu splenis orta, au-
 xiliantur, an. par. xij. Si purgās efficere voles
 vt plerunque conuenit in his affectibus, vt
 humor expulsionem rebellis per partes subdu-
 catur, addes fol. sennæ orient. mundat. epi-
 thimi, nigra enim deiciunt, polipod. querc.
 recentis, serosa & adusta euacuat, an. ʒ. j. &
 quia humor pituitosus interdum obstruit, vel
 multus generatur in hydrope leucophlegmatie,
 medul. semi. Catth leuiter cōtuse, vel æquali
 addes mensura vel ad ʒ. j. s. cum viscera robo-
 rare velis, Myrabol. Ind. & Cheb. an. ʒ. ij. succi*

rad.ireos, cum magis purgare tētas hydragogo medicamento ad aquas educendas ad ℥ ℥. Quidam auli sunt tantundem turpeti ascribere. sed quia verum non reperitur periculo non vacat, satius esset eius loco agarici recent. trochisc. æquali mensura præscribere, folia dictammi, etiam vulgaris, à nobis probatum fuit sua siccitate aquas absumere vel easdem propellere & quodam suo amarore expurgare, ℥. ℥. flor. genittæ & sambuci non solum aperiunt obstructions, sed & aquarum excretiones iuuant, flor. tamarisci propter splenem, flor. Rorismarini calore & odore aperiunt obstructions, an. p. ij. trium florum cord. propter humorem melancholicum an. p. j. fiat decoctio ad ℥. j. ℥. in colat. diss. sacch. q. ℥. clarificetur & aromatizetur, cum pulu. diacucurm. mai. In hydropē est magnopere efficax, pulu. diarrhod. abb. an. ℥. ij. Cinam. Electi: & saporis gratia commendatur & calore & tenuitate essentia, in affectibus frigidis hepatis & splenis cum maximis obstructionibus est præsidio, ℥. ℥. addes Syrup. de Epithymo si paratus in officinis inueniatur vel eius loco Syr. de scolop. ℥. iij. Oximellis scyllitici. vel mellis Ros. colati, ℥. ij. Miscē, fiat apozema pro quinque dosibus. Cap. de mane quatuor horis ante cibum.

De Apozemate pro renibus.

Apozemata seu decocta in affectib. tum calidis tum frigidis renum & vesicæ necessaria: ex his medicamentis constare debent quæ inflammationes mitigent, urinæ ardorem repriment, ulcera abstergant, cum morbi illarum partium calidi sunt & à materia calida oriuntur: in affectibus verò frigidis ut obstructione à pituita lenta, urinæ suppressione, calculo renum & vesicæ, cum corpus fuerit probè repurgatum, nullaque suspicio adest in reliquo corpore, ex cacochymia, humoris influentis in urinæ vias; tum adhibenda quæ potenter incidant, extenuent & calculos comminuant; minus vero si corpus sit impurum vsurpanda erunt talia medicamenta, sed magis lenientia & abstergentia, quæ vel leniter vel mediocriter urinæ meatus & ductus adaperiunt. Cæterum medicamenta purgantia non erunt præscribenda, nisi ad præseruandum, cum humores crassi & lenti in toto corpore fuerint collecti, & per partes subductione egent, nonnunquam adiicienda erunt: humor magis lenientib. & abstergentibus medicamentis ad

expulsionem habilis promptusque reddetur, ex quorum genere sunt dulcia quæ leniendo & lubricando valent, addas licet & amara, expurgando proficiunt vt ad expulsionem humor rectius disponatur.

C A P V T X L I I I .

De vsu apozematum in affectibus renum calidis.

A Pozemata quæ in calidis affectibus renum & vesicæ parari poterunt iis viribus sint prædita medicamenta necesse est, quæ refrigerent interdum incrassando, vt in ardore vrinæ, & vlcere vesicæ, & initio inflammationis : Nam si frigida tenuium partium, ob id aliquo modo vrinas mouentia præscriberentur, inde periculum existeret, ne ex vrina ducta per eisdem ductus cum semper acris sit plus minusve pro variis causis, partes ardore, inflammatione, vlcere, afflicta exerceret: ob id moueret dolores, qui fluxionis de nouo irruentis causæ existerent ad augendos huiusmodi affectus; sed tamen cum horum non est magnitudo, & refrigerando plus valent quàm tenuitate essentiæ, ne vrinas ciendo officiamus, etiam talia medicamenta erunt miscenda, vt humores calidi frigiditate reprimantur, & tenuitate essentiæ prompte in vrinæ vias præterfluant,
reliquo-

reliquorum medicamentorum delationem promoueant, & quadantenus accelerent; verum purgantia medicamenta alioqui non sunt præscribenda in affectibus renum & vesicæ, ne partes alterent & motu suo recalfaciant.

CAPVT XLIV.

Apozema in affectibus calidis renum & vesicæ & fistulæ vrinariæ, refrigerans, leniens, incrassans aliqua ex parte, & nonnihil cum tenuitate partium aperiens & abstergens.

Accipe glycirr. rasæ & parum contusæ, ℥.j.ß. vel ij. lenit, mitigat, aperit, leniter abstergit, rad. althææ ℥.j. cum abstersione mitigat, fol. portul. cum vigent, incrassant, reprimunt calorem feruidum. Cichorii, End. tenellæ, scariolæ, cum frigiditate tenuitatem essentia habent, Borræg. Buglo. cum prop. rad. Capill. ven. quia tēperata, ideo nihil incōmodant, an. m. j. semin. althææ, mal. & bombacis, quia leniunt & mitigant, an. ℥. ij. semin. Melonum leuiter contusorum, vt non tam valeant tenuitate essentia quam refrigerando polleant et si turbulentiùs parum reddat apozema, ad sanationem vtilius fiet hoc modo paratum, ℥. ß. semin. pap. albi & lactucæ, Incrassant & vrinæ

ardorem remittunt cum aliqua leniendi vi ut omnia lenta & glutinosa, alia magis, alia minus, an. ʒ. j. ꝑ. hord. mūd. abstergit, lenit & sua quadam viscagine non obstruente ardorem & siccitatem remittit. Eius ideo mensura & modus erit in augendus plus quam in alius apozematis, ꝑ. ij. prunorum dulcium, passularum mundatarum, iuiubarum & sebesten, an. par. xij. hi enim fructus miscendi quia leniendo & abstergendo valent; modo dolor capitis & vertigo non sit, addes carnes dactylor. par. vj. Nam præterquam quod leniunt & abstergunt hepar & alias partes astringunt, non nihil ergo roborant & fluxionis impetum cohibent. trium florum cord. & Nymph. an. ꝑ. j. ꝑ. fiat decoctio, ad lb. j. ꝑ. In colat. dissol. sacchari albi & penidiar. recent. cum magis lenire & abstergere tentas, ad ardorem reprimendum & lenius astringendum sacchari Ros. ad magis incidendum si quando permistus esset humor lentus, vel sabulones in viis urina inhaeserint sac. cand. an. q. ꝑ. Clarificetur & aromatizetur, cum parte diatraganti frig. sine Caphura & diamargar. frig. aut triantali, ʒ. j. addes Syr. violac. leniendo plurimum valet, ʒ. ii. aut Syrup. de End. Capill. ven. ʒ. ii. Milce, fiat Apozema pro quinque dosibus, sumat de mane quatuor horis ante pastum.

A Pozemata in affectibus renum & vesicæ frigidis ex iis constabunt medicamentis, quæ recalfaciunt moderatè, vt in Nephritico renum & vesicæ pathemate. Si vero plus æquo caliditatis gradu exuperarent; ex materia viscida, lenta & crassa & in toto corpore impacta, quod tenue esset promptè dissoluerent & quod crassum est in tophi & calculi generationem nouam conuerteretur, quare infra subsistendum erit huiusmodi calorificis medicamentis simul ac extenuantibus & aperientibus: Miscenda imprimis vel leuiora, vel quæ maximè omniū leniant, siue dulcedine & leui humiditate, siue amarore polleant. Cum præcautionis in curando consilium adhibetur purgantia quædam medicamenta præscribenda erunt, quæ pituitam & excrementa serosa repurgent: Cauendum à foliis aut follic. sennæ, præsertim cum in vesica malum subest, vel vlcus præsens est aut de instante à coniectura adest: Nam omnibus membranosis corporibus detrimento est, flatus & tormina gignendo, incitat distensiones, ob id fluxioni locum magis aptum reddit. Itaque cauendum erit in doloris insultu à calculo vel à lenta pituita vel à colluue vlcæris, & sabulonibus deuolutis in vasa

vrinaria à medicamentis purgantibus etiam in iis frigidis affectibus. Ne in ea exacerbatione & doloris tormento dolorem acerbiorrem inducamus & facile fluxionem nouam concitemus.

C A P V T X L V I.

A Pozemata quæ in affectibus renum & vesicæ frigidis præscribi solent, vel post minuens medicamentum cum leuioribus constare debent præfidiis & medicamentis, quæ aperiant obstructiones, vel à crassis & lentis humoribus genitas solum, vel à sabulonibus, vel à calculo, vel à sanguinis grumo vel à tumore & caruncula præter naturam in vrinaria fistula, vel denique à multa & crassa puris colluie in vlceribus harum partium obortis, dissecant, expurgent, vrinas moueant, calculos comminuant & vlcera abstergant. Si post purgationem à medicamento Cathartico factam medendum sit, citra doloris nephriticæ passionis insultum, medicamenta iam numerata valentioribus viribus semper polleant, de quorum exacta notione & obseruatione suo loco postea sigillatim dicemus, cum seriem medicamentorum catharticoꝝ adscripserimus. Notandum tamen hîc ea medicamenta vtilia esse quæ vrinas ducant, quorû ratio varia est & sola probe definita in methodo à Gal. calida

& sicca

& sicca esse & tenuium partium, vt primum
 sanguinem fundant & liquent: ex fusione se-
 cretio sequitur, ob id secernūt tenue à crasso,
 hinc igitur vrinas proliciunt; alia sunt tem-
 perata natura vt insigni caloris aut siccitatis
 gradu haud polleant, sed mediocri qualita-
 te aut tenuitate partium idem efficiant, alio-
 qui non expressa à Galeno, sed à recentiori-
 bus notata & vsurpata, ex quorum genere
 sunt adianthi species: præter ea & alia ascri-
 buntur, quæ etsi frigida sunt, tenuitatē essen-
 tiæ non minimã præ se ferunt, ob id vrinas
 cient & illa ipsa præsertim accōmodata cali-
 dis affectibus, vt intib. quatuor sem. frig. ma-
 ior. addas licet omnia quæ maiore humidi-
 tate scatent, & aqueæ sunt naturæ, modo fa-
 cultas expultrix valida sit, vrinæ molem &
 quantitatem deiciunt, ideo vrinas impellunt,
 postremo quædã sunt eiusmodi, quæ ex ali-
 qua cōsecutione dū impedimenta tollūt sibi
 & vrinæ percolandæ vt in viis exsiccatis &
 exasperatis ab arenulis eas leniunt & abster-
 gunt, vt oleum amygd. dulc. fructus dulces,
 psyllæ, iuiubæ, sebesten sua viscagine in de-
 cocto relicta, lubricando sabulones detru-
 dunt, ob id viã vrinæ facilē parant. Quæ cal-
 culos frangunt, in his affectibus etiam adici
 poterunt quæ non eximiè recalefaciunt &
 extenuant, ne calculi humiditatē absumant.

& quod crassum expulsionī ineptū reddant: amara potius sūt ex Galeno lib. de Compositione medicamentorum secund. partes, simul ac cum dulcedine abstergendo vtilia esse poterunt vt materiam calculi proximam expurgent & detrahant, vel comminuant calculum etiam genitum. Duplex verò existit calculus, vel ē Renibus & is minor, ideo leuiora calculum frangentia medicamenta efflagitat: vel in vesicā deuolutus & subinde magis impactus & auctus à pituita lenta copiosiore ibi collecta in loco ampliore; vel in ibi prius factus qui sensim in vesica coierit: vehementiorib. medicamentis eundem calculum frangentibus pugnādum erit, & præsertim cum vniuersalis præcesserit purgatio, nec tormentum fatigat doloris vt quietis tēpore. Itaq; medicamenta purgantia alioqui præscribēda non sunt, nisi prius corpore per-purgato & dum doloris non adest acerbitas, reliquæ adhuc pituitæ permaneant quæ aliquam euacuationem expostulent. Interim tamen hoc erit peragendum, vt in his apozematis, cum medicamentum minuens exhibitum fuerit & doloris vacuitas e it; corpore à pituita multum oppleto, & humores per partes subductione egere vidētur, à quibusdam medicamētis phlegmagogis iuuari potest & hydragogis, non vehemētioribus,

sed

sed leuioribus aut mediocribus. In quorum numero collocatur agaricus, qui etsi nauſeam & vomitum excitet, hoc modo etiam non nihil iuuare potest, nam vomitu excitato, ex ventriculo multa pituita extrahitur & reuellitur quæ ad calculi generationem materiam suggererat.

C A P V T X L V I I.

Apozema in affectibus renum frigidis, moderate recalsaciens, aperiens obstructiones, vrinas mouens, calculos comminuens & abstergens, & cum interdum purgans efficere volens ex medicamentis phlegmagogis & hydragogis, pituitam, aquas & serosa subducens.

A Ccipe quinque rad. communium temper. in vino albo, glycirr. rasæ & parum contusæ, Illa enim ex Gal præsertim exsiccata, calculos frangit & vias ab arenulis exasperatas blande lenit, an. ʒ j. rad. Eaul. Camp amarore non solum ab infarctu liberat, sed & calculos frangit. Rad. althææ. Nam præterquam quod emollit & lenit, calculos etiam frangit, Rad. Nymphæ accommodata est calculis vesicæ conterendis, an. ʒ ʒ. Betonice ab infarctu amarore suo liberat, dissecat, & calculos minuit. Ideo saxifraga dicta à Galeno lib. de Theriac. ad Pis. Eriopholsci. item effi-

tax est ad calculos frangendos, fol. Lythosp. saxifragæ & in ulceribus vesicæ ad probā abster-
 sionē, Equiseti, Pimpinellæ, Chamed. Cham-
 mep. herbar. Cappil. ex Galen. adiant. calculos
 renū solum comminuit, reliqua verò Capillares
 essentia tenuitate magis aperiunt obstructions,
 an. m. j. Cichorii fumar. Etsi frigiditate sana-
 tioni obsistere videantur, suo tamen amarore iu-
 uant & contēperant reliqua calidiora. End. te-
 nellæ tenuitate essentiæ urinas mouet & frigi-
 ditate tēperat, an. m. s. granor. halicacabi, po-
 zenter enim incidunt & calculos frangunt renū
 & vesicæ, ad idem valent Baccar. Iuniperi (in
 vesicæ Calculis præsertim hæc adijce,) an. ʒ. ij.
 semin. anisi fœniculi & Ligustici, an. ʒ. j. s.
 Cicer. rub. aperiunt & urinas mouent, p. j. pru-
 norum dulcium, passul. rum mundatarum,
 iuiubarum & sebesten, dulcedine abstergunt
 & vias à sabulonibus exasperatas leniunt, an.
 par. x. Caricat ping Etsi apozema reddāt cras-
 sum, sua visciditate non modo leniunt, sed ad
 calculi comminutionem effectum aliquem
 præbere compertum fuit, par. v. Si purgans ef-
 ficere sit opus addes polipod. querc. recent.
 aquas ducit, medullæ sem. Cart. leniter con-
 zusa pituitam & aquas euacuat, an. ʒ. j. s. aga-
 xic. trochisc. ʒ. s. Caue fol. senna ascribas præ-
 sertim in ulceribus vesicæ, nam tormina parit
 & tensione dolorem infert, flor. genist. vri-

nas valenter mouent, flor. sambuc. Rorism.
 stœcad. amarore expurgât, & acrimonia qua-
 dâ incidit & leniter extenuât, an. p. j. fiat deco-
 ctio ad ℥. j. ℞. In colatura dissolue sacchari q.
 s. sacchari Candi, ℥. iii. Incidit & calculos fran-
 git & leniendo valet, clarificetur & aromati-
 zetur Cum pulu. Cynam. Electi & diarrhod.
 abb. contemperat & mediocriter aperit, cum a-
 strictione roborat an. 3 ii. cum verò potentius
 magnos calculos magis vesica quam renum te-
 rere voles, adde pulu. Lytontri. ℥. ij. Syr Cap-
 pil. ven. ℥. iii. Oximellis scillitici, calculi
 causam propinquam, lentam pituitam dissecat
 & extenuat & calculi fragmenta quodammo-
 do separat vt facilius expellantur ℥. ii. Misce,
 fiat Apozema, Capiat de mane quatuor ho-
 ris ante cibum.

CAPVT XLVIII.

De apozematis pro vtero.

Apozemata & decocta quæ affectibus v-
 teri calidis & frigidis exhiberi possunt.
 ex iis medicamentis constare debent quæ
 insita virtute & peculiari dote, cum eo ipso
 membro familiaria sunt: ea vero duplici or-
 dine collocantur, vt sunt primo odorata &
 quæ suauem spirant odorem, illis ipsis re-
 creatur vterus & fœtencia abhorret, ideo in

H

præfenti pathemate, ne vterus magis sursum retrahatur naribus suffiendâ damus, quæ tetrum efflant odorem, vt bitumen, Castoreum, galbanum, perdicispennas combustas & similia: subdemus autem bene olentia medicamenta ad quæ sequitur vterus velut amplexus quidam ab amica sua. Ideo ergo odorata aecommodata sunt; & si claram rationem curiosius exquirere voles non aliter fit; præterquam quod vterus cum sit membranofus, ideo frigidior, & ex reliquo corpore, in eum tanquam in sentinam sæpius confluunt multa excrementa, vt pituitosa, serosa; vaporosa ob id aromatica & suavi odore ferientia, cum sint calida vteri frigiditatem emendant, penetrando aperiunt & discutiunt eiusmodi excrementa; quæ autem grauiter olent calida, quia secundum proportionem à primo ortu non fuere concreta & bene temperata, nec talem æqualitatem substantiæ præ se ferunt, ideo ab vtero ceu aspernantur, veluti illi membro inimica & infesta, Deinde quædam etiam vtero peculiari virtute sunt accommodata, vt mercurialis, quæ ideo ratione perspicua salutaris censenda est, quia nitrosa sua facultate impuriore in vtero cummulata excrementa repurgare valet. In eodem genere collocatur artemisia,

matricaria, quæ suis qualitatibus præfer-
 tim affectibus frigidis imprimis necessaria
 sunt, quia sanguinem menstruum vel diu-
 tius detentum vel non satis expurgatum
 mouent acrimonia quadam & tenuita-
 te partium, amarore autem expurgant.
 Porro medicamenta vterro destinata, in
 Apozematis ea miscenda erunt, quæ sæ-
 pius menses citare valeant, calida magis,
 sicca minus, si conferantur cum illis ipsis
 medicamentis quæ vrinas cient ex Galeni
 sententia. Notandum illos sæpe delinquere
 in menstruorum purgationibus promouen-
 dis, qui sine vlla causæ distinctione etiam
 in macilentis fœminis calidis, & siccis, &
 quæ vel propter calidam intemperiem im-
 moderatos & intempestiuos motus, cibi &
 potus frugalitatem suppressionem patiun-
 tur, calida & sicca præscribunt medica-
 menta: quibus sane plus detrimenti quam
 adiumenti afferunt, sed moderate frigidis
 & humidis & aliquot propriis hystericis me-
 dicamentis, etiam calidis minori modo ad-
 hibitis sanatio erit molienda. Ha præterea
 medicamenta vterro sanando vsurpanda e-
 runt, quæ sterilitatem auferunt & conce-
 prum iuuant, quæ pro varia causâ adicien-
 da erunt. Si enim ex mēstruorum retentione

pendeat sterilitas, quæ mouent menses erunt idonea, si à mucosis impletus & relaxatus uterus, ex purgantibus & abstergentibus omnino purgandus erit; si à frigiditate, recalcificandus, & quæ semen & venerem stimulant, præcipuè danda erunt vt Eringiorum radix, scinci, bautiæ radix, & semen eius. Itaque cum menses mouere studium erit, purgantia alioqui non misceas medicamenta: Nam hi duo aduersi sunt motus, mensium prouocatio & purgatio quibus negotium naturæ fieri solet, nec in hoc, nec in alio quicquam proficitur. A foliis autem & folliculis sennæ, non minus quam in omnibus vlceribus vesicæ, & fere in omnibus affectibus eiusdem, & ventriculi omnino abstinendum erit, Cum enim sint membranosa corpora ob id exanguia, frigida, facile à calore imbecilliore multos flatus generant, & loci amplitudine & natura partis distendi facile possunt, & senna cum tormina pariat, vtero & eiusmodi partibus aduersa esse solet. Notandum etiam acetum magno opere vterum offendere duplici de causa, quia pungit neruosum & membranosum corpus, ideo ei infestum; & quia frigidum, eius intemperiem auget & caloris vim feruentem in conceptu & semine infirmitat & peruertit: nec prætermittendum in quibusdam

quibusdam naturis mulierum ex hysterico pathemate conflictatis, dulcia tum in cibis, tum in medicamentis noxia esse, quia (reor) cum ventriculo occurrunt, nauseam & vomendi conatum mouent, & impellunt ex quadam consequutione, loci propinquitate, & membranosis ligamentis partes inuicem connexas, & uterum, qui secundum naturam inferiori loco continetur & coercetur, iam ex illorum dulcium assumptione & vomitu excitatur, & ad elatioris partes ligamentis suis superioribus in dorso natis magis vergit & inclinatur, ob id quendam strangulationis & præfocationis insultum promouet: & sæpius contingit non modo admotis bene olentibus medicamentis, sed & assumptis quod uterus male habeat. Quare dulcia erunt vitanda antea, sic & odorata medicamenta cum de hysterico pathemate suspicio & coniectura instat, radices, flores, pulueres odore ferientes consiliorum prætermittendi, In Apozemate autem pro affectibus uteri calidis talia erunt præscribenda quorum antea materia tractata fuit vel in calidis affectibus capitis vel hepatis, tamen interim ut vis illorum ad partem deducatur & ne plus æquo refrigeretur ab illis ipsis medicamentis, addes Rad. valerian. ad ℥.ss. Mercur. Artemisia, Matricar. an. m. ss. no

reddatur amarore ingratum apozema; ut paululum minus calefaciant hæc duo postrema, miscebis Artemesiæ & Matric. an. tertiam partem manip. vnius: flor. Rorism p. j. vel ß. Misce, fiat Apozema.

CAPVT XLIX.

Apozemata quæ in frigidis vteri affectibus, quibus plerumque laborat parari solent, ex eorum medicamentorum materia constare debent quæ calfaciunt, crassos humores extenuant, flatus discutunt, menses prouocant & conceptum iuuant, Mucos quibus in eiusmodi affectibus corpus in vniuersum abundat & iisdem vterus oppletur probè repurgent. Ad hæc medicamenta purgantia non erunt prætermittenda, ut pituitosa & serosa subducantur, modo non vigeat scopus potenter menstruæ purgationis ciendæ.

* * *

Apo-

Apozema in affectibus uteri frigidis recalcificiens, extenuans, discutiens, flatus, mensesque prouocans, pituitosa & serosa educens, conceptionem adiuuans.

Accipe rad. Valerian. & Men. rad. Rubiæ tinctorum, nam potenter sanguinem è venis uteri promouet, an. ʒ. j. ʒ. utero sunt accommodata, aperiunt venas uteri & vias obstructas & menses prolucunt, avari, menses prolucit ut & urinas, Enul. Camp. nõ est odoris expers, ideo utero grata & expurgando valet, ʒ. ʒ. quinque radicum aperitiuarum communium in vino albo temperatarum, non in aceto nam ei est inimicum, ad ʒ. j. radi E. ingii & Citris & bauitię. id est, pastinacę filuestris cum conceptum inuare necesse est an. ʒ. vi. fol. valerianę artemisię, matricarię. Omnes utero utiles & illi peculiare, sabinę, n. petę, ad eosdem vsus efficax cum menses mouere oportet, summ. thymi, nam ex Diosc. concretum sanguinem dissoluit & ut nos obseruauimus presentaneum est remedium & sanguinis trombi fundendi & menstruas purgationes ciendi, Lauandulę quia odore valet, ideo utero amica & tenuitate essentia menses mouet, Mercur. an. m. ʒ. minori modo addēda & qua hac medicamenta calida & aromatica sint maximarũ viriũ et minima mols

apposita, ascribuntur, Borrag. Bugloss. cum ra-
dic. quia temperant reliqua calidiora tempera-
ta facultate, herbarum Capili. temperata vige-
aperiendi facultate valent, an. m. j. sem. anisi &
fœniculi. quia flatu discutiunt, sceleros &
Ligustici quia iucundo odore uterum recreant
& menses mouent, sem. Apij & petiol. potentex
aperiunt, ob id menses prouocant. Nasturtij &
urticæ, eadem facult. pollent, & venerem sti-
mulando conceptum iuuant an. j. Cicer. tub.
ad menses ducendos & aperiendas obstructiones,
p. ii. prunorum dulcium, passularum enu-
cleatarum, ut leui humiditate caliditatem &
siccitatem reliquorum mitigent ac temperent,
modo peculiari mulierum natura & histericum
pathema non dissuadeant dulcium mixtionem.
an. par. x. Cum purgans reddere voles. addes Po-
lip. Querc. recentis & medullæ sem. Carth.
contulæ, an. ʒ. j. ß. Agaric. trochif. pituitam &
mucosores uteri repurgat, ʒ. ß. flor. Rosism. odore
sunt utero multum iucundi sambuci, stæcad.
salu. quia siccant, ob id absumunt quadam re-
crementa & menses prouocant, flor. genist. Non
modo vrinæ, sed menses educunt, flor. mali au-
rei siue arantij, qui ut cor iuuant & uterum
recreat odore suauis & aromatico, an. p. j. trium
florum cord. an. p. j. ß. fiat decoctio ad ʒ. j. ß.
In colatura dissolue vel parum sacchar. vel
mellis anthosati, an. ʒ. iii. cum à dulcibus ob-
horrent,

horrent, de his nihil aut minimum addendum erit, clarificetur & aromatizetur cum pulu. diamosch. dulcis, qui cerebro, cordi & aliquomodo ventriculo est accomodatus praesertim in affectibus frigidis, vel eius loco si rectè paretur Diambræ ꝑ. ii. Cinanom. Electi ꝑ. ꝑ. vel ꝑ. j. & gratum vtero, & menses mouet, ideo sceleratae mulieres aut puella qua illegitimo concubitis grauida fuerint, Cinanomiu su abortum prouocant, quia menses valde mouet, cum verò foetum continendi consilium est, etsi Aromaticitate perspicua non faciat ad sanitatem, tamen utilis esse consuevit. Rasuræ Eboris, ꝑ. ij. & ut peculiariter vterum afficias & conceptum iuues, pulueris vteri leporis antea siccati, ad ꝑ. ꝑ. addere valde conducit, Syrup. de Artemisia, quia vtero accomodatus ꝑ. iii. Mellis ros. colati vel Anthosati iuuant vterum, mucoseres purgant, ꝑ. ii. vel ubi scopus est cõceptum promouere, venterem stimulando, modo Pharmacopœi apud se reseruarint & in promptu habeant, ex alienigenis transportarint Syrup. conseru. condituræ zinziberis tantundem ad ꝑ. ij. magni vsus erit ad illum sanationis scopum iam designatum. In affectibus vteri cum menstrua purgatione immodica & fluore muliebri largiore consistunt, apparandi modus fieri potest, eũ illis ipsis medicamentis, quæ vi astringendi pollent, quorum forma & series me-

dicamentorum præscripta postea in serapiis traderetur potius quam apozematis, quia cum apozemata variis constant medicamentis, fieri nequit quin quædam medicamenta tenuium partium permisceantur, quæ fluxum maiorem conciliarent, ideo Serapia ad sanationem accommodata postea parabuntur.

CAPVT L.

De apozematis Articulorum.

CÆterum Apozema in affectibus articularum & membrorum extremorum tum calidis tum frigidis quia nervosa sunt extrema, vel ex neruorum insigni propagine sine condita: nerui autem è cerebro tanquam à fonte ortum ducant, & orta suis attestentur principiis, ideo medicamenta in articularum & membrorum extremorum affectibus vires consimiles, vt in capitis & cerebri malis obtineant necesse est. Miscenda tamen erunt quædam particularia & destinata articulis præsidia, præsertim in affectibus frigidis. Ex quorum primo est chamepyt. arthetica dicta & hermodactili, qui etiam aspernandi non sunt, præter quorundam medicorum sententiam, vt sanationis euentus confirmat, sed ne vel aliqua pernicie vim inferant, si tamen vlla delitescit, vel ex flatibus quibus abundant, noxam inferant, sem. anisi

&

& sc̄en. in eod. decocto erunt addēda, singularum pari portione ad ʒ.ii. Aromata peculiari virtute qualitati perniciosæ obſiſtunt, & ſubinde flatus diſcuriunt. Medicamenta autem purgantia in dolore & doloris inſultu præſcribenda nullo modo erunt, ſed quietis tempore quantum oportet, & tempeſtue adhibita proficient, quorum ratio & ſeries medicamentorum exhibita alibi à nobis eſt fuſè tractata; quare verbosius definire ac diſtinguere ſuperſedeo, vt ad alia tranſeamus, quæ breuius, quoad dabitur, explanabimus.

C A P V T L I.

De Serapiis

IN medicamentorum ſerie cohærenti ordine præſcribendo, apparatus & humorum coctio non ſolum fieri debet & poteſt illis ipſis apoze matris & decoctionibus, cum præfertim herbarum recentium a deſt copia & legendi opportunitas, ſed & ſerapiis cum aliquot æquis ſtillitatis permixtis, vel decoctione leuiore & magis prompta ex medicamentorum materia non æquè varia, & quæ ad manū in officinis pharmacopœorū parata, facilius & præoptius exhibeātur, ex faciēdi ſcopo & conſilio vt & præoptius adminiſtres medicamenta præparantia & concoquentia,

quo tempore recentibus plantarum viribus
 temporis statu frui non licet, sufficiet syr. re-
 feruatã conditurã & aquarum prõptam ma-
 riam fumere; ac denique vt egenorum fa-
 cultatibus consulatur, pro apozematis sera-
 pia viliori pretio coëmentur, ideo cõsultum
 fuit & ipsa serapia pro variis sanationis mo-
 dis sæpe præscribere: At verò stillatitæ aquæ
 quæ in officinis hoc seculo parantur pro-
 pter incendii seminarium Emyreuma &
 odoris & saporis alienioris modum, etiam
 prætermittendæ. At horum loco decoctio
 pro affectu accommodata ex radicibus ali-
 quot & seminib. & fructib. cum serapiis mi-
 scenda erit, Itaque si à bonis Pharmacopœis
 ex illorum propensa voluntate, & consi-
 lio medici in diplomate tale opus aquarum
 stillatitiarum perficeretur, decoctio ex illis
 multis medicamentis permiscenda non es-
 set; sed tamen notandum est huiusmodi a-
 quas hoc nostro sæculo, sine diplomate &
 vase duplici confectas in affectibus frigidis
 non parum vtiles esse, quia propter caloris
 & incendii vires, tenuitate essentiaë magno-
 pere præstant, facile penetrant, & humores
 crassiores extenuant. Ergo cum serapiis mi-
 scendæ erunt stillatitæ, eo modo & mensu-
 ra vt ad duplam quantitatem serapia exupe-
 rent, quod non sine ratione à doctis medicis

& inuentum & factitatum est: Nam si Syru-
 pi aut serapia quæ consistentia sunt crassio-
 re æquarent mensuram aquarum, non qua-
 quauersum ad intimos corporis sinus & spi-
 racula adducerentur, nec probè vel aperirēt
 obstructions & referrent meatus, vias flu-
 xiles redderent, humores ad expulsionem a-
 ptos conficerent, nam crassum difficile ve-
 hitur, tenue vero & liquidum vndequa-
 que spargitur & præterfluit, quia ex Hyp-
 poc. facilius est impleri potu quam cibo:
 simul ac ex rei natura patet, quod crassum
 in lingua medicamentosum ob id per-
 multis ingratum, hæret & impingitur. Te-
 nue verò ac liquidum sine molestia præter-
 labitur. Porro apud omnes medicos est con-
 suetum, magna ex parte cum eiusmodi se-
 rapiis apparantibus Electuaria solida præ-
 scribere cum iisdem serapiis continuata ad
 varios scopos sanationis vsurpanda & ac-
 commodanda, nec sine aliqua ratione hoc
 ipsum faciendum nouerunt & postea pro-
 pagarunt, non solum quod solidum cum
 liquido facilius permisceatur & à ventricu-
 lo facilius deducatur de potentia ad actum,
 & tanquam vice quotidiani cibi & potus
 sit, sed etiam hoc modo iuuare possunt
 Serapia sumpta cum Electuariis solidis, quia
 illa plerunque ex odoratis constant, ideo

gratius & commodius sumuntur, & propter
 illorum vim aromaticam in longiores de-
 ducunt partes, interim tamen ut quorun-
 dam palato obsequi videamur quibus est in-
 gratum mandare medicamentosa, in iisdem
 Syrupis & aquis stillatiis & decoctionibus
 solum pulveres aromaticos miscemus, &
 ut iucunda magis fiant & ad splendorem,
 & ad assumptionem, hæc omnia simul co-
 lo medico transfundimus & ebibenda damus.
 Dierum autem intervallum hæc medicamen-
 torum formis, & in aperiendo definiendum
 est ex humoris vel morbi eruditate longio-
 re vel breviori, quibus materia cruda est,
 nec in urina & aliis excretionibus, ne ex
 tolerantia ægri coctionis signa apparent,
 non tantum ad tres dies, sed & ad sex vel
 novem vel ad plus, si expediat, serapia præ-
 scribenda erunt. Si vero humor coctus sit fa-
 cilis & natura ad morbi depulsionem celeri-
 ter festinet, brevioris temporis spatium per se-
 rapia apparandi erunt, humores, vel ad tres
 dies sufficient, & hoc in usitata medicina
 frequentatum est, sed rationali medico non
 semper eadem erit via procedendum. Itaque
 hic ad scribemus serapia & aquas stillitias
 simul cum Electuariis solidis quæ in affecti-
 bus tum calidis tum frigidis præcipuarum

partium præscribere necesse est, vel nulla vel breuiore horum medicamentorum dignotione obseruata, quæ antea quoad fieri potuit in Apozematis vberius & dilucidius fuit explanata.

C A P V T L I I I.

Serapia in affectibus Capitis calidis vt phrenitide, Mania, &c. Refrigerantia & humectantia & siccitatem & ardorem & aduersionem mitigantia.

A Ccipe Syrup. violac. Nymphaeæ & de pomis bene olentibus, cum mania est, si verò phrenitis non cum perenni vigilia, Syrup. de End. simpl. non compos Nam plus a quo adaperit & bilem ad superiorem capitis partem peruehit vehementerq; deducit: si vero insignis ardor & siccitas adsint simul & ingentes vigilia plurimum infestent & delirium atrociter sauiat, Syr. de pap. an. ℥. j. ℞. aquæ viol. Borr. quia temperata & propter calorem in huiusmodi malis quadam bilis portio aduritur quæ in atram bilem conuertitur, efficaciter, quia melancholicis affectibus auxiliatur, Nymphaeæ in

continuis vigiliis, Lactucæ an. ℥ iii. Misce, pro tribus dosibus. Capiat de mane tribus horis ante cœnam.

Accipe Electuarium diamarg. frig. ℥. ℞. quibus est parcendum pecuniæ minori dosi *semper ad tres dies ad ℥. ℞. sufficiet, si vero ad plures dies ad ℥. j.* Cæterum vt phreniticis & insanientibus, interdum consulas, satius erit pro tab. pulueris diamarg. frig. ad aromatizandum addere vel ꝑ. ii. vel ℥. j. duplici de causa; Primo, quia liquidis & humidis humectandi sunt, non autem solidis; Secundo, cum sint abalienati mente & interpositis motibus non possunt mandere calida.

CAPVT LII.

Serapia in affectibus frigidis capitis, que calefaciunt, extenuant & digerunt crassos & lentos humores.

Accipe Syrup. è stœcade, Syr. conseruationis Acori, Mellis ros. colati, *quia expurgat mucosâ, an. ℥. j. ℞. aquarum Beton. primule veris & presertim in paralyfi & saluic*
an.

an. ℥.iiij. Inter hæc vel Serapia, vel aquas stillatitias, affectibus frigidis & soporiferis; si priores non ascribas, hæc sequentia non parum conferent, Oxymel scyllit. ad disseccandos crassiores humores, oxymel simplex ad minus crassos, & mel anthos. tantundem vtdictum est; aquarum Maioranæ, Calamanti, pulegii, si pareretur, nam potenter dissecant viscidam & lentam pituitam pari portione: vt in aliis aquis.

Accipe Electuarium diamosch. dulc. vell diambrae, ℥. β. vel ℥. j. vtatur cum serapiis si Electuarium non exhibeas, aromate suauius reddes puluer. nucis moschatæ, ℥. ij. aut ℥. j.

C A P V T L I I I.

De Serapiis oculorum.

Serapia quæ oculorum affectibus calidiss & frigidis conueniunt fere constant iisdem, quæ adscripta fuere capiti, sed in affectibus calidis vitanda erunt nimis incrasstantia, vt Syrup. de papa. aqua Lactucæ; quia spiritus animalis, qui postea visorius efficiatur cum ad oculos influxit continuo necessarius ad visionem efficiendam, crassior minime reddi debet, vel ne saligine obruatur,

vel ne crassior redditus detineatur: secus cæ-
 rera medicamenta in oculorum affectibus,
 vt in capite consimilia esse debent.

*Serapia refrigerantia in affectibus calidis
 oculorum mediocriter & ardo-
 rem reprimentia.*

Accipe Syrup. violae. de End. simpl. & de
 fumaris, Nam ex Gal. fumos ex oculis abigit,
 an. ℥. j. ℞. aquar. Cichorii fumaris & cap. ven.
 an. ℥. iii. Misce, pro tribus dosibus, sumat ma-
 ne tribus horis ante cibum.

Accipe elect. triasantali, quia vapore suo &
 odore ad longinquas partes vim reliquorum
 medicamentorum deducere valet & sensus ex-
 ocuit & emendat, ℥. ℞. vel ℥. j. vtatur cum se-
 rapis.

*Serapia in affectibus frigidis oculorum
 que calfaciunt, extenuant & va-
 pores discutunt.*

Accipe Syrup. conferuæ acoti, de stœcad.
 Mellis ros. col. an. ℥. j. ℞. aquæ fœnic. Euphra-
 siæ, si inueniatur, eius loco Beton. & pro-
 pter ventriculum qui ex vaporum delatione
 cum oculis consentit, aquæ absinthij, an. ℥.
 iii. Misce, pro tribus dosibus, tribus horis
 ante cibum.

CAP.

C A P V T L I V.

De Serapiis thoracis.

Serapia in affectibus thoracis & pulmonum, ut in peripneumonia, pleuritide & similibus.

Accipe Syrup. violar. de ziziphis, *alij addant Syrup. papau. in principio pleuritidis, ut humor tenuis incrassetur, & postea facilius sputo educatur, sed tentandum non erit, nisi in instante principio & materia multum tenui & acri, multo magis in delinitu, quia ad pulmones citius peruenit, ut eo magis incrasset, nam serapia antequam ad pulmones perueniant, remittunt vires & ideo non ita incrasset, Syrup. de ziziphis, cap. ven. an. ℥ j. β. aquæ decoctionis pectoralis, ℥. ix. vel si aquas addere volueris aquarum End. Borrag. & Capill. ven. quia temperata utrisque affectibus & calidis & frigidis profunt, an ℥. iiii. Misce, pro tribus dosibus de mane sumat.*

Accipe Electuarium diatrag. frig. *si sine Caphura fiat, quia acris est & frigida, tutius erit eius loco Electuariū diamargari. frigidū præscribe, cum simul præparare necesse est & vires cordis exolutas instaurare propter excretionem sanguinis immodicam, ut in hæmoptosi, nam*

propter corallum & Spodium & similia quæ astringendi vim habent, quæ eo tempore necessaria est, nec tamen deest permistio aliorum medicamentorum, quæ vim leniendi obtinent, vt gummi in omnibus affectibus pulmonum & thoracis vtile.

*Serapia in affectibus frigidis thoracis
& pulmonum.*

Accipe Syrup. de hyssopo, syrup. de glycir. quod serapium in affectibus calidis potest conuenire vt in pleuritide cum morbus longius processit & humor quidem extenuatione eget, non enim multum calfacit, vel mediocriter abstergendo & tenuando lenit, Syrup. de prassio si in officinis paratur, vel Capill. ven. an. ℥. j. β. aquarum tussilaginis, Marrub. Beton. & Cap. ven. an. ℥. iiii. si nolis aquas stillatitias, decoctionis pectoralis, (vt illa dulcia in flatu prompte non conuertantur,) addes sem. anisi & vrticæ, an. ℥. j. decocti autem dosis ad ℥. ix. misce, pro tribus dosibus, sumat de mane.

Accipe Electuarium diæreos simplicis, ℥. β. vel ℥. j. vtatur cum serapiis *dissecat crassos & lentos humores, ab infarctu liberat suo amarore pulmonum bronchia, vt viscida pituita spatio facilius edusatur.*

De Serapiis cordis.

Serapia in affectibus calidis cordis vt in febris ardentibus & malignis siue pestilentialibus, nam febris semper est propria cordis passio.

Accipe Syrup. de Limonibus, sua frigiditate non parum febris incendium restinguit, suo acore putredinis labem corrigit & omnem labem abigit perniciosam, Syrup. de acetositate Citri, si inueniatur paratus, Syrup. violac. Cum esset aliquis fluxus immoderatus & excretio symptomatica, vel per aluum, vel per vomitum, vel per sudores diaphoreticos & sanguinis narium largior profusio Syrup. de Ribes si inueniatur quorum forma in officinis est parata & tradita, vel Syrup. ex oxiacantha, prætermittendo alia priora, cum hoc symptoma superuenit, vel cum Syrup. de succo acetosæ, horum omnium pro triplici serie, dosis erit ad ℥.j.℞, aquarum viol. Borræg. acetos. si fluxus adsit aque ros. plantag. portulac. an. ℥.iii. horum omnium, misce pro tribus dosibus, sumat de mane.

Accipe Elect. diamarg. frigid. ℥.℞. vel ℥.j. utatur cum serapiis.

Serapia in affectibus cordis frigidis, vt tremore, tristitia, exolutione virium, syncope Cardiaca.

Accipe Syrup. de pomis bene olentibus, Syrup. de Buglo. de Cap. ven. an. \mathfrak{z} .j. β . aquarum Meliss. Mali Arantij si inueniatur, Borrag. & hyslopⁱ, an. \mathfrak{z} .iii. Misce. pro tribus dosibus.

Accipe Electuarium diamargar. calidi si paratum sit, vel diamoschi dulcis, vel diambræ, \mathfrak{z} . β . vel \mathfrak{z} .j. vtatur cum serapiis.

CAPVT LVI.

De Serapiis ventriculi.

Serapia in affectibus ventriculi calidis, ardore, inflammatione, cardiagmo.

Accipe Syrup. de succo Acetos. Syrup. de Cichor. cum Rhabarbar. oxysacchari simpl. an. \mathfrak{z} .j. β . aquarum End. portul. plantag. vel etiam rosar. an. \mathfrak{z} .iiij. pro tribus dosibus. Misce.

Accipe Electuarium triasantali vel diamargar. frigid. vel diarrhod abb. Interdum quia temperatum. \mathfrak{z} . β . vel \mathfrak{z} .j. vtatur cum serapiis.

*Serapia pro affectibus ventriculi frigidis,
vt in magna cruditate, inflatio-
ne & similibus.*

℞. Syrup. de menta, Syrup. de absynthio,
Syr. de Bugl. nam cardiaca temperata & ven-
triculo accommodata sunt, an. ℥. j. ℞. aquar. ab-
synthij & fœnic. vt discutiat flatus & Borrag.
an. ℥. iii. Misce, pro trib. dosib. sumat de mane.

℞. Electuar. aromatici ros. à Gabriele tra-
diti ℥. ℞. vel ℥. j. vtatur cum serapiis.

C A P V T L V I I.

De Serapiis hepatis.

*Serapia in affectibus frigidis hepatis, vt in-
flammatione, aestuatione, psora, lepra, quæ
à nimia hepatis caliditate fieri solent.*

Accipe Syrup. de End simpl. Cum obstru-
ctiones aperire voles, Syrup. de End. com-
positi, Syrup. de Cichor. cum Rhabar. Syr. de
cap. ven. an. ℥. j. ℞. aquar. End. fumar. Cicho-
rii, quia sanguinem emundant, & frigiditate
pollent, an. ℥. iii. Misce, pro tribus dosibus.

Accipe Electuar. triasant. refrigerat, aperit,
corroborat viscus, ℥. ℞. vel ℥. j. vtatur cum se-
rapiis.

Serapia in affectibus frigidis hepatis, vt in permagnis obstructionibus, cachexia, hydrope.

Accipe Syrup. de eupat. præsertim calore & amarore hepatis accommodatus valet, Syrupi Byzantini, potenter aperit obstructiones Syrup. de End. compos. Etsi leuiter refrigerat, tamen aperiendo obstructiones plurimum confert, an. ℥. ℞. aquarum absynthii, quia stillatio opere confecta est, tenuium magis est partium quam in syrupi consistentia, ideo facile penetrat, aperit & strenue ab infarctu liberat, cap. ven. magis renuat crassos humores, quam cichorii, est hepatis accommodata, & calidis & frigidis eius affectibus, an. ℥. iii. Misce, pro tribus dosibus, Sumat de mane tribus horis ante cibum.

Accipe Electuar. diarrhod. abb. ℥. ℞. vel ℥. j. cum in hydrope tollere necesse est obstructiones, electuar. diacurcu. mai. ex vsu esse poterit, & eo modo & mensura, vt Electuarium antea præscriptum.

C A P V T L V I I I.

De Serapiis splenis.

Accipe oxymell. simplicis, Syrup. acer. simplicis, Syrup. de fum. simpl. & compos.

poſ. an. ꝑ. j. ꝑ. aquæ cichorii, lupulor. fum. an.
ꝑ. iii. pro tribus doſibus mane tribus horis
ante cibum.

Accipe Electuarium diamargar. frigid.
*Melancholicis, ideo ſplenis malo laborantibus à
cauſa calida confert ꝑ. ꝑ. vel ꝑ. j. utatur cum
ſerapiis.*

*Serapia in affectibus ſplenis frigidis, ut in ob-
ſtructione à limoſo & recremento melan-
cholico ut ſchirroſi, id eſt, duritie, inflatio-
ne, tenſione, ictericia nigra.*

Accipe Syr. de Epithymo, de ſcolopend.
oxymel ſcilliticum, vel de quinque radic.
cum aceto, an. ꝑ. j. ꝑ. aquarum ſcolop. abſyn-
thii, etiam in affectibus ſplenis conuenit, ama-
rore expurgando, Borrage. an. ꝑ. iii. Miſce, pro
tribus doſibus, de mane tribus horis ante ci-
bum.

Accipe Electuarium diarrhod. abbar. ꝑ. j.
vel ꝑ. ꝑ. ſi uero ſplenis uitio hydrops adſit vel ap-
propinquare uideatur ex malo habitu perſpecto,
loco illius electuarij, diacurcume maior. eo mo-
do & menſura præſcribes, & cum eſſet tympani-
tes ab eodem ſplenis malo oborta, quia flatuum
magna eſt copia diacimini parem portionem ad-
ijcies, utatur cum ſerapiis.

Serapia in affectibus calidis renum, vesicæ & urinae meatuum, vt in inflammatione, ardore urinae, vlcere & similibus.

Accipe Syrupi violar. Syrup. de ziziphis, Syrup. de End. simpl. vel Capill. ven. vt non incrasset, sed refrenet, si verò ardor urinae nimis infestet, non alienum erit Syrup. de papau. adiacere ad ℥.j. s. aquæ decoctionis glycirr. passul. & hordei quæ multum vias urinae lenit & mitigat, ℥.ix. Si verò aquas stillatitias prescribere consilium est, aquarum hoc modo, End. violar. Cichorii, in summo ardore urinae, aquarum plantag. & Lactuc. ex aliquot trium serie, an. ℥.iii. Misce, pro tribus dosibus, sumat de mane tribus horis ante dapes.

Accipe Elect. diamargar. frigid. ℥.s. vel ℥.j. vtatur cum serapiis.

Serapia in affectibus frigidis renum, vesicæ & viarum urinae, vt in nephritide, calculo & obstructione.

Accipe Syrup. Cap. ven. oxymel. schillitici, modo doloris insultus non sit, mellis rosat. colati, an. ℥.j. s. aquarum saxifragiæ, Beton.
 Calculos

Calculos frangit & caliditate pollet, tenuandi virium non est expertus, cauda equinae si preparata inueniatur, in ulceribus renum & vesicae cum à crassa colluuie repurgare tentas, aquae graminis aut Alkekengi, an. ʒ. iii. Milce, pro tribus dosibus, sumat mane tribus horis ante cibum.

Accipe Electuarium diarrhod. abbat. etiam aliqua ex parte aperit, ʒ. ss vel ʒ. j. vtatur cum serapiis.

C A P V T L X.

De Serapiis vteri.

Serapia in affectibus vteri calidis eadem sere esse debent, quæ in affectibus cerebri & capitis calidis conueniunt, cum electuariis frigidis aromate valentibus, interim tamen ne eorum dulcedine histericum pathema promoueas, aquam absynthii adicies, quia insigni calore non exuperat, & eadem caliditate quadam ex parte iuuat, cum vterus sit nervosus, & à multum frigidis offendatur. Quare aqua absynthii permista reliquorum frigiditatem arcet & temperat & dulcedinem obrundit.

Serapia in vteri frigidis affectibus, vt in dolore à flatibus, hysterico pathemate & vteri strangulatione.

Accipe Syrup. de Artem. & de quinque radic. sine aceto, quia plane est, infestum vtero, cum pungat & vellicet membranofum & neruosum membrum & quia obstructiones aperit, & tenuat, magno vsu debet esse in iis affectibus, mell. rosati colati & anthosati, quia magis calefacit & digerit, an. ℥. j. s. aquarum rubiæ tinctorum, cum menses ducendi sunt modo parata reperiatur, Origani modo inueniatur ad Cien-dos menses, artemisiæ, pro serie horum aliquot trium, an. ℥. iij. Misce, pro tribus dosibus, sumat de mane.

Accipe Electuarium diamoschi dulcis vel diambrae calfaciunt & recreant uterum, ℥. i. vel ℥. j. cum serapiis.

C A P V T L X I.

De Serapiis articulorum in morbis calidis.

ACcipe Syrup. de rosis siccis, Syr. Myrtillorum Nam fluentem materiam in articulos prohibent & detinent sua vi astringendi & refrigerandi calorem mitigent & humores

tenues.

tenuēs plus a quo fluentes inspissando veluti immobiles reddunt, mellis rosati colati, etsi aliqua ex parte calfaciat, altera astringit, ideo fluxionem cohibet, præterea semper aliqua pituita permiscetur, qua eodem medicamento expurgatur, ad ℥.j. ℞. aquarum plantag. Cichorii, Borrag. an. ℥. iiij. Misce, pro tribus dosibus, sumat matutino tempore tribus horis ante pastum.

Accipe electuarius diamargar. frigid. vel triafranti. nec errare potes præsertim cum materia mixta est, ex bile & pituita, addendo diarhod. abbatis ℥.i. vel ℥.j. vtatur cum serapiis.

Scrapia in affectibus frigidis articulorum.

Accipe Syrup. è stœcade, calfacit, Syrup. conseruationis acori, prohibet fluxum humoris, cephalica enim medicamenta, vt hac Scrapia nervosis partibus & extremis, quia exanguia & frigida, multisq; excrementis pituitosis abundant accommodata sunt, calesfaciendo & pituitam resiccando, qua magna ex parte à cerebro in hac ipsa membra illabitur & perfluit, Mellis rosati colati, an. ℥.j. ℞. aqu. Iuz artheticae propter articulos, betonicae & salviae, an. ℥.iiij. Misce, pro tribus dosibus, sumat de mane tribus horis ante pastum.

Accipe Electuarium diamoschi dulcis,

valenter enim pituitam à cerebro in articulo-
rum sinus fluentem desiccatur, sed tamen si cali-
ditatem alcutiam ex doloris tormento per-
timescas ne augeatur ab huius medicamenti
vfu, & caput nondum ex toto repurgatum
fit, facile vaporibus impletur à Moscho &
aliis odoratis, huius loco Elect. diarrh. abb.
adiicies, ℥.β. vel ℥.j. hæc autem serapia cum
aquis stillaritiis permista singulis vici-
bus eorundem assumptionis
electuaria solida simul
dantur.

FINIS LIBRI PRIMI.



LIBER



LIBER SECVNDVS.

CAPVT I.

De Catharticis.



CONSILIVM summi Hippo-
 cratis sequuti, concocta medi-
 cari & non cruda apparatu
 facto, indiciis concoctionis
 apparetibus, tempestiuum
 est vt medicamenta purgantia
 Cathartica appellata, quæ humorem no-
 xium ex toto submouent exhibeantur, eo
 tempore quo in morbis ad finem status
 peruentum est, vel ad declinationis prin-
 cipium, quando ex Auicenna, si natura non
 mouet, mouetur hora motus eius, nam na-
 tura coctione laudabili peracta per locum
 conferentem Critica expulsionem auxilia-
 res manus dando, ab humoris concoctio-
 ne, secretionem purum ab impuro secernit.
 Igitur purgans & attrahens medicamen-
 tum, tum tutius ac innocentius humores

noxios & relictos educet & euacuabit. Cæterum hæc purgantia medicamenta, cum iisdem minuentibus medicamentis antea à nobis traditis, variis constant formis & substantiæ modis, vel in solida, vel in media, vel in liquida. In solida autem vt Catapotia & electuaria, sanè accommodata esse debent pro singulorum conditione & natura peculiari, quibus magis solida placent quam liquidiora, illis ipsis exhibendo quibus ventriculi rugitus ex flatibus, nausea & vomendi facilitas ac laxa ventriculi constitutio & humoris influxi & collecti copia adest. Addas licet quibus à capite nervis, articulis, vtero; & nonnunquam pulmonibus humores non solum longius diffusos, sed etiam eosdem frigidos, crassos & lentos, & quodammodo impactos hyemis magis tempore quam alia anni parte in pilularum & catapotiorum forma trahere conueniet. Minus autem per Electuaria solida vel mollia peragendum erit, minime omnium per liquidas potiones & medicamentosas: Quantitas autem medicamentorum purgantium hisce tribus præcipue definiripotest, à virium robore & imbecillitate; aut ab humorum multitudine, aut paucitate; aut à loco aut situ longiore & propinquiore; nam quibus vires robu-

stæ, quantitas medicamenti in augenda, quibus verò imbecilles, minuenda : humorum multitudo, vt pituita: quæ largior abundat, maiorem medicamenti purgantis quantitatem efflagitat, paucitas minorem. Postremo cum loci situs longius dissidet & vires medicamentorum in transitu frangantur, & remittantur, quantitate maiorem vehementiam & vires compensare oportet & exæquare. Si vero locus & via propinquior sit, vel minor quantitas sufficiet. Obseruare item oportet in vsu & administratione purgantium medicamentorum, quando ex scammonio vel ex diagridio vel ex aliis vehementioribus medicamentis, vt Colocynthide & turpeto & consimilibus constant. Eodem die assumptionis medicamenti purgantis, dum fere purgatio absoluta fuerit, eluens exhibendum esse poculum, vel ex iure carnis simplici, eoque insulso vt lauare melius valeat, quàm vt salis initio permisto astringat & purgationem cohibeat, vel ex decoctione Cicerum rubcorum. Nam cum eluendi & expurgandi vim quandam habeant aperiendo & dilatando vias intestinorum & primarum venarum, quæ supersunt recrementa consequutione quadam præterfluunt, & expelluntur: Quædam etiam alia magis medicamentosa in iisdem

iusculis incoquuntur à quibusdam folia Borrag. & Mercur: frequentius vsurpare solitum est saccharum rubrum quod in abstergendo citra caliditatem & tormina nulla excitando plurimum pollet. Hæc verò medicinae faciendæ ratio non tam noua est quam vsu comprobata & posterioribus medicis, Arabum sectatoribus, ex rei natura rationibus confirmata; ea enim medicamenta, ex scamoneo & vehemētoribus purgantia parata de genere eorum sunt, quæ veneni quoddam seminarium retineant, ne sua aliqua substantia in villis ventriculi & intestinorum, ceu infixæ permaneat, similiter eluenda & expurganda erit. Adhæc vt quod ex toto corpore attractum est, ex humoribus noxiis in eam partem deductis, simul ope eluentis iusculi foras propellere commodum erit, quamuis ex Hipp. consilio lib. de ratione victus in acutis, aliter suo seculo moliebantur, nam confestim post hellebori assumptionem & peplij, sorbitio ptisanæ propinabatur, quæ & relictam medicamento portionem in ostiolo ventriculi detraheret, ne in ea parte tanquam eximio sensu prædita oris ventriculi morsus & καρδιακῆς excitaret simul ac frigida qualitate arceret ac mitigaret intemperiem calidam in eodem ostiolo ventriculi contractam. Quod nos ipsum fere

imitari

imitari, animaduertere quiuis potest, nam pharmacopœi nostri dum medicamenta propinant, illico vel saccharum rosatum vel fœmen anisi saccharo conditum vel Cinamomum dant, & cum Catapotis serapia, vt melius deglutiant; & eodem modo etiam iuuant, vt nihil in ore ventriculi infideat: attracta nostratia talia non sunt, quæ inducant tantam intemperiem, quia mitiora, & frigida qualitate prædita, postèrius & fœlix medicamentorum sæculum inuenit, probauit & confirmauit: Post vero diem assumpti medicamenti quauis forma præscripti, in iis præsertim, quæ vehementius agunt & exscammoneatis constant, Bolum cardiacum vel collectuarium solidam in tessellis, cum aliquot pulueribus interdum in bolo adiectis, ad varios sanationis scopos damus, eo consilio vt interna & præcipua viscera à medicamento purgante exoluta & confirmentur & corroborentur, eoque magis vt relictæ quadam medicamentis pernitiæ aut venenatæ qualitate Cardiacis corrigatur, atque emendetur, quod à Galeni doctrina & faciendæ medicinæ ratione, non alienum esse ostendi potest, nam lib. 4. sanitatis tuendæ post usum medicamentorum purgantium, Ambrosiæ & Arthasiasæ antidota medicamēta propinari iubet, eandemque methodum medendi reuouit.

De catapotis.

Catapotia ad purgandum ex toto, & vt
 Cilli inquit, radicibus deglutuntur:
 non solum in calidis affectibus, sed etiam
 maximè in frigidis & à pituita subortis; dum
 ex longinquo vti à capite, neruis, articulis,
 pulmonibus, oculis, vtero euacuandum e-
 rit; hyeme magis quàm æstate sumi debent;
 interdum circa veris initia & autumnii incli-
 nationem; at tamen humidis corporibus ma-
 gis quam siccis præscribenda erunt, quia
 Catapotia vt plurimum pro basi aloë conti-
 nent; quæ quum plus equo exsiccat, Galenus,
 senibus vsum illius interdixit: Catapotia
 purgantia communia alioqui solida non sem-
 per sunt commoda; sed in altera forma vel
 liquida vel media vsurpata: illorum quedam
 sunt, quæ bilem purgant magis quam pitui-
 tam, vt aggregatiuæ ex omni corporis par-
 te (eam exigunt,) ex rhabarbaro magis ex
 hepate; sine quibus esse nolo bilem & pi-
 tuitam attrahant; de quinque generibus,
 Myrabol. In articulorum affectibus vehe-
 mentioribus & defluxionibus accommo-
 data sunt, vt purgando corroboremus & bi-
 lem vna subducamus; tamen ad alios quo-
 que

que humores exigendos determinata sine
 vniuersim calidis affectibus præcipuè ac-
 commodantur. Cum purgando non ma-
 gnopere calefaciant neque exagitent. Quæ
 verò in frigidis affectibus in vsum veniunt
 ad repurgandam pituitam talia sunt Cocchiæ
 ex cerebro, neruis & articulis: lucis maiores
 ex oculis, de Agarico ex omnibus mem-
 bris, præsertim ex capite, pulmonibus, vte-
 ro, ex articulis: de hermodact. fœtidæ pillu-
 læ ex vtero. Ad melancholicum humorem
 euacuandum accommodatæ sunt pillulæ
 indæ, de lapide Lazuli si fideliter paratæ in-
 ueniantur. Ad adusta serosa recrementa e-
 uocanda pillulæ de Thymelæa, de Chama-
 lea si modo paratæ sint vel parari iusseris.
 Quantitas Catapotiorum assumendorum
 ea præscribi solet, ex quorundam audacia
 an. ʒ. j. ad ʒ. ij. sed reuera modus exuperat;
 nam ex ea dosi plus quam nouem pillulas
 efformari necesse est, ob idque cum mole-
 stia deglutiuntur, propter numerum: addas
 licet quia sunt scamoneata, ad ʒ. ij. plus
 æquo repurgarent & superpurgationes se-
 querentur; verum tamen quibusdam robu-
 stis indulgere aliquando visum est, & in-
 terdum tentandum magis quam consulto
 prospiciendum à ʒ. j. ad ʒ. j. ß. prorogare:
 turissimum & consuetum est præscribere,

ad 3. iiii. vel de vno pillularum genere tantum vel de duobus vel de tribus pro variis euacuandorum humorum scopis aut propter membrorum conditionem à quibus magis humores euacuare necesse est. Numerus impar præscribi solet ex consuetudine & leui quadam superstitione: quamquam veri aliquam præ se ferre similitudinem videatur, hæc ipsa medendi ratio, nõ modo quod deus impari numero gaudeat, sed etiam quia facultas expultrix ventriculi & intestinorum ex inæqualitate magis stimuletur, quam ad paria deuorata, ideo melius & potentius euacuant dicto impari numero; hora autem assumendi est post mediam noctem & primum somnum, vt somno postea ascito diu-rius in visceribus morentur in sua consistenzia crassa, & calor naturalis uegetior factus melius & facilius, de potentia in actum eas reducat.

CAPVT III.

De Catapotis quæ bilem purgant.

*Catapotia quæ repurgant bilem à capite
& aliis membris.*

℞. Massa pillul. aggregatiuarum, Massa pillul. de quinq; generibus, Myrabol. quando

ex

ex articulis quoque materia calida euacuanda erit, an. ʒ. ʒ. pillular. sine quibus ʒ. j. Cum aqua End. magis quam cum Syrupis, Nam crassiore mole Serapia ampliores reddunt pillulas, ideo deuorata molestiores sūt, fermentur pillulæ vii. Si minores efficere uolueris, nouem quas capiat post primum somnum, cum probo vitæ regimine & eluente iusculo sequenti.

ʒ. Sacchari Rub. ʒ. ʒ. misceatur cum iusculo pulli simplicis & sine sale, vel cum decoctione Borriginis aut Cichorij, sumat fere expleta purgatione hora ix.

ʒ. Conf. ros. & flor. Cichorij, an. ʒ. ij. Si uerò puluerem aliquem adieceris minues dosim cōditi, ad ʒ. j ʒ tantū adicies, pulueris vel diarrhod. abbatis vel triasantali vel diamarg. frigidis, ʒ. s. sacchari Cand. modicum ad gratiam. Misce, fiat bolus quem sumat in diem crastinū medicinæ & mane trib. horis ante cibum, si uerò Bolus displiceat huius loco tessellas mandendas dabis ex Electuar. diamargaronis frig. triasantali, diarrhod. abb. tabellam vnā, vel si hic bolus & electuaria in omni medicamento exhibito in affectibus calidis semper utilia erunt & præscribi poterunt.

CAPVT IV.

Catapotia Phlegmagoga, id est, pituitam educentia è capite, neruis & aliis nostri corporis partibus.

℥. massæ pillul. Cocchiar. è capite præsertim pituitam educunt, pillul. de Agarico, vniuersim ex alis membris, pillul. lucis maioris. Ex oculis, pill. fœtidæ, nō modo è cerebro, sed etiam præcipuè ex utero, pillul. ex hermodactil. propter articulos, harum omnium ℥. iiii. vel cum duobus generibus earundem vel tribus tantundem: & si plus euacuare tentandum est, vt plerumque fit in iis morbis qui ex pituita oriuntur ad ℥. j. s. modum augere poteris; si verò tantum ad ℥. j. vel ℥. iiii. ascripseris; Trochiscor. Alhandal. qui pituitam ex longinquis partibus valenter exigunt, adicere licebit ad gran. iiii. aut iiii. robustis magis ad ℥. β. Cum aqua Beton. saluix & primulæ veris pro affectib. capitis & neruorum; pro affectibus oculorum aquarum euphras. fœnicul. Chelid. verbenacæ, pro affectibus ventriculi; Absynth. Mentæ, pro utero Artimisix, matricariæ, nepetæ; pro articulis iuæ arthetice, saluix, beton. & interdum cum Syrup. calfacientibus & exsic-

can-

cantibus, & melle rosato colato iisdem sanationis scopis formentur, pillul. vii. aut ix. quas sumat circa mediam noctem, aut post primum somnum cum proba vitæ regimine & iusculo sequenti.

℞. Sacchari rub. ʒ. j. Misceatur, cum decoctione Cicerum rub. & fere peracta purgatione, sumat hora nona vt moris est.

℞. Theriacæ antiquæ & probatæ vel Mithridati Antidoti, ʒ. j. vel ʒ. iiii. vt facilius assumatur, & citra ægri molestiam sacchari Candi modicum. Misce, fiat bolus quæ sumat die sequenti, mane quinque horis ante cibum. Lōgius enim internallum esse debet ab assumptione theriace ad cibum vsque quam in aliis medicamentis, propterea quod ob varietatem medicamentorum largiore egent reductione de potentia ad actum; quamobrem vt facilius penetret, & quaqua-uersum promptius vires suas exerat, parum vini ebibere mox deuorato bolo plurimum conducer.

Bolus cardiacus ex alio medicamentorum genere paratus qui iisdem viribus pollet.

℞. Conseruæ flor. Rorism. stœccados vtriusque an ʒ. j. ʒ. pul. diamoschi dulcis, ʒ. ʒ. sacchari Candi modicum. Misce, fiat bolus quem sumat die sequenti tribus aut quatuor horis ante cibum.

*Catapotia Melanagoga, id est, atram bilem
& adustam repurgantia.*

℞. Mass. pillul. de fum. *adusta* & *melancho-*
lica euacuam, pillul. Ind. *si parata inueniatur*,
pill. de lapide Lazuli & lapide Armenio, *in*
Melancholia & *melancholicis affectibus permul-*
tum iuuant, horum singulorum vel plurium
ʒ iiii, robustis magis ʒ. i. s. cum aqua Borrage.
lupul. & fum. *In splenis malis*, cum oxymelite,
formentur pillulæ 7. aut ix. quas sumat post
primum somnum vel mediam noctem, cum
probo vitæ regimine & eluente iusculo se-
quenti.

℞. decoctionis Borrage. & Cichorij ʒ. v.
sacchari, ʒ. i. vel cum decoctione Cicer. rub.
sacchari tantundem adicies, vel in iure sim-
plici. Misce, sumat hora nona.

C A P V T VI.

De Electuariis solidis.

Electuaria solida in tessellis reddita man-
dendo deuorata paratu facilia & minus
opulenti plerumque exhibentur ad purga-
tionem quorum exhibitio & assumendi op-
portunitas non tam longo horarum inter-
uallo

uallo protrahitur, quo modo in Catapotiiis conscribatur, hora vero assumptionis mane, hora vsque ad cibum ad quinque & sex horas dilata. At verò si vires exolutæ fuerint post assumptionem per horam dormire non erit alienum, vt eo melius Electuaria solida suam purgandi vationem peragant atque compleant.

℞. Electuarium è succo ros. ʒ. v. aut vi. sumat mane quinque horis ante cibum, cum probò vitæ regimine & eluente iusculo, & sequenti de bolo Cardiaco superius tradito in Catapotiiis Cholagogis.

℞. Elect. diacarthami, ʒ. v. aut vj. sumat mane quinque aut sex horis ante cibum, cum probò vitæ regimine & eluente iusculo, boloque cardiaco antea præscripto in Catapotiiis phlegmagogis.

℞. Elect. de Citio sol. ʒ. v. aut vj. sumat bene mane quinque aut sex horis ante cibum, cum probò vitæ regimine & eluente iusculo, simplici carnis cum saccharo rubro ad ʒ. i. & bolo postea assumpto die sequenti ex conserua flor. Borræg & Bugl. & Cichorij, an. ʒ. j.

f. Theriacæ antiquæ & probatæ, ʒ. i.

sumat de mane quatuor horis
ante cibum.

De Bolo.

Electuarium solidum, vt atram bilem educat in officinis nullum est omnino accommodatum, nisi ex Indo solidum efficias; interim tamen Electuarium diacarthami pituitam & aquas educit, nonnunquam illius explere vicē poterit, ad serosa & adusta quæ atræ bilis formam referant euacuanda. Boli qui in forma Electuarii mollis, id est, opiatę vulgo dictę forma, confecti paratęque sunt, in purgatione molienda recte exhiberi possunt, quibus alia medicamento- rum forma ingrata esse solet, illi enim ipsi dilui poterunt cum aquis stillatitiis pro variis sanationis scopis: hora autem assumptionis fere vt in Electuariis solidis eadem esse debet vel paululum inferior, si non ad quinque saltem ad quatuor horas differre cibum expediet.

Bolus purgans biliosa clementer leniendo, & vehementius euacuando biliosa & aquas Citrimas.

℞. Cass. recenter extra ctę, ℥ vi. Electuar.
è succo

è succo rosa ʒ. iij. Si verò cum astrictione bilem exigere necesse est, addes pulueris rhabar. electi ʒ. iiii. aut ʒ. ij. Cum saccharo fingatur bolus, capiat per se, vel dissoluendo in aquis Endiuæ vel Cichorii, viol. Borrage. Capill. ven. ex his vnam aut duas q. ʒ. Misce, sumat de mane quatuor horis ante cibum. Cum probo vitæ regimine & eluente iusculo vt in scamoneato, bolo Cardiaco refrigerante die sequenti tempestiue exhibito.

℞. Cathol. ʒ. vi. diaphœnici, bilem & pituitam educit, vt pituitam & aquas magis educat. eius loco etiam diacarthami ʒ. iij. Cum saccharo fiat bolus quem capiet per se vel dissoluendo in aquis Beton. & Cap. ven. an. q. ʒ. Misce, sumat de mane quatuor horis ante cibum, cum probo vitæ regimine & eluente iusculo & Bolo Cardiaco die sequenti vt dictum est.

℞. Cathol. ʒ. vi. Confect. hamech propter melancholicum humorem, diasennæ solutiui propter serosa adusta, an. ʒ. j. Cum saccharo fingatur bolus, quem capiat per se vel dissoluendo in aquis Borrage. & fumar. an. q. ʒ. sumat de mane quatuor horis ante cibum, cum probo vitæ regimine & eluente iusculo ex decoctione Cicerum rub. vel Borrage. cum sacchari rubr. sufficienti portione &

bolo Cardiaco, itaque silentio prætermittendum nõ erit cum aquis stillatitiis diluendos esse, quæ ad varias partes accommodantur & iisdem affectibus plane obstant, quarum series fuit expressa, ob id ne prolixiores simul sigillatim in singulis bolis non apponimus.

C A P V T V I I I.

De potionibus.

Potiones medicamentosæ ad purgandum in primis necessariae sunt iis, qui temperamento sunt sicciore, & affectu laborant ex frigiditate & siccitate, aut ex caliditate aut siccitate, aut ex humore tali qualitate præditi; æstate magis quam hyeme, circa finem veris, & autumnii initium; nihilominus tamen etiam & naturis hisce contrariis, & affectibus dissimilibus à pituita genitis plerumque præscribendæ sunt; quia simul miscemus medicamenta purgantia phlegmagoga, vel mediocria vel vehementiora cum aliis medicamentis, quæ vias paratu faciles reddunt & humores crassos simul extenuant, ut facilius excretioni humores evacuandi cedant, atque pateant, nec non addimus ea ipsa me-

dicamenta

dicamenta membri peculiari dote prædita, quæ transferant & vehant vim medicamenti & vapores ad illas partes: Itaque diluuntur hæc medicamenta purgantia vel cum decoctione communi, vel cum alia quæ præcipuè sanationi sit accommodata, vel cum aquis stillatitiis, quæ in promptu sunt & facile paratæ inveniuntur in officinis apud pharmacopœos; horum omnium dosis & quantitas aliter definiti non potest; nisi ex proprio temperamento & sicciore affectu: quò enim maior est siccitas, modò ventriculus amplior sit & capax satisque robustus ad continendum, neque ad nauseam & vomitum propensus sit, maior exhibenda est, sin verò contra, minor. Cæterum communem & vſitatam nec moleſtam doſim omnium ſi tibi proponere volueris, ad ℥. iiii. ſufficiet, aut ſaltem ℥. v. non excedat. Hora autem aſſumptionis ſit, à ſummo mane, expergefactis quatuor horis ante cibum nullo interim ſomno aſcito, quia quod liquidum eſt facillimè diſtribuitur & ſuas vires in purgando citiſſime exerit, vt craſſum multum reſiſtit, & tarde quaquaverſum ſeſe inſinuat. Verumptamen obſeruandum eſt, in iis qui ex aliqua occaſione vel natura proprietate facile exorbantur à purgantium aſſumptione

vel ratione morbi vel symptomatis, vel denique alicuius accidentis superuenientis à causis externis, vires non mediocriter collapsæ apparent: post assumptionem medicamenti purgantis, vt vires recolligant, calorque naturalis vegetior reddatur, vt melius & facilius actionem medicamenti purgantis promoueat: Somnus statim accersendus breuior ad semi horæ partem vel ad horam ad summum, nec longior ne impediret actionem purgandi optatam. Præterea animaduersione dignum erit in illis ipsis quibus est vomendi facilitas vt præsidio apto & opportuno occurras, vt melius intra ventriculum datam potionem contineant, in aqua frigida manus extremas immergant: leni & iucundo colloquio animû aduertant, aceti vel vini generosi odorem naribus obiicias, vel cepam dissectam & aceto fortissimo imbutam prope nares olfaciendam præbeas; mali Cydonij taleas & segmenta mandenda præbeas, ita, vt ea minime deuorent: Ad hæc piper in ore & circa dentes continere ad vomitum arcendum quidam fœlici successu & euentu comprobarunt: Inter omnia plurimum conferent eiusmodi præsidia, frictio lenis & moderata in extremis cruribus, tibiis pedibusve peracta.

C A P V T I X.

Potio medica in affectibus calidis bilem repurgans, quam alui immoderato fluxu à bile & pituita excitato, purgando & astringendo simul, necesse est adhibere.

℞. Rhabarb. opt. in tota substantia, purgādo astringit, ut in diluto liquore expresso magis euacuat, per se ita dari potest. vel leuiter excessum ne vis purgatrix quodammodo euanescat, sed quia Empyreuma ab adustione relictum quidam pertimescunt, ne ob eam causam magis fluxum excitet ideo mihi consuetum est, sic prescribere diligenter irrorati & remolliti in aqua portulaca, quia inspissat, ob id fluxum cohibet, & frigiditate incendium non modo bilis, sed etiam medicamento remittit, ℞. iiii. aut ʒj β. Nō additur spica, neque Cinamom. quia cum Rhabarbaro adiecta non modo fecelicitant, ut illi inquirunt Rhabarb. operationem, sed etiam vitz purgandi accelerant atque augent, Myrabol. Cinnamon. sine infractione oleorum, cum de obstructionibus inaugurandis nullum periculum existit sed magis astringendo proficiendum veniet. Si vero obstructiones timeas cum oleo amygdalar. m. dulcium confricatarum, & ubi aliqua pituita resiccanda foret, & cheb. l. an. ʒ. β. aut ℞. ii. Syrup. Cydoniorum, & de rosis.

℞.

ficcis, an. ʒ. ʒ. ʒ. aquæ plantag. quæ vel leniter abstergit, sed magis astringit, & Borrâg. quæ tametsi astrictione non polleat, quia Cardiaca, ob id vires & spiritus instaurat, præsertim cum exolutio subsequi soleat, in omni immoderata vacuatione, aliquot cardiaca semper miscenda erunt, an. ʒ. j. ʒ. vel ʒ. ii. Misc, fiat potio, sumât mane tribus aut quatuor horis ante cibum. Nam hic differre ultra non conuenit, ut cibi pondere, quod imbecilliter attractum fuit deuoluatur, sine ullo alioqui iusculo exhibere oportet, quia nulla sunt medicamenta ex scammoneo & aliis eiusmodi uehementiora.

℞. Conseru. ros. antiquæ, eo quod magis astringit, quam recens, quia humiditas quæ relaxat, vetustate expirauit. ʒ. ii. aut ʒ. j. ʒ. addendo pulu. diamargar. frigidi, quia roborat, confortat & refrigerat, & rasuræ Eboris, siccatur & astringit, an. ʒ. j. sacchari rosati, parum, misce, fiat Bolus, quem sumat in diem crastinum medicamenti purgantis tribus horis ante cibum de mane.

℞. Rhabarbari optimi in aqua End. infusi & expressi, & si magis actionem promouere uolueris aperiendo vias obstructas, cum leuiore caliditate addes cum modico vini albi, ʒ. ii. Cinnamonomi, eodem modo præparati, quod si distillationes interdum è capite pertimescas, eius loco spica Nardi eodem modo præparat. ʒ. ʒ.

In

In colatura dissolue Syrup. ros. solut. simpl. & sine scammeo, ℥. ij. Si minus purgare uolueris, ℥. j. β. Misce, fiat potio, quam sumat mane quatuor horis ante cibum, cum proba vitæ lege instituta. Ceterum si decoctionem communem ascribere nolis, sed faciliè parabilibus aquis stillatitiis potionem medicamentalem diluere hoc modo licebit, aquarum End. acetos. fum. Cichorii, violarum, Borrag & Capill. ven. ex iis duas tantum frigidas cum frigidis vel temperatas tantum, an. ℥. ij.

*Potio purgans biliosa cum scammeatis
medicamentis, ex decoctione pecu-
liari pro arbitrio medici
accommodata.*

Accipe glycirr. rasæ parum contusæ, ℥. β. prunorum dulcium, passularum mundatarum, iuiubarum, ut feruorem bilis reprimant & dulcedine eluant, an. par. vj. quatuor sem. frig. mai. an. ℥. j. seminis anisi, quia interdum flatu sunt & ex errore victus geniti & ad aperiendas vias obstructas interdum addere poteris ad ℥. j. β. hordei mund. p. j. trium florum cord. an. p. j. fiat decoctio de colatura, cape ℥. iiii. in qua dissolue Rhabarbari optimi:

L 2

SCD Lyon 1

in aq. end. infus. ʒ. j. ʒ. Spicæ eodem modo præparatæ gran. iiii. Electuar. è succo rosar. ʒ. ij. *Cassiam autem in potionibus medicamentosis addere magnopere ingratum est assumentibus, sed Catholici sufficientem quantitatem præscribere plerumque necesse est, nam vniuersim omnes humores repurgat, ob id serosa & biliosa educit, continetque, Cassiam repressam & temperatam, ʒ. iiii. vel ʒ. ʒ. Syrup. rosar. lax. ʒ. j. Syrup. violar. ʒ. ʒ. Misce, fiat potio quam sumat in Aurora, cum proba vitæ regimine & eluente iusculo, & sequenti die bolo cardiaco pro affectibus calidis antea commemoratis.*

*Potio purgans biliosa & pituitosa sine
scammoneatis.*

ʒ. Agar. recent. trochiscati in oxym. Simpl. in aqua Beton. expressi & infusi, ʒ. iiii. aut ʒ. j. ʒ. Rhabarbari optimi, *se si bilem repurget, primario pituitam secundario ducit, generosis & mediocri fortuna hominibus in omni potione medicamentoſa frugi & solemne medicamentum non prætermittendum in aqua Betonice eodem modo infusi & expressi. ʒ. j. Cinamom. eodem modo præpar. gran. iiii. cum decoctione communi medicinae, ad-*

dendo

cinx addendo sem. Carthami, ℥. β. & ne diu-
 tius in ventriculo hareat actionemq; eius acce-
 leret, sem. anisi ℥. j. β. In colat. dissol. Syrup.
 rosar. solut. sine scammonio, ℥. j. β. vel ij. Syr.
 capp. ven. Mellis ros. col. an. ℥. β. Misce, fiat
 potio quam sumat quatuor horis ante ci-
 bum, cum probo vitæ regimine. Si cum a-
 quis stillaritiis diluere voles aquar. Beton.
 saluix, primulæ veris, Iuæ arthetice, absynt.
 artemisiæ, Borræg. Capp. ven. dicas ex iis, an.
 ℥. j. β. vel ij.

Alia similis cum scammonio.

℞. Glycirr. rasæ & parum contusæ, rad.
 Enulæ Camp. an. ℥. β. prunorum dulcium,
 passularum mundatarum, sebesten, an. par.
 iv. seminum anisi & fœniculi, an. ℥. β. flor.
 stœcados, rorismarini & trium flor. cord. an.
 p. j. fiat decoctio: De colatura, cape ℥. iiii. in
 qua dissolue catholici ℥. β. Diaphænici &
 diacart. an. ℥. ij. Syr. ros. sol. ℥. j. Syr. è stœcade
 vel mellis ros. colat. pro affectibus vteri, Sy-
 rupi de Artemisia vnum ex iis tantum, ℥. β.
 Misce, fiat potio quam sumat mane quatuor
 horis ante cibum, cum probo vitæ regimine
 & eluente iusculo, ex saccharo rub. die verò
 sequenti, cum bolo cardiaco pro affectibus

frigid. antea descripto ex theriacæ antiquæ
 ʒ. j.

*Potio purgans melancholica sine
 scamoneatis.*

℞. Cathol. ʒ. β. *quamuis sit uniuersale me-
 dicamentum ad crassos humores vacuandos
 præsertim ad melancholiam confert*, cum de-
 cocto communis medicinæ, addendo poli-
 pod. quercini recentis, Epithymi, vel foli-
 colorum sennæ mundator. an. ʒ. β. sem. anisi,
*ut flatu discutiat & facilem purgationem red-
 dat in melancholia*, ʒ. ii. In colatura dissolue
 Syrup. ros. fol ʒ. ii. Syr. de Bugloss. ʒ. β. Misce,
 fiat potio quam sumat mane quatuor horis
 ante cibum, cum probò vitæ regimine, si
 verò sine decoctione, cum aquis stillatitiis
 diluere voles, addes aquarum Borræg. lupul.
 fum. Cichorii viol. Cappill. ven. duas ex iis,
 an. ʒ. j. β vel ʒ. ii.

℞. Cortic. rad. Bugloss & glycirr. rasæ &
 parum contusæ, an. ʒ. β. passular. mundata-
 rum, prunorum dulcium, sebesten, an. par. vi.
 sem. Melonum, *quia adusta refrigerat & ape-
 rit*, ʒ. β. sem. anisi & fœniculi, an. ʒ. j. *Cum fla-
 uis discutere tentas, magis*, ʒ. j. β. hordei mun-
 dati p. j. polipod. quercini recentis Epithy-
 mi, an. ʒ. β. trium florum cordial. an. p. j. fiat.
 decoctio

decoctio, de colatura cape ꝑ.iiii. in qua dissolue Cathol. ꝑ. ꝑ. Confect. hamech. & diafennæ, solut. an. ꝑ. j. ꝑ. si plus purgare consilium sit in robustis. ꝑ. ii. Syrup. ros. sol. & de Bugloss. aut Capp. ven. aut viol. an. ꝑ. j. Misce, fiat portio quam sumat mane quatuor horis ante cibum, cum proba vitæ regimine & eluente iusculo ex pullo recenti, vel ex decoctione Borræg. sequenti die cum bolo cardiaco.

Ꝓ. Conferu. flor. vel rad. Bugloss. & violar. an. ꝑ. j. ꝑ. pulu. diamarg. frig. ꝑ. ꝑ. sacchari Candi modicum. Misce, fiat Bolus, sumat de mane quatuor horis ante cibum.

C A P V T X.

De Pregnantibus.

PRægnantibus & vterum gerentibus primis nec postremis mensibus vehementiora medicamenta purgãtia præscribere ex Hippocrate tutum nullo modo est, quia eo tempore vincula, & membranosa ligamenta conceptus vtero coherentia facillè à motu purgationis excitato dirumpi dissoluique possunt, hinc abortus intempestiuæque excretio, quemadmodum in fructibus quibus pediculi qui primum erumpunt firmi non sunt, facillèque euelli possunt. Sic

in maturitate promptè decidunt. Eodem modo euenit ex medicamentorum purgantium exhibitione in prægnantibus, vt illa agitatione à purgatione vehementiori peracta, facile suo loco diffiliant & rumpantur, sicq; infans facile vtero excidat. Sed tamen si verè Hippocratis sententiam interpretari licet, intelligendum est vterum gerentes repurgandas non esse illis ipsis medicamentis, quæ suo tempore vsitata frequentataque erant, vehementia: ex Helleboro & peplo; sed fœlix nostrum sæculum non solum meliora, sed etiam mitiora inuenire & obseruare potuit, quæ omni tempore gestationis, sine incommodo & vlla noxa exhibentur, ex quorum genere sunt multa bilem & pituitam repurgantia, tum simplicia, tum composita, vti cassia fistulatis, Manna, Myrabolani, Tamarindi & consimilia; Nec Rhabarbarum respiciendum est præter Neoterici cuiusdam sententiam, si modo detur in tota substantia; Nam præterquam quod repurgat sine effreni motu astringendo corroborat, abortusque periculum non infert, nisi liquida & tenuis expressio exhibeatur.

* * *

CATA-

*Catapotiā quā bilem & pituitam repurgant,
& in pregnantibus omni tempore accom-
modata esse possunt, modo febris non vr-
geat & calore extorreatur.*

*℞. Mass. pillul. de hiera simpl. ʒ. j. cum a-
qua absynth. vel Borrāg. aut Capp. ven. for-
mentur pillul. quinque quas capiat post pri-
mum somnum, cum probō vitæ regimine.*

Bolus purgans bilem clementer in pregnantibus omni tempore.

℞. Cassiæ recentē extractæ sub fumo decoctionis anisi, ut non flatus gignendo officiat, alioqui sine vlla correctione, quia flatuosa, factum excutere posset, ligamentorum distensione, ex qua ruptio sequeretur, hinc tandem intempestiva excretio, ʒ. x. sacchari Cand. modicum. Misce, fiat Bolus, quem capiat per horam ante cibum.

℞. Syrup. rosar. solut. ʒ. ij. aquarum Borrāg. & Capp. ven. an. ʒ. j. Misce, fiat potio quam sumat de mane tribus aut quatuor horis ante cibum, vel cum decoctione communis medicinae addendo Thamaris. ʒ. ʒ.

*Potio purgans bilem omni tempore
in pregnantibus.*

℞. Rhabarb. optimi in aquis Betonice & Bugloss. remolliti, ℥.iiii. spicæ nardi, gra.iii. *Cauene addas Cinamomum. Nam menses mouet, ob id abortum facit. Agaric. non præscribitur, quia nauseam excitat & interdum vomitum, sicq; eiusmodi motibus, consequutione partium fœtus excutere posset, ideo Rhabarb. solum sufficiet quod non modo bilem, sed etiam pituitam e-ducit, cum decoctione communi medicinae addendo sem. Carthami, ℥. ℞. seminis anisi, ne carthamus ventriculum offendat additur ℥. j. In colatura dissolue Syrup. rosa. sol. ℥. j. mel-
lis ros. col ℥. ℞. Misce, fiat potio quam sumat mane quatuor horis ante cibum. Porro cum quid in pulmonibus prægnantium insistat magnopere conducet exhibere, ℥. i. f. Man-
næ granatæ in iusculo pulli per horam ante cibum ad repurgandam bilem & pituitam sine violento motu.*

Potio purgans serosa & adusta.

℞. Glycirr. rasæ & parum contusæ cor-
tic. rad. Borræg. an. ℥. ℞. passularum munda-
tarum, prunorum dulcium, an. par. vi. semin.
anisi, ℥. ii. polipod. quercini recentis, Epithy-
mi, an. ℥. ℞. Myrabo. Indarum, cum oleo amy-
gdal.

gdal. dulc. confricatarum. ℞.iiii. trium flor.
 cord an. p. j. flor. Rorism. p. l. *Caue ne semina
 si igida adscribas vllis pragnantibus, Nam tor-
 mina excitant, ideo factum ad exitum accele-
 rant: & quod animaduersione dignum est in e-
 iusmodi medicamentis purgantibus, qua utero
 destinata sunt peculiari dote, adiicienda non e-
 runt, vt Syrupus, de artemis. aqua vel folia e-
 iusdem, neque matricaria, neque Mercurialis,
 nam cum medicamentis purgantibus permixta
 promptè & ad eam partem deuehunt non modo
 vim, sed vapores medicamenti, hinc maior pur-
 gatio & denique maior motus qua uteri liga-
 menta dissoluunt & partum accelerant.*

C A P V T X I.

De Infantibus.

CÆterum Infantes ac impuberes & qui
 decimum annum non sunt prætergressi
 lenioribus medicamentis & mitioribus e-
 uacuandi erunt, quia illorū substantia hali-
 tuosa, multa & præptè dissipatur ab vsu me-
 dicamentorū purgantiū & vehementium &
 medioerīū. Itaq; quando necesse est in pue-
 rulis ac lactantibus aluum subducere glande
 vel enemate ex decoctione pulli ad quar-
 taria j. vel ii. cassiæ ex Canna extractæ, ℞. s.

ſacchari rub. ꝑ. ꝑ. Addes vitell. ouorum numero j. enema ſubiiciatur, mane vel ſero à ſomno expergefactis, præterea conſulendum matri vel nutrici, vt medicamentofis cibus, laxantibus inſculis, ex Mercuriali, Malua, Beta. Borragine vtantur, prunis dulcibus, decocto eorundem, vel etiam per os aſſumptis medicamentis purgantibus pro ſanationis affectu diſſimilibus, ob id Hippo. ſexto Epid. conſuluit, vt ſi quis infantem purgare volet, Mater Cucumerem agreſſem edat, vt vis medicamentorum purgantium in lacte transfundatur: interim tamen vehementiora præſcribenda non ſunt, ne natura matris labefactetur, interdum licet hæc medicamenta purgantia infantibus dare.

℞. Rhabarb. opt. in aqua End. & portul. remolliti ꝑ. j. mellis roſati colati ꝑ. ſ. aquæ Borrage ꝑ. ij. Miſce, fiat potio quæ exhibeatur, paulatim cum cochleari duabus aut tribus ad ſummum horis ante ablaſtationem aut cibum, *purgat enim bilem & pituitam confortando clementer*, vel hoc modo in forma pulueris.

℞. Rhabarbar. opt. Mirabol. confricatar. cum oleo amygdal. dul. an. ꝑ. j. Polipod. querc. recentis ꝑ. ſ. aniſi ꝑ. ii. ſacchari candi ad pondus omnium. Miſce, fiat puluis ſecundum artem, quem ſumat cum lacte per
cochlearia

cochlearia, vel cum decocto pulli recentis,
mane tribus horis ante cibum.

*Potio in grandiusculis lumbricis labo-
rantibus purgans bilem &
pituitam.*

℞. Rhabarb. opt. infusi in aqua grami-
nis, & portul. deinde expressi ℥.iiii. Magis
robustis ʒ. j. s. spicæ nardi eodem modo præ-
paratæ gran.iiii. Syr. ros. sol. ʒ. j. s. aquar. por-
tul. & acetosæ vel Borræg. Nam *cardiaca con-
ferunt lumbricis enecandis*, an. q. s. Misce, fiat
potio quam sumat mane tribus horis ante
cibum.

Hæc autem potio medica in his qui deci-
mum ætatis annum prætergressi fuerint tu-
tius vsurpanda quam natu minoribus.

CAPVT XII.

De Corroborantibus.

DE Alterantium autem siue immutand-
ium aut purgantium materia vel mi-
nuendo vel ex toto euacuando cumulate

que est explicatum, restat vt ad ea ipsa transeamus medicamenta, quæ roborant & confortant, & semper in omni parte post vniuersales purgationes vsui esse debent & possunt; ideo roborantia vulgo nominata sunt, quòd membris peculiari dote sunt destinata, vt Bugloss. Cordi, Eupatorium hepatis, corallium ventriculo; & ampliori significatu roborantia ea omnia sunt, quæ contraria qualitate partem ad pristinum temperamentum reuocant; vt humores noxios, ex partium imbecillitate relictæ, qui subinde accumulantur & coaceruantur, sensim per partitas iteratasque purgationes, ex dierum interuallo mensiumque longitudine distinctas, euacuare valeant; nam ex Galeno in Methodo curatiua pronuntiatum fuit, robur partium non modo consistere in probo partium temperamento, sed etiam in iusta quantitate & qualitate triplicis substantiæ. Quamobrem quæ immutant, & partem ad naturalem redigunt temperiem, etiam roborant simul; quæ humorem euacuant superfluum & boni quantitatem retinent etiam corroborant & confortant ex quadam consequentione. Eam igitur ob causam à practi- cis Latinis largè sumpto vocabulo corroborare dicuntur. Cæterum capiti post vniuersales purgationes permulta accommo-

dantur,

dantur, tum sumpta, tum admota in affectibus calidis & frigidis, variis formis præscripta & diuersis facultatibus prædita, quæ corroborant siue immutando, siue sensim euacuando.

C A P V T X I I I.

Potio in calidis affectibus capitis, quæ refrigerando immutat & corroborat, vt in phrenitide, si perennes sint vigilia.

℞. Syrup. de papa. Syrup. viol. an. ℥. j. pulu. diamargar. frigid. Nunquam enim præmittenda sunt cardiaca in Narcoticis & Caroticis medicamentis, ne calor naturalis ex valentium medicamentorum usu, ceu extinguatur aut hebescat, in sua autem symmetria ab illis ipsis cardiacis conseruetur, aquarum Lactucæ, violar. vel Nymphææ, an. q. β. Misce, fiat potio, quæ sumat circa horam somni consuetam cum antea sanus esset, vt eò magis somnum proli-
ciat, nullo præcedente, neque sequente cibo aut potu per tres horas. Porro silentio præmittendum non est in iis quibus somnia vigent & infestant, non tam ex caliditate quam ex deprauata concoctione & doloris insultu, cum

aliquo frigido humore permisto Syrupi de papauere tantum ad ℥. s. addes & cum pulu. diamargariti frig & pul. diaircos simplicis permiscebis. Nam iris somnum conciliat vapore multo caput replendo & sic caliditate ventriculi imbecillitatem à frigiditate emendat & corrigit, Cum aquis stillatitiis simul ascribi alienum non erit, aquam Borræg. & Capp. ven.

Potio in affectibus capitis frigidis, & in apoplexia, caro, Lethargo & consimilibus calefaciens, corroborans.

℥. Syr. è stœchade, Syrup. conf. Aeori vel mellis ros. colati, vel anthosati ex duobus tantum, an. ℥. j. Theriacæ antiquæ & probatæ, potentior enim resiccet & confect. Alkermes, quamuis sit cardiacum medicamentum, & non præcipuè capiti destinatum, tamen modo si fluxus nullus sit immoderatus, aut qui ex propinquo præcesserit, plurimum confert calfaciendo, spiritus vitales augendo & dilatando qui ad naturales efformandos præcipua materia existunt, an ℥. j. pulu. diamoschi dulcis, ℥. R in somno profundo confert inexpugnabili, Castorei gran. iii. Interdum si magis resiccare veluerit am insignem humiditatem & lar-

giorem pituitam in cerebro & nervis congestam, ad ð. s. inaugere poteris, aquarum saluix, Beto. primul. veris an. ʒ. j. Misce, fiat potio quam sumat omni hora dum vrget necessitas, siue interdiu, siue noctu, modo per vnam horam aut alteram cibo onusti & prægauati non fuerint, & quando in attonito morbo aut caro integram dosim propinare omnino non licet, in duas vices partiri necesse est: sit interuallum à cibo aut iusculis assumendis saltem per tres horas.

CAPVT XIV.

Electuarium molle in affectibus capitis refrigerans & corroborans.

ʒ. Conf. flor. viol. Buglossi & Cichorij, an. ʒ. s. Conf. rosar. ʒ. iii. pul. Triasantali. nam præterquam quod refrigerat, suo odore, vapore aut fumo deuehit atque deducit ad caput vsque reliqua medicamenta, pul. diamarg. frig. an. ʒ. j. pulu. diarrhod. abb. ð. ij. Cum Syr. de End. aut viol. aut Cappill. ven. an. q. s. Misce, fiat in modum opiatae de qua sumat, ad quantitatem nucis comestibilis superbibendo partem vini albi diluti, cum aqua Cichorij.

M

mane tribus horis ante cibum alternis die-
bus vel ter in hebdomade.

*Electuarium molle in affectibus capitis
frigidis calefaciens & cor-
roborans.*

℞. Conf. flor. rorism. & stœcados *si parata
inueniatur*, Cōf. rad. acori, *sin minus augeas mo-
dum precedentium*, an. ℥. s. puluer. diamoschi
dulcis & diambrae, an. ℥. j. pul. diagalangæ, ℥.
ii. Syr. è stœcade vel Confer. acori vel de hys-
sopo, vt in Epilepsia, addendo pulueris pœo-
niæ ℥. ii. Misce, fiat in modum Opiatæ de
qua sumat ad quantitatem nucis vel Casta-
neæ superbibendo parum aquæ saluiæ &
Beton. Mane tribus horis ante cibum alter-
nis diebus vel ter in hebdomade.

*Electuarium solidum in affectibus ca-
pitis frigidis calefaciens & cor-
roborans.*

℞. pulu. diamoschi dulc. & diamb. an. ℥. i.
pul. diarrhod. abb. & diagalangæ, an. ℥. ii.
sacchari dissoluti in aquis Beton. & saluiæ,
an. q. s. misce, fiat electuarium in tessellis pō-
derantibus, ℥. iii. sumat tessellam vnam,

mane

mane tribus horis ante cibum, nihil alioqui superbibendo, vt magis exficcare valeat; nihil impedit quin ad cerebrum vsque illorum vi transferatur, quia facile vsque ad cerebrum spirant atque transmeant.

C A P V T X V.

Catapotia in vsu dierum & mensium sensim ad repurgandam bilem, in affectibus capitis calidis, que simul corroborant.

℞. Masse pill. Assaiar. tamen si pituitam exigant bilem etiam euacuant, ill. aggregatiuar. an. ʒ. i. rhab. opt. in aqua End. remolliti & pul. Thamarind. an. ʒ. i. Cum Syrup. ros. sol. formentur pill. vi. pro drachma, capiat tres dum it cubitum præcedente leui cœna, vel post mediam noctem semel in hebdomade, reliquum seruet in dictum vsum.

Catapotia repurgantia pituitam & interdum melancholicum humorem in affectibus capitis frigidis.

℞. massæ pillul. Assaiar. agari. recentis

M. 2

trochiscati, an. ʒ j. f. trochiscor. alhandal, po-
 zenter enim pituitam ex lōginquis partibus sub-
 ducunt. ʒ j. Si bilem atrā ducere expediet, addes
 folliculor. senna orient. ʒ ii. vel ʒ. j. ad corrigen-
 dam sennā, ne tormina pariat permiscere poteris
 sem. anisi. ʒ j. Si verò scopus sit praeseruare Epi-
 lepticos & sanare pulu. pœoniæ pari portione
 ʒ j. adiciēs, cum aqua Beton. & saluiæ, vel
 in melle rosato colato, formentur pillul. sex
 pro drachma, capiat tres post leuem cœnam
 in introitu lecti, vel post mediā noctem cum
 debita custodia semel in hebdomade, aut ter
 in mense, reliquum seruet in vsum.

CAPVT XVI.

De Formulis.

*Formule pro affectibus capitis, cerebri, neruo-
 rum frigidis, calfacientes & re-
 frigerantes.*

ʒ. puluer. nucis mosch. ʒ. ij piperis ʒ. j. in
 aqua saluiæ fiant formulæ similes lupinis
 quæ in ore detineantur, nec masticādo, nec de-
 glutiendo in Apoplexia, spasmō & paralyti, cara
 & lethargo. Ad eundem sanationis scopum
 plurimum valet theriaca antiqua, vel confectio

ANA-

Anacardina in ore detenta singulorum, à ℥. j. ad ʒ. j. Item illis quibus ex eiusmodi soporiferis affectibus os non inhiat sed clausum permanet, & commode propinari non possunt medicamenta, neque assumi, pennam intinctam theriaca vel melli rosato colato vel anthosato vel Oximelite scillitico, veluti furtim & vi quadam intra os immittere necesse est ad pituitam euocandam & reuellendam, quò minus à capite irritationis organa ac ventriculum irruat & easdem partes infarciat, cum suffocationis instantis periculo.

C A P V T X V I I.

De Apophlegmatismis, seu Masticatoriis.

Apophlegmatismi, id est, Masticatoria quæ pituitam è cerebro educunt.

℥. Mastiches ʒ. j. β. pyretri & pulu. staphisagriae, an. ℥. j. Misce, fiant formulæ ad instar Auellanae, quæ in ore mane detentæ pituitam sensim expurgent.

CAPVT XVIII.

De Gargarismate.

Gargarizatus & oris collutio ad eosdem affectus frigidos cerebri, & soporiferos, pituitam eliciendo & resiccando necessarius.

℞. Staphisagriæ, ℥. s. Synapi, ℥ iii. hydro-
melitis, ℥. iiii. oximelitis scillitici, ℥. ii. Misce,
fiat gargarisma de quo os colluat. Topica re-
media pro affectibus capitis quædam ad-
mouentur, pro malis cerebri intimis, Alia
verò pro affectibus externis capitis.

CAPVT XIX.

De Lotionibus:

*Lotio pro affectibus capitis calidis, vt in mania
& phrenitide, cum cerebrum ad eximiam
siccitatem terminatur.*

℞. Decoctionis capitis veruecis q. s. flor.
viol. flor. Nimpheæ, an p. j. flor. Chamæmeli,
quia sedat dolorem & in caliditate non excedit,

*sed magis iuuat facultate dolorem sedando p.
f. sem. pap. albi & Lactucæ, an. ʒ. ii. de colatura
ta cape ℥. ii. ex qua fiat lotio capitis tepefa-
cta.*

*Lotio pro affectibus capitis frigidis recalsa-
ciens & exsiccans.*

*Recip. fol. Beton. flor. stœcad. roris marini,
saluæ, an. p. j. f. flor. Chamæmeli, p. j. Calami
aromat ʒ. j. granorum tinctorum, ʒ. iii. Agari-
ci fœminini, ʒ. ii. vel Corticum eiusdem pari
portione: Non solum Agaricus assumptus pi-
tuitam educit, sed etiam admotus extergit, &
per poros seu inuisibiles meatus pituitam digerit
& euacuat, fiat decoctio in media parte Li-
xiui vitium & vini albi oligophori & aquæ
ad temperandum, de colatura cape ℥. ii. Ex
qua lauetur tepidè, caput mane longè à cibo.*

C A P V T X X.

*Synapismus vel puluis affectibus capitis calidis
utilis.*

*Recipe. Rosarum rubr. santalorum o-
mnium, flor. viol. & Nymphææ, an. ʒ. iii.
Bac. myrti, ʒ. ii. Coriandi præparati, ʒ. j. f.*

redigantur omnia in tenuiff. puluerem, quo
 finapifetur anterior pars capitis fero & mane
 longè à cibo, quando vero summus ardor infe-
 stat & phrenitis urget, hic synapismus refrige-
 rans apponendus est circa fynciput ad motis ca-
 tulis difsectis, vel pullis columbinis per dorsum
 difsectis & puluer. afperfis: mirabili sunt auxilio
 phrenitidi, quia calor uiuentium est humidus,
 idcirco in calore acri & feruido, eum abigit &
 fuo eodemque calore vitali benignè temperat,
 quia moderate calidus & fymmetros, ideo calo-
 rem alienum tollit, & humidus ficcitatē corri-
 git, vita enim noftra in calido & humido confi-
 fit. Eam igitur ob caufam horū animalium
 calor vitalis plane aduerfus est calori ficco
 adurenti & feruenti.

℞. Seminis papau. & lactucæ, an. ʒ. ii. flor.
 viol. & nymphææ, an. ʒ. j. β. granor. tinctor. Vʒ
 vehiculum fit horum medicamentorum frigi-
 dorum ad internos cerebri finus, ʒ. ij. Misc. fiat

puluis de quo fynapifetur anterior pars
 capitis, vel in ventre Catulo-
 rum vel columbarum, per
 dorsum exenteratorum
 ponatur puluis
 hic.

Syna-

Synapismus & puluis pro affectibus capitis frigidis calefaciens, siccans & roborans.

℥. Nigellæ rom. parum torrefactæ, granorum tinctorum, Coriãdri præparati, Cortic. Citri sicci, an. ʒ. ij. Nucis moschat. Cario- phyllorum, macis, an. ʒ. j. *Quod si temperare voles, quando intemperies non solum frigida, sed etiam inæqualis ex caliditate capitalia addes santalorum omnium & rosarum rub. & Bac- car. Myrti, an. ʒ. ii. Redigantur in pulu. tenuem, ex quo synapisetur anterior pars capitis sero & mane. Ex hisce autem pulueribus & synapismis in affectibus frigidis, Cucuphas & semicucuphas rectè apparere possumus, si cū syn- done rubro vel panno Bōbacino, vel panno raro lineo interiecto paucis Bombacæ carpto, interpun- gantur & filo insuantur capiti gestata & noctu & interdium permultis præscribenda sunt, præser- tim si hoc tale remediij genus gratius & accom- modatius sit quam puluis syncipiti respersus.*

C A P V T X X I.

De Suffitu.

Suffitus ex eadem materia, & in calidis & frigidis affectibus confici poterit, ex

eadem medicamentorum materia, si modo in crassas portiones non nam tenues redigantur pulveres: In affectibus tamen capitis addere poteris gummi hœderæ, torrefactum, thus & Styracem Calamyt. an. ℥.ii. fiat pulvis crasso modo contritus qui pro suffitu supra carbones iniiciatur, ex quo cum velamine capitis nidorem & halitum excipiat.

Suffitus in forma trochiscorum paratus pro affectibus frigidis capitis.

Recipe, granorum tinctorum, Calami Aromatici, gummi hœderæ torrefacti, an. ℥. ii. nucis moschatae, gariophyllorum, santalorum citrinorum, an. ℥. i. Styracis Calamytæ, ℥. ii. rosarum rub. *ut calidiora temperent & astringendo roborent*, ℥. j. Misce, fiat pulvis, quo cum Ladano & Mastiche dissolutis in aqua saluix & Beton. an. q. l. formentur Trochisci, de quibus vnus iniiciatur, sero & mane in introitu & exitu lecti supra carbones ignitos, ut suffitus fiant pro velamento capitis. Addere interdum poteris ad magis resiccandum & destilla-

tiones

ziones arcendas Nigellę rom. parum torrefactę & gallię moschataę, an. ʒ. ʒ.

C A P V T X X I I.

Puluis & synapismus pro affectibus capitis, in affectibus externis, vt in capillorum effluuio, vt in areis, ophiassi & similibus desiccans & capillos generans.

Recipe, Insectorum paruorum animalium, (quę parua sunt, & de insectorum genere rubra & aliquot nigris maculis distincta & variegata,) in sole vmbra desiccatorum, pulueris Talpę leniter combustę, pulueris apum, an. ʒ. ʒ. Abrotoni sicci, adianti vtriusque sicci an ʒ. ii. Cortic. intimi auellanarum, ʒ. i. ʒ. spicę nardi, ʒ. i. redigantur in puluerem, qui capite deerso & probę cum panno aspero confricato capiti inspergantur, Ex eodem pulu. cum melle q. ʒ. excipere interdum licebit, vt ad linimenti formam reducas de quo illiniatur ad eisdem vsus.

* *
* *

Puluis & synapismus à nobis probatus & expertus, in achoribus & tinea vlceribus capitis manantibus, modo præcesserit fons rarefaciens & abstergens qualis accommodari potest, qui antea fuit præscriptus, ex decoctione & irrigatione capitis frigidi.

℞. Lapidés siliceos num. iii. aut v. aceto acerrimo per biduum aut triduum macerentur, postea in clibano calido tamdiu permancant vt postea conteri possint. Ex his fiat puluis qui capiti inspergatur continuando per hebdomadam, sed si dolor excitetur vehemens ab vsu istius medicamenti, fiat decoctio ex floribus Chamæmeli & flor. plantag. an. p. ii. ex qua fiat vt dictum est. Cæterum isti lapides nitri & sulphuris nidorem præ se ferunt, idèò potenter abstergunt & desiccant.

CAPVT XXIII.

Linimentum in affectu capitis frigido & soporifero, vt in caro, multum desiccans & vigiliâs inducens.

℞. Capillorum hominis, q. s. comburan-

tur

tantur de quorum puluere excipiantur, ℥. ii. Castorei, ℥. ℞. misceantur cum succo rutæ & fiat in modum linimenti, de quo prius antea, confricato capite illiniatur pars anterior & posterior sero & mane.

C A P V T XXIV.

Emplastrum efficacissimum in destillationibus capitis presertim à materia frigida, quod vim habet calfaciendi, & desiccandi, ex alto trahendi, ob id reuellendi & aliqua ex parte corroborandi.

℥. Galbani, Styracis calamitæ, Mastiches an. ʒ. j. stercoreis columbini, ex alto enim trahit & reuellit, quo minus destillatio irruat in partes inferiores, ʒ. ii. stercoreis muris, hisce viribus pollet & resiccat non mediocriter, ʒ. j. Nig. rom. parū torrefectę ʒ. ii. Nucis moschatæ & granorum tinctorum, an. ʒ. j. Cum pauca therebentina aut cera manibus inunctis cum oleo nardino, fiat emplastrum paruum rotundum vel ad formam literæ, T. quod supra sinciput & suturam coronalem & rectam quam sagittalem appellant, per vnam aut alteram hebdomadam retineat, postea renouetur ex relicta massa

vsui referuata hîc à nobis præscripta. In iis quibus lues venerea altius insidet, & dolores capitis diuturnos ac solutu difficiles excitat, vt nullis vsitatis præsiidiis, neque assumptis, neq; admotis sedetur & interquiescat, bene antea eraso capite & panno aspero confricato paratur emplastrum sequens efficacissimum, tubercula & tophos emolliens & inflationem discutiens, dolorem sedans, hoc modo.

℞. massæ Emplastri de ranis, sic nominati à Ioh. de Vigo compositi, peculiariter enim doloribus morbi gallici medetur ℞. s. Emplast. filii Zachariæ, Emplastri de melitoto. emplast. diuini, Empl. Cheronci, Empl. diachilonis ireati, an ℥.iii. farinæ sem. lini & fœnugr. sedât dolorem & discutiunt, an ℥.s. Bdellii, Ammoniâci, Emolliunt dissolutorum in oleo de lilio, an ℥.iii. Croci, Concocteriam & Anodinam facultatem possidet, ℥.s. therebentinæ, q. s. formetur magdaleon, id est, massa Emplastri ex qua super alutam formetur pileolus, qui capiti deerso imponatur continendo ad v. aut vi. dies, postea renouetur. Quin & maximerit vsus in Tophis & articulorum doloribus, si particularia fiant Emplastra pro aliis membris nostri corporis, eo ipso malo condictatis.

C A P.

In affectibus capitis calidis & ab insigni feruore excitatis, vt in febris ardentibus, quando vigilia excruciant, & de phrenitide instante propinquum periculum est, vnguentum tale prescribatur.

Recipe, vnguenti populeonis ℥. ii. aut iii. inungatur regio frontis aut temporum frigide, vel vt penetret tepide; itaq; non modo conducit eo loco apponere, sed etiam in volis manuum & pedum & circa carpum, quia cum sint neruosæ partes ex communiõne & consequentiõne quæ est cum cerebro neruorum principio, inde vis & qualitas medicamenti ad eandem partem transferri poterit, vel propter arterias ex carnes, quæ in illis locis interfertæ sunt, sanguis feruidior refrigerari & tenuior increassari potest, ob eam igitur causam somnum allieere possunt.

Illitus in affectibus capitis calidis ad repellendum vaporum acrium influxum, vt in febris ardentibus.

℥. Oxyrrhodini ℥. iii. aut iiii. illiniatur

regio frontis & temporum tepidè vel frigidè, longe à cibo, quod hoc modo parare poteris.

℞. Olei rosacei, ℥ ii. aceti vini albi, ℥ j. albumina ouorum numero ii. agitentur omnia simul. Misce, fiat in modum linimenti de quo illiniantur regio frontis & temporum, eo modo vt antea dictum.

Illitus in affectibus capitis à frigida & mixta materia abortis abstergens, resiccans, dolorem sedans atque roborans hoc modo.

℞. Aloes ℥. β. Olei rosacei q. β. Aceti parum, misce, fiat in modum linimenti quo illinatur frons & tempora tepidè longe à cibo. Ceterum quia talia humida & liquida in doloribus capitis sedandis dum opportunum est distillationibus plerumque officere solent, idcirco aliud præsidij genus moliendum quod forma sua iisdem viribus polleat.

C A P V T XXVI.

Frontale refrigerans somnum concilians & acrem dolorem mitigans.

℞. flor. violar. Nymphaeæ & rosar. aa. ℥. j. sam-

j. Santalorum omnium ʒ. j. seminum papaucris albi & Lactucæ, an. ʒ. j. Cortic. rad. papau. ʒ. ij. & ut vehiculum sit horum medicamentorum frigidorum ad cerebrum usque & interiores sedes, granorum tinctorum, ʒ. ii. Interdum addere poteris, flor. Chamameli & Melilos. & Anerhi, qui plus a quo non calfaciunt & simul sedant dolorem ac somnum prouocant, an. ʒ. j. Misce, fiat puluis irroratus parum cum aceto vini albi & aqua rosacea, cum syndone rubro vel panno raro lineo; fiat frontale inter punctum quod in fronte gestet diu & noctu donec leuamen sentiat.

Frontale in dolore capitis à materia frigida vel mista, calfaciens, siccans, dolorem sedans & corroborans.

ʒ. flor. Chamameli & Meliloti, an. ʒ. j. Coriandri præparati, ʒ. ʒ. granorum tinctorum, Macis, Nucis Moschata & Betonica, an. ʒ. j. Santalorum citrinorum & rosarum rub. an. ʒ. ij. redigantur in pulu. & aqua Betonica aur saluia irroretur parū, & syndone rubro vel panno lineo raro & pauco bombace excipiat, ut blande calefaciat in hoc doloris pathemate à causa frigida, fiat fron-

¶

zale quod in fronte gerat tandiu donec le-
uamen sentiat.

C A P V T X X V I I .

De auribus.

IN affectibus aurium calidis & frigidis, ea
ipsa medicamenta, quæ sensim euacuant,
vitalia, vt sic loquar, antea præscripta & ele-
ctuariorum corroborantia pro affectibus capitis
assumpta magnopere proficere poterunt, v-
tiliter autem hæc sequentia admouebuntur.

*Suffitus pro affectibus aurium calidis refrige-
rans & sedans dolorem.*

℞. Rosar. rub. & flor. viol. & Nymphaea,
an. p. j. flor. Chamæmeli, p. β. Balaustior. ʒ. j.
santalorum omnium, ʒ. β. fiat decoctio, ex
qua per infundibulum fiat suffitus qui intra
aures excipiatur & immittatur. Mane longè
à cibo.

*Suffitus in affectibus aurium frigidis calfa-
ciens, abstergens, expurgans & discutiens
vapores & flatus.*

℞. Cort. ligni sancti, potenter siccant & ab-
stergit

stergit & halitu suo vapores & flatu in surditate & aurium murmurio discutit, galangæ, Calami Arom. an. ʒ. ʒ. schœnāti, ʒ. iiii. florum stœcados Rorismarini, saluiæ, an. p. j. flor. Chamæmeli & Meliloti, an. p. ʒ. amygdalar. amararum, plurimum abstergunt & desiccant, Idcirco absument vapores & flatu in auribus inclusos, ʒ. j. Euphorbii, potenter exsiccant & absument, altius penetrando, ʒ. ʒ. si fiat decoctio in media parte vini albi & aquæ, ex qua suffitus fiat per infundibulum qui excipiat intra aures sero & mane longè à cibo.

Illitus pro affectibus aurium calidis refrigerans & mitigans dolorem leniendo.

℞. Olei rosar. viol. an. ʒ. ii. si mixta materia sit loco olei rosarum addes olei Chamæmeli tantundem, vel ad ʒ. iiii. misceantur simul & cum bombace in ipsis oleis inuncto guttatum imponatur intra aures, vel cum eodem bombace ipsis oleis imbuto occludantur aurium introitus mutando renouandoque bis aut ter in die.

N 2

*Illitus in affectibus aurium frigidis calfaciens,
siccans & abstergens.*

*℞. Olei amygdal. amar. interdum solum
ad ℥.iiii. vel cum oleo Nardino, quando simul
astringere & roborare necesse est, horum singu-
lorum ℥.ii. Si verò magis resiccare & absumere
consilium est olei de Castoreo, ℥.j. Et si para-
rum inueniatur arte chimica oleum de Thy-
mo efficacissimum esset. Miscantur simul &
cum bombace oleo imbuto guttatim intra
aures imponatur, & ex eodem includat
aures.*

CAPVT XXVIII.

De oculis.

IN oculorum affectibus generalia ea me-
dicamenta vsurpantur, quæ in affectibus
capitis designata fuerunt. Ex Catapotis ta-
men pillulas lucis maiores peculiariter dare
poteris, ad ℥.ii. vel ℥.j. cū succo herbæ fœni-
culi. Inter admota medicamenta, quæ in e-
iusmodi oculorum malis eueniunt hoc per-
petuo memoria tenendum est, indicatione
sumpta à peculiari natura & constitutione
partis,

partis, acria & exedentia nullo modo esse v-
 surpanda, propter exactum sensum & earum
 partium mollitiem; sed tamen indicatione
 sumpta nonnunquam à materia morbifica,
 vt in vngula, Cataracta & consimilibus af-
 fectibus, adhibenda sunt nihilominus qua-
 dam acria & multum abstergentia, vt fellis
 genera, auium rapacium & piscium ac Me-
 tallica, Antimonium, tuthia & consimilia;
 nam indicata morbi materia quæ crassior
 infixæ est & coit eo loco, resistendo frangit
 & remittit vim medicamentorum acrium,
 quominus vel membranas, vel humores o-
 culum constituentes offendant. Præterea
 obseruandum est Lactucam & assumptam &
 admotam, nec non & oleum exterius præci-
 pue non conuenire, quia incrassant & aciem
 oculorum perstringunt, cum spiritui ad vi-
 dendum destinato, ceu caliginem inducant.
 Cæterum inter ea ipsa medicamenta quæ o-
 culis imponuntur, hæc peculiaria sunt col-
 lyria nominata, siue liquida, siue sicca; alia
 verò cataplasmatibus vice imposita profunt;
 fofus etiam interdum adhibentur, sed non
 semper vsurpandi, nam si ex astringentibus
 & reprimentibus parentur vel frigidi admo-
 uentur, ob id materiam in oculis impingunt
 & inculcant, si vero fiant resoluentes fofus,
 calidè vel tepidè, relaxant & dissoluunt

oculi robur magisque attrahendo nocent quam discutiendo iuuare videantur.

Interim tamen cum probè vniuersum caput & corpus repurgatum fuerit fofus pro affectibus oculorum calidis confimiles profunt.

℥. Rosar. rub. & flor. viol. an. p. j. Summitatum fumarix, quia fumos ex oculis abigit, p. ℞. Balauftior. ʒ. j. ℞. fantalorum omnium, ʒ. ℞. fiat decoctio in aqua pluuiali qua foueatur oculus cum linteo molli & panno raro: non cum nimium calfacientibus, & multo minus cum spongia, quia falfugine & acrimonia pungeret oculos & morderet, dolorem moueret, fluxionemque confequenter excitaret.

Fofus pro affectibus frigidis oculorum calfaciens ex tenuitate effentia.

℥. fœnuigr. ter loti in aqua Cisternæ, ne nimis calore fuo robur oculorum diffoluant temperatur aqua lorione. ʒ. ii. fem. fœnie. ʒ. j. rad. a-cori vulgaris, ʒ. ℞. fiat decoctio in media parte vini clari & odoriferi & aquæ pluuiæ, qua foueantur oculi tepidè fero & mane longè à cibo.

In affectibus oculorum calidis, quando lippitudo & inflammatio infestare incipiunt non parum conducet hisce remediis sequentibus vti.

℞. Tria albumina ouorum, agitentur fortiter donec spuma multa erumpat, ea detracta super affundes aquæ peculi rosarum, ad magis repellendum circa inflammationis initia, ℥.ij. aquæ rosar. ut suo odore penetret, ℥.j. Misceantur simul & sæpius, oculis imponatur. Item ad eisdem vsus plurimum confert sequens præsidium.

℞. Semen Cydoniorum, ℥.j. feminis psilij. ℥. β. Cum aqua rosarum & violarum extrahatur mucago, vsui reseruetur, de qua sæpius imponat in horas oculis ad ardorem mitigandum & dolorem sedandum: sua viscagine & glutinosa consistentia spiracula per quæ fluxio humoris tenuis irruere solet, præcludit. Pomum semiputre ad dolores sedandos oculorum, cataplasmatibus vice impostum, quando portione aqua rosacea irroratur magni vsus esse solet, quia refrigerando lenit.

Collyrium in affectibus oculorum calidis circa inflammationis initia refrigerans, repellens, & leniendo dolorem sedans.

℞. Trochiscor. alborum rhasis sine opio, ℥.ii. licii. ℥.j. aquæ peculi rosar. ℥.iiii. Misce, fiat collyrium quod intra oculos infundatur sero & mane, vel hoc modo.

℞. Aquæ rosar. ℥.iiii. Lapidis hæmatitis, Coralli rub. puluerisati, cum aqua ros. loti, an ℥.ii. Margaritar. refrigerando, emundant spiritus caliginosos & oculos corroborans. ℥.j. pulu. Myrabol. citrinar. Emundant & roborant, cum frigiditate, ℥.℞. Caphuræ gran.iii. Misce, fiat collyrium quo oculi madefiant, mane & sero.

Collyrium in affectibus oculorum à mixta materia, tum calida, tum frigida circa incrementum ophthalmiæ partim refrigerans, magis calfaciens, & abstergens.

℞. Tuthiæ præparatæ, sarcocoll nutritæ, an. ℥.j.℞. Antimonii, ℥.j. Aloes lotæ in aqua rosar. ℥.ii. lapidis hæmatitis ℥.j. aquæ ros. & fœnic. an. q.℞. Misce, fiat collyrium de quo
impc-

imponat supra oculos sero & mane.

In affectibus autem oculorum frigidis & suffusione iam concreta vngula & similibus, in quibus humor crassus in oculis coit, calfaciens, abstergens, & potenter siccans, & materiam crassam extenuans vsui est: fomento prius parato quod rarefaciendi & abstergendi viribus polleat.

℞. Herbarum fœniculi & euphrasæ, an. p.ii. ros. rub. p.ß. sem. fœnuigr. diligenter loti cum aqua cisternæ & fœniculi, an. ʒ.iii. fiat decoctio in aquæ sufficienti quantitate, quo foueantur oculi tepidè cum spongia molli donec imponatur collyrium sequens.

℞. Vasorum figulinorum, spumæ Maris, stercoreis lacerti, Boracis, lapidis hæmatitis, an. ʒ. ii. fiat puluis subtilissimus per syndonem & cetaceum siue incerniculum cribellatus.

℞. Rad. acori, Chelidoniæ, an. ʒ.ii. Conquassentur & coquantur in vase mundo in lb.j. aquæ donec ad quartam partem redeat, & in eam aquam immergatur puluis supra dictus & postea siccetur in ymbra, postea

feratur, & cum dicta aqua iterum incorporatur, hoc fiat quinquies, tandem fiat puluis, & cum aqua Euphrasie & fœniculi fiat collyrium, imponatur sero & mane, vt dictum est. Item aqua stillatitia fœlicissimo successu à nobis experta à Leonello Faentino descripta maximi est vsus in affectibus frigidis oculorum ad clarificandum visum & sine morfu manifesto disentiens & exterens catharactas hoc modo.

℥. Zinziberis, Cinnamomi, gariophillorum, nucis moschatae, granorum paradisi, an. ℥. β. florum salviae, ℥. j. Cardamomi, Cubebarum, galangae, rorismarini, Maioranae, Lauandulae, Melissae, Betonicae, an. ℥. ii. infunde omnia in puluerem redacta & bene contrita in vino albo ad ℥. ix. vel in vino distillato vase vitreo, vt vinum supernatet per quinque aut decem dies, fiat distillatio secundum artem in diplomate quod balneum Mariae appellant & vsui referuetur, qua de aqua intra oculos imponat duas aut tres guttas sero & mane: Item ad eisdem vsu efficacissima est aqua mellis stillario opere confecta, cum momento pulueris sacchari candi. Ouum præterea induratum & per medium dissectum, in quo puluis sacchari candi à ℥. j. ad ij. resperus sit, oculis tepidè admodum digerit circa declinationem ophthalmiae

mia & in aliis oculorum morbis à materia frigida & crassa excitatis non mediocriter conferre potest. Saccharum Candum immoderatum consumit humiditates oculorum & cæcitatem inducit; aqua in qua saccharum Candum fuerit dilutum multum iuuat.

Collyrium siccum pro affectibus oculorum illachrimantium, vt in fistula lachrymali resiccanda, siccans, astringens, roborans.

℞. Rosar. rubr. Coralli rubr. nucleorum dactylorum, an. ʒ ij. gummi Tragacanti torrefacti deinde loti cum aqua rosar. ʒ. j. santali Citrini, ʒ. ij. Margaritarum. ʒ. j. redigantur in puluerem ex quo imponatur tantillulum supra oculos & fistulam lachrymalem.

Porro cum affectus oculorum consistit in partibus extimis palpebrarum ex humorum ardore & acrimonia hoc modo vnguentum parari potest quod refrigerandi, repellendi, & desiccandi vim habet.

℞. succi fœniculi, ʒ. iii. gummi tragacanthi

ʒ.ii. Mucaginis seminum Cydoniorum, ʒ.ʒ. rosar. rub ʒ.ii. santalorum omnium, ʒ.ʒ. Cum pauca cera citra oleum, *nam oculis nocet*, fiat in modum vnguenti, quo inunguntur palpebræ sero inter dormiendum, & mane abluat cum aqua rosar. continuet donec leuamen sentiat, longè à cibo.

Vnguentum in affectibus oculorum externis & palpebrarum à materia frigida, vt in inflammatione à vaporibus crassis, calefaciens moderate & abstergens.

ʒ. Succi herbæ fœniculi ʒ.iiii. seminis fœnigræci loti, cum aqua pluuiali *ne nimis calfaciat*, ʒ. i. Aloes succotrinæ aut hepaticæ ʒ.ii. tuthiæ præparatæ, ʒ.ʒ. cum pauca therebintina & cera, fiat in modum vnguenti, de quo inungantur palpebræ sero inter dormiendum, deinde abluat se cum aqua florum fabarum & fœniculi. Continuet donec leuamen sentiat.

CAPVT XXX.

De Naribus.

Per narium itinera, quedam medicamenta

iiii-

iniiciuntur, quæ admoueri solent in affectibus tum frigidis, tum calidis, non modo, vt ea mala, quæ in hoc loco consistunt sanare valeant, sed etiam anteriores cerebri ventriculos expurgent errhinis, id est, caput-purgiis rectè accommodatis.

℞. Hordei torrefacti, Eo magis siccando abstergit & quadam adustione recrementa ad expulsionem irritat, quæ per illas partes & dicta itinera fluere debent, ℥. ℞. succi rosar. potenter trahit & expurgat sine vlla caliditate perspicua, ℥. j. vini malorum granatorum acidorum. Eluit & emundat, cum frigiditate & siccitate, facultatem expultricem stimulat, ℥. iii. Misce, fiat Errhinum quod intra nares immittat, mane dum à somno expergefactus fuerit.

Errhinum in affectibus frigidis calefaciens, multum abstergens & attrahens & repurgans recrementa, in anterioribus cerebri ventriculis.

℞. Nigellæ rom. parum torrefactæ, potenter resiccatur & absumit distillationis materiam,

3. ij. pulueris nucis mosc. 3 j. succi siclæ, ni-
 zrosa qualitate expurgat, succi maioranæ, a-
 marore expurgat & cerebrum corroborat, succi
 Anagallidis, multum enim attrahit & reuellit
 insita quadam facultate propria, an. ʒ. j. aquæ
 violæ. ʒ. ʒ. Misce, fiat caputpurgium de quo
 immittat intra nares mane à somno excita-
 tus dum surgit à lecto probe se mungendo.
 In affectibus autem soporiferis, ut caro & le-
 thargo & apoplexia expediet puluerem hellebori
 in iisdem fere Errhinis, ʒ. j. vel ʒ. j. addere vel
 ex eodem sine ullo liquore intra nares insuffla-
 ri. Nam insigni caliditate & acrimonia sopitos
 excitat & pituitam ad expulsionem & discutio-
 nem paratam reddit. Nonnunquam etiam utile
 foret his quos vigilia infestant, quando alia
 non proficiunt remedia, & in varietatem me-
 dicamentorum, tentare licet hunc puluerem
 sequentem parare qui refrigerat & somnum
 conciliat.

℞. Seminum papau. albi & Lactucæ, an.
 ʒ. j. florum violarum & Nymphææ, an. ʒ. j. ʒ.
 lantalorum omnium, ʒ. ii. Misce, fiat puluis
 qui intra nares insuffletur hora somni, vel
 etiam interdiu longè à cibo. Item quibus est
 narium fœtor à bile putrefacta & pituita
 salsa & summus capitis ardor infestat opti-
 mum erit globulos conficere qui odore suo
 spiritum

spiritum graueolentum emundent simul ac refrigerare valeant.

C A P V T X X X I.

*Globuli in affectibus capitis refrigerantes
& odore iucundi.*

℞. florum violarum, nymphaeæ & rosarum rubr. an. ʒj. santalorum omnium, ʒ.ʒ. gummi Tragacanthi dissoluti in aquis rosarum & nymphaeæ, an. q.ʒ. Misceantur simul, ex quorum massa formentur globuli qui manibus gestati sæpius prope nares admoueantur, vt halitum & odorem excipiant.

Globuli in affectibus frigidis ad spiritum graueolentem emendandum & cerebrum recalsaciendum atque resiccandum.

℞. pulu. nucis moschatae, schænanthos, an. ʒ.iii. flor. saluiae & roris. pulueris maior. an. ʒ.ʒ. Ligni aloes, ʒj.ʒ. Nigellæ rom. styracis, Calamytae & Benioini, an. ʒj. Ladani puri & gummi tragacanthi dissoluti in aqua

Mali aurei q.ß. Misceantur simul, ex quorum massa fiant globuli manibus gestati, sæpius prope nares admoneantur odorem & halitum excipiendo.

Cæterum quia è naribus sanguinis profluum immoderatus plerumq; vires conuellit, sistendum est, eo loco aptius adhibitis remediis hoc modo.

Tenta naribus admota refrigerans, astringens, & peculiari quadam virtute exterius sanguinem fluentem cohibens.

℞. Bol. Armenæ, terræ sigillat. & sang. drac. an. ʒ. ii. Aloes succotrinæ vel hepaticæ, ʒ. j. Cum succo plantaginis & pannis lineis mollibus & paruis adhibitis pilis leporinis & simul mixtis fiant, tentæ quæ naribus imponantur.

Vnguentum in affectibus narium ex vlcere desiccans & abstergens.

℞. pulu. plumbi vsti & loti, cum aqua solani, tuthiæ, Antimonii, an. ʒ. j. ß. Cerusæ, ʒ. ij. Lychargirii, ʒ. ß. lapidis calaminaris puluerisati, ʒ. iiii. olei de vitellis ouorum, *potentior enim siccat & abstergit*, Olei rosacei, vt

temperet, an. ʒ. ij. Ceræ parum. Misce, fiat unguentum quo inungantur nares vlcere obfessæ.

C A P V T XXXII.

De medicamentis sthomaticis seu oris.

Sthomatica medicamenta & in varia forma & pro dissimilibus sanationis scopis præscribi poterunt, imprimis gargarizatus & oris collutiones in affectibus tum calidis, tum frigidis.

Gargarizatus in affectibus oris calidis, ut in inflammationibus, destillationibus acribus & salsis, & huiusmodi vlceribus, qua cum defluxione consistunt ex ipso humore acris & pungente refrigerans, repellens & non nihil abstergens.

ʒ. fol. plantag. oleastri & herniariæ herbæ, sine morſu siccant & à nobis ad hernia sanationem salutaris usu probata, & experta in vlceribus intestinorum & pudendorum, addas licet in oris vlceribus & inflammationibus, in lue venerea, resiccando multū pollet & non mediocriter abstergit sine ullo punctiois sensu, an. m. j. sum-

mitatum lentisci, m. ℞. ros. rubr. p. j. Balau-
stior. ℥. j. Baccar. myrthi, ℥. ℞. Misce, fiat de-
coctio in aqua hordei, *quando magis repellere*
conueniet in aqua Chalybeata. De colatura ca-
pe ℞. j. In qua dissolue diamori simplicis, ℥.
iiii. Si verò asperitatem ab acri humore reli-
ctam lenire necesse est, addes Syrupi viol. ℥.
ii. aur. iii. Misce, fiat gargarisma quo frequen-
ter os colluat.

Gargarisma in affectibus oris partim calidis
partim frigidis ex materia mixta, repellens
& resoluens in progressu, anginae efficax.

℥. fol. plantag. summitatum lentisci, an.
m. j. flor. Chamemeli, p. ℞. Balaustior. ℥. j. pas-
sular. cum gigartia, *ut abstergant & repri-*
mant, par. viii. Aluminis, ℥. ii. quando nulla est
inflammatio pro angina increcente malo ut ab-
stergant & repellant, Baccarum Myrthi tan-
tundem, fiat decoctio in aqua hordei, de cu-
jus colatura cape ℞. j. In qua dissolue dia-
mori dulcis, ℥. ii. dianucum, ℥. j. Mellis rosati
colati, ℥. ℞. Misce, fiat gargarisma quo
frequenter os col-
luat.

IN ore medicamenta, quæ detineri possunt, quæ caput calfaciunt, siccant, absumunt, aliquorum series iam à nobis expressa est, ut in affectibus capitis frigidis, siue in forma collutionis & gargarisatus & apoplegmatismi & paruerum trochiscorum. Iam verò quædam sunt adiicienda, quæ fluxiones nimium calidas è cerebro decumbentes in partes subiectas arceant, atque inhibeant refrigerando, astringendo & inspissando, ut in Catharro à pituita salsa, qui plerumque infestare solet eos quos vlcus pulmonum tabidos efficit.

*Formula refrigerantes, astringentes in
Catharro ab humore acro
& salso.*

℞. Trochisc. de Bolo, ℥. ii. teneat in ore interdium & præsertim noctu vtilis sunt, & quibus virget sanguinis sputum è pulmonibus: Ad idem valet diacodion in ore detentum lambendo, & assumptum faccharum rosatum, in tessellis formatum. Syrup. de papauer. ad ℥. ij. ℞. Syrup. de ziziphis, ℥. ii. aut iii. Miscantur simul.

Ⓞ 2.

SCD Lyon 1

& cum cochleari sumat de nocte, & inter dormiendum in ore quoad fieri potest contineat.

℞. Amyli, pulu. diatragac. frig. an. ʒ. ii. si materia non sit adeo cal. & mixta addes spicæ nard. astringit enim & fluxiones cohibet, mastiches, an. ʒ. j. gummi tragacanthi dissolutorum in aqua rosar. q. β. Misce, fiant trochisci & formulæ similes lupinis quas in ore interdium nonnunquam contineat: præsertim verò noctu inter dormiendum.

CAPVT XXXIV.

Vlcera in ore plerumque contingunt, quæ cum putrida sunt, aliusque insident & mali sunt moris, in lue venerea, potenter resiccanda sunt collutionibus & gargarisatu antea traditis repellentibus & abstergentibus. Interdum dissoluere licet quamuisori sit ingrati, sed sanationi accommodatum, vnguenti Ægyptiaci, ʒ. j. quod valenter abstergit & desiccatur in vlcerebus malignis & putridis. Ad hæc quando cum vlcere inflammatio est & acris fluxio, & abstergendum & reprimendum, tum aquam aluminosam à Guidone Cauliaco descriptam excipere oportet, cum pauco bombace, & loco vlcere obsesso in ore circumponere sero & mane & interdium. Inter verò omnia præsidia

dia ad resiccanda vlcera illa maligna magni
vsus esse aquam sequentem experiri potes.

℞. Aquæ fortis, ℥. s. quia eximia acrimonia
poller, temperanda est aqua egelida; vel aliis e-
iusmodi aquis in officinis pharmacopœorum pa-
ratis, vt aquæ peculi rosar. & plantaginis, an.
℥. j. s. vel ij. Misceantur & cum paucis Bom-
bace in iisdem aquis intincto, attingantur
oris partes vlcere obsessæ, cauendo omnino
à partibus circumstantibus sanis.

C A P V T X X X V.

De Dentisfriciis.

Dentisfricia quæ dentibus admoneri so-
lent, vel eorum mala sanare possunt, in
varias formas præscribi solent, in affectibus
tum calidis, tum frigidis, quorum seriem hic
breuiter addemus: & imprimis hoc scitu di-
gnum esse monemus dentibus aduersissima
esse quæ actu sunt frigida, ob id ab Hippo-
cra. scriptum fuit Aphorism. 18. lib. 5. frigi-
dum esse inimicum ossibus, dentibus, ner-
uis, cerebro, spinali medullæ. Hinc videre
licet in illis locis in quibus aquæ potabiles
nimio algore refrigerant, homines illius

gentis dentes habere infirmiffimos & corruptioni obnoxios. Adhæc dulcia lac & similia, quia facilè putrefcunt & carnem gingivarum mollem facile immutant, ex loci communione & propinquitate corruptionis labem dentes contrahunt; ac denique omnia quæ fluxionis causæ existunt, vt cerebrum ad eos implendos opportunum fiat, vt omnes mulieres, quæ fucò ex sublimato & eiusmodi causticis vtuntur in facie, quia destillationem mouent & sponte sua exedunt dentes, non modo nigriores redduntur, sed & facile carie concidunt & tabescunt. Medicamenta autem dentibus aecommodata in doloribus vehementissimis à bile & pituita salsa & serosis recrementis excitatis fluxionis impetum arcerè & cohibere debent, verbi gratia, Emplastro paruo & rotundo ex massa Emplastri contra rupturam confecto potius quam ex Mastiche, tamen si astrictione polleat, caliditate tamen non nihil fluxionem impellere potest. Sed in hoc emplastro contra rupturam, cum omnia sint glutinantia ideo fluxionis impetum intercipiunt, & vasorum extrema oscula densant atque cogunt: & quia magna ex parte ingrediètia frigida sunt, humoris caliditatem remittunt & ad fluendum retardant supra temporum venas imposi-
sum

fitum efficacissimum erit. Item oris collutio & gargarisatus sequens ad materiam magis impactam & propinquam infrænandam & mitigandam ne dolores inferant acerbiores.

Gargarizatus & oris collutio pro doloribus dentium à materia calida excitatis, refrigerans, sedans dolorem, refrænans & mitigans dolorem.

℞. fol. hiosciamii & plantag. an. ℞. florum violarum & rosarum rubear. an. ꝑ. j. Capitum papau. ꝓ. j. flor. saluix, quia siccant, eluunt & corrigunt frigiditatem stupefacientem, addes ad ꝓ. vi. fiat decoctio in aqua pluuiæ addendo aceti, ꝓ. iiii. refrigerat & repellit propter humorem calidum & acrem & vehiculum est aliorum medicamentorum, de colatura cape ℞. j. ex qua fiat oris collutio frequenter. In doloribus autem dentium qui non ita excruciant à materia frigida, ad prohibendam fluxionem ex usu erit supra venas temporum paruum emplastrum rotundum ex mastiche dissolutum, cum oleo nardino, & decoctione parare ex saluix m. j. decocto, cum vino stiptico atque diligenter colluere

calidè, aut eadem folia saluix ex vino imbuta calide supra dentes apponere, & capite demisso sal decoctum iuxta guttatim effundere in dentes, nam doloris causam detrahit.

Gargarizatus & oris collutio in doloribus dentium à materia frigida, calefaciens & abstergens, extenuansque crassos humores.

℞, Rad. peucedani, fœnic. & calami Arom. an. ℥. j. saluix, m. j. fiat decoctio, in media parte aquæ & vini. De cuius colatura cape ℞. j. in qua dissolue & oximelitis scillitici, ℥. iiii. Misce, fiat oris collutio sæpius in ore lauando dentes repidè. Cæterum in dente carie exeso quando dolores mouet & fluxiones irritat eo tempore magni vsus erit vt in perforato dente præsertim quando destillatio acris est Caphuræ portiunculam per aliquot horas detinere, mirabiliter enim dolores sedat.

Dentisfricium quando facilè dentes è fluxione laxi sunt, & facile à suis alueolis permouentur & gingiuarum caro laxa est, è putredine tabescit, siccans, abstergens nonnihil

*hil & adstringens ex frigidis & aliquot
medicamentis calidis constans.*

℞. Ossis sepiaë, pumicis, Coralli vtriuf-
que, an ʒ. ij. lapidis Marmoris, & dealbat &
firmat dentes, ʒ. j. ʒ. Santalorum omnium ʒ. j.
schenantos, ʒ. ij. Aluminis, multum enim a-
stringit & eluit, ʒ. j. Misce, fiat puluis secun-
dum artem quo dentium radices & gingiua-
rum infricet.

C A P V T X X X V I.

IN affectibus oris externis quando angina infestat vel circa fauces, vel in muscu-
lis laringis, semper ad exteriora trahere ma-
gnopere conducit, eam igitur ob causam il-
litum parare ex hisce olei conueniet.

*Illitus in collo admouendus, relaxans, resol-
uens & sedans dolorem.*

℞. Olei Chamæmelini, olei de lilio & a-
mygda. dulcium, an ʒ. ii. Misce, illiniatur ca-
lide inuoluendo postea panno calido.

De thoracis affectibus.

IN affectibus thoracis & pulmonum vel ex assumptis, vel per admota remedia, ea sunt necessaria, quæ vel materiam morbi siue calidam, siue frigidam sensim euacuant, quæ in parte propinqua adhibentur. Nullo modo astringentia sint nisi sanguinis sputum vrgeat, nam talia sputi deductionem prohibent & respirationem raram & densam efficiunt pectusque coarctant, vt libere moueri non possit. Vitanda insuper acida, acria, quæ pungunt & vellicant pulmonum substantiam raram & mollem, nec non talia quæ multum sunt acria, calida, sicca, nec non tenuium partium, veluti quæ vrinas maximè proliciunt, quæ infesta & noxia esse pulmonum malis affirmavit Galenus, quia quod est tenue dissoluunt & digerunt, quod vero crassum lapidis modo indurant & cogunt, & in tophi naturam conuertunt. Hæcque imprimis pectori & pulmonibus sunt, quæ simul dulcedine valent & leniunt amarore ab infarctu à materia lenta & viscida pulmonū, bronchia expediunt & liberant, quanquam nonnunquã indicatione solum sumpta à materia non à partis conditione & natura quædam miscemus acria quæ incidendi & tenuandi

quandi vi eximia lentam & viscidam pituitam ad excretionem promptè moueant.

Potio roborans in affectibus thoracis & pulmonum calidis refrigerando leniens.

℞. Syrupi viol. Syr. Cap. ven. an. ℥. j. pul. diamarg. siig. ꝑ. ii. aquar. End. viol. vel Borr. rag. temperata utrisque affectibus & calidis & frigidis confert, an. q. β. misce, fiat potio quam sumat mane vel sero nullo præcedente, vel sequente cibo aut potu per tres horas. Interim tamē animaduersione dignum est, quod quando fluxio, quæ in pulmones illabitur est multum acris & tenuis, Syrupis de pap. & de ziziphis loco aliorum addere expediet & pro aqua Endiuiaæ aquam Lactucaæ.

Potio roborans, calfaciens, & abstergens, & sputi educationem promouens, vt in astmate.

℞. Syr. de hyssopo, Syr. de glycirr. humorem crassum & lentum extenuat, an. ℥. ii. pulu. diaireos simplicis, ꝑ. iiii. aquæ Capill. ven. Borr. rag. aut tussilag. an. q. β. misce, fiat potio quam sumat, mane aut sero nullo præcedente aut sequente cibo per tres horas.

Conditum in affectibus thoracis & pulmonum calidis, refrigerans, leniens & nonnihil corroborans.

℞. Conf. flor. viol. & flor. Borrage. & Capill. ven. an. ℥. β. pul. diatragacanti frigid. ℥. j. pul. diamargarit. frig. refrigerando roborat, ℥. ii. sacchari Candi, ℥. ii. Misce, fiat conditum auro coopertum de quo capiat per se, vel dissoluendo in iusculis, vel cum aqua bullita tempore fitis extra suos partus.

Conditum in affectibus pulmonum & thoracis frigidis calfaciens, abstergens & spurti educationem promouens, nonnihil corroborans.

℞. Conser. flor. rorismarin. Bugloss. & Capill. ven. an. ℥. β. rad. enulæ camp. conditæ cum saccharo, ℥. iii. pulueris diaireos simplicis, ℥. j. sacchari Candi, ℥. ii. Misce, fiat conditum auro coopertum de quo capiat per se vel dissoluendo in iusculis vel cum aqua bullita extra suos partus longè à cibo.

In hisce autem affectibus pulmonum & thoracis post vniuersales purgationes non
nun-

nunquam licet quando alius nimis est dura, Clysteribus emollientibus & lenientibus per interualla eam irritare & mouere, & subinde aliquot medicamentis per os assumptis clementioribus euacuare semel in hebdomade vel ter in mense. Cauendum est à vehementibus purgantibus, nam alui fluxus in thoracis malis periculosus existit. In affectibus igitur thoracis & pulmonum calidis ad bilem detrahendam ex vsu erit bolum Cassiæ dare cum tantillo sacchari per horam ante cibum ad ℥. j. vel ℥. x. adde mannam esse accommodatissimam ad ℥. j. β. in iusculo pulli exhibere per horam ante cibum. Cæterum omnia fugienda sunt capotia siue vehementia siue mediocria sint siue imbecilliora, quia plus æquo desiccant & præsertim in illis ipsis qui vlcere pulmonum laborant, vt inde corpus in dies contabescat, marcescatue, cum omnia catapotia pro basi Aloen recipiant, & eadem vi desiccandi eximia sint prædita. Idcirco Gal. lib. 4. de sanitate tuenda aloës vsum senibus interdicit: sed tamen in affectibus frigidis, vt in asthma magna vsus esse poterunt.

℞. Mass. pillul. assaiar. ℥. j. β. Agaric. recenter troch. ac præpar. ℥. ij. quando in a.

state sumere conuenit ad temperandam caliditatem reliquorum & quandam bilis portionem subducendam, addes pulpa tamarindorum macerata in aqua violarum per tres horas ut leniendo valeat, ʒ. ʒ. Cum melle rosato colato formentur pill. vi. pro drachma, sumat tres, vel si magis aluum irritare sit necesse, pillulas quinque capiat post Cœnam leuem in introitu lecti vel post mediam noctem semel in hebdomade aut ter in mense cum probò regimine vitæ. Delingenda in affectibus thoracis & pulmonum assumuntur, medicamenta vel in forma Syruporum qui sensim in asperiam arteriam decidant, vel in forma elegmatis, quæ alioqui in crassa substantia parari non debent, ut plerumque fit, sed paulo liquidiore, ut commodius ad angustam asperæ arteriæ viam & pulmonum illabi possint.

Syrupi pro delinctu in affectibus calidis pulmonum refrigerantes leniendo & incrassando.

℞. Syrup. viol. Syrup. Cap. ven. leniendo præstant, an. ʒ. ii. Syrup. de ziziphis. Syrup. de papauer. ut in principio pleuritidis & in-

distillatione salsa & acri irruente in pulmones circa initia, quando vehementius affligit, ut inde de exesione & exulceratione pulmonum periculum imminet incrassando praestant tantummodo, ad ℥.ii. Misce, fiat del nctus de quo saepius sumat paulatim lambendo & delin-gendo.

Delinctus in affectibus thoracis & pulmonum frigidis, calefaciens, tenuans, dissecans, & pituitam per sputum euacuans.

℥. Syrup. de glycirr. tenuando multum valet non alioqui insignis caliditatis gradus exuperat, Syrup. cap. ven. temperata caliditate extenuat, an. ℥.ii. Quae vehementiori facultate pollent serapia miscenda erunt ad valenter dissecandum & extenuandum humorem crassum & lentum & sputo repurgandum Syrup. de hyssopo, vel de prassio, vel oxymel scilliticum ex duobus tantum, ad ℥.iii. Misce fiat delinctus, de quo sumat saepius lambendo longè à cibo.

Elegma, id est, looch Arabum in affectibus pulmonum frigidis calefaciens, tenuans, desiccans, & abstergens.

℞. pulu. diatragacanthi frigid. ℥. β. pul. diaireos simp. quia caliditate pollet minori modo adhibetur, sputi educationem iuuat, ideo praetermittendum non erit, ℥. ii aut iii. pulpæ pafular. bene pinguium & dulcium. ℥. vi. sem. Maluæ & Bombac. an. ℥. j. Syr. viol. & de ziziphis, si incrassare concilium sit initio fluxionum & principio pleuritidis, sin minus Syrup. Capil. ven. q. β. Misce, fiat Elegma satis liquidum de quo sumat cum baculo glycirrisæ læpius delingendo longè à cibo.

Elegma pro affectibus thoracis & pulmonum frigidis calefaciens, extenuans, & desiccans & sputi educationem promouens.

℞. pul. Electuar. diaireos simpl. & rad. Enulæ Camp. cum saccharo conditæ, an. ℥. β. si quaedam caliditas mixta esset & propter siccitatem nimiam exasperata essent via, nõ alienū foret puluerem diatragacanthi frig. addere ad ℥. iii. peni-

penidiar. recentium, ʒ. vj. seminis malux & Bombacis, citra vllum caliditatis excessum nunquam sunt pratermittenda, an ʒ. j. Syr. de glycirr. & Capp. ven. ad maiorem purgationem per sputum & cum Syr de hyssopo ad violentius desiccandum, quidam addunt farinam Orobi, imo audaces sunt, rad. Brionia & iarri commiscere. a ʒ. j ad ʒ. ii. sed vehementiora sunt & tusses irritant non postea sanabiles pungendo & mordendo membranam, asperam arteriam & pulmonum substantiam lenem. Misce, fiat Elegma satis liquidum, quo vtatur sæpius lingendo longè à cibo, cum baculo glycirrizæ.

Electuarium solidum in affectibus thoracis & pulmonum calidis refrigerans, incrassans & leniens.

℞. Electuar. diatrag. frig. recenter dispensati. ʒ. iii. quando pertimescis sanguinis sputum, vel etiam præsens adest, sine caphura parari iubeas, teneat sæpius in ore.

℞. Electuar. diaireos simpl. ʒ. iii. teneat in ore.

C A P V T XXXVIII.

IN malis pulmonum, quando ex vlcere & empiemate vniuersim contabescit
P

corpus, ea danda erunt medicamenta, quæ leniendo nutriant, tamen si id quibusdam absurdum videtur, & Auicennæ sententiam imitantur, medicamenta cum cibis miscenda non esse, quod veritati consonum est si intelligas ea medicamenta quæ multum nostram naturam immutant, & purgando præsertim valent. Sed in medicamentis clementioribus, quæ velut alimenti retinent naturam imprimis accommodata & salutaria esse poterunt tabidis & marasmo consumptis.

Magdaleon vel pasta regalis affectibus pulmonum calidis, leniens, humectans, refrigerans, & reficiens cum moderata frigiditate & temperata caliditate.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum lotarum cum aqua rosarum, eo scopo, quia sua astrictione inflammationem amygdalarum prohibet. ℥.iii. penidiarum recentium ℥.j. pulpæ passul. pinguium & dulcium, an. ℥.j. pul. glycirr. ℥.℞. pulu. diam. frig. ℥.ii. sacchari dissoluti, in aquis viol. q. ℞. & fiat in modum pastæ regalis vel magdaleonis, vt in marcio pane quo vtatur vt visum fuerit.

Pasta

Pasta regalis in affectibus thoracis & pulmonum frigidis moderatè calfaciens, leniens, abstergens, & sputi eductionem promouens.

℞. pinearum mundatarum, si pertimescas caliditatem, quando lenior subest mixta in illis affectibus lotarum cum aqua violarum & cap. ven. amygdalarum dulcium, eo modo præparatarum, an. ℥. ii. diaireos simpl. ℥. ℞. pulmon. vulpis præparati, ʒ. ii. penidiar. recent. ʒ. vj. sacchari candi dissoluti in aqua tussilaginis, & cap. ven. an. q. ℞. Misce, fiat in modum pastæ regalis, qua utatur ut libuerit, vel hoc modo præparata massa & veluti placenta quædam ex carne & pulpa passularum, quæ magni est vsus in tabidis & affectibus thoracis ad nutriendum, abstergendum & concoquendum hoc modo.

℞. pulpæ passularum, bene pinguium & dulcium extractæ, cum aqua Cap. ven. & percolatæ in seraceo, ℔. ℞. vel j. sacchari candi, ʒ. iiii. sacchari albiss. quart. j. dissolutorum ad formam & modum Cydoniaci, fiat placenta qua utatur omni hora ad libitum.

EXterius autem linimenta siue illitus & unguenta præscribere consueuerunt. Medici in affectibus pulmonum calidis & frigidis quæ leniendo semper valeant, astrictiōnis verò nullam qualitatem in se retineant, ne difficilem & densam reddant respirationem musculos contrahendo.

Illitus refrigerando leniens in affectibus thoracis calidis.

℥. Olei violacei, olei nymphaeæ, an. ℥. iii. Misce, illiniatur pectoris regio tepidè, raro actu frigidè in æstate, & quando illa pars insigni ardore exæstuat, vt in febribus ardentibus.

Illitus in affectibus thoracis & pulmonum frigidis, calefaciens, leniens & relaxans.

℥. Olei Amygdal. dulc. olei de lilio, olei Chamæmel. vel Irini, an. ℥. ii. Misce, fiat unctio in regione pectoris calidè vel tepidè, sero & mane longè à cibo.

CA-

Vnguentum in affectibus thoracis & pulmonum calidis, vt in febribus ardentibus, refrigerando leniens & humectans ex ariditate contractos musculos.

℞. Olei viol. Nymph. an. ℥. ii. Muccaginis, seminis psillii extractæ cū aqua violarum, ℥. j. ℞. Mucaginis seminis althææ ℥. ℞. Ceræ albæ q. ℞. Misce, fiat vnguentum, quo inungatur regio pectoris tepidè, in æstate tantum frigidè in summo ardore.

Vnguentum in affectibus thoracis & pulmonum frigidis, calfaciens, relaxans & discutiens.

℞. Olei Amygd. dulc. olei Chamæmel. & de lilio, an. ℥. ii. Butiri recentis vel diligenter loti in aqua viol. ℥. j. Muccaginis seminis lini & althææ, an. ℥. vj. Axungia gallinæ recentis, ℥. ℞. Croci, ℞. j. vel ℥. j. si magis calfacere & coquere volueris, Ceræ citrinæ, q. ℞. Misce, fiat vnguentum, quo inungatur regio pectoris tepidè vel calidè, sero & mane longè à cibo.

Cæterum in pleuritide si tibi adhuc suspecta est vtrum vera sit, vel illegitima à flatibus excitata quando statim ægro succurrèdum fuerit, remedium promptum non tam ad sanationem quam explorandum opportunum, ab Hippocrate de ratione victus in acutis probatum atque commendatum, citra enim morsum siccatur & absorbitur flatus, & per exiguam aquæ pituitæ materiam influxam, quæ lateris dolores mouet; interim tamen si vera sit pleuritis ex sanguine bilioso plerumque suborta, non tantum discutere valet quantum vberiore sanguinis materiam loco dolenti impellere, ob id doloris tormento pungente ad veræ pleuritidis dignotionem explorandam non mediocriter confert hoc modo.

℞. Milii torrefacti, *èd magis siccatur* partes duas, salis præparati partem vnam, *quod alioqui non adiecit Hippoc. sed posteriorem medicorum est, siccando multum absorbitur.* Misceantur simul & includantur calide in sacculis expanso lineo raro confectis, qui non refrigerati, sed calentes lateri dolenti admoueantur; peracta venæ sectione hoc modo, fiat forus.

℞. florum Chamæmeli & Meliloti, *ad tensionem relaxandam nonnunquam addere poteris*

poteris althea cum radicibus, & branca vrsina quidam permiscuerunt, an. p.j. feminum lini & fœnugræci, an. ʒ.ʒ. Misce, fiat decoctio qua foueatur latus dolens cum filtro calide, mane & sero longè à cibo, deinde vagatur oleis sequentibus.

ʒ. Olei Chamæmel. de lilio & amygdal. dulc. an. ʒ. ij. Misce, fiat vt dictum est, vel sic.

ʒ. Vnguenti resumptiui, ʒ. ii. olei Amygdal. dulc. ʒ. ii. Misce, inungatur latus dolens & regio pectoris tepidè vel calidè, mane & sero longè à cibo.

C A P V T X L I I.

De Corde.

Cordis mala varia sunt, & plurima, sed hæc præcipua, vt febris, quæ quamuis totius corporis morbus esse dicatur, inprimis sedem in corde occupat, Nam febris esse non potest nisi cor incalescat; ex quorum genere itidem morbi censentur cordis tremor, palpitatio, mæror, mæstitia, & quæ eiusdem sunt propria pathemata, exolutiones, animi deliquia, syncope, in quibus sanandis adhibenda sunt remedia propria & determinata cordi, quorum series fuit à nobis tradita in Apozemate pro affectibus cordis, in summa omnia medicamenta

quæ exolutiones tollunt. Spirituum symmetriam in quantitate & qualitate seruant, & humores prauos sensim educunt in usu medicamentorum *καρδιακόν* veniunt; vitanda autem omnia, quæ vehementer purgant, quæ sunt de genere eorum, quæ veneni pernicie nos enecant, venenum enim vitæ insidiatur, & cum facultas vitalis in corde insideat, venena, & quæ veneni seminarium in se continent, vel toto genere, vel qualitate excedente cordi aduersissima esse solent. Itaque præscribenda erunt medicamenta corroborantia in affectibus tum calidis, tum frigidis, quæ non modo peculiari dote cordi auxilium adferant, sed etiam aduersa qualitate morbo plane obsistant. Inter autem purgantia nulla hoc loco mihi ascribenda erunt vsualia, nisi quæ antea in affectibus aliarum partium & calidis & frigidis ad humores noxios clementer euacuandos idonea visa sunt.

Potio in affectibus cordis calidis, vt in febris malignis, pestilentibus, alieno calore diuexantibus refrigerans, putredinem & pestilentem labem, coercens.

℞. Syrup. de limonibus, de acerositate
Citri

Citri, vel Syrup. de succo acetosæ, an. ʒ. j. pul.
diamarg. frig. ʒ. j. aquæ acetosæ & violar. an.
q. ʒ. Misce, fiat potio quam sumat mane aut
sero, nullo præcedente vel sequente cibo aut
potu per tres horas.

*Potio in affectibus cordis frigidis, magnis exo-
lutionibus, vt ab immoderatis euacuatio-
nibus dum calor naturalis ad extinctio-
nem properat, calfaciens, roborans &
spirituum substantiam instaurans, &
malignos vapores nonnihil expurgans.*

℞. Syrup. de pomis bene olentibus Syr.
de Buglossò, an. ʒ. j. Confect. Alkerm. modo
bene sit preparata nec de alui fluxu sit metuen-
dum, aut qui iam præsens adsit, alioqui confe-
ctionis de hyacintho illius loco ponenda esset, ʒ. j.
Et quando veneni seminarium vel ex interna
vel externa causa intus delitescit frigiditatis
pathemata inducens, addes pulueris Bezoardi-
ci, ʒ. j. aquarum scabiolæ, vt in carbunculo
præsertim esset accommodata. Et Melissæ, &
Borrag. an. q. ʒ. Misce, fiat potio quam sumat
mane aut sero, nullo præcedente aut sequen-
te cibo vel potu per tres horas.

*Conditum in affectibus cordis vii febribus
 aestuantibus, refrigerans &
 corroborans.*

℞. Conf. ros. conf. flor. Cichorii & viol. vel
 Nymph. in maligna putredine & pestilente,
 conf. acetosę, an. ʒ. ʒ. pulu. diamarg. frig. tria-
 fantali, an. ʒ. ii. pulpæ granorum Beberis, ad
 gratiam saporis conciliandam, refrigerandam
 & arcendam putredinem, ʒ. ij. sacchari, q. ʒ.
 Misce, fiat conditum auro coopertum, de
 quo capiat per se cum cochleari, vel dissol-
 uendo in iusculis, vel cum aqua bullita tem-
 pore sitis extra suos partus.

*Conditum pro affectibus frigidis, calfaciens,
 abstergens, mediocriter aperiens obstructio-
 nes, interdum nonnihil astringens si vsus
 exoptulet.*

℞. Conf. cap. ven. conf. flor. & rad. Buglos.
 Cortic. citri cum saccharo conditi, quando
 ventriculus male habet ex frigiditate, & cor illi
 consentit, vel alui fluxus superuenit, an. ʒ. ʒ.
 pul. diarrhod. abb. ʒ. j. pulu. Electuar. de gem-
 mis ʒ. ii. sacchari, q. ʒ. Misce, fiat conditum
 auro coopertum, de quo capiat per se cum
 cochleari, vel dissoluendo in iusculis, vel
 cum aqua cocta tempore sitis extra suos pa-
 rtus.

Ele-

Electuarium molle pro affectibus cordis calidis, refrigerans, omnem venenatam qualitatem propulsans, corroborans.

℞ Conf. ros. acetos. & viol. an. ℥. j. pul. diamarg. frig. & triasantali, an. ℥. j. raturæ Eboris ꝑ. ij. cum Syrupo de acetositate citri, & de succo acetosæ. an. q. s. Misce, fiat in modum opiatæ, de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis, de mane tribus horis ante cibum, alternis diebus superbibendo parum de aquis sequentibus.

℞. Aquar. acetosæ. Nymph. & viol. an. ℥. ij. aquæ Borræg. ℥. j. aromatizentur, cum ℥. j. pulueris santali citrini. Misce, fiat vt dictum est.

Electuarium molle in affectibus cordis frigidis, vt in melancholia, tremore & palpitatione cordis, & immodica aliqua evacuatione, quæ ceu quandam caloris extinctionem, efficit, calfaciens, spirituum substantiam augens & roborans.

Opiata.

℞. Conseru. flor. & rad. Bugloss. & conf.

flor. roris mar. & Capil. ven. an. ʒ. ʒ. ʒ. Confect.
 Alkerm. *si pertimescas alui fluxum loco illius*
confect. de hyacintho, ʒ. ii. pulu. diamb. ʒ. j. ʒ.
 fyrupi Myrabol. conditor. & de pomis bene
 olentibus, vel conseruationis Corticis citri,
 an. q. ʒ. Misce, fiat in modum opiatae, de qua
 capiat ad quantitatem nucis comestibilis,
 mane tribus horis ante cibum alternis die-
 bus superbibendo parum de aquis sequen-
 tibus.

℞. Aquarum Borrage. & flor. Mali aurei,
 Melissæ, an. ʒ. ii. Aquæ Capill. ven. ʒ. j. Aro-
 matizetur cum pulu. Cinnam. electi, ʒ. ii.
 aut ʒ. j. Misce, fiat, vt dictum est.

C A P V T X L I I I.

Electuaria autem mollia quæ antidoti
 vicem explent ad omnem veneni perni-
 ciam fugiendam nullum accommodatius
 ex iisce inuenias (præter quam theriacæ, aut
 mithridatis) antidotum omnibus exitiali-
 bus venenis præfens remedium à ʒ. j. vel ʒ.
 iiii. exhibitum, vel cum vino in frigidis ve-
 nenis, in calidis cum aqua Borrageinis
 & acetosæ, mane aut sero qua-
 tuor horis ante
 cibum.

Electua-

Electuarium molle in pestilenti lue & aëre contagio affecto propulsando non modo alexiterium esse potest, sed & frigiditate temperata caliditatem remittit & caliditate temperata frigiditatem cohibens.

℞. Rad. torment. in puluer. redactæ, ʒ. ʒ. pulu. rad. Enulæ Camp. ʒ. ii. terræ sigillatæ, electæ & boli armænæ lotæ cum aqua rosar. an. ʒ. j. ʒ. coralli rubri loti cum aqua rosar. & Nymphææ, ʒ. j. pulueris Zedoariæ *omnem aërem pestilentem expellit.* ʒ. ʒ. Conf. flor. Cichorii & acetosæ, an. ʒ. j. Syrup. de acetositate citri vel de limonibus, q. ʒ. Misce, fiat in modum opiatæ, de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis superbibendo parum vini diluti, cum aqua Borruginis & acetosæ, mane tribus aut quatuor horis ante cibum.

CAPVT XLIV.

IN exolutis & quibus vires sunt conuulsæ, non modo ex morbi diurnitate, sed ex vehementia & *conuulsione* quando aliis præfidiis vtendis locus non exhibetur ad instaurandas vires & velut ex orco reuocan-

dam auram vitalem instaurantes liquores qui stillatio opere perficiuntur parandi erunt, in affectibus tum calidis, tum frigidis, tenuitate siquidem essentia pollent, vt etiam minimo modo exhibiti promptè quaqua- uersum in omnes corporis partes permeare valeant, atque spirituum substantiam reficiunt, atque recreant.

Instaurans liquor in affectibus calidis, vt in febris ardentibus & malignis, in summa virium exolutione, moderatè refrigerans, spirituum substantiam augens cardiaca facultate.

℞ Conf. ros. conf. flor. Cickorii Nymphae & acetosæ, an. ʒ ij. conf. flor. & rad. Bugloss. nunquam pratermittenda propter Cardiacam facultatem temperatam, an. ʒ j. ʒ. Confect. Alkerm. Etsi calliditate polleat pratermittenda non erit ad spiritus dissolutos reficiendos, quia mortuorum est vita, id est, in iis quibus mors est in propinquo, auram vitalem promptè excitat, in hisce tamen affectib. calidis minor modus adhibendus erit quam in frigidis, ʒ.iiii. pulu. trias. intali, pulu. diarrhod. abb. an. ʒ. ii. pulu. diamargar. frig. ʒ. j. ʒ. aquar. acetosæ, viol. nym-

nymphææ, Borrage.an. ʒ.iii.iufculi capi recentis, & non antiqui & fine pinguedine, q. ʒ. Misce, fiat sublimatio secundum artem in diplomate, id est, Balneo Mariæ, de qua ponantur parua tria cochlearia singulis vicibus quando propinabunt iufcula consueta, vel per se interdum exhibeatur cochlear vnum.

Instaurans liquor in affectibus frigidis in summa exolutione, ex aliqua immoderata euacuatione, recalsaciens, & spirituum substantiam augens.

ʒ. Conseru. flor. rorismar. conf. flor. & rad. Buglossi, cortic. citri cum saccharo conditi, an. ʒ.ij. Confect. Alkerm. & ex hyacintho, an. ʒ. j ʒ. pulu. diambrae, ʒ. j. pulu. diarthod. abb. diamargar. frigid. an. ʒ. j. *vsq. temperet reliqua calidiora*, aquæ Borrage. cap. ven. & flor. mali aurei, an. ʒ.iii. aquæ Melissæ, ʒ.ij. iufculi capi mediæ ætatis, vel antiqui sine pinguedine, q. ʒ. fiat sublimatio secundum artem in diplomate sumat, vt antea dictum est.

*Electuarium solidum in affectibus cordis
calidis refrigerans, &
roborans.*

℞. pulu. diamargar. frigid. pulu electuar.
Triafantali, diarrhod. abb. an. ʒ. j. *addi possunt
conserua ex quorundam prescriptis, sed minus
commode miscentur. Si igitur ex illorum imi-
tatione medicina faciendæ rationem sequi vo-
lueris, addes cum eis pulueribus conserua. rosa-
rum, conserua. acetosæ, an. ʒ. iii. Si lenire vo-
lueris, conser. viol. ad abstergendum & refrige-
randum, flor. Cichorii singul. tantundem,
sacchari dissoluti in aquis acetosæ & Borra-
ginis, an. q. ʒ. Misce, fiat Electuarium in ta-
bulis ponderantibus, ʒ. iii. Capiat tabellam j.
Mane tribus aut quatuor horis ante cibum
alternis diebus, superbibendo parum aquar.
viol. & Cichorii.*

*Electuarium in affectibus cordis fri-
gidis calfaciens & cor-
roborans.*

℞. pulu. diambraz & diamoschi dulc. an. ʒ.
j. ʒ. i. Aromatici tol. non modo ventriculo,
sed etiam cordi auxilium adfert, aromate
spirituum

Spirituum substantiam augens, sacchari dissoluti in aquis melissæ & Borriginis, an. q. ß. Misce, fiat Electuarium in tabulis ponderantibus, ʒ. iii. sumat tabellam vnam manetribus aut quatuor horis ante cibum alternis diebus superbibendo parum vini diluti cum aqua Borriginis.

CAPVT XLVI.

EXterius autem admoueantur in sterno circa regionem & situm cordis in affectibus tum calidis, tum siccis, in sacculorum forma & epithematum irrigatione, quæ quidem omnia medicamenta ex toto astringentia esse non debent, ne pectus & pulmones coarctent, vt respiratio inde oblædatur.

Sacculus in affectibus calidis cordis refrigerans, spirituum substantiam augens.

℞. Ros. rub. flor. viol. & Nymphææ, an. ʒ. f. santal. omnium. ʒ. ii. coralli rubri, ʒ. j. ß. redigantur in pul. in syndone rubro, fiat sacculus interpunctus ad formam pyramidis, qui supra cordis regionem imponatur irroratus cum aqua flor. viol. & ros.

*Sacculus in affectibus cordis frigidis, cal-
faciens & substantiam spirituum
augens & re-
creans.*

℞. flor. roismarin. & Borrage an. ℥. j. doronici & calami aromatici, an. ℥. ℞. rad. Been vtriusque, an. ℥. ii. pulu. granor. Alkerm. ℥. j. croci, ℥. j. Misce, fiat puluis irroratus cum aqua flor. mali aurei, Borrage. & Melissæ, cum syndone rubro: fiat sacculus interpunctus ad formam pyramidis qui imponatur circa cordis situm.

*Epithema pro affectibus cordis refrigerans,
omnem malam putredinem, coer-
cens, alienum calorem
mitigans.*

℞. Aqu. viol. ros. acetosæ, an. ℔. ℞. aquæ nymph. & Borrage an. ℥. ii. pulu. ros. rubr. ℥. iii. pulu. diamarg. frig. ℥. j. aceti vini albi, ℥. j. Croci ℥. i. *ut sit vehiculum & ad conseruandam naturalem partis temperiem.* Misceantur simul & cum panno cremesino intingatur pro Epithemate, mane

&

& sero longè à cibo imponatur supra cordis regionem.

Epithema pro affectibus cordis frigidis, vt in maligna exolutione recalsaciens & spirituum substantiam augens & corroborans.

℞. Aquæ flor. mali aurei, Borræg. & Melliss. an. ʒ. iiii. confect. Alkerm. & diambrae, an. ʒ. ii. pul. de gemmis, ʒ. i. vini maluatici, ʒ. i. & penetrat & spirituum substantiam restaurat, Croci ʒ. ʒ. Misceantur simul & fiat Epithema pro cordis regione de quo pannus creme-ficius vocatus scarlata intingat, qui regioni cordis admoueat, mane & sero.

CAPVT XLVII.

De Cancro.

Cancer non modo palpebris oculorum, labiis oris, pudendis, sed etiam mammis plerumque contingere solet, quæ vnguento multum resiccante sanari vel saltem interdum mitescere potest, ex multorum desiccantibus & quibusdam metallicis bene preparatis.

Q 2

*Vnguentum in carcinomate multum resic-
cans in mammis.*

℞. Succu solani, plantag. depuratorum,
an. ℥.iii. pulu. herniariæ herbæ, ℥.β. pulu. her-
bæ roberti, ℥.ij. tuthiæ, antimonii, Lythargi-
rii vtriusque, plumbi vsti in puluerem reda-
ctorum & cum aqua solani dissolutorum, an.
℥.iii. cerusæ, ℥.vi. ceræ q.β. addendo olei ros.
Omphacini, ℥.v. agitentur in mortario
plumbeo & pistillo plumbeo in
modum vnguenti, quo
inungantur mam-
mæ.

LIBRI SECYNDI FINIS.



LIBER



LIBER TERTIVS.

CAPVT I.

De ventriculo.

IN ventriculo sanando post vniuersales purgationes nonnunquam vomitum, vt in principio aut purgationem mouere expedit: Diorismos autem & certas leges vomendi seorsim tradere constituimus, vt de venæ sectione. Iam verò mouisse sat erit vomitum nonnunquam necessarium esse post purgationes modo affectus exoptulet, vel à pituita, vel à bile in ostiolo ventriculi supernatâre, vomere consuetis, quibus pectus angustum non est, nec pulmones male habent, & sanguinis sputum non adest, nec instare videtur, quos dolor capitis & vertigo non affligit, simul

Q 3

ac quibus oculi non laborant ad præcauendum & valetudinem bene tuendam, ex Hippocratis consilio in mense semel duobus diebus continuis vomitum citare non parum confert & ad renellendum vel paulatim euacuandum, vt in nephritide & quibus calculi in viis vrinæ geniti sunt, ad crapulam detrahendam vomitus plerumque salutaris esse solet, simul ac in vteri inflammationibus imperare vtile magnopere est. Primò, exhibitis lenioribus, postea mediocribus, vehementioribus raro nisi necessitas vrgeat vomitum cientibus vtendum erit, quæ reuera non mediocriter ventriculum infirmant, quorum seriem enumerare hic non decernimus, sed in alium distulimus locum. Ceterum memoria semper est tenendum omnia medicamenta in ventriculo corroborando astrictione pollere debere, quia præterquam quod roborant simul ac coctionem iuuant: vt verò facultas retentrix probe suo fungatur munere omnino auxiliantur, tum calida, tum frigida; ob id purgantia, præsertim quæ vehementiora sunt vti acria, incidentia, plus æquo tenuantia, valde infesta ventriculo esse consueuerunt. Interim tamen clementiora medicamenta purgantia, quæ simul cum astrictione robur confirmant &

aro-

& aromate concoctionem iuuant in vsum erunt per temporis interualla adhibenda, plurima autem alia præsidia in varia forma & assumpta & admota in affectibus tum calidis, tum frigidis vsurpanda erunt.

C A P V T I I.

Catapotia in affectibus ventriculi calidis qua sensim repurgant, & clementer cum astringitione bilem, & quadam serosa educunt recrementa.

℞. Mass. pill. de hiera simpl. ʒ. ii. rhabarb. opt. remolliti in aqua Endiuixæ & portul. ʒ. i. pulp. tamarindor. ʒ. ii. cum Syrup. ros. solutiuo, formentur pillulæ vi. pro drachma, sumat tres per horam ante cibum vel mane desuper dormiendo per horam aut alteram semel in hebdomade, reliquum seruet in vsum.

Catapotia pro affectibus ventriculi frigidis pituitosa ducentia & corroborantia.

℞. Mass. pill. elephanginar. ʒ. ii. si paulo magis malis ducere pituitam agarici trochiscati

3.j. Mastiches, ℞. j. quando verò per horam vnam, ante cibum assumi non debent, loco agarici adijcies, harbarbari optimi, ℞. ii. Spicæ nardi. ℞. j. & tunc formentur pillulæ, cum aqua absynthii, sex pro drachma, sumat per horam ante cibum: Si autem cum Agarico præscripto bene mane desuper dormiendo per duas horas semel in hebdomade, cum bono vitæ regimine, reliquum seruet in vsum.

CAPVT III.

*Potio in affectibus ventriculi calidis, refrigerans, corroborans, vt in ~~καρποδύμω~~
id est, morsu oris ventriculi.*

℞. Syr. de rosis ficcis, de Berberis, vel de succo acetosæ, horum duorum, an. ʒ. i. pulu. diamarg. frig. ʒ. j. rasuræ Eboris, ℞. j. aquarum portul. & acetosæ, an. q. β. Misce, fiat potio quam sumat mane & sero nullo præcedente aut sequente cibo aut potu per tres horas.



Potio

Potio in affectibus ventriculi frigidis, calfaciens, concoctionem iuuans & roborans.

℞. Syrupi conseruationis corticis citri, Syr. de absinthio, vel de Menta, vel de Buglossio, ex duobus. an. ℥. i. pulueris aromatici rosati ℥. j. aut ℥. iiii. aquarum mentæ & Borrag. an. q. β. Misce, fiat potio quam sumat mane vel sero ante pastum, post tres horas.

C A P V T IV.

Electuarium molle in affectibus ventriculi calidis refrigerans & corroborans.

℞. Conf. rosar. antiquæ, Conser. flor. Cichorii, an. ℥. j. Myrabolan. Emblicarum condit. num. j. puluer. rosatę nouellę & diamargaritonis frigid. an. ℥. iiii. cum Syrupo de Buglossio. q. β. Misce, fiat in modum Opiatę, de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis, mane tribus horis ante cibum, alternis diebus superbibendo parum aquę Borriginis & portulacę.

*Electuarium molle in affectibus ventriculi
frigidis calfaciens & robo-
rans.*

℥. Confect. Aromatici rosati in modum opiatae ex descriptione Gabrielis, ℥. ii. *si in plures dies continuare necesse fuerit, ad ℥. iii. sumat ad quantitatem nucis comestibilis, mane tribus horis ante cibum superbibendo parum vini rubri diluti, cum aqua Borriginis alternis diebus.*

℥. Conseruae radicum & florum Buglossi, Corticis citri saccharo conditi, an. ℥. j. confectiois de Cinnamomo, ℥. β. pulueris aromatici rosati, ℥. ii. cum Syrup. conser. corticis citri, q. β. Misce, fiat in modum opiatae, de quo sumat ad quantitatem nucis auellanae superbibendo parum vini cum aqua Borrage. & portulacae, *interdum verò ut magis calfacias si opus sit & flatus discutias, ut in his qui propter summam frigiditatem ventriculi, colico dolore vehementer consistantur,*

addere poteris diagalangae &
diacimini

an. ℥. j.

Electua-

*Electuarium solidum in affectibus ventriculi
calidis refrigerans & robo-
rans.*

℞. Electuar. diamarg. frig. vel triasantali
vnum ex his ad ℥. ii. aut tres sumat tabellam
j. mane tribus horis ante cibum per se vel bi-
bendo parum aquæ Cichorii & portulacæ
alternis diebus, vel sic.

℞. pul. rosatæ nouellæ, pul. diamarg. frig.
& triasantali, an. ℥. j. β. rasuræ Eboris, ℥. j. sac-
chari dissoluti in aquis Cichorii & portula-
cæ & ad saporis gratiam simul & ad sanatio-
nem aquæ ros. an. q. β. Misce, fiat electuarium
in tabulis ponderis, ℥. iii. sumat mane tribus
horis ante cibum tabellam vnam, alternis
diebus eodem modo, vt dictum est.

*Electuarium solidum in ventriculi frigidis
affectibus calfaciens & corrollo-
rans.*

℞. Electuarium Aromatici rosati, & quan-
do non multum calfacere consilium est in in-
temperie mixta & coniugata calida & frigi-
da, Electuarium diarrhod. abb. Ex hisce
ad ℥. ij. aut tres, sumat tabellam vnam,

mane tribus horis ante cibum per se vel superbibendo parum aquæ absynthii & Borrag. vel sic:

℞. puluer. Aromatici rosati & diarrhod. abb. an. ʒ. j. β. *Interdum ad magis calfaciendum quamuis Cephalicum, stomacho tamen opportunum, calore aromatico iuuans concoctionem & humiditatem largiorem exsiccans,* pulu. diamoschi dulcis ʒ. j. pul. diagalangæ, ʒ. ii. sacchari dissoluti in aquis absynthii & Borrag. an q. β. Misce, fiat electuarium in tessellis ponderantibus, ʒ. iii. sumat tessellam j. Eodem modo, vt antea dictum est.

C A P V T V.

Puluis in affectibus ventriculi calidis, refrigerans, corroborans, & concoctionem iuuans.

℞. Coriandri præparati, ʒ. β. *plus enim refrigerando astringit, quàm caloris seminaria retineat, sem. anisi, tamen si calore præstat & officere videatur, in affectibus ventriculi calidis, ne plus æquo refrigeres minimo modo aromatica miscèda erunt vt cõcoctionem iuuent, nam concoctio calore perficitur, moderato tamen & temperato,* ʒ. ii. pul. diacitoniten sine speciebus, ʒ. vi. coralli rubri, & loti cum aqua ros. ʒ. i. β.

j. β. rasuræ Eboris, ℥. iiii. sacchari ros. ad pondus omnium, misce & fiat puluis secundum artem de quo sumat Cochlear. j. post suos pastus nihil superbibendo. Cæterum si quibusdam displicet puluis iisdem medicamentorum viribus mixturam conficere poteris hoc modo.

℥. Conf. ros. antiquæ, carniū citroniorum conditorum, cum saccharo, an. ℥. j. Myrabol. emblicor. *vi medicamentorum saporem tollas*, cum aqua ros. lotorum nu. j. membranarum internarum ventriculi gallinæ, ℥. j. sacchari rosati. q. β. Misce, fiat mixtura cum aliquot foliis auri interiectis & minutim concisis, de qua sumat Cochlear. j. post suos pastus nihil superbibendo & comedendo postea.

Puluis pro affectibus ventriculi frigidis, calefaciens, concoquens, flatus discutiens & roborans.

℥. Semin. anisi & fœnic. an. ℥. iii. Coriandri præparati, ℥. ii. pul. diacitoniten, vel cum speciebus si ita paratus sit, vel etiam sine speciebus, ℥. β. Macis ℥. ii. Cortic. citri sicci & bene contriti, ℥. j. β. Mastiches, ℥. j. sacchari ad pondus omnium.

misce, fiat puluis de quo capiat cochlear
vnum post suos pastus nihil bibendo sicut
comedendo postea, *vel si ingratus sit puluis*
fiat mixtura sequens pro iis sanationis scopis.

℞. Cortic. citri saccharo conditi, ℥. ii. car-
nium Cytoniorum conditarum cum saccha-
ro, *tametsi non calfaciant a strictione iuuant &*
saporis gratiam conciliant, ℥. j. Myrabol. Embl-
icarum lotarum cum vino, numero j. macis ℥.
j. sacchari, q. β. interiectis foliis auri & minu-
tim concisis, fiat mixtura, de qua sumat, vt
dictum est, pro diuitibus excellens & gratum
medicamentum ac sanationi accommoda-
tissimum.

CAPVT VI.

EXterius autem admoventur medicamen-
ta ventriculo accommodata, in variis for-
mis præscripta, tum calidis, tum frigidis affe-
ctibus, neque prius adhibenda erunt, nisi v-
niuerſim & per partes subductus fuerit hu-
mor purgatione vel vomitu.

Fotus in affectibus ventriculi calidis ad refri-
gerandum simul & corroborandum, &
quadamtenus dolorem sedan-
dum.

℞. fol. plantag. m. j. ros. rub. p. j. β. *ad sedan-*
dum

dum dolorem, ut etiam quadam astringitione roborare valeat cuius expertus non est, addes flor. Chamæmeli, p. j. Balauſtior. ꝑ. j. fol. & Baccar. Myrthi, an. ꝑ. i. Summitatum lentiscedi ꝑ. j. fiat decoctio in ſufficienti quantitate aquæ, ex qua foueatur regio ventriculi calidè ut penetret, deinde inungatur oleis ſequentibus.

℞. Olei de abſynthio, olei nardini, maſtichini, an. ꝑ. ii. ad dolorem ſedandum & tenſionem tollendam, olei Chamæmelini & Anathini, an. ꝑ. i. Miſce, fiat ut dictum eſt.

C A P V T V I I.

Vnguentum pro affectibus calidis refrigerans & corroborans.

℞. Olei Cydoniorum, olei myrtillor. olei lentiscedini, quod non magno opere calefacit, ſed astringendo plurimum valet, multum ſi quidem refrigerare non oportet, ſed calida quadam ſunt permiscenda, ut concoctio inueniatur, an. ꝑ. ii. Accæ, hypociftidos ro. arum rubiarum, an. ꝑ. i. ſantalorum omnium, coralli rubri, an. ꝑ. ij. Baccar. myrtillorum, ꝑ. j. cum

pauca cera candida, fiat vnguentum. Quo inungatur regio ventriculi sero & mane longè à cibo.

℞. Olei de absynthio, Mastichini. Nardini, an. ʒ. ii. gariophyllorum, macis, Cardamomi, galangæ crassæ, an. ʒ. ii. Calami aromatici, ligni aloes, an. ʒ. j. f. Coralli rubri, *tametsi sit frigidum qualitate euidenti, præcipua ramedote ex sententia Mesuæ affectibus ventriculi accommodatissimum, ideo calidis & frigidis tuto usurpari potest,* ʒ. j. cum pauca cera fiat vnguentum, quo inungatur ventriculi regio tepidè vel calidè sero & mane longè à cibo. Porro silentio prætermittendum non est, quando in ore ventriculi affectus consistit præsertim ex calida intemperie & carditogmo siue forus, siue illitus, siue vnguenta circa dorsi situm ad quem inclinat stomachus, eiusmodi erunt ad mouenda præsidia.

CAPVT VIII.

Emplastrum in affectibus ventriculi calidis, refrigerans & roborans.

℞. Succu Cytonior. ʒ. ii. succi plantag. & portul. an. ʒ. j. pul. santalorum & coralli rub. an. ʒ. ii. Coriandi præpar. ʒ. j. f. Bac-

Baccar. Myrti acaciæ & hypocistidos, an. ʒ. j.
 Cera albæ q. ʒ. olei of. Omphacini, ʒ. iiii. in-
 corporentur omnia simul & reducantur ad
 formam massæ Emplastri, de qua super a-
 lutam formetur Emplastrum in forma scuti
 quod regioni ventriculi, & interdum sto-
 macho si male habeat circa dorsum admo-
 ueatur, quando verò cibus concoctus esse
 videbitur ad tres horas saltem aut quatuor,
 vt chylus ex piloro in venas meseraicas il-
 labi non prohibeatur, auferatur per horam
 aut alteram, postea denuo super impo-
 natur.

*Emplastrum in affectibus ventriculi frigidis,
 calfaciens, concoctionem iuuans
 & corroborans.*

℞. Massæ Emplastri mastiches & stoma-
 chici, an. ʒ. ij. Cardamomi, galangæ crassæ
 & gariophyllorum in puluerem redacto-
 rum, an. ʒ. ii. cera, q. ʒ. Misce, cum oleo nar-
 dino manibus inunctis, fiat massa emplastri,
 ex qua super alutam formetur Emplastrum
 iultæ magnitudinis ad formam scuti, quod
 regioni ventriculi admoueat, fiat eo mo-
 do, vt antea dictum est.

R

Sacculus pro affectibus ventriculi calidis, refrigerans & corroborans.

℞. Ros. rubear. Baccar. & fol. Myrthi, an. ʒ. j. Coriand. præparati. ʒ. β. santalorum omnium & coralli rubri, an. ʒ. ij. redigantur in tenuissimum pulu. Ex quo cum pauco bombace & syndone rubra, fiat sacculus interpunctus ad formam scuti quem continuo circumferat.

Sacculus in affectibus ventriculi frigidis, calfaciens, concoctionem iuuans & corroborans.

℞. Absynthii sicci & mentæ, an. ʒ. j. β. gariophyllorum, Macis, schænantos, Cardamomi, an. ʒ. ii. spicæ nardi, coralli rubr. ʒ. ii. ad temperandum & ventriculum simul iuuandum insita & peculiari virtute, redigantur in tenuissimum pulu. & cum pauco Bombace in syndone rubra, fiat sacculus interpunctus ad formam scuti, quem continuo ferat.

CAPVT X.

De affectibus hepatis.

IN sanandis hepatis malis, quando sensum
 I purgando medicamenta in usum veniunt,
 ea deligenda erunt, quæ non effræni motu
 purgant, vt robur visceris non dissoluatur &
 incendium in humoribus paretur, quod
 promptum est fieri in hepate & venoso ge-
 nere, qualia sunt vehementer calida &
 sicca, vt diagridium, scammonium & consi-
 milia præsertim affectibus calidis. Præterea
 omni ratione prospiciendum est, vt ea ad-
 hibeantur, siue sumpta, siue admota, vt spica
 nardi & alia aromatica, quæ simul astring-
 endi vim habent ad naturalem partis tem-
 periem conseruandam, quia calidum calore
 aromatico in symmetria fouetur, calor na-
 turalis & spirituum substantia augetur: quo-
 niam viscus est toti corpori necessarium,
 ideo astringentibus simul corroborandum
 est atque confirmandum; addas licet ea
 plerumque præscribi medicamenta, in affe-
 ctibus hepatis quæ sanguinem expurgant
 & eluere valeant: nam cum sit sanguinis
 generandi instrumentum, & in eo & venis
 totius corporis sanguinis moles continea-
 tur in qua humorum impuritas & collu-
 uies sit, Idcirco quæ sanguinem emun-
 dant in hepatis malis vsurpanda veniunt.

R 2

Cæterum quando caua hepatis pars præcipue laborat, medicamenta quæ mediocriter aluum subducunt necessaria erunt, nam locus aptus est, vt è propinquo per aluum noxia excrementa expurgentur; si verò malum in gibba hepatis parte insideat, quæ vrinas ducunt, imprimis erunt præscribenda medicamenta, ob id magna ex parte in hepatis affectibus, quæ tenuitate essentia valent qualia sunt diuretica, & aperiendo obstructions tollunt, quibus plerunque infarcitur hepar, hepatis determinata esse consueuerunt.

CAPVT XI.

Electuaria mollia ad sensim repurgandum, præsertim in affectibus hepatis calidis quæ potius præscribenda erunt, quàm catapotia, quia calidiora & siciora, & ob id inflammationem hepatis promptè addunt, humorumque incendium parant, quare euitandum erit ne inflammatio suboriatur.

℞. Cathol. ℥. ij. diapr. ℥. j. ad adulta fe-
xola subducenda, dialenæ solut. ℥. ℞. ad a-

quas citrinas subducendas, id est, biliosas sanies,
 Elect. è succo rosar. ʒ.iii. Syrup. ros. sol. sine
 scamm. an. q. ʒ. Misce, fiat in modum Opiatæ,
 de qua sumat per se ad ʒ. ʒ. vel dissoluen-
 do in decocto Borræg. fum. & Cichorii, ma-
 ne quatuor horis ante cibum, cum probò
 vitæ regimine semel in hebdomade.

*Opiata in affectibus frigidis hepatis, crassos,
 & melancholicos humores sen-
 sim repurgans.*

ʒ. Cathol. ʒ. ii. diaphæn. ʒ. j. diacarth. *ve*
in hydropè ad aquas educendas, ʒ. ʒ. confect.
hamech. ad melancholiam euocandam, ʒ. iii.
cum syrup. ros. sol. vel ad tenuandum, vel ma-
gis aperriendum, Syrup. cap. ven. an. q. ʒ. Misce,
 in forma opiatæ, de qua sumat per se vel
 dissoluendo in decoctione ciccerum rub. vel
 mercurial. cum probò vitæ regimine qua-
 tuor horis ante cibum, semel in hebdoma-
 de. Porro nunquam prætermittas in diuitibus
 Rhacoma addere in affectibus tum calidis, tum
 frigidis, quæ est hepatis medicina & viscus
 roborat, hoc modo in affectibus hepatis
 calidis rhabarb. optim. emolliti in aqua
 End. ʒ. iii. vel ʒ. ʒ. ad ʒ. j. cum spica nardi
 ad ʒ. j.

De Serapiis magistralibus.

Serapii magistrales ideo dicti quod magistri arbitrio præscribi soleant, nec alioqui in officinis prompti paratique inveniuntur, illi ipsi magni usus esse possunt in affectibus hepatis calidis & frigidis, quando simul non modo repurgare sensim expedit per partes, sed etiam alterare & corroborare pro variis scopis necesse est. A decoctis seu Apozematis differre non videntur, nisi quod perfectius coquantur, ut conditura in plures menses reservari valeat, Adhæc dosis & quantitas in singulis medicamentis maior ad duplum esse poterit, quam in Apozematis præscribendis.

Syrupus Magistralis in affectibus hepatis calidis refrigerans & non nihil obstructions aperiens, roborans, sensim repurgans & biliosa & serosa.

℞. Glycirr. rasæ & parum contusæ, ℥. j. ꝑ. lapathi acuti cum rad. acerosæ cum radicibus, *sine caliditate eluunt & emundant sanguinem incendio quodammodo adustum vel aduri promptum*, Borræg. & Bugloss. cum propriis radic. Cichorij, Endiviæ tenellæ summitatum fumaris, rostri porcini, lenticulæ

culæ aquaticæ, an m. ij. herbar. Capill. m. j.
 quatuor sem. frig. maior. End. & portul. an. ʒ.
 ij. sem. anisi, ʒ. j. *ut possis accelerare vim quo-*
rundam medicamentorum purgantium tarde,
& sennam corrigere ne tormina pariat, hordei
 mundi, p. ii. prunorum dulcium, passularum
 mundatarum iuiubar. & sebesten, an. par. xv.
 polipodii querni recentis, fol. sennæ orien-
 talis mundatorum, an. ʒ. iii. tamarindor. ʒ. j.
 Myrabol Citrinar. oleo amygdal. dulcium
 confricatarum, ʒ. j. *ut in Elephantiacis propter*
adustionem ad melancholicâ repurganda, Epi-
 thymi ʒ. ʒ. trium flor. cord. p. ii. flor. Nym-
 pheæ, p. j. fiat serapium perfectè coctum, de
 colatura cape ʒ. j. in qua dissolue sacchar.
 q. ʒ. Clarificetur & aromatizetur, cum
 pulu. triasantali & diarrhod. abb. an. ʒ. j. ʒ.
 Inter clarificandum addes Rhabarbari o-
 ptimi in panno raro ligati & fortiter ex-
 pressi, ʒ. iii. aut ʒ. ʒ. spicæ nardi, ʒ. j. Sy-
 rup. ros. sol. ʒ. iii. Misce, reseruetur vsui,
 sumat per se ʒ. ii. aut iii. vel cum deco-
 ctione Cichorii Borrag. & fumar. quatuor
 horis ante cibum, semel in hebdo-
 made cum probò vitæ
 regimine.

Serapium magistrale in affectibus hepatis frigidis, vt in Cachexia, hydrope, calfaciens, aperiens obstructions, pituitosa & serosa subducens, ac simul corroborans.

℞. Quinquerad. communium temperatarum in vino albo, an. ℥.j. radie. Enulæ Camp. pentaph. asari, corticis radic. Cappar. præsertim si ex splenis vitio oriatur malum, & mediani fraxini, an. ℥. ℞. Eupatorii. agrimonie, herbar. Capil. Pimpinellæ, pilosellæ, summit. fumæ, Cichorii lupulor. Endæ. tenellæ scariolæ, Borrag. Bugloss. cum propriis radicibus, an. m. j. ℞. Camædrios, Camæpith. mercurialis, Brassicæ marinæ, an. m. j. nam siccat & aquas ducit, ideo hydropticis confert, sem. apii, petroselini & tæniculli, & anisi quatuor sem. frigid. mai. Endiuivæ & portul. an. ℥. j. ℞. Cicerum rubr. p. j. prunorum dulcium, passularum mundatarum, an. par. xv. medul. seminis Carthami leniter contusæ, polipodii quercini recentis, folliculorum fennæ orientalis mundatorum, an. ℥. ii. Myrabol. citrinar. & Chebul. oleo amygdal. dulc. confricatarum, an. ℥. j. agarici trochiscati in panno raro ligati, ℥. ℞. succi rad. ireos, ad aquas subducendas efficacissimum

sissimum medicamentum, ʒ. vj. Cassuta ʒ. j.
 flor. genistæ, sambuci Tamarisci, rosmari-
 ni, an. p. ij. triu. flor. Cord. an. p. j. fiat serā-
 pium perfectè coctum, de colat. cape ℥. j. in
 qua dissolue sacchari puriss. q. β. clarificetur
 & aromatizetur, cum pulu. Cinnamomi e-
 lecti & diarhod. abb. an. ʒ. j. pulu. diacucur-
 mæ, ʒ. ij. *inter clarificandum addere poteris,*
quia medicina est iecinoris, Rhab. opt. fide-
 liter expressi, ʒ. iiii. serapii ros. sol. ʒ. iiii. Misce,
 reseruetur vsui, de quo sumat. ʒ. iiii. per se vel
 dissoluendo cum aquis cicerum rubr. semel
 in hebdomade quatuor horis ante cibum,
 cum probo vitæ regimine.

CAPVT XIII.

*Electuarium molle, id est, Opiata in affectibus
 hepatis calidis refrigerans, nonnihil
 obstructions aperiens &
 corroborans.*

℥. flor. Cichorii, Conser. capill. ven. &
 flor. Bugloss. an. ʒ. j. pulu. triasantali, diar-
 rhod. abb. & rosatæ nouellæ, an. ʒ. j. trochis-
 cor. de Eupatorio, ʒ. ii. *vim medicamenti
 citius in hepatis vias transfert, & in eo assu-*

mendo recreatur à permixtione huius, addito Syrupo de Endiuia simplici, vel de End. compositi aut de fum. q. ß. Misce, fiat in modum Opiatæ, de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis, mane tribus horis ante cibum superbibendo parum aquarum Cichorii & absynthii & vini albi diluti, cum iis aquis alternis diebus.

Electuarium molle in affectibus hepatis frigidis, calfaciens, aperiens obstructions, corroborans.

℞. Conferu. flor. genistæ & radic. Apii, si non sit parata, parari iubeatur, nam efficacissima est ad obstructions tollendas in affectibus hepatis à causa frigida. Confer. flor. rorismar. an. ʒ. j. pulu. diar. hod. abb. ʒ. ii. pulu. diacucurm. maior. ʒ. j. Trochiscorum de Rhabbarbar. de Eupator. an. ʒ. ß. Syrup. de quinque radicibus, vel de Eupat. vel Capill. ven. ad temperandum, q. ß. Misce, fiat in modum opiatæ, de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis, mane tribus horis ante cibum superbibendo parum vini fului vel albi diluti cum aqua Eupatorii

paratorii & cardui benedicti alternis diebus.

Electuarium solidum, in tessellis pro affectibus hepatis calidis, refrigerans, aperiens obstructiones, & corroborans.

℞. pulu. rosatæ nouellæ, diarrhod. abb. & triasantali, an. ʒ. j. β. pul. diamargarit. frigid. ʒ. j. sacchari dissoluti in aquis endiuixæ & Cichorii, q. β. Misce, fiat electuarium in tabulis ponderantibus, ʒ. iii. Cape tabellam vnam, mane tribus horis ante cibum alternis diebus superbibendo parum aquæ endiuixæ, & capill. ven.

Electuarium solidum in tessellis pro affectibus frigidis hepatis, calfaciens, aperiens obstructiones & corroborans.

℞. pulu. diacucurmæ maior. diarrhod. abb. & triasantali duplicato Rhabarb. an. ʒ. j. β. Eupatorii sicci & in pulu. redacti. ʒ. ii. spicæ nardi, ʒ. j. sacchari dissoluti in aquis Eupat. & absynth. an. q. β. Misce, fiat Elect.

in tessellis pond. ʒ iiii. sumat tabulam vnam, mane tribus horis ante cibum, superbibendo parum vini albi diluti cum aqua absynthii, vel cardui Benedicti, vel Borrage. alternis diebus.

C A P V T X I V.

TOpica præsidia quæ hepati præscribi solent varia sunt ac multiplicia, quorum omnium series à nobis scribenda non erit, præsertim cum potius ad materiam chirurgicam spectare videantur, quam in præsentia tractare institutum non est, sicque persequendo in his præsidiis foris ad mouendis circa hepar obseruandum est perpetuo, vt non tam affectus & causæ morbi habeamus rationem, quam naturæ partis, vt scilicet robur asseruetur, ac naturalis temperies retineatur, nam communem & toti corpori necessariam actionem hepar habet, viscus præcipuum; & quia obstructionibus facile afficitur propter intercursum venarum implicitos, ad sanguinis elaborationem necessarios, ideo ab infarctu liberantia remedia superius descripsimus. Olea quæ superimponuntur, nonnunquam sunt lauanda ne suo glutine spiracula præcludant & obturent meatus.

Fotus

Fotus in affectibus hepatis calidis
refrigerans: & corro-
borans.

℞. fol. plantag. (plantago præter vim re-
frigeratoriam habet & astringentiam qua robur
hepatis confouet, ideoque eam in dysenteria su-
perius usurpauimus.) Endiuæ & Cichorii,
an. m. j, rosar. rubr. & flor. nymphææ, an. p.
j, s. summitatum lentisci, p. s. santalorum
omnium, ℥. s. fiat decoctio in aqua pluuiali
qua foueatur regio hepatis calidè parum, se-
ro & mane longè à cibo post inungatur o-
leis sequentibus. Cæterum summitates len-
tisci, quia teneræ facilè in decoctione vim
suam amittunt, ideo parum decoqui de-
bent.

℞. Olei Myrthini, olei Nymphææ, &
rosarum Omphacini, an. ℥. ij.

Misce, fiat vt di-
ctum est.



*Fotus in affectibus hepatis frigidis, cal-
faciens & robo-
rans.*

℞. fol. absynthii & Eupator. an. m. j. flor. Chamæmeli, ꝑ j. ß. palmularum numero vi. passularum cum anillis, par. viii. calami aromatici, ꝑ vi. fiat decoctio in media parte vini rubri stiptici & aquæ puræ, qua foueatur regio hepatis calidè & tepidè sero & mane longè cibo, deinde vngatur oleis sequentibus.

℞. Olei Nardini de absynth. & Mastichini, an. ꝑ. ii. Misce, vt dictum est.

C A P V T X V.

Ceratum & vnguentum pro affectibus hepatis calidis refrigerans & corroborans.

℞. Cerati santalini, ꝑ. ii. vnguenti rosacei, ꝑ j. ß. Olei Myrrhini, ꝑ. iii. cum pauca cera, fiat in modum vnguenti vel cerati, quo inungatur regio hepatis, frigidè æstate, tepidè hyeme.

Vnguen-

*Vnguentum pro affectibus hepatis frigidis,
calfaciens, nonnihil aperiens
& corrobo-
rans.*

℞. Olei Nardini, olei de absynthio,
olei irini, an. ℥.ii. calami aromatic. ligni a-
loes, santali citrini, gummi laecæ, an. ℥.℞.
spicæ nardi. ℥.ii. ceræ, q.℞. Misce, fiat in
modum vnguenti, quo vogatur regio he-
patis tepidè vel calidè, sero & mane longè
à cibo.

*Vnguentum in hydropè calefaciens, siccans,
aquas absumens & flatus
discutiens.*

℞. Succii absynthii, Eupatorii, an. ℥.
ij. succii brassicæ ma in. *dum in his locis ea in
quibus magna eius copia succrescit, & viget,
℥.j.℞. vel siccata si fuerit pulueris eiusdem, ℥.j.*
farinæ orobi, ℥.vj. pulueris radic. cucumeris
asinini & Cyclaminis, an. ℥.iii. aris vsti, ℥.
ii. spicæ nardi. ℥.j. olei irini & amygdal.
amararum, an. ℥.iii. stercoris vaccæ, ℥.ii.
ceræ therebintinæ, an. q.℞. ducantur & a-
gitentur omnia simul in mortario, & fiat in

modum unguenti quo inungatur regio ventris inferioris in hydrope, Ascite & Tympanite, à materia præsertim frigida: In Tympanite autem addere poteris pulveris Cumini, ℥.ss. *vel emplastrum sequens ventri superimponendum, quod digerit, resoluit, aquas absorbet & flatus discutit.*

℥. Mass. Emplastri de Baccis lauri, ℥.iiii. Stercoris vaccæ, ℥.ij. misceantur simul & calidè tumenti ventri admoueantur.

C A P V T X V I.

Epithema pro affectibus calidis hepatis refrigerans & obstructions aperiens.

℥. Aquarum End. Cichorii & acerolæ, an. ℥.iiii. aquæ Nymphææ, ℥.ij. sem. End. & portul. an. ℥.ij. Santalorum omnium, ℥.j.ss. Spicæ nardi, *ad seruandam naturalem temperiem partis*, ℥.j. Misce, fiat epithema, quod regioni hepatis admoueatur sero & mane longè à cibo.

Epithema pro affectibus frigidis hepatis, calfaciens, aperiens obstructiones & corroborans.

℞. Aquarum absynthii, Eupatorii, cap. ven. an. ℥. iiii. Calami aromatici, schænantos in pollinem redactorum, an. ℥. iii. spicæ nardi, ℥. j. Misce, fiat Epithema quod regioni hepatis admoveatur sero, & mane tepidè longè à cibo.

CAPVT XVII.

Sacculus in affectibus hepatis calidis refrigerans & corroborans.

℞. Rosarum rubr. flor. viol. & Nymphaeæ, an. p. j. s. End. m. j. santali rubri & albi, an. ℥. ij. sem. acetosæ, End. & portul. an. ℥. j. spicæ nardi, ℥. j. misceantur, simul in pulu. redigantur, & cum syndone rubro fiat sacculus interpunctus ad formam semilunæ irroratus cum aqua End. & ros. admoveatur regioni hepatis tepidè.

Sacculus in affectibus frigidis hepatis recalescens, obstructions tollens & corroborans.

℞. Eupatorii, absynthii, an. m. j. ligni aloes, calami aromatici, santali citrini, an. ʒ. ii. spicæ nardi, ʒ. j. redigantur in puluerem & cum syndone rubra & pauca bombace. *Ut recalescat*, fiat sacculus interpunctus ad formam semilunæ irroratus, cum aqua absynthii & florum mali aurei, hepatis regioni admoueantur. Sacculi admoueri possunt regioni ventris inferioris, ut in Tympanite, dum ventrem detumescere volumus & flatus digerere hoc modo.

℞. Milii partes tres, salis communis partem vnā, seminum anisi & fœniculi, an. partem dimidiam, milium & sal torrefiant, & cum pannis raris lineis fiant sacculi interpuncti, qui regioni ventris inferioris admouentur calidè.

* * *

De splene.

IN affectibus splenis eadem fere præsidia conueniunt, quæ antea hepatis præscripta fuerunt, tum in assumptis, tum in admotis modo adicias illi parti propria & accommodata, vt Cappares & cortices radic. cappar. scolopendriam, psillium, hemionitida, viticem & si men eius præcipuè tamariscum, acetum & quæ aceto constant, nam eo oblectatur, vt antea monuimus, aqua fabrorum ferrariorum, quæ vulgò chalybeata dicitur, insigni sua siccitate splenem imminui sæpe numero probatum fuit, interim tamen quædam peculiaria à nobis describentur maxime in eiusdem frigidis affectibus quibus plerumque diuexari solet.

Electuarium solidum in eisdem affectibus natis ab obstructione, calefaciens, aperiens, & corroborans.

Recipe, pulu. diacapar. diacucur. maior. an. ʒ. j. ꝑ. pulueris rosatæ nouellæ, ʒ. j. puluer. diacamini, ꝑ. ij. sacchar.

dissoluti in aquis Borragin. & scolopend.
an. q. β. Milce, fiat Electuarium in tabulis
ponderantibus, ʒ. iii. sumat tabulam vnam,
mane tribus horis ante cibum, superbiben-
do parum vini diluti aqua absynthii alternis
diebus.

*Electuarium molle in affectibus splenis frigi-
dis, recalsaciens, obstructions a-
periens, corrobo-
rans.*

℥. Conseru. flor genista, conser. flor. Ta-
marisci & Cap. ven. an. ʒ. j. pul. diacapparisi, ʒ.
ii. pulueris diacynamomi & rosatae nouellae,
an. ʒ. j. Syr. de scolopend. Oximelitis, an. q. β.
Milce, fiat in modum opiatae, de qua sumat
ad quantitatem nucis comestibilis, mane
tribus horis ante cibum superbibendo pa-
rum vini albi diluti, cum aqua Cap. ven. &
Borraginis.

C A P V T X I X.

Cæterum in quibus cachexia apparet
ex splenis vitio oborta conueniet li-
maturam chalibis addere à ʒ. j. ad ʒ. iii.
exterius autem adhibeantur medicamen-
ta pro splene, quæ præsertim inflationes

&c

& tumores duros sanare valeant.

*Fotus in affectibus splenis propter duritiem &
molliens & extenuans crassos &
lentos humo-
res.*

℥. fol. scolopend. & tamarisci, an. m. j. fol.
rutæ m. ℞. flor. Chamæmeli & meliloti, an. p.
j. ℞. flor. genistæ & tamarisci, an p. i. rad. cu-
cū. afinini, Enul. Cam. & panis porcini, an. ℥.
℞. sem. rutæ & viticis, an. ℥. ii. sem. anisi & fœ-
niculi, an. ℥. i. ℞. fiat decoctio in duabus parti-
bus aquæ pluviæ, & vna aceti vini albi, si a-
liqua caliditas fuerit adiuncta addere poteris
semina Endiu. & portulacæ, an ℥. iii. qua fo-
ueatur regio splenis calidè vel tepidè sero &
mane longè à cibo, deinde inungatur oleis
sequentibus.

℥. Olei de Cappar. olei de lilio, olei irini
aut rutacei, an. ℥. ii. Misce, inungatur regio
splenis calide aut tepidè sero & mane longè
à cibo.

*Ad magis induratum splenem emolliendum
vnguentum sequens summo presidio esse
poterit.*

℞. Olei de Capparibus & de lilio, an. ʒ. j. β.
 rutacei, ʒ. j. amygdalarū dulcium, ʒ. β. Bdel-
 lii ammoniaci dissolutorum in aceto, an. ʒ. ii.
 sterconis Capræ & seminis viticis, an. ʒ. j. β.
 Sem. portul. quod spleni in primis accommodatum
 est, nam tenuandi vim habet diuersam à foliis
 quæ inspissandi vim habent, ʒ. j. Croci. ʒ. f. ace-
 zi parum & ceræ, q. f. Misce, fiat vnguentum
 quo inungatur regio splenis calidè vel te-
 pidè & sero & mane.

*Emplastrum in affectibus splenis ad eius duri-
 tiem emollien-
 dam.*

Recipe, Massæ Emplastri de Meliloto,
 Massæ emplastri diachilonis ireati, an. ʒ. j. f.
 Corticis Capp. scolopendriæ siccæ, an. ʒ. ij.
 sem rutæ & viticis, an. ʒ. j. subigantur oleo
 de lilio, & formetur Emplastrum in lin-
 guæ bouis formam, quod lienis
 regioni admoueat.

* *
 *

CAP.

C A P V T XX.

De intestinis.

IN intestinorum malis plurima varia-
que remedia & assumpta & admota ad-
hiberi solent, vt in lumbricis enecan-
dis, diatrhea, dysenteria, colico do-
lore & tenasmo quæ hîc præscribenda e-
runt. Communia autem sunt, hic non
repetenda ventriculi affectibus accommo-
data.

Iraque in lumbricis enecandis, quorum
generatio & ortus præsertim in intesti-
nis; ad illos ipsos enecandos, amara acria,
& nitrosa necessaria sunt, quæ omnem pu-
tredinis labem submouent vermium mate-
riam consumendo & euacuando, qualia
etiam sunt, Agaricus, Colocynthis & Rha-
barbar. præter quam quod enim amarore
lumbricos interficiunt, etiam euacuando
pituitosa illorum materia non mediocriter
iuuare videntur, tum frigida qualia acida,
quæ omnem putredinem arcent, accom-
modata sunt medicamenta, ac proficiunt.

Quædam quæ aperiunt obstructions à pituita infecta, in spiraculis ventris inferioris vt gramen Præterea cum alienus & feruidus ex putredine exciteretur calor, quæ refrigerando spissant, vt portulaca in lumbricis enecandis, nonnunquam præsens remedium esse consuevit, & cū illo calore feruido, putredo maligna & veluti cuiusdam pestiferæ conditionis seu qualitas acquiratur: quæ sunt cardiaca, sed est cordi accommodata, plerumque cum aliis admiscere necesse est. Addas licet ex quadam consequutione remedio esse dulcia, non modo in enematis, ad eos alligandos, sed etiam in ore exhibita, maxime quando lumbrici ad ventriculum illati sunt, qui instanter oris ventriculi morsum & animi deliquium promouere possunt, vt dulcedine quadam ac passione eludant lumbricos dulcia præscribunt. Oleum item lumbricis esse infectum omnibus probatum expertumque est, quod glatine suo, vt antea dictum fuit, spiracula eorum, vt in omnibus aliis infectis, adeo præcludit, vt illorum calor vitæ etiam imperfectæ opifex ex toto extinguatur, ob id lumbrici mortui, ab eadem olei lubricandi facultate exhibitione è corpore facile expellantur.

CAP.

CAPVT XXI.

*Potio in lumbricis enecandis, quando caliditas
& febris simul coniuñcta sunt ex acidis
putredinem inhibenti-
bus.*

℞ Syr. de limonibus, Syr. de Berberis, & si
cardiaco proficere volueris, loco illius addes
Syrupi de Buglossio, an. ʒ. j. seminis citri mi-
nutim contusi, cornu cerui viti, pul. di amarg.
frigidi an. ʒ. j. aquarum portulacæ, acetosæ
& graminis, quia caliditate non exuperat &
lumbricos enecare valet, an. q. ʒ. Misce, fiat po-
tio quam sumat longè à cibo aut lactis suctu
per duas aut tres horas mane & sero.

*Potio lumbricis enecandis necessaria & ac-
commodata, quando nulla caliditas
subest, ex amaris constans &
cardiacis.*

℞. Syrup. de absynth. Syrup. de Bu-
gloss. an. ʒ. j. Syr. de limonibus, vt temperes ca-
liditatem reliquorum medicamentorum & si-

mul putredinem Inhibeas malignumque vaporē
propellas ꝑ. ꝑ. seminis contra, & cornu cerui
vili, confectiois Alkermes & cor iuuat &
lumbricos enecat, an. ꝑ. j. aquarum gram. & de
absynth. an. q. ꝑ. Misce, fiat portio quam su-
mat duabus aut tribus horis à cibo aut lactis
suctione, mane aut sero.

*Vtiles etiam sunt noduli in lumbricis ene-
candis impositi in iusculis hoc
modo.*

℞. Sem. Citri, End. & portul. an. ꝑ. ii. con-
tundatur leniter & in panno lineo inuoluan-
tur, fiant noduli filio alligati, qui imponatur
iusculis.

*Vnguentum pro lumbricis enecandis quando
caliditas subest & febrilis calor coniun-
ctus est, ex refrigerantibus,
acidis & putredinem,
inhibenti-
bus.*

℞. Succu acetosæ, portul. plantag. an. ꝑ. ii.
ci, fol. mali persici, ꝑ. j. ꝑ. sem. citri & portul.
an. ꝑ. j.

an. ʒ. ii. olei ros. & citoniorum & nymphaeæ,
 an. ʒ. j. ʒ. acetii, ʒ. ʒ. cum paucula cera, ducan-
 tur omnino .n. mortario & fiat in modum
 vnguenti quo inungatur regio ventris infe-
 rioris tepidè, sero & mane longè à cibo aut
 à lactis suctu.

*Vnguentum pro vermibus enecandis quando
 caliditas febrilis adiuncta non est,
 ex amaris præcipue con-
 stans.*

℞ Succii, Tanaceti, succii absynthii vul-
 garis & santonici, an. ʒ. ii. succii abrotani, ʒ. j.
 ʒ. lupinorum. ʒ. ʒ. cort. c. rad. mori. ʒ. iii. spicæ
 nardi, ligni aloes, an. ʒ. j. Olei amygdala. ama-
 rarum, mastichini, nardini, an. ʒ. j. ʒ. acetii,
 parum ceræ, q. s. ducantur omnia in morta-
 rio, fiat in modum vnguenti, quo inungatur
 regio inferioris ventris calidè aut tepidè se-
 ro aut mane longè à cibo vel à suctu lactis.
 Ex hisce autem vnguentis si ceræ modum
 inaugeas ad Emplastri consistentiam for-
 mare poteris & ventri imponere vtile non-
 nunquam erit, vt diutius loco hæreant.

De alui fluxu.

IN alui fluxibus immoderatis restrin-
 gendis singulare præsidium esse solet,
 cor veruecis ex animale recenter auulsum,
 & confestim calidum aut tepefactum in
 vas figulium recondere & in profluuiio al-
 ui ab humore acri immiscere oportet aquæ
 rosaceæ ℥.iiii. Si verò ab humore frigido ob-
 oriatur malum, transpungere cordis substan-
 tiam vtile est cum gariophillis & aliquot
 frustolis Cinnamomi, deinde ceu quodam
 luto pasta obducere orificium vasis & in cly-
 bano calido per horam relinquere donec ex
 corde innatus succus eliciatur, deinde magni
 vsus erit agroranti per cochlearia parua ius
 illud in horas exhibere, nam & constringen-
 di vim habet & spiritus dissolutos ab immo-
 deratis profluuiis instaurandi atque inau-
 gendi, *non ob aliam causam præter quàm quod
 cordis substantia ex sanguine crasso est condita,
 ob id astringit & alui fluxum detinet. Multoque
 magis ex permistione eorum quæ odore valent
 spirituum dissipatam substantiam reficere. Item
 remedium paratu facile est in profluuiis ventris
 immodicis puluerem mori fructus. ad ℥. j. ꝑ. ex-
 hibere, cum aquæ rosaceæ ℥. ii. in affectibus
 calidis,*

calidis, in affectibus autem frigidis cum vino
stiptico subnigro & adstringente.

*Electuarium molle in profluvio alui immode-
ratis, presertim in Cholera morbo, re-
frigerans, astringens, ac simul pro-
pter ugendum humoris o-
mnem pestilentem
reprimens.*

℞. Conseruæ ros. antiquæ, Conf. acetosæ,
& ymphiti, an. ʒ j pul. trium santalorum, ʒ.
j. ʒ. coralli rubri loti cum aqua ros. & cristal-
li. *contra communem feruorem ualei infranat
& simul pernicioso humori resistit, an. ʒ. j. sem.*
Citri, ut sit alexiterium humoris maligni, ʒ ʒ.
cum syrupo conseruationis Myrabolanorum
conditorum, q. ʒ. fiat in modum Opiatæ, de
qua capiat ad quæritatem nucis comestibilis
mane aut sero tribus horis ante cibum su-
perbibendo parum aquæ ros. & acetosæ.

*Electuarium molle in immoderatis alui proflu-
uiis, calfaciens, astringens & spirituum sub-
stantiam in augens.*

℞. Corx. Citri cum saccharo conditi,

Conferu. rad. Bugloss. *ut spiritus dissolutos inflaurare valeat*, an. ℥ j. Carni. m Cytoniorum cum saccharo conditorum, *ad saporis gratiam & ad astringendum*, ℥ s. pulu. aromat. rosati, ℥. ii. cum syrupo conf. cortic. citri, fiat in modum opiatae, de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis, mane aut sero tribus horis ante cibum superbibendo parum vini stiptici diluti cum aqua Borriginis.

C A P V T X X I I I .

Cataplasma in dysenteria quando morsus in ventre & vellicatio magnopere infestare solent, refrigerans, reprimens morsum & sedans dolorem.

℥. Succī plantag. succī portulac. succī symphiti, an. ℥. iii. Mucaginis, sem. psilii extractae cum aqua ros. ℥. j. s. farinae orizae, ℥. j. pulu. florum Chamæmeli & ros. rub. an. ℥. ii. Olei ros. omphacini, q. s. Misce, fiat in modum cataplasmatidis addendo succi cytoniorum, quando illorum

opportunitas viger, ℥.ii.admoueatur ventri inferiori frigide si dies sunt caniculares & summus ardor, sin minus tepidè.

*Cataplasma in immoderatis alui fluxionibus
ab humore frigido calcfaciens, a-
stringens & dolorem se-
dans.*

℞. Succimentæ, succi saluix & maioranæ,
an. ℥.iii. succi serpilli, ℥.ii. farinae seminis Ni-
gellæ, *potenter enim siccatur & astringit*, ℥.j. s. spi-
cæ nardi, galangæ crassæ, an. ℥.ii. pulu. flor.
Chamæmeli, ℥.iii. Olei omphacini, olei ma-
stiches. q. s. fiat in modum cataplasmatismatis
quod imponatur supra regionem ventris in-
ferioris.

Item illitus & vnguenta commodè pa-
rari possunt, simili modo, vt in affecti-
bus ventriculi siue calidis, siue frigidis
antea dictum fuit, & ad dolorem sedan-
dum opportunum semper erit addere ab
℥.j. ad ℥.ii. Olei Chamæmeli, quod vtri-
que affectibus propter facultatem tempera-
tam conuenire poterit. Quando in dysen-
teria & in tenesmo ob doloris acerbiteriam
ac fluxionem excitet & vlcus inaugeat,

interdum contingit enemata non retineri, ideo alio præfidij genere moliendum est, vt alui fluxum restringas, nimirum halitu excepto ex trochiscis, quorum forma eiusmodi est.

Trochisci in dysenteria, tenesmo à materia calida, refrigerantes, astringentes.

℞. Balaustior. p̄fidia, baccar. myrthi granorum somach. an. ʒ. s. Boli armenic. terræ sigillatæ, sanguinis draconis. an. ʒ. ij. gummi tragacanthi dissoluti in aqua rosarum, q. s. fiant trochisci, qui in cathedra perforata carbonibus ignitis iniiciantur in ignem, inde ægrotus per sedem halitum excipiat.

CAPVT XXIV.

Fotus pro colicis doloribus ex materia calida, moderatè refrigerans & sedans dolorem, nec non modicè calfaciens propter flatum, qui semper coniuncti sunt in omni colico dolore.

℞. fol.

℞. fol. plantag. m. j. flor. Chamæmeli & Meliloti, an. p. ii. sem. lini. ʒ. β. *tametsi calefaciat, nihilominus humiditate leniente dolores acres sedat & mitigat.* Misce, fiat decoctio in quantitate aquæ sufficienti qua foueatur locus doloris tepidè sero & mane, longè à cibo, deinde inungatur oleis sequentibus.

℞. Olei Chamæmel. olei viol. an. ʒ. iij. Misce, fiat vt dictum est, *tametsi quidam tan audaces fuerint, interdum cum foelici quodam euentu in doloris colici tormento acerbiorè à materia calida pro bile æruginosa, qua illius mali, vt plurimum causa existit, succum semperuini supra coli intestini circuitum in ventris inferiori admpuere non sine periculo.*

Fotus in colico dolore à materia frigida & flatibus recalfaciens, discutiens flatus & sedans dolorem.

℞. Origani, calamenti, pulegii, an. m. ʒ. flor. Chamæmeli & Meliloti, an. p. ii. florum rorismarin. p. j. seminis lini & fœnugræc. an. ʒ. β. sem. anisi, fœniculi, cumini, an. ʒ. ii. fiat decoctio in aquæ sufficienti quantitate, qua foueatur locus doloris cum spongia

T

molli vel filtro sero & mane longè à cibo,
deinde iungatur oleis sequentibus.

℞. Olei de lilio, Chamæmelini & amygdalarum dulcium, aa. ʒ. j. β. Misce, fiat vt dictum est, sed ad reprimendum acrem humorem & corroborandas partes naturales ex vsu erit, vt sumat de electuario sequenti.

℞. Electuar. diarrhod. abb. ʒ. j. sumat tessellam vnam, mane & sero tribus horis ante cibum.

Verum ad flatus discutiendos & humorem frigidum edomandum, vtile erit sequens remedium.

℞. Diacumini vel electuar. aromatici rosati, ʒ. j. sumat tabulam vnam, mane & sero tribus horis ante cibum, ex vsu magis erit in Electuario molli dare, & ex confectione sequenti.

℞. Confect. aromatici rosati in modum opiatae ex descriptione Gabriellis, ʒ ii. sumat ad quantitatem nucis, comestibilis, mane & sero tribus horis ante cibum, superbibendo parum vini maluatici, si non sit in promptu alterius vini generosi.

Lotio

*Lotio & balnei vice praesidium in tenesmo à
materia calida, refrigerans, astringens
& nonnihil dolorem
sedans.*

℞. fol. plantag. & verbasci, añ. m. ii.
Balaustiorum & rosarum rub. an. m. j. bac-
car. & fol. myrthi, an. ℥. ij. & ad dolorem se-
dandum, flor. Chamæmeli, p. ij. fiat de-
coctio qua lauentur crura & femora pe-
cten & lumbi, deinde inungantur oleo se-
quenti.

℞. Succi plantag. depurati, ℥. iiii. Mucca-
ginis seminis psilii extractæ cum aqua ros. ℥.
v. ceræ candidæ, q. s. fiat in modum vnguen-
ti quo inungantur partes, vt in Balneo di-
ctum fuit.

*Lotio & Balnei vice, praesidium in tenesmo à
materia frigida calefaciens, & nonni-
hil abstergens & materiam
submouens.*

℞. Origani, fol. lauri, calamintæ, an.
m. j. flor. rosismarin. Chamæmel. meliloti &
anethi, an. p. ii. calami aromatici, ℥. s. fiat
decoctio in duabus partibus aquæ & vna

vini qua lauentur crura & femora, pecten
& lumbi, deinde vngantur oleis sequen-
tibus.

℞. Olei nardini, mastichini & irini, *vs*
penetret materiam crassam & dissecare valeat,
vt in halitum dissoluatur, an. ʒ. ii. Misce, fiat.
vt dictum est.

Fotus astringens in proidentia
ani.

℞. fol. & Baccar. Myrthi, sumach. an. m. j.
Balauft. pfidiæ, an. ʒ. ii. fol. verbasci, m. ʒ. hy-
pocistidos, ʒ. j. fiat decoctio in vino astringe-
nti qua foueatur anus tepidè.

℞. Antimonii pulueris. plumbi vsti &
loti cum aqua plantag. an ʒ. j. pulu. ossium
dactilor. & rosar. rubr. an. ʒ. ʒ. pulu. Cornu
cerui vsti, ʒ. ii. Misce, & fiat puluis quo re-
spargatur extremitas intestini recti prolapsi.

C A P V T X X I V.

De hemorrhoidibus.

Hæmorrhoides, id est, venę quę ad anurā
desinunt, quibus sanguis fluere per
circuitus consueuerat, si restringatur illa
euacuatio, danda erit opera, vt quibusdam
assum-

assumptis & admotis, adaperiantur. Ergo sic parentur catapotia fluxum hæmorrhoidum promouentia.

℞. Aloes, Myrrhæ, an. ʒ. j. pulu. rubiæ tinctorum, radic. asati, Cinnamomi electi, an. ʒ. j. cum aqua rubiæ tinctorum, fermentur pillulæ sex pro drachma, capiat mane tres in aurora, quatuor aut quinque horis ante cibum semel aut bis in hebdomada addendo croci ʒ. ʒ. Ad hæc animaduertendum ad eosdem vsus efficaces esse pillulas Ruffi, eodem modo assumptas continuando vsus: sequuntur catapotia, quæ in fluxu immodico hæmorrhoidum purgant humorem noxiu & astringunt.

℞. Massæ pillul. è bdellio, ʒ. ii. aut iii. sumat in aurora quatuor aut quinque horis ante cibum: exterius autem adhiberi poterunt, quæ venas ani adaperiunt, & sanguinis fluxum opportunè mouent, vt hirudines, prius tamen confricato ano admoueantur & tamdiu maneant, donec bene saturatæ appareant, & sufficientem sanguinis quantitatem eduxerint. Ad id plurimum confert folium ficuum asperum sedi admotum, quo infricare oportet venas, vt inde sanguis effluat, vel foliis nepetæ quæ & calore adaperiunt & reserant & villis quibusdam ceu

aculeis perpungunt, & similiter foliis Borrag propter villos sanguinem è venis ani ad effluxionem irritare valent, citra vllam molestiam. Addas licet succum cepearum plurimum valere, vel glandem subditam, quæ calefacit, tenuat, aperit, trahit & sanguinem fundit hoc modo.

℞. Succu cepearum bene acrium, ℥.iii. pul. rad. ciclamini & rubiæ tinctorum, an. ℥.iii. Euphorbii, ℥.j. Croci, ℥.ss. saponis albi, q.ß. fiant glandes iustæ magnitudinis quæ ano subiiciantur. Si vero ex acrimonia dolor quidam contingat poteris illinire linimento sequenti.

℞. Muccaginis seminis althææ extractæ cum aqua ros. ℥.ii. pulu. gummi tragacanthi, ℥.ii. albuminum ouorum, numero ii. Olei rosacei parum. Misce, fiat in modum liniamenti, de quo fiat vt dictum est. Id ipsum nonnunquam ad dolorem mitigandum conferre potest, quando hæmorrhoides sunt tumefactæ, & sanies quædam virulenta præ redundantia effluere incipit, tunc hoc remedii genus apponere optimum est.

CA-

De Nephritico dolore.

Nephritica vocata medicamenta, ex Gal. lib. de compos. med. secundum partes in duplici genere sunt collocata; quedam laborantibus calculo accommodantur, alia verò renum inflammationibus & vlceribus in genere comprehenduntur, quin etiam affectibus vesicæ persanandis accommodantur. Hæc verò ipsa medicamenta, inflammationibus & vlceribus renum & vesicæ vsurpanda constare debent ex mitigatoriis medicamentis, & vt ad vias urinæ deduci valeant miscenda diuretica, id est, urinas mouentia. Quæ verò calculos frangunt & comminuunt, incidendi & abstergendi vi prædita & manifesto calore valere debent, ob id amara in primis necessaria esse dicuntur. Nec ex toto calida & acria addenda, nam quod tenue est dissoluunt, reliquum verò topi modo impingunt, ob id calculum augent & cogunt. Cæterum plurima sunt medicamenta, quæ insita facultate id ipsum potius efficere videntur quam vlla euidenti qualitate, vt lapis spōgiæ, rad. nymph. cū tamen plâta sit frigida ex effectu probatū est & exploratū, non modo calculos renum,

sed etiam vesicæ ampliores excutere, sic etiam in eorum numero collocantur quæcumque verrucas tollunt & excidunt. Boni & experti medici aiunt intus assumpta medicamenta calculos frangere & comminuerè posse, vti portulacam & succum portulacæ exhibitum, præsertim ex illius aciditate, tametsi perspicua sua facultate refrigerandi spissandique vi polleat. Si quis vero saporè eius acidum diligenter examinarit, tenuandi & incidendi facultate calculos frangere comperiet. Addas licet non minimum iuuare calculorum excretionem, quæ leniendo lubricant; partes enim exasperatas ex sabulonibus abluunt, & easdem præparant, vt facilius arenulas & calculos minores, & eorum fragmenta expellant, vti decoctum fructuum dulcium passularum, iubarum, sebesten & caricarum pinguium. Inter hæc addas oleum amygdalarum dulcium. Verùm ex altero euentu id fieri credibile est, vt oleum lubricando calculi expulsionem promoueat, vnde nostræ obstetrices, post partum, dum secundæ non sunt excretæ, olei paucam exhibent quantitatè, ex qua confestim, vel paulo post, secundas expelli ceu quodam miraculo obseruare poteris. Quamobrem oleum oliuarum dulce, & amygdalarum dulcium. ad ʒ.

ij. cum

ii. eum vini albi ꝑ.iiii. mane tribus horis ante cibum epotum ad præcautionem bis aut ter in hebdomade; & ad curationem in insultu & doloris tormento calculi expulsionem non solum iuuat; sed etiam alia ratione proficere videtur, nimirum, quia relaxat ventriculum, idcirco ad vomitum impellit, ex quo multa pituitosa & cruda reiciuntur, hinc leuamen detracta nimirum pituitosa materia, quæ in calculi generationem abire solebat. Porro calculi renum, quia & minores & locus in propinquo est, vt vis medicamenti ex toto non dissoluatur, egent clementioribus & mitioribus medicamentis vel solum lenientibus, vel ex amaris, vel ex iis duobus inuicem mixtis non alioqui acutioribus & incidendi facultate vehementiore præditis. In vesica autem molliendum est atque peragendum aliter, quia grandiores calculi & ampliores cum sint, nullis ferè cedunt remediis & chirurgi manum potius efflagitant quàm vt indigeant præsiidiis; aut ne oleum & operam perdas, quia locus diffusus est à viis communibus & longius exporrigitur, tentanda sunt medicamenta calculos frangentia & comminuentia quæ & acrimonia & incidendi & extenuandi facultate polleant. In summa calculis renum & vesicæ minoribus atterendis auxiliatur semen iuni-

peri ad ℥. ss. cum vini albi ℥. iiii. exhibitum
ac puluis elaphobosci, auriculam leporis
vulgo vocant, eodem modo cum vino albo
potus magni vsus esse solet, vel pabulum
cerui, vel ophioctonon quo cerui aduersus
serpentes se armant.

C A P V T X X V I.

*Potio quæ in doloris insultu, modo antea præ-
cesserint vniuersales purgationes, & sal-
tem alui lenitio, calculum frangens &
comminuens.*

℥. Syrup. cap. & viol. an. ℥. j. oximellis.
scillitici. ℥. ss. ocreæ luteæ purissimæ, pulu.
diamargarit. frigid. *si leuamen præstare voles
quando de illarum excoriatione partium perti-
mescis, vel ab vsu horum medicamentorum,
vel à morbi materia, an. ℥. ss. pul. Lytontri. ℥. j.
& quando calculus grandis est in renibus, &
præcipuè in vesica pulu. scorpionum præpara-
ti, ℥. ss. jaquæ Beton. & capill. ven. an. q. ss.*
Misce, fiat potio quam sumat mane
vel sero tribus aut quatuor
horis ante ci-
bum.

Alia

Alia potio calculum vesicæ frangens, qui vehementioribus eget præsiidiis.

℞. pulu. Lytontr. & rad. nymphaeæ, an. ʒ. ʒ. ʒ. sanguinis hirci præparati & puluer. scorp. præp. an. ʒ. j. aquæ decoctionis graminis & cicerum rubr. ʒ. iiii. Misce, fiat potio quæ exhibeatur mane aut sero, longè à cibo aluo antea expurgata per enemata emollientia.

Electuarium molle ad præcautionem & curationem calculi, vrinae vias exasperatas leniens, abstergens, & nonnihil paruos calculos frangens.

℞. pulpæ cassiæ recenter extractæ sub fumo decoctionis, seminis altheæ & seminis anisi, pulpæ passularum bene pinguium & dulcium, pulpæ sebesten, an. ʒ. j. puluer. diamargar. frigid. & glycirr. an. ʒ. ii. ocreæ luteæ & purissimæ ʒ. j. ʒ. pulu. Lytontr. ʒ. j. Syrup. cap. ven. & viol. an. q. ʒ. Misce, fiat in modum opiatae, de quo capiat ad quantitatem nucis comestibilis, mane tribus horis ante cibum superbibendo parum vini albi diluti cum aqua graminis & Beton. alternis diebus aut ter in hebdom. Item therebentina sola exhibita ad expurgandas

vrinæ vias & easdem dilatandas plurimum auxiliatur nephriticis & calculo laborantibus, hoc modo.

℥. Therebentina abietis vt magis aperias vias & calculi generationem inhibeas incidendo & tenuando lentam viscidamque materiam cum aqua Alkekengi diligenter lotæ, vt magis lenias refrigerando cum aqua violacea, & vt calorem reprimas ne therebentina suo calore nimis aperiendo & dilatando vias promptiores reddat ad influxum crassi humoris vel sabulorum in venis congestorum cum aquis ros. ætate præsertim, in humore calido, & quibus renes calidi sunt, inflammationisque suspicio instat, ℥. ii. sumat. ʒ. ii. per bolos paruos vel cum nebulis semel in hebdomade quatuor horis ante cibum, vel hoc modo.

Electuarium molle ex therebentina cum aliis medicamentis mixta expurgans, vias vrinæ aperiens & dilatans, & nonnihil calculos frangens atque comminuens.

℥. Therebent. abietis, eodem modo lotæ pro variis scopis, vt ante monuimus, ℥. ii. pulu. sacchari candi, ʒ. j. pulu. glycirrhizæ & dia-

tragaç.

trocag. frig. an. ʒ. ii. Misceantur simul, vsui
 reseruetur, sumat ʒ. ʒ. per bolos paruos
 superbibendo parum vini albi diluti, cum a-
 qua graminis, Beton. aut capil. ven. mane,
 quatuor horis ante cibum semel in hebdo-
 made, nonnunquam etiam ex vsu erit pulue-
 rem Lytontripon. ad ʒ. ii. sumere cum deco-
 ctione cicerum rub. de mane vt supra, vel
 hoc modo.

*Puluis calculos comminuens, aperiens & ex-
 tenuans. crassos humores in renibus & ve-
 sica.*

℞. fol. auriculæ leporis, pimp. cap. ven. Be-
 ton. an. ʒ. ii. radicis nymphæ graminis
 an. ʒ. ii. pulueris avis caudæ tremulæ ex assa-
 tæ in clibano, an. ʒ. ʒ. sem. seseleos & ligusti-
 ftici, an. ʒ. j. sacchari candi ad pondus omniũ.
 misce, fiat puluis secundum artem, de quo su-
 perbibendo parum vini albi, vel dissoluendo
 cum decoctione cicerum rub. mane vt supra.
 bis aut ter in hebdomade.

CAPVT XXVII.

IN his quibus vrina propter calculum,
 vel propter obstructionem ab humore
 crasso & lento supprimitur, vel ab alia

causa præter naturam: pro topico præsidio mirificè succurrit Raphanus ceu radícula excauata, & croci puluere adpersa intus illita oleo scorpionum virga intro posita, adeo vt breui spatio detenta non modo vrinam proluciat, sed etiam calculos exiguos trahendo, vt expellantur non mediocriter iuuat. Addas licet infame remedium ex pediculis ad vrinæ suppressionem, vt interdum comperi, qui supra ad extremum veretrum ponantur, vt pruritu dolorem moueant, ex quo vrina ad locum affectum tandem impetu quodam ruat, & vrinæ excernendi sensum ceu obtusum impellat atque excitet. Ad calculi excretionem promouendam, balneum emolliens & relaxans plurimum conferre solet, si modo æger sine virium insigni resolutione id ipsum ingredi valeat.

*Balneum pro calculo excernendo emolliens,
relaxans, aperiens, & meatus
dilatans.*

℥. Malu. althææ cum radic. Branc. viſ.
panet. an. m. iii. flor. melilori & Chamæmel.
an. p. ii. seminis lini & fœnuigræci, an. ℥. ii.
fiat decoctio pro balneo quod ingredia-
tur,

tur, tepidè sero & mane longè à cibo, in eorandiu immoretur, vt non sudet eum molestia, sed solum defideat in balnei aqua ab vmbilico infra pedes vsque, se probè abstergendo, deinde inungatur regio renum & vesicæ si sit calculus in ea parte, vt excuti facilius possit his medicamentis, videlicet vnguento sequenti.

Vnguentum laxans, aperiens, dilatans, vias leniens, cum caliditate calculi excretionem promouens.

℞. Olei amygdal. dulc. Chamæm. anethi, an. ℥. ii. Olei scorp. ℥. j. β. butyri recentis, ℥. j. axungia cuniculi, ℥. vj. succi parietariae, ℥. β. therebentinae abietis lotæ in vino albo q. β. Cerae parum, fiat in modum vnguenti, quo inungatur regio renum & pubis, quando in ea parte dolor est à calculo, tepidè sero & mane à cibo, modo nulla sit caliditas in illis partibus, inflammationis & ardoris coniectura non leuis, quia hæc ipsa medicamenta calidiora inflammationem auerent, alioqui oleis temperato calore lenientibus & frigiditate quadam præditis i. litus parandus esset, hoc modo.

Illitus pro calculo renum & vesicæ, in quo inflammatio & ardor coniuncta sunt leniens & nonnihil refrigerans.

℞. Olei viol. nymphaeæ & amygdal. dul. an. ℥.ii.ß. Caphur ꝑ. j. Misceantur simul, & fiat in modum linimenti quo inungatur regio renum, vel hoc modo.

℞. Vnguenti albi Galeni refrigerantis, ℥.iii. olei nymph. & viol. an. ℥.ii. Misce, fiat in modum vnguenti satis liquidi addendo caphuræ, ꝑ. j. inungatur regio renum & vesicæ, hyeme calide actu, æstate frigidè sero & mane longè à cibo.

In ardore vrinae assumptis & admotis ex vsu erit vti medicamentis frigidis lenientibus & nonnunquam abstergentibus.

Electuarium solidam, refrigerans, astringens in ardore vrinae.

℞. Santalorum alborum & rub. an. ℥.j.ß. sacchari solidi in aqua rosar. & semperuiui dissoluti, fiat electuarium in tessellis ponderantibus, ℥.iii. Capiat tessellam vnam, mane tribus horis ante cibum superbibendo parum aquæ endiuia.

℞. Conf. ros. flor. nymph. & Cichorii, an. ℥.j.ß. sem. acetosæ, portul. & End. an. ℥.

j. omnium

ʒ. omnium fantalorum, ʒ. j. ʒ. Trochiscorum
de Caphura, ʒ. j. cum Syru. de viol. & de Ber-
beris, fiat in modum opiatæ de qua sumat ad
quantitatem nucis comestibilis mane tribus
horis ante cibum superbibendo parum aquæ
End. alternis diebus.

*Muccago cum decoctione excipienda qua mul-
tum refrigerat in ardore vrina.*

ʒ. Sem. altheæ, maluæ bombacis, an. ʒ. j.
gummi tragacanthi, ʒ. iii. infundatur in deco-
cto seminis altheæ aut seminis papau. albi &
granor. Alkekengi, vt ad vias vrinae deducat,
fiat mucago de qua sumat ʒ. j. ʒ. aut ii. cum
prædicta decoctione vel hordei & glycirr.
mane tribus horis ante cibum continuando
per quinque aut sex dies.

ʒ. Oleorum nymph. viol. & rosarum
omphacini, an. ʒ. j. ʒ. Muccaginis seminis
psilii extractæ, cum aqua rosar. ʒ. j. albu-
minum ouorum numero ii. agitentur o-
mnia, addendo Caphuræ. ʒ. j. Misceantur
simul, fiat in modum linimenti quo illi-
natur regio renum, pubis & veretri frigi-
dè sero & mane longè à cibo: vel cum sy-
ringa iniiciatur intra virgam lac ouillam

V.

acidum, à quo fuerit extractum Butirum cum mucagine psilii. In vlceribus autem renum & vesicæ ex vsu erit modo ventriculus adeo infirmus non sit & nulla febris putrida comes, lac caprillū recentèr emulctum, ℥. vj. cum pul. sacchari rub. aut ros. ad ℥. ii. Mane, quatuor horis ante cibum ebibendum dare continuando per vnam aut alteram hebdomodam vere & autumno potissimum.

Electuarium molle leniens, abstergens & non-nihil laxans in vlceribus renum & vesicæ.

℥. Crassiæ recentèr à canna extractæ, pulpæ icbesten & pulpæ granorum berberis, an. ℥. j. pul. glycirr. & caudæ equinæ, an. ℥. iii. pul. Cicadar. ℥. ii. *non modo doloribus vesicæ succurrunt, sed etiam renum*, cum Syr. cap. ven. & viol. an. q. s. Misce, fiat in modum opiatæ, de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis, mane tribus horis ante cibum superbib. parum aquæ decoctionis glycirr. & radicis althææ.

Puluis in vlceribus renum & vesicæ abstergens & leniens.

℥. Caudæ Equinæ, ℥. s. pul. glycirr. ℥. iii. cicadarum, ℥. ii. quatuor sem. frig. mai. minutim

minutim cōtusorum, an ʒ. j. ꝑ. sacchari candi ad pondus omnium. Misce, fiat puluis de quo sumat, mane tribus horis ante cibum ad ʒ. ꝑ. superbibendo parum aquæ decoctionis hordei glycir. passul. vel dissol. in dicta decoctione alternis diebus.

Item danda erit opera, vt per syringam, fiat iniectio ex trochiscis Gordonii qui abstergunt, leniunt, glutinant, adeo vt omnes sanationis scopos contineant, qui necessarij erunt, in omni tempore vlceris.

℞. Quatuor femin. frigid. maior. sem. papau. albi, maluæ, bombacis, portul. Cytoniorum, baccar. Myrthi, gummi tragac. gummi arabic. pinear. mundatar. pistaciorum, penidiar. recentium, glycir. mundæ, an ʒ. ij. bolus Armeni, sang. dracon. spodii, rosar. myrrhæ, an ʒ. ꝑ. excipiatur cum hydromelite simplici, & ad leniendum cum decoctione hordei, passularum & iuiubarum ad glutinandura, leniendum, cum lacte ouillo, fiat iniectio semel aut bis in die, mane aut sero continuando donec de vlceris sanatione indicium tibi erit.

CAPVT XXVIII.

De vtero.

IN vtero post vniversalem purgationem varia medicamentorum genera commendantur pro eius affectibus, vt strangulatur

vteri, difficili partu, conceptu iuuando,
 suppressione mensium & fluore nimio
 muliebri. Itaque medicamenta histerica
 quamuis antea à nobis fuerint definita,
 bene olentia imprimis vtero familiaria
 esse, quod iisce magnopere oblectetur,
 peculiari quadam dore; è contrario graui-
 ter olentia & fœtida, infesta; tamen ex
 quadam consequutione strangulatiui vte-
 ri sunt accommodata. Verùm in summa
 hoc loco pronuntiare poteris medica-
 menta calida in vtero esse vsurpanda, quia
 plerumque frigidis tentatur affectibus, &
 cum multorum recrementorum colluie
 impurum reddatur, amara erunt determi-
 nata. Idcirco Artemesia, Matricaria, Ne-
 peta, Sabina & consimilia vtero sunt ac-
 commodata, quia vterum calefaciunt &
 omnem impuritatem amarore suo expur-
 gant, paululum acria interdum adhiben-
 da, non quæ hac qualitate vincant, nam v-
 terem vellicarent, hinc acetum illi parti ad-
 versissimum est, eo tantum scopo vt pau-
 lulum acria & tenuium partium cum a-
 marore menses suppressos ducere valeant.
 In strangulatu vteri vt tanquam semimor-
 tuas excitare valeas, tritum & paratum est
 remedium halitum parare, & nidorem ex
 penis perdicis, linteolis corii portiuncula

vt nidorem excipiat mulier; assa fætida, castoreum naribus è propinquo admota suo graui odore vterus refugit: ne suffocatio opprimat singulare & præstantissimum est remedium, oleum ex gagate confectum, non modo naribus obiectum, sed etiam circa vmbilicum illitum mirificè succurrit, calore suo, materiam crassam & vaporem digerit qui halitu tetto furtim com meat ad cerebrum, eodem modo vt reliqua graueolentia auxiliatur; item eo tempore quo hoc diu exantur pathemate zybeti, ʒ. j. aut ii. intra collum vteri imponere cum bombace magni vsus erit, vt vterus odotis suauitate retrahatur, & subinde magis calore aromatico discutiat omnem vaporem crassum, huius mali præcipuam causam, vel fiat suffitus sequens de aromaticis calidis vterum recreantibus vaporem & humorem crassum discutientibus in strangulatu vteri.

℞. Cass. lignæ, Cinnamomi, an. ʒ. ii. aloes, thuris, an. ʒ. j. β. lauendulæ, ʒ. j. galliæ moschatæ, aliptæ moschatæ, an. ʒ. j. incorporentur, cum styrace liquida & fiant trochisci similes lupinis, quorum vnus ponatur super carbones accensos, & per traiectorium siue infundibulum suffitum intra vterum excipiat.

Illitus in strangulatu vteri, quo infricari poterit, intra vterum, calefaciens, & digerens.

℞. Olei nard. ℥. j. olei iriñi & de lilio, an. ℥. j. Misceantur, in quibus dissoluatur galliæ moschatae, ℥. j. quibus obstetrix experta inunctis duobus digitis fricet os vteri & totum collum sæpius.

Emplastrum pro strangulatu vteri, calefaciens & digerens, molliens & flatus discutiens.

℞. Massæ Empl. cheronei, massæ Emplast. pro matrice, an. ℥. j. oppopāicis, galbani, ammoniaci, an. ℥. ii. gummi dissoluantur, in vino misceantur super alutam, formetur emplast. rotundum & admoueat inter vmbilicum & pectinem.

Catapotia item exhibenda quæ sensim ducant pituitam & corroborent ventriculum & vterum.

℞. Mass. pillul. de hiera simpl. ℥. ii. agarici recenter trochiscati, ℥. j. cum succo artemisiæ, formetur pillularum massa, de qua sumat tres aut quinque iustæ magnitudinis, post
primum

primum somnum cum bono vitæ regimine
reliquum seruetur in vsum.

C A P V T X X I X.

EXtra vteri strangulatum ad præcautio-
nem semel in hebdomade pro diuitibus
aliquot grana moschi præscribere poteris, vel
parare iubeas efficacissimas pillulas de Mos-
cho à Mótagnana descriptas. In vfu item erit
in eo parthemate persanando enematis vti
calfacientibus, flatus discutientibus & pitui-
tam vacuantibus, ex hiera picra Galeni &
benedicta laxatina, horum singulorum, ad ʒ.
ʒ. ex typo ante præscripto enematum. Ad
corroborandum verò vterum, hoc electua-
rium molle exhibendum erit, calfaciens,
discutiens, corroborans vterum & ventricu-
lum.

℞. Confect. aromatici rosati in modum
Opiatæ ex descriptione Gabrielis, confe-
ctionis de Cinnamomo, an. ʒ. j. Cape ad
quantitatem nucis comestibilis, mane & se-
ro tribus horis ante cibum superbibendo pa-
rum generosi vini. Cæterum quando ex hoc
morbo mulieres exolutæ sunt, & vires mul-
rum deiectæ, portione cardiaca & hysterica
succurrendum erit.

Potio cardiaca & hysterica recalsfaciens corroborans & spirituum substantiam inuulgens.

℞. Syr. de artemesia, Syr. de pomis bene o-
lentibus, an. ʒ. j. confect. Alkerm. ʒ. j. si autem
fit quidam vapor perniciosus simul corrobo-
rando calefacere oportet, addere poteris the-
riacæ antiquæ & probatæ, ʒ. j. aquarum Bor-
rag. absynth. an. q. ʒ. Misce, fiat potio quam
sumat nullo præcedente vel sequente cibo
potu-ve tres horas ante cibum. *Animaduer-
tendum erit interdum calorem quendam acce-
dere & febrem nocturnam coniunctam esse, ob
id caue ne sis nimis audax in continuatu horum
medicamentorum calidorum, sed eum interponas
& dictorum calidorum dosim minuas, addere
poteris pul. diarrhod. abb. diamarg. frig. an. ʒ.
ʒ. ad caliditatem reprimendam in potione ante
prescripta minuendo dosim confectiois Alker-
mes & cum theriaca prescribere, ad ʒ. j.*

Pillule de Moscho, purgando & corroborando
vtero efficacissima sunt in strangulatu vte-
ri ad sanguinem menstruum etiam prouo-
candum & conceptum iuuandum.

℞. Se-

℞. Seseleos, rad. rub. tinctorū, pulegii, mediani corticis cassiæ fistulæ, medullæ granorum pœoniæ, calami aromatici, an. ʒ. iii. Moschi electi, ʒ. j. spicæ nardi, ʒ. ii. fiat pillularum massa cum succo artemisiæ, quando vero solutiuas efficere volueris, addes aloes non lote, si lenius purgare oporteat lote, ʒ. i. dosis erit ʒ. j. aut ʒ. iii. semel in hebdomade post mediam noctem vel in aurora prima luce oriēte, interim tamen caue ne eo tempore exhibeas quo est fluxus menstruus, & si febris aliqua sit coniuncta. Zedoaria in ore detenta insultum strangulatus uteri impedit, vel mansa vel deuorata.

℞. Conf. flor. rorismar. & confectionis Cinam. à Nicolao descriptæ, an. ʒ. j. conf. rad. Zinziberis & corticis citri cum saccharo conditi, conf. rad. Eringiorum, an. ʒ. ʒ. rad. Bautiæ & seminis eiusdem, an. ʒ. iii. fisticorum & pineatum mundatarum an. ʒ. ii. renum styncorum, ʒ. j. ʒ. pul. diamoschi & diambriæ, an. ʒ. ii. cum syrupo conseruationis corticis citri aut rad. zinziberis. an. q. ʒ. Misce, fiat in modum opiatæ de qua sumat ad quantitatem nucis comestibilis, mane tribus horis ante cibum superbibendo parum vini maluatici vel vini rubri clari diluti cum aqua Borrag. Caterum animaduertere oportet hoc electuarium molle

conferre illis ipsis mulieribus tantum quibus conceptus impeditur à frigida intemperie totius & uteri quando abundant multis mucosis excrementis, quæ seminis vim extinguunt & illos ad venerem & concubitus hebetes reddunt, quando vero ab intemperie calida mixta vel ichoribus acribus malum pendere solet, ex usu erit minuere dosim horum calidorum & puluerem diarrhod. abb. triasantali & diamarg. frigidorum singulorum, ad ʒ. ij. adijcere rasura Eboris, ʒ. j. ʒ.

Electuarium solidum conceptionem iuuans,
& menses promo-
uens.

℞. pul. diamoschi dulcis & diambrae, an. ʒ. j. interioris Cynnamomi electi. ʒ. ii. linguæ auis, id est, seminis fraxini & seminis seseleos, an. ʒ. j. redigantur in puluerem, qui postea excipitur cum saccharo dissoluto in aquis artemesiæ, & Borrage. an. q. ʒ. Misce, fiat in modum electuarii in tabulis ponderantibus, ʒ. iii. sumat tabulam vnam, mane tribus horis ante cibum superbibendo parum vini diluti, cum aqua Borrageinis alternis diebus. Si ex caliditate mali causa existat vtatur electuario diarrh. abb. eodem modo, vt dictum est.

Catapo-

SCD Lyon 1

*Catapotia quæ roborant, ventriculum, vterû
conceptum promouent.*

℞. Masse pillul. Elephanginarum, ʒ. ii. Cas-
siæ lignæ, linguæ auis, seminis seseleos, an.
ʒ. j. Quando menses mouere expediet rad. A-
zari, ʒ. ii. cum aqua arthemisiæ & absynthii
formentur pillulæ vi. pro drachma, capiat
tres per horam ante cibum semel aut bis in
hebdomade: Balneum & incessus calfa-
ciunt, vterum recreant, aperiunt, dilatant &
per vapores vterum expurgant ad conce-
ptum iuuandum & menses ducendos.

℞. fol. lauandulæ, lauri, origani, cala-
menti, pulegii, an. m. j. flor. arthemisiæ, ta-
naceti, rorimar. an. p. j. rad. seseleos, ligu-
stici, & linguæ auis, an. ʒ. ʒ. rad. valerianæ,
hypofelini & calami aromatici, an. ʒ. j.
styracis rubræ, ʒ. vi. fiat decoctio in media
parte vini & aquæ, ex qua fiat balneû tepe-
factum, quod ingrediatur mulier lauando se
ab umbilico ad pedes vsq; vel ex eadem de-
coctione calida in pelui vel vase reseruata,
sedeat mulier supra Cathedram perforatam
& sedens fumum hauriat.

℞. styracis rubræ & calamitæ, an. ʒ.
ʒ. linguæ auis, seminis seseleos pulueris,

flor. Thimi, an. ʒ. ii. calami aromarici, ʒ. ʒ. galliæ moschatae & aliptæ moschatae, an. ʒ. j. excipiantur ladano & fiant trochisci qui iniiciantur supra carbones accensos & mulier in cathedra perforata excipiat & hauriat fumum per infundibulum intra vterum.

CAPVT XXX.

Pessarium paruum in nuclei dactili formam conformatum, quod intra vterum iniicitur calfaciens, expurgans, roborans, vterum ad conceptionem iuuans.

ʒ. Croci ʒ. ʒ. Moschi, ambrae griseae, Xiloaloes, linguae auis, an. gra. iii. coaguli leporis, q. ʒ. fiant formulae similes ossibus dactylorum, ex quibus mulier subiiciat vnam in vtero tenendo tota die & nocte nisi quando se viro congeminare voluerit.

Pessarium quod recalfacit & expurgat vterum, & mollitiem omnem soluit, quae interdum est in vtero, adeo vt semen recte eiaculari non possit ad conceptum efficiendum.

ʒ. Galbani, opoponacis, an. ʒ. iii. Aloes
hepati-

hepaticæ & myrrhæ Electæ, an. ʒ. ii. ityracis liquidæ ʒ. j. cum succo mercurialis & pannis lineis inuolutis simul, fiat pessarium postea administrandum vtero repurgato quod calore aromatico & astrictione roborret & ad conceptum præparet.

℞. Gariophyllorum macis nucis moschatæ, thuris, mastiches, an. ʒ. ii. calami aromatici, nucis cupressi, an. ʒ. j. β. Mosci, gra. ii. Ziberti, ʒ. j. excipiantur coagulo leporis & pannis lineis simul inuolutis, fiat pessarium quod cum filo Coxæ alligetur & intra vterum immittatur.

C A P I T U M XXXI.

Ad menses autem educendo hoc medicamentum & quedam alia & præscribenda erunt, sed animaduertendum in hoc ipso serapio non alioqui miscenda medicamenta purgantia, nam purgando mensium educationem reuelleres, idcirco nulla neque mitiora neque vehementiora adicienda.

℞. Quinque rad. communium temperatarum in vino albo, non in aceto, rad. valerianæ & hipposclini, asari, cassiæ lignæ,

Eaulæ camp. rubiæ tinctorum, an. ʒ. j. glycirr.
 rasæ & parum contusæ in quibus caliditas
 quædam erit coniuncta. nam temperabit sua hu-
 miditate reliqua alia ingredientia, ʒ. j. ʒ. fol. ar-
 temisiæ, sabinæ, matricariæ, tanaceti, Vale-
 rianæ, summitarū thimi, an. m. j. Borriginis,
 Buglossi, cum propriis rad. & herbarum ca-
 pillar. an. m. j. ʒ. ad temperandum, nec illis ta-
 men deest partium tenuitas, Cichorii, endiuie
 tenellæ, summitatum fum. an. m. ʒ. seminis
 seseleos ligustici, apii. petroselini, an. ʒ. ij. se-
 minis anisi, fœniculi, an. ʒ. j. ʒ. quatuor sem.
 frigid. mai. an. ʒ. j. ciceram rub. p. j. prunorum
 dulcium, passularum mundatarum, an. par.
 xii. flor. genitæ, sambuci, rorismar. & stœca-
 dos, an. p. ii. trium flor. cordial. an. p. j. fiat Syr.
 perfectè decoctus, de cuius colatura capet ʒ.
 j. sacchari, q. ʒ. clarificetur & aromatizetur,
 cum puluere Cynamomi electi & pulu.
 diamoschi dulcis, an. ʒ. ii. augendus enim
 aromatum modus, non modo vt gratius
 assumatur, sed vt recreet vterum & men-
 ses educant, misce, reseruetur vsui, sumat
 ʒ. iiii. aut v. per se vel cum decoctione ci-
 cerum rubr. & mercur. quatuor aut quin-
 que horis ante cibum semel aut bis in heb-
 domade.

Pulvis

Puluis potenter ducens menses.

℞. Cynamomi electi, ʒ. β. rad. azari, valerianæ & hypofelini, an. ʒ. iii. trochiscorum de myrrha, ʒ. j. β. Croci. ʒ. j. sacchari ad pondus omnium. misce, fiat puluis secundum artem, de quo sumat cochlearia tria cum decoctione cicerum rubror. mane tribus horis ante cibum alternis diebus.

Pessarium quod menses educit.

℞ flor. thimi, tripheræ magnæ sine opio an. ʒ. ii. myrrhæ electæ, ʒ. j. β. moschi gra. ii. croci, ʒ. j. cum succo artemisiæ & nepetæ pannis lineis simul inuolutis, fiat pessarium cum filo coræ alligato, quod intra uterum immittatur.

C A P V T X X X I I.

AD conceptum retinendum ne intempestiue abortiat mulieri imperanda erit quies in primis cum animi tum corporis, vociferatio prohibenda & ea quæ menses mouent, in cibo & medicamentis, vt aromatica, acria omnia, apium petroselinum, crocus, vinum album colore fuluum, vinum aromatis.

Puluis qui astringit, corroborat & faciem retinet.

℞ Mastiches, macis, gariophillorum, an. ℥ ii. ras. Eboris, Margaritarum splēdidarum, coralli rubri, an. ℥ j. ꝑ. sacchari rosati ad pondus omnium, misce, fiat puluis de quo capiat cochlear vnum, mane & sero longè à cibo superbibendo parum vini rubri stiptici, præterea confert, vt sepius per interualla dierum sumat corticem citri cum saccharo conditum.

Emplastrum astringens, refrigerans, conueniens in his mulieribus quibus renes & vterus caliditate aestuant, vt de abortu periculum immineat.

℞ Terræ sigillatæ, sanguinis draconis, boli armenæ, an. ℥ ꝑ. acatiæ, hypocistidos, coralli rub. rad. Bistortæ, an. ℥ iii. nucum cupressi, ℥ j. Olei cydoniorum Myrtillorum, an. ℥ iii. Cerae albæ, q. ꝑ. reducantur ad formam massæ Emplastri de qua super alutam formetur Emplastrum quadratum & latum quod circa regionem dorsi admoueatur, ex eadem materia

ria alterum parari poterit, quod supra pectinem & vmbilicum figura rotundum emplastrum admoueat.

Emplastrum ad fœtum continendum in mulieribus, quibus renes & vterus ex frigidityate imbecilles sunt, calfaciens & astringens.

℞. Thuris, ladani, mastiches, ligni aloes, an. ℥.j. radic. Bistortæ & Baccarum Myrthi, nucum Cupressi, an. ℥.ss. massæ emplastr. de mastiche, ℥.iii. Ceræ, q.ß. fiat ad formam massæ emplastrii, de quo super alutam formetur debitæ quantitatis rotundum & latum, quod regioni lumborum admoueat eodem modo, vt antea dictum fuit.

Aliud superimponendum Rotundum inter vmbilicum & pectinem: in iis mulieribus in conatu puerperii grauiter laborantibus succurrendum erit iisce medicamentis, quæ fœtum excutere valeant, & secundinas interdum retentas deiicere. Medicamenta autem illa magnarum sunt virium & menses ducere solent, eximia vi tenuandi, incidendi & aperiendi, nec prætermittere debes cardiaca medicamenta, quæ spiritibus sub-

X

stantiam & calorem naturalem augent, vt viribus confirmatis facilius à puerperio liberari possint.

Potio qua foetum excutere valet & prægnantem roborare.

℞. Syr. de arthemisia & pomis bene olen-
tibus, an. ʒ. j. Confect. Alkerm. ʒ. j. pulu. Ari-
stol. rotun. & trochisc. de myrrha, an. ʒ. ʒ. ʒ. a-
quarum rubiæ tinctorum Borrage. & artemi-
siæ, an. q. ʒ. Misce, fiat potio quæ ex-
hibeatur tempore magni conatus, & deie-
ctionis virium, sumendo per duas aut
tres vices, sit interuallum ab vna ad alteram
vicem duarum saltem horarum: vinum aro-
matites per interualla bibere magni est vsus.
Nullum vehementius esse potest, nec ma-
gis idoneum ad educendum foetum quam
axungia serpentis ad ʒ. ʒ. exhibita cum vino
vel aqua rubea: Quædam bonæ matronæ
expertæ fuerunt, & nos semel tentare id vo-
luimus, idque cum fœlici successu, sed ne ti-
bi infamiæ notam inuras à cachinnis multo-
rum quibus solent medici affligi, si quando
ex illo remedio exhibito fœlix euentus non
succedat & infans moriatur, ideo prioribus
præsidis vtendum tibi censeo.

Balneum

Balneum quod ad educationem fœtus confert aperiendo vias.

℞. Althææ cum rad. fol. arthemisiæ, nepetæ, lauendulæ, an. m. j. flor. Chamæmeli & meliloti sambuci, an. p. ii. seminum lini & fœnugræci, an. ℥. ii. semin. feseleos, ligustici, an. ℥. ii. rad. Aristolochiæ, ℥. iii. fiat decoctio in aqua pluuiali pro balneo quod ingredia-
tur sero & manè, tepidè ab vmbilico ad pedes, deinde inungatur vnguento sequenti.

Vnguentum ad educationem fœtus relaxans, & molliens.

℞. Olei de lilio Chamæmelini, irini, an. ℥. ii. axungie gallinæ, butiri recentis, an. ℥. i. Muccaginis seminis psilii, lini, fœnugræci, althææ, an. ℥. ℞. pul. aristoloch. rotundæ. ℥. ii. Croci, ℥. j. Ceræ, q. ℞. quo inungantur lumbi, regio pubis & circumquaque ab vmbilico ad coxas.

In his quibus secundinæ retinentur, potio præscripta antea pro educatione fœtus præsentaneo remedio esse poterit, vel hoc modo.

℞. Succu calendulæ depurati, ℥. iiii. aquæ rubiæ tinctor. ℥. iii. pulu. carabæ, ℥. ii. Misce,

fiat potio quæ exhibeatur, quo tempore vrget hoc pathema nullo sequente cibo, nisi pauco vino saccharato & iusculis per tres horas post.

CAPVT XXXIIL

De Hernia.

IN Hernia secunda hisce medicamentis vtendum, quæ siccant, astringunt, vniunt & glutinant, quiete imperata ab omni vociferatione abstinendum, & iis quæ flatus generant: è medicamentis purgantibus illa tantum deligenda, quæ vel leniter purgant, astringunt & corroborant ventriculum.

Catapotia ventriculum corroborantia, vel minimum enacuantia pituitam & bilem, quæ in viis ductuum occurrit.

℞. Mass. pill. è bdellio Elephanginar. an. ʒ. j. ℞. Mastiches, ʒ. ss. cum aqua absynthii. Si homo sit temperamento bilioso interdum cum succo vel miua Citoniorum. formentur pillule vj. pro drachma, sumat tres per horã ante cibum semel aut bis in hebdomade, frequens vsus mane esse poterit pulueris herniariæ herbæ,

herbæ, ad ʒ. β. cum vino albo diu continuando, vel hoc puluere composito æger vtatur.

℞. dictæ herniariæ, pimpinellæ, osmundæ regalis & symphiti petrei, an. ʒ. ij. Macis & raluræ eboris, an. ʒ. ij. mastiches, ʒ. j. sacchari rosati ad pondus omnium. Misce, & fiat puluis secundum artem, sumat mane tribus horis ante cibum.

Electuarium molle, corroborans, astringens & vniens.

℞. Confer. rosar. antiquæ, conf. Symphiti, corticis citri saccharo conditi, an. ʒ. j. iaceæ albæ & nigræ, fol. symphiti, flor. eiusdem & herniariæ, an. ʒ. iii. boli armeni, Rhabarbari torrefacti, an. ʒ. ii. Macis, ʒ. j. cum Syrupo conseruationis Myrabol. Emblicarum, fiat in modum opiata, de qua sumat ad quantitatem nucis, mane tribus horis ante cibum alternis diebus superbibendo vinum stipticum, rectè miscere poteris Mirabolanorum conditorum pro diuitibus ʒ. j.

Fotus qui habet vim siccandi & astringendi.

℞. Summitatum lentisei, fol. Oleastris,

lymphiti & herniariæ. an. m. j. pſidiæ Balauſtiorum acaciæ & hypociftidos, an. ʒ. ii. vitrioli, aluminis, an. ʒ. ʒ. ʒ. fiat decoctio in duabus partibus aquæ chalibeatæ & vna vini ſtiptici, ex qua cum ſpongiis tepidè foueatur locus affectus abvmbilico vſque ad ſcrotum ſero & mane continuandø per hebdomadam quieſcendo, tandem ſequens emplaſtrum admoueatur.

℥. Maſſ. empl. contrarupt. ʒ. iiii. emplaſt. de Maſtiche, pulu. herniariæ, terræ ſigillatæ, ſanguinis draconis, lapidis Magnetis, tamerſi hoc medicamentum à quibuſdam vanum videatur improbantes, quod vim attra-hendi non habeat niſi ferrum, non perito-riæum diſciſſum aut relaxatum quibus ſane id concedendum eſt, ex rei natura perſpecta & intellecta, nihilominus tamē illis reſpon-dendum eo modo proficere, vt inſigni ſua ſiccitate omnem humiditatem exhauriat ob id contrahendo vniat, ʒ. j. ʒ. ceræ & there-bentinæ parum, manibus inunctis oleo cito-niorum, fiat maſſa emplaſtri, ex qua ſuper a-luram aut pellem arietinam foimetur em-plaſtrum debitæ quantitatis, quod loco her-nia affecto commodè admoueatur cum ſub-ligaculo & faſciis vndique ſecundum artem admotis. Alternis nouem diebus renouari poterit emplaſtrum,

De Arthritide.

IN Arthritide sananda varia est remediorum forma quæ à nobis vberius fuit expressa in peculiari tractatione arthritidis. Nunc quædam præcipua vsualia, vt appellant, & præsertim topica ascribentur, animaduertendum præterea erit præteriam dicta multa esse in electuariis mollibus, & solidis, & catapotiiis, & potionibus pro affectibus capitis, & neruorum antea commemorata, & accommodari posse tuto in articulorum doloribus clamosis, quando doloris acerbitas, & tormentum adest.

℞. Syrup. de pap. Syr. de rosis ficcis, an. ʒ. j. pul. diamarg. frigid. ʒ. j. aquar. viol. lactuæ & plant an. q. s. Misce, fiat potio quam sumat ingruente somno nullo præcedente & sequente cibo aut potu per tres horas.

Catapotia in dictis doloribus à materia calida, quæ sedant dolorem ex opio bene represso.

℞. Myrrhæ, castorei, an. ʒ. j. styracis calamitæ, croci, an. ʒ. j. opii. ʒ. s. cum succo consolidæ formentur pillulæ paruæ,

capiat tres ingruente somno semel aut bis in hebdomade, quando instabit fluxio, quæ dolorem mouere incipiet, vel etiam præsentis doloris insultu in primis conducet horum assumptio. Topica præsidia quæ in anhrithide calida admouentur in superiori parte dolentis particulæ ad repellendum materiam fluentem, & quædam ex iis super locum doloris ad mitigationem superimponuntur, & de illis iam primum agamus, vt si dolor sit in pede applicabis in crure, quod tibi perficiendum non erit, nisi minorata fuerit materia, vel per venæ sectionem, vel per vomitum, vel per pharmacum, & cum hoc etiam diuertatur materia ad partem oppositam, vt per frictiones, nam si admouentur ante minuentia præsidia & humor sit multus, pertimescendum ne humor peruaderet ad aliquod nobile membrum, vnde insignis noxa sequeretur & propinquum exitium. Itaque facta humoris subductione in materia calida repellatur, vt sequitur & apponatur in superiori loco particulæ dolentis.

℞. Olei Myrtillorum, rosarum & citoniorum, an. ℥. ii. Boli armeniaci, terræ sigillatæ, an. ℥. β. Myrtillorum, sumach, an. ℥. ii. Misce, fiat linimentum, quo leniatur pars superior particulæ dolentis addendo aceti,

℥.j. utatur ut dictum est, vel hoc modo.

℥. Vnguenti populeonis, ℥.iiii. boli ar-
me. terre sigill. an. ℥.iii. Myrtillorum, ℥.ii. Mi-
sce, cum albumine ouorum & aceti, ℥.j. ap-
plicetur, ut supra.

℥. Cerusæ, ℥.ii. boli armeni, ℥.j. Misce,
cum oleo rosaceo & albumine ouorum, fiat
linimentum addendo aceti ℥.j. utatur, ut di-
ctum est.

C A P V T X X X V.

AD mitigationem doloris, tribus scopis
curationem contineri animaduerten-
dum est, primo ut fluxus prohibeatur; se-
cundo, ut dolor sedetur; tertio, ut id quod
effluxit, & in parte impactum est, digeratur
& resoluatur: primus verò iam perfectus
est, de secundo agendum nobis erit. In do-
lore mitigando & sedando à causa calida,
animaduersione dignum est, quod in hac
doloris mitigatione à causa calida utendum
est temperatis, vel accedentibus parum ad
frigidityatem quoad fieri poterit, prætermi-
tenda autem vehementer frigida, nisi prius
euacuata materia, vel per venæ sectionem,
vel per vomitum. Quare prius aggre-
dienda doloris mitigatio ab huiusmodi

lenioribus & clementioribus medicamentis hoc modo.

℞. Cassiæ recentis extractæ, ℥. ii. dissoluatur in aqua plantag. vel rosar. fiat linimentum quo illiniatur locus doloris, vel sic.

℞. far. hordei, vitellum oui & fiat in modum cataplasmatiss, quod supra locum doloris admoueat. Hæc autem imponi debent actu frigide, & cum incipiunt calefieri auferantur, vel hoc modo in intemperie multum calida.

℞. Mucraginis, seminis psilii extractæ cum aq. ros. vel plantag. ℞. j. illiniatur locus doloris frigide si sit vehemens calor, addatur parum aceti, vel fiat sic.

℞. Cerusæ, ℥. j. ℞. cum aqua end. fiat linimentum, quo illiniatur locus doloris. Est notandum quod in Arthritide medicamentum sæpius mutari debeat & variari, quibusdam natura membri assuefacta est medicamento aliquo non vitur tanquam medicamento, sed familiari, & sæpe vnum confert vna hora & altera nocet, quò fit vt eo tempore indicium sit diuersæ materiæ.

Opiata medicamentum admodum sumimus ardor est, & doloris vehementia multum affligit, hoc modo.

℞. vi.

℞. Vitellos ouorum duos, croci, ℥.j. opii,
 ℥.ii. olei ros. parum, fiat linimentum pro lo-
 co doloris, vel sic.

℞. Medullæ panis remollitæ in lacte vac-
 cino, vel caprillo, vel ouillo ℥.j. pistetur
 addendo olei rosacei. ℥.ii. croci, ℥.iiii. opii,
 ℥.j. β. fiat catapl. & frigidè applicetur su-
 pra locum, & cum incipit calefieri auferatur
 & non permittatur exsiccati, nam alioqui
 augetur dolorem, & ad prohibitionem exsic-
 cationis superimponat folium caulis vel fi-
 clæ. *Mitigatio autem doloris in materia frigida
 vel mixta, frigida vincente, fiat hoc modo.*

℞. hermodact ℥.j. far. hordei. ℥.ii. hermo-
 dactilus est theriaca doloris iuncturarum quod
 dolorem sedat, tum intra, tum extra, Croci, ℥.j.
 vitellos ouorum, n.ii. cum oleo rosaceo, fiat
 cataplasma super locum doloris; vel sic.

℞. Medullæ cassiæ recenter extractæ, ℥.ii.
 dissoluatur cum oleo calente, & fiat linimen-
 tum pro loco doloris: *Nota in causa calida,
 cassia dissoluitur cum oleo simplici, vel rosar. vel
 aqua plant. & in materia frigida cum oleo
 calente, vel sic.*

℞. Rapam tostam cum axungia porci,
 cataplasmatice vice admoueaturo loco doloris
 cum caulibus recentibus pistatis, & calidè
 locus illiniatur cū sanguine leporis qui mul-
 tum in hoc affectu est accommodatus, vel ita

℥. Cineris leporis in furno exsiccati, & cum axungia porci admoueaturo loco doloris, vel inungatur oleo anethino, vel calente simplici calidè actu, & *his non est utendum in calidis, sed cum materia plus æquo frigida est.*

℥. fœnugr. conuassati, p.j. coquatur in aqua & aceto quousque fiat muccago, deinde addas mellis q.ß. fiat in modum cataplasmatismatis, & loco dolenti admoueaturo, & *hoc confert in materia mixta vel frigida, vel sic fiat, quod magis confert in materia frigida.*

℥. Succi Ebuli, ℥.iii. hermodactilorum ℥.j. axungia porci q.ß. Emplastretur locus doloris.

C A P V T X X X V I.

De arthritide à causa frigida.

IN Arthritide à causa frigida, ex usu erit per interualla temporum assumere theriacam antiquam & probatam, ad ℥.iiii. quinque horis ante cibum semel aut bis in hebdomade superbibendo parum vini diluti cum aqua Betonica aut Iuxæ arthericæ. Item Carapotia vsualia: quæ sensim repurgant cerebrum & materiam pituitosam ad nervos confluentem, hoc modo.

℥. Massa
SCD Lyon 1

℞. Massæ pill. assaiaret ʒ. j. ꝑ. hermodactil. ʒ. j. agarici trochiscati, ʒ. ꝑ. trochiscorum alhandal. gran. iiii. cum aqua Luæ arthetice formentur pillulæ vii. pro drachma, capiat tres in ingressu lecti quatuor horis post cœnam, vel post mediam noctem cum probō vitæ regimine, semel in hebdomade ad præcautionem, eo tempore quo doloris insultus non affligit, circa tamen declinationem paroxysmi, interdum tentare non erit alienum. Cæterum in arthetica passione à materia frigida, id quod in parte impactum est ex alto trahendum atque euocandum erit, & hoc modo fiat vesicatorium, vt Rhafis notauit, cum sicibus & synapi & Emplastri modo pro vesicatorio imponatur articulo dolenti, & factæ vesicæ aperiantur, & extrahatur aqua, vel fiat vesicatorium cum apio risus, quod à multis laudatur plurimum: cum cantaridibus, abiectis capitib. & alis & fermento. Repulsiuum autem in materia frigida quoddam superiori parte ponatur nemateria ad locum doloris fluat, hoc modo.

℞. Corticis vlmi m. j. caudæ Equinæ, stœcados Arabicæ an. m. ꝑ. aluminis rochæ. ʒ. j. fiat decoctio in vino stiptico rubro, & aqua chalybeata, & cum linteis calidè epithemetur pars supra articulum dolentem.

IAm veniendum est ad resolutionem, & tria sunt obseruanda, primò resoluerè materiam, secundò vt quæ aliquantulum est indurata emolliatur, tertio quæ est magis in gypseam conuersa emolliatur & discutitur: primò agendam est de materia, nondum conuersa in gypseam, & in materia minus calida, pharmaca non debent adeo calida esse, vt in œdemate, hisce præfidiis sequentibus.

℞. flor. chamæmeli, meliloti, sambuci, fol. ylini, an. m. j. s. seminis iuniperi, ʒ. iii. fiat decoctio in vino rubro & cum spongiis, fiat fofus in locis læsis, vel cum dicta decoctione lauentur partes affectæ, sero & mane, & mox facta lotionè & fofu applicentur sequentia.

℞. Olei Costini, castorei, cheirini, an. ʒ. ii. Misce, illiniatur locus læsus calide post fofum mane & sero, vel

℞. Axungie gallinæ, ʒ. iiii. cineris caulium vel brassicæ, ʒ. j. fiat linimentum quo illiniatur locus læsus, vel sic.

℞. Olei Chamæmelini, anethini, quando materia est multum tenuis, olei de lilio, an. ʒ. ii. Muccaginis, lini & fœnugræci, an. ʒ. j. s. farinæ seminis, lini & fœnugræci, an. ʒ. s.

℞. Misce,

Misce, fiat linimentum quo illiniatur locus læsus vt supra, vel sic.

℞. flor. anethi, farinæ seminum, lini & fœnugr. an. partes æquales, & cum succo caulium fiat cataplasma quod loco admoueat. Brassica habet maximam proprietatem hoc morbo, vel ceratum fiat.

℞. Diachilonis ireati, ℥. iii. aut iiii. dissoluatur in oleo Chamæmelino, & admoueat in loco dolenti, & hoc pro materia non multum calida.

C A P V T X X X V I I I.

Pro materia frigida resoluenda.

℞. Olei irini, olei veteris, an. ℥. iii. Euphorbii, ℥. ii. ℞. cum pauca cera fiat vnguentum, vngatur locus calidè mane & sero, vel sic.

℞. rad. ebul. ℞. j. pulpæ hermodact. ℥. ii. a-xungia galliæ ℥. iii. fiat vnguentum, & vngatur locus dolens calidè, vel sic.

℞. Emplast. cheronei ℥. ii. emplastri descriptione philagri, ℥. j. ℞. bdellii, ammoniaci dissolutor. in oleo d. lilio, an. ℥. ℞. Misce, fiat Emplast. pro locis dolentibus, vel sic, quod plurimum laudatur.

℞. Olei dulcis, ℞. j. Euphorbii, ℥. j. Castorei, ℥. ii. Cera, q. ℞. fiat vnguentum,

quo inungantur loci affecti. Aliquando omnibus istis non resoluitur, quia materia indurata est, & tunc est vtendum emollientibus pluribus mixtis cum resoluentibus. Igitur hoc modo.

℞. Axungia anseris & gallinae, an. ℥. j. β. olei Chamæmelini de lilio & costini, an. ℥. β. Muccaginis sem. lini & fœnugraec. extractæ in aceto, an. ℥. ii β. Cum cera, fiat vnguentum quo inungatur locus læsus calidè, vel sic.

℞. Vnguenti è bdellio Mesuæi, ℔. β. vngantur articuli loco illius vnguenti philagri.

℞. Emplastr. de melleoto diachilonis magni, an. quartar. incorporentur cum oleo de lilio & fiant Emplastra pro locis læsis. vel

℞. Vulpem depilatam & euiscerata[m] vsque ad ossium separationem in vino, deinde ablatis ossibus caro exprimitur & liquor qui inde exit cum vino bulliat. quousque reducatur ad formam vnguenti, & tunc addatur Castorei, bdellii, mastiches, myrrhæ, ammoniaci, an. ℥. β. fiat vnguentum quo inungantur loci affecti: & est de materia indurata, sed nondum ingipfata. Quando est ingipfata, id est, nodosa, primo remollientibus, deinde

dige-

digerentibus & iterum remollientibus, interdum curandi ratio perficienda erit, vel sunt simul miscenda emollientia cum resoluventibus, quamuis possimus errare in administratione tum remollientium, tum resoluventium.

℞. Maluæ, bismal. cum radicibus, an. m. iii. iuæ artheticae, flor. saluix Chamameli, sambuci & rorismar. fol. vlmī, *quæ plurimum commendantur*, an. m. ii. fiat decoctio in vino qua lauentur loci affecti vbi est materia gypsea mane & sero quousque quidam appareat rubor & deinde:

℞. Olei amygdal. dulc. de lilio, irini, an. ℥. ii. axungia anseris & gallinae, an. ℥. j. Muccagin. seminis psilii, lini extractæ cum aceto, an. ℥. vi. cum cera fiat vnguentum quo vngatur prius lotionē facta, mane & sero spatio quatuor dierum continuando, postea lapis pyrites siue Marcasites, vel Molaris accendatur & aspergatur acero, capiat fumum & deinde lauetur aceto calido decoctionis flor. sambuci spatio duorum dierum, *deinde vtendum remollientibus, futurumque est paulo tempore vt resoluatur quod longo tempore est remollitum, deinde redeat ad remollientia supra & resoluentia veluti per circuitus. Non est tam diu resoluventibus quam emollientibus vtendum, quoniam materia facile induratur, vel*

fiat hoc modo quando curari poteſt ſine vlla remollitione vt per vnum medicamentum compleatur vtraque intentio, vt ſcripſit Rhaſis nono ad Almanſorem.

℥. Caſei veteris partes duas, ſeminis nalturtii partē vnam, pulueriſentur & incorporentur cum decoctione pedum porci ſale conditorum coctorum quouſque conſiſtat ad quandam muccaginem, fiat cataplaſma & loco gypſeato adhibeantur, vel hoc.

℥. Caſei veteris ad quantitatem ſufficientem & cum oleo communi, fiat cataplaſma & loco gypſeato adhibeatur, vel ſic.

℥. Caſei vetuſtiſſimi quod ſatis eſt, & cum axungia porci ſalita & decoctione ſalitorum pedum porci, fiat cataplaſma. Iſta cataplaſmata à Rhaſe laudantur, radix ricini contrita & emplaſtri modo impoſita articulis maximi eſt etiam vſus.

C A P V T X X X I X.

De morbo gallico.

MORBI parthenopæi curationem tribus remediorum formis perficere poteris, dixta vt appellant, inunctione, ſufficis. Dixta autem eſt yitz lex exquisi-

ta, quæ in assumptione quorundam medicamentorum instituitur, vt ex scobe & ramentis Ligni guaiaci, vel ex radice schinæ, vel ex rad. falsæ parigliæ nuperrimè inuentæ vel safaphras. Quidam pro guaiaco substituere voluerunt ramenta buxi, sed re vera viribus non respondent, vt deprehendere licet ex sapore buxi: cum enim amarorem non præ se fert, vt expurgare valeat, nec etiam acrimoniam, vt humores crassos & lentos incidat extenuet, imò verò est participes stipticæ cuiusdam substantiæ, vt ex sapore acerbo deprehenditur, ob id ad sudores proliciendos minus efficax, addas licet euentum infœlicem neque optatum, vt sudores non probè commoueat, neque expurgando morbum curari posse plane obseruabis. Quidam audaces fuerunt, vt ad aliud transfirent remedii genus quod æquare voluerunt guaiaci decocto, ex iuniperi ligno quod sane amarore & acrimonia valet, id tutum non est, ac periculosum & suspectum esse debet medicamentum, vt legere licet in quibusdam Dioscoridis Exemplaribus, Ramenta, inquit, iuniperi deuorata interficiunt, eam igitur ob causam non expediet eo vti medicamento. Inter celebria radix chinæ præsentis

est remedio & utilis biliosis & ficcis' naturis atque delicatis. Hæc autem radix nullo alioqui sapore est prædita, idcirco ἀπύρος dicta, vt tantum insita virtute huiusmodi perniciem abigat, euentus ipse confirmat, nisi curiosius rationem exquiras, quæ est eiusmodi, vt ficcitate solum valeat, ob id humores absumat, vrinas & sudores proleciat, vt aqua fabrorum ferratorum siccitate splenem minuit, eo modo hoc genus remedij, non alia euidenti qualitate auxilium affert; in primis dabis operam, vt si optato & felici euentu potiri volueris ea deligatur, nullis teredinibus exesa, sed vndique facta, nã facile eiusmodi teredine & perforatione corrumpitur & tabescit, idcirco multos curare non potuit, eam ob causam multi curiosi prætulerunt suberis taleolas, & pro eadem chyna substituunt, cum aliquo euentu, sed reuera dum modum substantiæ in se non habet neq; agendi efficaciam, ideo tale medicamentum vanum & curiosum prætermittendum potius erit. Peracta igitur vniuersali purgatione interquiescat ab omni vsu medicamentorum trium dierum intervallo in loco clauso & conclauis ludis & luscinis animum recreet, deinde ad dietam se comparet, eo vitæ regimine, vt ad omnibus elixis abstineat, euchimis vtatur eduliis, as-

lis pa-

fis, pane asso, uuis passis, vinum alioqui huic
 malo perniciosissimum esse solet, permittunt
 tamen quidam, vt se obsequiosos præstent
 medicos potius quam frugi & sanitatis cu-
 stodes, vinum Olygophorum secunda deco-
 ctione dilutum, chinae temperatum, ex vsu e-
 rit, sed satius est ne humores fusi in neruo-
 rum spiracula descendant à vino abstinere,
 nisi tam insignis & inopinata virium exolu-
 tio derepente subsequatur, huius vel mini-
 mum concedendum, donec vires ad prio-
 rem & naturalem statum redeant. In declina-
 tione potius vsurpandum quo alio diætæ
 tempore interea dum diætæ instituetur ad
 xx. aut xxx. quibusdam salubriter ad xl. pro-
 trahi potest dierum intervallum. Dum aluus
 erit constipata semel aut bis in hebdomade
 enema leniens & emolliens subiici poterit,
 vel semel in hebdomade exhiberi potio po-
 terit ex Catholiconis, ℥. vi. Syrup. rosarum
 sol. ℥. ii. cum aquis Borrag. & capil. ven. an. q.

s̄ sumat mane quatuor horis ante ci-
 bum, sine assumptione eius-
 dem chinae, eo solo die
 prætermittat.

Y 3

CAPVT XL.

℞. Rad. chinæ transuersim in talleolas dissecta, ℥. ii. Coque in ℔. x. aut xii. aquę laudati fontis lento igne ad consumptionem tertię partis aut quartę, deinde sub cineribus calidis in ampulla vitrea vsui referuetur, sumat mane hora quinta, ℥. viii. calide, deinde stragulis bene inuolutus & coopertus sudor proficiatur, citra tamen insignem molestiam & virium deiectionem probè se abstergendo: si æger obsequatur & vires ferre valeant circa vesperam dictam decoctionem ad ℥. v. aut vi. exhibere etiam poteris vtiliter, melius enim id fit in hac diætā ex chyna quā ex guaiaco, quia longè suauior & gratior est, neque fatigat sudoris largiore profluuiō, neque exsiccāt tantopere, quia verò diætā commouet sitim vt huic obuēniamus:

℞. Facem decoctionis præcedentis si sumptus ferre valeat æger, vt potio sit magis medicamentosa addere denuo poteris, ℥. iii. eiusdem radicis chinæ recentis in ℔. xvi. aquę, fiat decoctio ad consumptionem medię partis, ad gratiam saporis addere poteris delicatis sacchari puriss. ℔. j. & vt aromate suauior reddatur pulueris Cinnamonomi

namomi electi, ʒ. j. pulu. fantali citrini, ʒ. ii.
per colum medicum sepius transfundatur, &
omni hora loco potus vratur.

CAPVT XLI.

De Dieta ex guaiaco.

IN affectibus frigidis & naturis pituito-
sis, diæta ex guaiaco maxime salutaris
est, nec non biliosis modificata & modo
lues venerea ea sit, quæ insita virtute hu-
ius medicamenti sanatur, quamuis calidis
& siccis officere videatur, nihilominus e-
mergit emolumentum maius quam in-
de sequatur detrimentum, cum præterea
possimus reprimere caliditatem guaiaci
multa aquæ perfusione & quibusdam ad-
ditis frigidis tenuium partium, vt endi-
uia, Cichorio, quatuor semin. frigid. mai.
& iis quæ abstergunt refrigerando, vt
hordeo & fructibus dulcibus, qui humi-
ditate leniente siccitatem corrigunt. Cæ-
terum nonnulli, vt plurimum solent gua-
iacum excoquere cum vino albo, vt poten-
tius sudores promoueat, sed id sine vl-
lo diorismo moliri solent, nam calidis
& siccis naturis intrepide exhibent, hinc

fit vt plus æquo incalescant. At in frigidis naturis crassis & obæsis & in quibus crassa & lenta est materia decoctum guaiaci ex vino albo tenui & aromatico est aptissimum, vniuersim tamen si velis guaiaci vim in liquorem deponi, nullus alius melior & aptior esse potest, quam aqua pura & syncera, quia est seminarium omnium medicamentorum; & cum huiusmodi sit *ἀπορία*, id est qualitatis expers, facile omnes medicamentorum facultates recipit & subinde non immutat, nisi quod eo scopo tēperet caliditatem guaiaci, idcirco plus adiiciendum erit aquæ, quando exhibere volumus biliosis naturis, sicque simplici guaiaco & corticibus eiusdem vtēmur, nisi quod aliquando adiicienda sunt, quæ sudorem valentius moueant, vt radix ciclamini, vel quæ infarctū liberant, vt radix Enulæ campanæ, vel quæ propria & insita virtute, illi morbo sunt contraria, vt folia & semen cardui benedicti, quando verò in affectibus frigidis, diætā ex guaiaco paramus, vtiliter adiaci poterunt varia, quæ ad sanandos affectibus necessaria sunt, vt in affectibus thoracis asthmate glycirrizam, dulcia & lenientia: in affectibus neruorū & articulorum. rad. acori primulam veris & hermodactilos: Ad conceptum iuuandum in scæminis artemisiā, matricariam & semen fraxini se-
selcos

seleos & ligustici, interim cauendum est, ne illorū abutū sequaris, qui in eodē decocto intermiserunt medicamenta purgantia, quod Empirici non verentur factitare, vt etiam vna purgent, sudores moueant, quod à ratione plane est dissonum, vt euentus infelix conmonstrat: nam plerumque fit, vt in marasmum adigant agrotantes impune, vel morbum non sanent, tophos & nodos relinquunt: cū in sudoribus mouendis & purgatione magna violentia naturæ fiat, viresque magno opere conuellantur, quod in partibus internis delitescit per sudores ad externas partes euocatur: purgantia verò contrario motu agunt ab externis ad internas; attamen si voles, vel extra diætā, vel in remedio diætæ tempore decoctionem ex guaiaco parare in qua sint medicamēta purgantia, nihil repugnat leuiora imbellicioribus, vehementiora robustis pro vario humore expurgando: cum guaiaco purgantia vtiliter miscere poteris, nam guaiacum tametsi sudores moueat, purgatorium sic effici solet & eo tempore ad tres vel quinque dies exhibere poteris, citra tamen sudoris motionem aliquam, & ita parabis.

℥. Ligni Indici, ℥. j. corticis eiusdem, ℥. iiii. coque lento igne, in vase bene obturato in ℥. xii. aquæ ad consumptionem tertiæ partis vel quartæ ex qua sub cineribus calidis bene reſeruata dabis mane hora quinta, ℥. viii. calide deinde ſtragulis bene conſectis ſudorem mouebis, citra tamen inſignem moleſtiam, probe poſtea ſe abſtergendo, interdum in iis qui ferre eam valent & in quibus ſudores mouere continuo expedit ſub veſperam eiusdem decoctionis exhibere poteris, ℥. v. & ſic eſt diæta paranda ex guaia-co & cum permixtione aliorum medicamentorum ſic.

℥. Ligni ſancti. ℥. j. cortic. eiusdem. ℥. iiii. Coque lento igne in ℥. xii. aquæ bene obturato vaſe addendo glycir. raſæ & parum con- tuſæ, ℥. j. rad. ciclaminiſ, acori, enulæ Camp. an. ℥. ſ. fol. card. bened. Beton. & primulæ veris, Borrage. Bugloſſi cum rad. & herbarum capillarium, an. m. j. *ſi temperare caliditatem expediet, addes Cichorii Endiuia ad lentos expurgandos humores & propter neruoſos affectus, granor. pœonia, an. ℥. iii. ſem. anifi & fœniculi, an. ℥. ii. quando temperare voles caliditatem ſequentia dantur, quatuor ſem. frigi. maior. an. ℥. j. ſ. hordei mundi, p. j. prunorum dulcium, paſſularum mundatarum, & ſe- beſten. an. par. x. trium ſorum cordial. an. p.*

j. ad

j. *ad sudores mouendos* flor. genistæ sambuci *pro affectibus capitis & neruorum*, flor. stæcados & rorismar. an. p. j. *pro affectibus articulorum*, hermodactilorum, ℥. j. fiat decoctio ad consumptionem tertiæ aut quartæ partis de qua exhibeatur eodem modo vt dictum est.

℥. fœcem decoctionis prioris vel posterioris, coques in ℔. xv. aquæ, addendo sacchari ℔. j. *propter amarorem* ad consumptionem dimidiæ partis, aromatizetur cum puluere Cynamomi electi, ℥. iii. *& pro affectibus cerebri & neruorum loco illius* cum puluere nucis moschatae, ℥. ii. *quando temperare volueris* caliditatem, & miscere poteris puluerem santali citrini, ℥. iiii. per colum medicum sæpius transfundatur, ex qua decoctione loco potus vtatur omni hora pro arbitrio.

CAP V T XLII.

De Sarcaparilla.

Dietam ex sarcaparilla hic non ascribam, quia frequentata non est, neque adeò à nobis probata, semel tantum

experta, ita vt euentus foelix non successe-
rit, de fuffitu nihil agam, quia diutius non so-
let in corpore confiltere, & plerumque in
tabem multos præcipitat, & quia Empirico-
rum magis est, quam medicorum dogmati-
corum; idcirco lubens prætermittere volui.

C A P V T X L I I I.

De inunctiõne hydrargiri.

Inunctiones hydrargiro & multis calorifi-
cis medicamentis simul mixtis inter om-
nia medicamentosa præsidia pro lue venerea
sananda efficacissima esse plerumque exper-
ti fuimus, adeo vt quos diæta ex radice Chi-
næ & guaiaco curare non potuerat, hoc po-
stea adhibito præsidio, ex toto reualuerunt,
nec audiendi quidã indocti Medici, qui hoc
remedij genus infamant; id puto ab illis cõ-
missum propter temeritatem & imperitiam
Chirurgicorum & Empyricorum, qui inun-
ctionem intempestiuè & sine arte admini-
strabant, neque hydrargiri vim perniciosam
corrigere intellexerunt, idcirco male curati
permanserunt; peractis itaque vniuersalibus
purgationibus, quibus vlcera & pustulæ po-
tissimum

tiffimum apparent, inprimis necessaria; nec inutilis quibus articulorum dolores adfunt ex lue venerea & rophi, nam & reficcat, & discutit, & emollit & peculiari virtute illi malo repugnat, vt euentus confirmat.

℞. Axungia porci liquefacta, ℞. j. Mercurii in aqua salviae extincti, ℞. viii. styracis liquidae, ℞. ii. Medullae cervi & cruris vaccae, an. ℞. j. β. Therebintinae in aqua vitae lotae, ℞. iiii. axungiae gallinae, anseris & anatis, an. ℞. j. olei de spica nardi, laurini, an. ℞. iiii. olei naccini, irini, an. ℞. ii. olei Chamamel. lumbricorum, an. ℞. vi. aquae vitae, ℞. vi. thuris, Mastiches, an. ℞. j. ceruae lythargiri, an. ℞. iiii. resinae pini, ℞. iiii. Euphorbii, ℞. β. vitrioli albi, ℞. v. Misceantur, simul & fiant in modum liniamenti secundum artem, quo inungantur vertebrae dorsi & partes vlcerebus herpetibus obsessae & sub vola pedum. Cauendum tamen a partibus principibus: primo sensim, deinde mediocriter, postremo vehementer, vequento manibus infricare oportet. Neque vero initio vehementer faciendum erit, ne quod tenue est dissoluatur, quo crassum est remaneat & difficulter discutiat, idque semel tantum in die hora sexta mane, deinde singulis vicibus inunctiois ex refrigerantibus inungatur regio hepatis ne ex caliditate inunctionis plus a quo recalefiat hepar.

Ad hepar.

℞. Cerati santalini, ℥. iii. spicæ nardi, gran. iiii. fiat vt dictum est, & vt pernicialis vis hydrargiri reprimatur, & ne inueteratis præcipuis visceribus feminaria quædam malæ qualitatis relinquat electuario sequenti cardiaco cum aquis stillatitiis vt expediet.

℞. Electuarii diamargar. frig. ℥. ii. sumat tabellam vnã singulis diebus inunctionis, tribus horis ante cibum superbibendo parum de aquis sequentibus.

℞. Aquæ cardui benedicti, Borragin. & capil. ven. an. ℥. iii. Misce, fiat vt dictum est, vel hoc modo aliud vnguentum parari potest.

℞. Axungie porci liquefactæ, ℔. j. Mercurii aqua saluie extincti, ℥. vii. bdelii, opoponacis, galbani, sagapeni dissolutorum in aqua vitæ, an. ℥. j. resinæ piæ liquefactæ, ℥. iiii. thuris, Malliches. an. ℥. j. Euphorbii ℥. j. s. Cinabaris, ℥. iii. lithargiri, cerusæ, minii an. ℥. ii. olei Chamameli, Amblicorum, de spica & laurini, an. ℥. iiii. olei

olei rutæ, ℥. j. vnguenti dialtheæ ℥. ii. Mī-
ſceantur ſimul & fiat vnguentum ſatis li-
quidum quo vtatur, eo modo omnia ad-
miniſtrando, vt antea dictum fuit: ad
quinque vices inunctio fieri poterit æſti-
mato virium robore, nam interdum qui-
buſdam vires concidunt poſt tertiam in-
unctionem, ideo quieſcendum eſt vna die
interpoſita: Si vires denuo redeant, ad v-
nam & alteram tranſeundum erit: ſi mi-
nus prætermittere oportet. Interdum et-
iam vſu veniet in valide robustis & qui-
bus humores craſſi altius deliteſcunt vt ſu-
doris effluvia copioſa non erumpant pri-
mis & mediis inunctionibus, neque expui-
tio multa de ore emergit, vel alia euacua-
tio per vomitum, vel alui deiectionem
ſuperuenit, quæ tamen optanda ſunt & ex-
petenda vt à lue venerea liberare poſſis:
ideo ad ſex inunctiones tranſeundum e-
rit, raro ad ſeptem aut octo vel nunquam
moliendum, niſi aliæ inunctiones parvæ
fuerint, in valde robustis: occurren-
dum autem gargarismatis & oris collu-
tionibus lenientibus, refrigerantibus & mo-
derata abſterſione valentibus, non autem re-
pellentibus ne adhuc impediās naturæ ex-
pellentis euacuationem per expuitionem.

℞. Decoctionis hordei glycirr. passul. ℞. j.
 syrúpi viol. ℥. j. Misce, fiat gargarisma, quo
 frequenter os colluat: post aliquot dies ex
 vsu erit repellens, astringens, & abstergens
 gargarisma, & oris collutionem hoc modo
 parare.

℞. fol. plantag. oleastri, summitatum rubi,
 lentisci, an. m. j. rosar. rub. p. j. ℞. Balaustior. ℥.
 ii. aluminis ℥. ℞. fiat decoctio in aqua hordei,
 & si magis repellere volueris in aqua chaly-
 beata, de colatura cape ℞. j. in qua dissolue
 diamori simplicis, ℥. iiii. mellis rosati colati ℥.
 ii. Misce, fiat gargarisma quo frequenter os
 colluat.

CAPVT XLV.

De Dentisfriciis.

*Dentisfricium ita prescribendum erit, ad car-
 nem gingivarum lapsam firmandam &
 siccandam.*

℞. pulu. ossis sepia, coralli vtriusque,
 an. ℥. ℞. pumicis, ℥. ii. aluminis, ℥. j. schæ-
 nanthi ℥. ii. redigantur in puluerem, quo
 infricentur dentes. Cæterum bene perspe-
 ctum consultumque fuit in gracilibus &
 naturis calidis & biliosis post octo dies
 inunctionis balneum aquæ dulcis repe-
 factæ

factæ præscribere, in quo misceantur folia
& flores, quæ vim refrigerandi & leniter
abstergerendi habeant.

C A P V T X L V I.

De cura luis in infantibus.

IN pueris & infantibus quando cōtagio
luis venereæ illos inuasit, exhibitis ante
lenioribus purgantibus, quorum forma fuit
ante tradita, non erit inutile vnguentum pa-
rare ex hydrargiro illi naturæ accommoda-
tum, non modo minuendum erit argentum
vium, sed etiam calidiora medicamenta,
imo multa prætermittenda, quæ in adultis
permiscuntur, ne illorum calor hâlituosus ex
tam insigni dissolutione iacturam patiatur,
viresque concidant, & tandem extinguan-
tur, sic igitur vnguentum moderandum
temperandumque erit.

℥. axungia porci liquefactæ & gallinæ,
an ℥ β. Mercurii extincti in aqua saluiæ, ℥.
ii. aut iii. si paulo robustiores sint medullæ
cruris vituli, ℥. ij. therebintinæ, ℥. iii. thuris,
Mastiches & styracis, an. ℥. β. pulu. granorum
pœonia, ℥. iii. Cerusæ, lytargiri, an. ℥. vj. olei
lumbricorū de lilio, Chamamelini, an. ℥. iii.

Z

olei irini, laurini, an. ζ .ii. Misce, fiat linimentum secundum artem quo illiniatur semel tantum in die ad tres vices tantum. Eodem modo administranda erunt medicamenta alia quæ scripsimus in adultis, pondus & mensura diminuetur ad dimidium.

C A P V T X L V I I.

De Balneo.

Balneum in affectibus calidis pro vniuerso corpore præscribendum, vt in hectica febre & consumptis. Interdum ex aqua dulci tepesfactum in quo diutius non immoretur æger, sed ad madorem vsque perueniat tantum non ad sudoris effluuium, mane hora sexta ingrediatur. Compositio fieri poterit hoc modo.

℞. Maluæ, altheæ cum radic. violarum. Braicæ vrsinæ, fol. lactuæ, cucurbitæ, Cichorii, End. scatiolæ, an. fasciculos, iii. flor. viol. Nymph. Borræg. Buglossi, an. p.iiii. rosar. rub. p.ii. quatuor seminum frigidior. maior. leuiter contusorum, an. ζ .ii. hordei p. v. *ad maiorem humectationem, capitis veruecis numero j. addes seminis lini, quia calore non officit quantum humiditate proficit, ζ .j. fiat decoctio pro balneo tepesfacto, ingrediatur vt diximus continuando per triduum, deinde*

de inungatur singulis diebus ab exitu balnei linimento sequenti.

℞. Olei violacei. Nymphææ & de salicibus, an. ℥. ss. olei rosat. omphacini, an. ℥. iiii. Butiri recentis ℥. j. Misce, fiat in modum linimenti quo illiniatur corporis habitus ut dictum est.

C A P V T X L V I I I.

Balneum resfrigirans, abstergens cum quibusdam calidis, in lepra, in psora & lichene.

℞. Rad. Brioniæ, lapathi, acuti, cucumeris asinini & serpentariæ, an. ℥. ss. saponaria, Anagallidis vtriusque, fol. plantag. lapathi acuti, acetosæ, scabiosæ, cichorii, End. scario-læ, Borræg. Buglos. cum toro, an. falculos iiii. lupinorum. ℥. ii. hordei integri, p. iiii. trium florum cordial. Nymphææ, rosarum rubr. an. p. v. aluminis, ℥. iiii. fiat decoctio pro balneo, quod ingrediatur tepesactum mane ieiuno stomacho per tres vices, & à prandio continuando spatio trium dierum, deinde vtatur in exitu balnei vnguento sequenti.

℞. Succis radic. lapathi acuti, succi fumaræ

℞ 2

riæ, succi rad. Enulæ Camp. an. ℥.iii. succi limonum, ℥.v. pul. rad. Ellebori, ℥.j. cerusæ, lythargiri, an. ℥.ii. tuthiæ, ℥.j. ꝑ. sulphuris viui, ℥.vj. vitrioli, ℥.iii. therebintinæ, q. ꝑ. ducantur & agitentur omnia simul in mortario & pistillo plumbeo, fiant ad formam vnguenti. Aliqui addunt ab ℥.j. ad ℥.ii. argentum viuum in foetidissima plora & lepra quo inungantur partes affectæ, vt dictum est.

C A P V T X L I X.

De spasmo & resolutione.

Aqua recalsciens, resiccans, & nervis corroborans, in resolutione & spasmo.

℥. Origani, calamenti, pulegii, sisimbrii, centaurii min. Betonicæ, herbæ paralyseos, saluiæ, samplici, an. m. j. succi ebuli & sambuci, an. ℥.iiii. rad. acori, ℥.iii. florum Chamæmeli, meliloti, stœcados, rorismarin. & sambuci, an. p.iii. galangæ vtriusque, an. ℥.j. Euphorbii, castorei, an. ℥.j. ꝑ. sagapeni, opopanax, ammoniaci & galbani dissolutorum, cum albis, an. ℥.ii. sthyracis calamitæ, ladani depurati, Benioini, an. ℥.x. therebintinæ abietis, resinæ pini, an. ℥.iiii. temperentur omnia

nia simul in aqua vitæ per xxiiii. horas, & postea omnia distillentur secundum artem in alembico vitreo, de cuius aqua in æstuario calido & sicco irrigentur partes resolutione affectæ, & præsertim tota spina & os sacrum continuando trium dierum aut quinque spatio.

℞. Melissæ. ℞. ss. temperetur cum vino albo, postea accipe mithridatis veteris ℞. j. fiat distillatio in Alembico, cuius aqua utatur vt antea, vel sic.

℞. Castorei, ℞. j. hirundinum iuuenum quinquaginta, aceti ℞. ii. fiat sublimatio in alembico, vtatur vt dictum est, deinde vngatur vnguento sequenti.

℞. Olei de nucẽ indica, vulpini, an. ʒ. iiii. olei de laterib. ʒ. ii. de lilio & chamæmelini, an. ʒ. iii. axungia vrsi, taxi, an. ʒ. ii. sagapeni, opopanax dissolutorum in vino maluatico aut generoso, an. ʒ. j. styracis, ʒ. ss. pulu. nucis moschata, galangæ vtriusque, rad. ireos, an. ʒ. ii. Castorei, ʒ. j. therebentina in aqua vitæ lota, q. ss. Misce, fiat in modum vnguenti quo tota spina inungatur, os sacrum & partes resolutæ, vt est dictum.

* * *

Z 3

De dentium dolore.

℞. Thuris hypocistid. ladani, an. ʒ.iii. pi-
cis, mastich. an. ʒ.ii. olei lentiscini parum,
misce, fiat emplastrum. *Confert quando dolor
fit ab influxu materia crassa frigida, sed si sit
calida & acris materia additur semin. papau.
albi, ʒ. j. vel meconii ʒ. j.*

℞. folior. salicis, m. ʒ. rad. pentaphilli, ʒ. ʒ.
gallarum, ʒ. ii. fiat horum omnium decoctio
in vino rubro austero, quo calidè collua-
tur os.

℞. hederæ, m. j. cort. moriv. vel lentisci, ʒ. j.
gallarum immaturatarum, ʒ. ii. fiat decoctio
in vino stiptico, quo os calidè abluatur.

*Ad iuuandam variolarum
eruptionem.*

℞. Laccæ ablutæ, ʒ. v. lentium excortica-
garum, ʒ. vj. tragacan. ʒ. iii. deinde decoqua-
tur cum dimidia ʒ. aquæ ad consumptio-
nem quartæ partis, detur tepidè in potu.

Aliud imbecillius.

℞. caricar. ping. ʒ. vj. lentium excortica-
ear. ʒ. iii. tragacan. seminis fœnic. an. ʒ. ii. de-
coquantur in ʒ. j. ʒ. aquæ fontis ad consum-
ptionem tertijæ partis.

Pro

Pro exsiccatione variolarum.

℞. Cort. ramarisci contus ʒ. x. lentium non
excorticatarum contusarum m. ii. ros. rub.
siccat. m. j. decoquantur in ℔. viii. aquæ
plant. ad consumptionem dimidii, & in fine
decoctionis, adde salis optime contriti, ʒ. j.
℔. deinde post leuam ebullitionem colato, &
in hac colatura, adde pulu. santal. citrin. ʒ. ii.
trochisc. de camph. puluerisatorum, ʒ. j. ℔.
reſeruetur in vase vitreo ad vsum.

*Ad oculorum præſeruationem
extra admouendum.*

℞. succorum plant. poligoni depurato-
rum, an. ʒ. j. aq. rosatæ ʒ. vj. album oui recen-
tis diu agitati numero j. croci gr.
v. vtere vsque ad quar-
tum diem.

FINIS LIBRI TERTII.





LIBER QVARTVS.

CAPVT I.

FORMA CVRATIONIS
FEBRIVM PVTRIDARVM;

*Et primò tertiana exacta & vera inter-
mittens, qua in septem accessiones
iudicatur longissima.*

PRIMO si alius ob inflamma-
tionem indurata sit, ad inter-
ceptionem materiarum & va-
porum ad caput, nec non ad
calidam intemperiem partium
naturalium demulcendam datur sequens e-
nema emolliens ac refrigerans.

*℞. fol. malux, bismalux cum radic. vio-
lar. atriplic. acanth. id est, branc. vrsinæ &
mercurial. nam hac folia & radices in decoctio-
ne multum exprimunt lubricam materiam, &
praesertim mercurialis, qua stimulat intestina,*

an.

an. m. ii. quatuor seminum frigid. contusorum ad faciliorem in decocto expressionem, an. ℥. β. seminis lini & fœnugr. lentorem similiter exponunt. & ad dissipationem flatuum, an. ℥. iii. prunorum dulcium, acida enim aluum morantur, passularum bene mundatarum, ob adstrictionem, an. par. vj. trium flor. cordial. violar. Borrage. Buglossi an. p. ii. fiat decoctio, donec prædictorum medicamentorum vis & facultas sit elicitæ. In colatura dissolue cassiæ recenter extractæ, ne diuturniori mora naturalem humiditatem & lubricantem vim amittat. ℥. vj. diaprunor. simplic. recipit enim pulpam cassiæ & tamarindos & rhabarb. ℥. iiiii. mellis violacei & iucci mercurialis & ciclæ, pro stimulo, an. ℥. j. olei viol. ℥. ii. fiat enema, vel hoc exhibeat.

℥. Medullæ cassiæ recenter extractæ, ℥. x. ut parum est actiuosa, sic eius dosis est augenda, ut non fastidiat, & fastidio naturam commoueat, Syrupi viol. ℥. j. decoctionis florum & fructuum cordial. q. β. fiat potio danda ante accessionem, mane non exeundo à cubiculo donec operata sit. Verum si hæc potio ventrem plane non expurgarit & patiens nausea infestetur, ut materiam eam facientem educamus ad vomitum ægrum sic adducemus.

℞. Syrup. acetosæ simpl. ℥.ii. ab aceto enim crassa pituita, extenuatur substantia ventriculi firmiter adhaerens extenuataq; miscetur potioni, qua cum expultricis vim commouerit simul materiam nauſcabundam euocat, fiat sic vomitorium addendo ʒ.ii. tepidæ, ℥.iiii. quemadmodum enim frigida substantiam vetriculi firmat, sic tepida eam exoluit. Misce, fiat potio, detur circa initia accessionū, ut ventriculo bene expurgato cetera remedia artificiosius admoueantur, maximè cum in principijs morborum & paroxysmorum natura sese erigat & excitet ad expellendum, atq; vbi medicus inuenerit materiam dispositam vacationi iubere debet egrum digitum velpennam, oleo communi intinctam in os immittere, & ita vellicare os ventriculi, quam vellicationem etiam illius fundo communicat, vbi materia vomenda superest & restat, quod in dicta febre morbifica causa sit flaua bilis, que in agris immaniter ferocit, ideo inueniendum fuit remedium quod eius ferociam & amaritudinem educeret, hanc ob itaque causam iulapia saccharo condita & composita sunt & inuenta, hac autem ita paramus.

℞. Syrupi de endiuia compos. ℥.iiii. hepatis intemperiem calidam, primò delebit, secundariò cordis, syrup. acetos. simpl. & syrup. nymph. an ℥.ii. arcent putredinem, & flos nymphæ multum refrigerat, aquar. nymph. endiuie

uix & acetosæ, an. ʒ. vj. fiat iulapium pro quatuor dosibus matutinis, *tot enim doses requiruntur ad bilem purgationi disponendam*, nam licet humor sit tenuis & calidus, quoniam putridus in naturalem statum est reuocandus per pepasimum, id est, concoctionem eiusmodi humoribus debitam, nisi enim concoqueretur educationi esset inepta, & difficile cathartico cederet, imò vix subduceretur & graua symptomata inferret, ideo est concoquenda, quæ concoctio ex vrinis apparet, & ita apparatus & concocta materia facilius sequenti cathartico cedit.

℞. Medull. cass. rec. extract. *quia bilem educit*, ʒ. vj. rhabarb. in aqu. endiuix per diem naturalem infusi & expressi, ʒ. j. ʒ. *sic enim innatam omnem humiditatem deponit, est enim valde cholagogum*, syrupi violacei, ʒ. j. decocti solutiui, q. ʒ. Misce, fiat potio quæ detur finitis syrupis mane cum custodia & regimine artis.

Alia potio.

℞. trium flor. cord. *id est, violar. Bugloss.* & Borrage. an. p. j. quatuor semin. frigid. maior. an. ʒ. j. prunor. dulc. passul. mundar. an. par. vj. thamarind. elect. ʒ. vj. infusa-

dantur omnia in aq. fontis, q. s. per noctem,
& deinde coquantur, in colatura, dissol.
medullæ cassiæ recenter extract. ʒ. vj. rha-
barbari electi per diem infusi & expressi, ʒ. j.
ʒ. syr. viol. ʒ. j. Misce, fiat potio, detur post v-
sum syrupi modo priori.

*Bolus ad intemperiem calidam &
siccam corrigendam.*

℞. pulv. triasant. & diatragacant. frig. an.
ʒ. j. conf. viol. & nymph. an. ʒ. j. sacchari
parum, fiat bolus, detur post diem assumpti
cathartici cum aquis sequentibus.

℞. aquar. endiuicæ Bugl & acetosæ, an. ʒ. j.
ʒ. quibus fit ut cordialium medicamentorum
vires ad intimas partes perducantur. Et hæc
pro febris feritate. Sed cum dicta febris multa
eaque vehementia inuenerit, illis sic erit oc-
currendum. Primò si sitis torqueat ea cohibenda est,
nequaquam tamen initio accessionis est bibe-
ndum, quia potio, quæ tunc accedit, natura mo-
tum peruertit, qua nullis assumptis ab opere suo
est auocanda. Simili ratione in augmento nõ est
concedenda potio, in vigore autem & in ipsius
fine, hoc est in principio declinationis ager bibere
potest, dummodo non adsint obstructiones quæ
impediant. At cum aqua potio, in nativa frigiditate

tate calori innato nocere possit, inueniēdum fuit remedium. quod aqua intemperiem refranaret. Nonnulli eam diu in ore retinent, ut eam repriment, sed cum illi sit innata, vix eam deseret quantumuis retineatur. At minus laedet, si eam intermiscemus conseruis, & pulueribus cordialibus in hunc modum.

Conditum.

℞. Conser. flor. violar. nymph. & Bugloss. an. ʒ. j. pulu. triafant. & diamatgar. frig. an. ʒ. j. quatuor semin. frigid. maior. contul. an. ʒ. j. sacchari parum, fiat conditum, de quo summat cochlear vnum per se, vel cum aqua laudabilis fontis. *Sitim autem restinguet refrigerando & ventriculum corroborabit, & ut plane sitim molestantem extinguiamus tale præscribi debet.*

℞. Syr. acetosæ & nymph. an. ʒ. iiii. Misce, utatur cum aqua potabili.

Si apparuerint signa coctionis in urinis in quibus se manifestare solent, circa quartam accessionem cum securitatis indicis & mali moris non sit, tunc frigida ægri tantum bibant, donec facies luescat, & donec calor febrilis videatur extinctus. Etenim ex illa velut pugna tantus postea sudor erumpet, ut febrem plane soluat. Verum cum totū os & lingua inarescat

humiditate ab igneo calore descripta, solemus quasdam formulas lupini semini similes formare qua in ore volutantur & masticantur, sicque humiditas è cerebro quadam euocatur quæ aridam linguam humectat, sunt autem eiusmodi.

Formule seu rotule salivales.

℞. semin. phil. & cydoniorum, an ℥.iii. ligentur in sindone rub. & fiant formulæ seu rotulæ, cum aq. solani, nymph. & ros. ex his vnam teneat in ore & masticetur: quoniam ex masticatione fit quadam muccago ex seminibus dictis, quæ totum os abluit: & sic subsequitur leuatio: At cum omnibus modis sit fugienda illa intemperies, ac oporteat humiditatem substantificam fouere, ac continuo agrum victu humido nutrire, ideo solemus illis iuscula ex carnibus elixatis parare. Verùm quoniam empireuma aliquod redolent, ut huic prouiderent medici consuluerunt, iusculis refrigerantibus quadam semina hoc modo incoquere.

Iusculum.

℞. quatuor sem. frig. maior. & contul an. ℥.j. β. papau. albi & lactucæ. an. ℥.β. ligentur in panno lineo ad pondus, ℥.j. & bulliant in iusculis. Sic enim vim suam decoctione deponunt multipliciter, & ita utiles redduntur propter dictam intemperiem qua agros vigilis &

pravis in somniis infestat eductis & correctis humoribus peccantibus, itaque ut huic malo medici occurrerent, sequente potione utuntur.

Potio.

℞. syr. de papau. ℥. j. s. aq. lactucæ, ℥. ii. aq. nymph. ℥. j. Misce, fiat potio, detur hora somni. Etenim composita hæc medicamenta intemperiem dissipant, & in statum naturalem deducunt, somnum conciliant, licet syr. de papau. aliquando sit suspectus, nisi vires præsent. Ad id cum in quaque febris specie summus sit dolor capitis, muneris est medici eum pro artis efficacia depellere, quippe qui animales omnes functiones interturbat: sic autem expelletur.

Frontale.

℞. olei ros. omphacini ℥. iiii. aq. ros. & acceti ros. an. ℥. ii. album. ouor. numero ii. agitentur simul & imbuantur panni linei, fronti applicandi, propellit namque vapores ad capus delatos, simulq; per nares ad cerebrum plus a quo calefactum, refrigeratorem vim desert, ad id quod refrigerat, & consequenter dolorem sedat. Dicitur esse sæpe bilem flauam exactam tertianam producere, in qua scilicet bilis simpliciter dicta dominatur, quæ aliquando tanta est, ut quamplurima plus equo aut per alium, aut per vomitum à natura

reiciatur non sine magna virium prostratione ad id hoc cataplasma ventriculi regioni medici adinuenerunt.

Cataplasma.

℞. fol. mentæ virid. exactissimè contus. m.iii. medullæ papau. albi, ℞.j. coque simul in aceto fortissimo quousque reducantur in forma pultis, addendo in fine rosar. rubr. tritar. subtiliss. p.iii. pulu. mast. ℥.ß. puluer. corall. rub. ℥.ii. lachrym. sang. diac. ℥.j. fiat cataplasma, quod imponatur regioni ventriculi. Constat enim medicamentis ventriculum corroborantibus, à cuius imbecillitate prodit malum, influxum recipientis præ imbecillitate bilis, qua oppletus non potest se exonerare per quâlibet viam, at quoniam cataplasmata non adeo inherent partibus quemadmodum unguenta, hac itaque si ita videatur parari poterunt.

Vnguentum.

℞. Olei cydon. ℥.iiii. olei de menta, ℥.ii. pulu. corall. rubr. ℥.ß. pulu. mastic. & sanguin. dracon. optimi. an. ℥.ß. ceræ albæ, q.ß. Misce, fiat vnguentum quo inungatur regio ventriculi, sicque cohibentur eiusmodi excretiones symptomaticæ, interdum tantus est istius febris ardor, vt etiam post bilis purgationem præter modum incallescant

lescant iecur renes & partes adiacentes, cui ardori quamprimum est occurrendum ne febrem quodammodo sopitam denuo excuset: ita autem his inflammationibus medebimur.

Aliud vnguentum.

℞. Olei ros. omphac. ℥. vi. ceræ albæ, ℥. j. ss. Misce, fiat vnguentum in duplici vase quod lauetur in aq. frigid. ut imbibatur aqua quantum imbibere poterit, & eo recentissimo inungatur regio hepatis, renum, &c. addendo inunctionis tempore aceti albi parum ad penetrationem, idq; extra accessionem & finitis sudoribus ne naturæ motum impediamus. Si autem ventriculus fuerit admodum relaxatus & frequens sit vomitus, loco syrupi acetosi simplic. antea præscripti sufficiet oxisacchara simplex, non enim adeo acetosum & acre est, est autem acetositas & acrimonia substantiæ ventriculi & neruorum inimica, quare aduersus sitim hoc utemur.

℞. Oxisacch. simpl. & syr. nenuphar. an. ℥. iii. Misce, utatur tempore sitis cum aqua, & loco præscripti conditi, accipe mixturam sequentis descriptionis.

℞. conferu. ros. nymph. & Bugl. specier. electuar. triasantal. & diamarg. fuj. an. ʒ. ʒ.

Aa

℞. sacchari rosati tabellati parum. Misce, de hac mixtura capiat cochleare vnum vrigente siti ex se vel cum pauco aquæ fontis, nam hac mixtura ventriculum quasi exsiccatum à febrili ardore liberat & refrigerat atque humectat ipsum corroborando superbibendo ex syrupis præordinatis, vt sitis penitus extinguatur, vt supra dictum est. Vbi verò minorantia præscripta fuerint, cum nulla alia remedia supersint, habebis rationem apothepia agrotantis, quare in fine cibi mandere poterit aliquod frustulum carnis cydoniorum cum saccharo condit. circiter, ℞. non autem cum melle paratorum cum sit calidius, quineciam ad eundem finem poterit ager in ore volutare cerasa acria condita cum saccharo & id genus alia que habent vim astringendi & refrigerandi corroborando. Atque hæc dicta sufficiant de exacta febre tertiana.

CAPVT II.

De tertiana proportionata dicta.

POSTQVAM de febribus tertianis tractare constituimus, reliquum est, vt nunc de tertiana proportionata dicta verba faciamus: est autem ob id sic denominata quod prædictæ tertianæ portione quadam respondeat, & à Græcis κενός verus & sincerus est nuncupata, nam vt ea causam habet biliosum humorem & sinceram, sic & κενός: neque enim

nim aliter inuicem differunt, nisi quod prædicta sit intermittens, *καὶ τὸς* verò continua febris: etenim licet tertiana quædam videatur nos continenter affligere, tamen vera & genuina non dicitur, quoniam certam quandam præ se fert remissionem, non nisi ab ocularis & peritis medicis perspectam, & cum tantæ sit difficultatis, sunt hæc febres diligenter distinguendæ, ne vna pro alia sumatur, itaque signa pathognomonica diligenter sunt perpendenda, quæ nos ad veram differentiam ducant: & ne ab incepto ordine diuertamur, videndum est in primis an alius sit libera, an etiam facultas expultrix irritatur febrili ardore, quæ si irritatur non pauca infert incommoda, & si res ita habeat, præscriptum enema iniiciemus circa insultus febris primum & citius quam fieri poterit, tum postea minoratium sequens, quod est tale, vt materiam peccantem sensim non autem affatim minuatur atque deturbet sine corporis conurbatione.

Potio minorans.

℞. Medullæ cassiæ recentè extractæ, ℥. vi. diaprun. simplic. & pulpæ tamarind. elector. an. ℥. ii. syr. viol. ℥. j. aquar. aceto-sæ & Buglossi, an. q. s. Misce, fiat potio, detur mane ieiuno ventriculo horis tribus

Λα 2

ante cibum die præcedenti reiecto enemate iniecto: possumus enim cassi: a securè uti, nequaquam elect. de succo ros. de psillio, diaprun. solut. & aliis eiusmodi scammoniatis, quæ scilicet scammonium recipiunt, quoniam est maximè calidum, & sic potius calorem auget, quàm bilem refrenaret. Abstinentum quin etiam est à pillulis quales sunt, aurea, de fumaris, &c. quæ præterquam quod maxime calefaciant, ita desiccandi vim habent, quæ duo plurimum exagitant causone laborantes. Abstinentum etiam erit à vena sectione, quia peccans humor à sanguine segregatus est, & quoniam in talibus febribus vires parum constant, quæ magis à scamoneato medicamento frangerentur: at satius erit bilis feruorem restringere syrupis refrigerantibus quales superius præscripsimus, aut eiusmodi formula uti si prior non sufficiat.

Iulepus.

℞. Syr. de endiua compos. & syr. de nymphaea, an. ℥. j. ℞ syr. acetose, simpl. ℥. s. aq. end. nymphaea & aceti rosati, an. ℥. iii. Misce, fiat Iulepus, clarificetur, pro quatuor dosibus, mane, post operationem medicamenti minorantis.

℞. Electuar. trias. ℥. j. capiat tabellam vnam post quamlibet serapii assumptionem, idque ad vires ventriculi rescindingas quas fregit usus refrigerantium.

Ordo

SCD Lyon 1

Ordo communis exigit, vt postquam euacuationi disposita est materia eam euacuemus, at quoniam magna ex parte die quinto rigor superuenire solet, qui caussa soluit, sudore, vomitu, & alui fluxu, vel largo vrinae profluuio, fiatque perfecta & integra crisis, tunc satius est syrupos continuare quam solutiuum dare, vtpote quod plurimum etiam praeter modum commoueat, ita vt aeger imbecillior fiat praere ardore. Itaque in supra dicta tertiana exquisita non fuerit opus vti cardiacis, vt in caussa cogimur ob extremum calorem, cui obuenire omnibus modis est necesse tam epithematibus cordis regioni admotis, quam aërem alterando & cubiculum irrorando aceto, aqua, foliis vitis, salicis, arundinis, viridibus & aliis insigniter refrigerantibus, deinde parentur murmura ad instar riuorum defluentium, & breuiter omnibus modis occurrendum est, si aestas fuerit vt aër ambiens refrigeretur, & super praecordia & praecordia & pectus adhibebuntur epithemata sequentia.

Epithema.

℞. aq. endiuiae acetosae & ros. an. ℥. iiii.
 aquar. nymphaeae & rosar. an. ℥. ii. puluer.
 omnium santalorum, an. ʒ. j. puluer. ros.

℞ 3

rub. viol. & nymph. an ʒ. f. gr. k. rmes, ʒ. ii. acet
 ti rosati, ʒ. j. Misce, fiat epithema quod regio
 ni cordis & precordiis tepide cum pāno coc
 cinea per interualla admoueat, & p̄aser
 tim si sudores critici non superueniant.

*Adde quod in causo si vnquam vsus aqua co
 piose aptus sit, hic se offert, maximè verò si corpus
 sit robustum & nihil sit quod vetet, ut vigor fe
 bris. in aliis temporibus febris excedere in potu
 non est plane à ratione alienum, etsi aqua insi
 gniter frigida sit, ut actuali frigiditate immen
 sum illum ardorem extinguat, presentaneum
 remedium febrium ardentium erit: insuper agri
 in hoc affectu corripit solēt immoderatis vigiliis,
 ideo si iuiculis utantur non omitemus illis in
 coquere semina papaueris albi & lactuca, nec
 non quatuor semina frigida maiora, qua im
 pense refrigerant, deinde danda erit potio somni
 fera hora somni in forma precedenti, vel si vires
 fuerint imbecilles in hunc modum.*

ʒ. iyr. de pap. ʒ. j. f. confect. alkerm. ʒ. ʒ.
 pulu. triasantal. & diamarg. frig. an. ʒ. j. ʒq.
 nymph ʒ. ii. ʒq. bugl. & lact. an. ʒ. f. Misce, fiat
 potio detur hora somni. Si autem propter vi
 giliae immineat delirium solet addi in pradietis
 potionibus confectio requiei Nicolai, qua tamen
 non est utendum nisi maxima urgente necessita
 te, utemur similiter oxirhodino super frontem
 & tempora, quod si haec non sufficiant hoc sequēs
 cataplasma erit parandum.

Cata-

Cataplasma.

℞. succi semperuiui maioris, vmbilici venenis & solani, an. ℥.iiii. aceti vini albi, ℥.j. farinae hordei, q. β. fiat pulcicula, quæ instar cataplasmatidis super frontem & tēpora applicetur. In ea occasione etiam valet vnguent. ros. vnguent. populeum, oseum frig. Nicolai, deinde parari poterit lotio pedum & crurum, quæ ita fiet.

Lotio pedum.

℞. fol. cann. virid. fol. vitis albæ viniferæ, vio. lactucæ recent. an. m. ii. quatuor sem. frig. maior. contusorum, an. ℥.ii. capitum papau. albi paria vi. cortic. rad. mandragoræ, flor. viol. ros. & nymph. an. p. iii. flor. camomillæ p. ii. seminis anisi. ℥. β. fiat decoctio, de qua hora somni tepidè lauentur crura, tibiæ & pedes.

C A P V T III.

De tertiana non exquisita.

Acturi de tertiana non exquisita, imprimis causam morbificam designabimus, hæc autem non à simplici & sincera flaua bile oritur, vt tertiana exquisita, sed à pallida aut citrina bile, non veræ enim bilis hæc duæ sunt differentia, vt vna sit vitellina, altera citrina, aut

si volumus vti nominibus Auicennæ dice-
 mus bilem non sinceram esse duplicem,
 nempe maioris famæ & minoris, bilis spuria
 maioris famæ commiscetur pituitæ tenui &
 vocatur biliscitrina; aut immiscetur cum pi-
 tuita crassa, & dicitur vitellina bilis: at bilis
 vitellina apud Galen. hæc non est, sed potius
 cum bilis naturalis superassatur præter na-
 turam crassiorque seipsa multò deterior: ed-
 ditur: quare hæc raro efficit febres tertianas
 exactas, sed potius causos perniciosissimos,
 & qui nullum errorem medicorum admit-
 tunt, quamobrem debet medicus diligenter
 prospicere, num hic humor sit impactus in a-
 liquo viscere, quemadmodum v.g. in pulmo-
 nibus, in ore ventriculi, in hepate & aliis
 eiusmodi propinquis partibus cordis, & de-
 bet propellere cum maxima solertia, & habi-
 zaratione vitium, & quæ fit ex bile pallida,
 quæ generatur ex permixtione pituitæ te-
 nuis, longior quàm exacta, non tamen adeò
 facile discutitur & soluitur tertiana quæ fit
 ex bile pallida & admixtione pituitæ crassæ
 & glutinosæ. fiat igitur initium febris cu-
 rationis in hunc modum: & primo clyste-
 rem præscribemus.

Enema

Enema seu Clister.

℞. Decoctionis communis clysteris,
 q. β. dissolue catholici & medullæ cassiæ,
 recenter extractæ, an. ʒ. vi. mellis rosati co-
 lati & sacchari ros. an. ʒ. j. olei viol. ʒ. ii.
 Misce, fiat clister, detur longe à cibo, & die
 sequenti ieiuno ventriculo dabis minorati-
 um sequens in forma boli.

Bolus.

℞. Catholici, ʒ. vi. medullæ cassiæ recen-
 ter extractæ, ʒ. β. sacchari albi parum, misce,
 fiat bolus, qui detur, mane ex se vel cum
 aqua graminis vel acetosæ.

Iulepus.

℞. Syr. de endiuia compositi, ʒ. iiii. syrupi
 capil. ven. & aceto. simplic. an. ʒ. ii. aquar. Bu-
 glossi, Borræg. graminis & endiuia, an. ʒ. iiii.
 misce, fiat iulepus, clarificetur pro quatuor
 dosibus incipiendo post minoratiui assump-
 tionem.

Tabelle.

℞. Electuar. diarrhod. abb. tabellati, ʒ. j.
 sumat tabellam vnam, post quamlibet iu-
 lepi assumptionem.

*Notandum prater ea eo vsq; erunt continuãdi
 iulepi vel syrupi quousque appareant signa con-*

coctionis, & si natura non possit ex se humorem vitiosum euacuare poterit extra diem accessionis purgari hoc medicamento.

Potio.

℞. Catholici & medullæ cassiæ recenter extractæ, an. ʒ. iiii. rhabar. electi in aq. endiniæ per diem naturalem infusi expressi. ʒ. j. β. cinamomi electi gr. vi. in expresso dissol. syr. rosati solut. ex infusione ros. sine scam-moneo, ʒ. j. β. aq. graminis & acetosæ, an. q. s. fiat potio, detur post vsum syruporum in die electa cum custodia & regimine artis.

Bolus.

℞. pulu. elect. triasant. & diarrhod. abb. an. ʒ. j. conferuæ capil. ven. & flor. cicorei, an. ʒ. j. sacch. albiss. parum, misce, fiat bolus, qui detur post diem medicamenti in sequentibus aquis.

℞. aquar. gram. Bugl. & acetosæ an. ʒ. j. β. misce, quibus vtatur vt antea dictum est. Si autem siti intolerabili corripatur æger sequentibus vtatur.

℞. Confer. capil ven. & flor. cicorei, an. ʒ. j. conf. rad. Bugl. ʒ. β. elect. triasant. & diarrh. abb. an. ʒ. j. β. sacchari albissimi parum. Misce, & de hac mixtura capiat cochlear vnum tempore sitis per se vel cum modico aquæ fontis, deinde

℞. syr.

℞. Syr. acetosæ simpl. & capil. ven. an. ℥. iii.
 utatur tempore sitis cum aqua cocta, si au-
 tem vigiliis vexetur, his in hunc modum pa-
 ratis ager uti poterit.

Potio.

℞. Syr. de pap. syr. capil. ven. an. ℥. j. Mi-
 sce, fiat potio detur vigente siti & hora som-
 ni.

*Notandum in hac febre utile esse commouere
 urinas & ubi apparuerint signa concoctionis &
 corpus decenter fuerit purgatum, mane frictio-
 nibus mediocribus ager uti debet, si autem ager
 liberè vomere non possit in principio insultus
 prouocanduserit cum mediocri quantitate syru-
 pi acetos simpl. & aq. tepida. Si autem fuerit ter-
 tiana spuria, ex bile scilicet vitellina, tunc inci-
 pienda est cura à clistere si aluus sit dura, cuius
 formula erit eiusmodi.*

Clyster.

℞. decoctionis communis clysteris ℔. j.
 in quibus dissolue elect. catholici, ℥. x. mellis
 rosati colati & succi mercurialis, an. ℥. ii. olei
 viol ℥. ii. Misce, fiat clister qui detur longè à
 mensa, postea purgandus erit ager eiusmodi
 medicamento.

Bolus εκκαταρκτης.

℞. electuar. catholici, ℥. x. sacchari al-
 bissimi parum, misce fiat bolus detur mane

cum custodia & regimine artis per se, vel dissoluendo in aqua capil. ven. & Bugloss. *Verum non potest commodius, quam syrupis bilis vitellina domari, & continuandi diu venient ob illius contumaciam hoc modo.*

℞. Syr. de endiuia compos. & de duabus radicibus cum aceto, an. ℥. iii. oxifacchar. compos. & syru. capil. ven. an. ℥. ij. endiu. fum. & Bugl. an. ℥. v. aqu. fœn. & cap. ven. an. ℥. ii. β. Misce, fiat iulep. clarificetur pro sex dosib. assumendo mane post minoratiui assumptionem, dum signa concoctionis apparuerint, purgabis hoc modo.

Recipe, elect. catholici. ℥. vi. rhabarbari electi in vino albo & aq. endiuix per diem naturalem infusi & expressi, ℥. ii. cinnamomi electi, itemque infusi, ℥. j. syr. capil. ven. ℥. j. aquar. graminis & Buglossi, an. q. β. Misce, fiat potio, detur post vsum syruporum recto obseruato artis regimine.

Bolus.

℞. elect. diarrhod. ab. ℥. β. conf. rad. Bugl. & capil. ven. an. ℥. j. sacch. albi parum. Misce, fiat bolus, detur post diem medicamenti cum aquis sequentibus.

Rec. aquar. Bugl. capil. ven. & gramin. an. ℥. j. Misce, vtatur vt dictum est.

Pra-

Præterea nota quod viribus valentibus valet phlebotomia è basilica dextra, qua tamē non est administranda existentibus cruditatibus, vel in ventriculo, vel in primis viis, qua neque sit larga seu copiosa, cum febris natura sit diuturna, in qua vires quàm maximè fieri poterit sunt conseruanda. Præterea si detur ptissana hordeacea Hippocr. quam vulgo hordeum mundatum vocant, non debent huic misceri porri cum anetho quemadmodum olim fiebat, tamen illi sunt immiscenda ad illius visciditatem incidendam quadam incidētia & attenuantia, ut radices foenic. petrosel. & alia eiusmodi, adde in super quod hac febris in sextum mensem vsque prorogatur. Quare si in principio paroxysmi nausea aut cibi fastidium proruperit, optimum erit ad euacuandum ventriculum vi vomitorio sequenti inchoando à lenioribus.

Vomitorium lenius.

Recipe, syr. acetosi simpl. aceti acerrimi, ℥. j. ℞. decoctionis passul. à gigartis mundatar. ficuum albar. ad duplum syrupi, fiat portio & detur: & post horam vomitus prouocetur titillando gulam digito, quod si sufficienter non prouocet, fortiori vomitorio erit vtendum.

Vomitorium lenius.

Recipe, oximellis squillit. & oximell.

simpl. an. ℥. j. aquæ raphani siluest. ℥. iiii.
Misce, fiat potio detur tepida.

Nota etiam in hac febre solere superuenire sopores profundos, ut coma & alia eiusmodi, quorum curatio ex propriis capitibus petenda est in quibus ex professo accuratè tractantur: neque vnicuique sufficiens purgatio, sed eam bis terve geminare conuenit, idque ex medici adstantis consulto iudicio fiet, quod si medicamentis non cedat & materia peccans sit incocta ac proinde cruda eam preparabimus ac minuemus hoc sequenti decocto, vel apozemate.

Apozema.

℥. quinque rad. aperitiuar. & diuretic.
in aceto scilicet per diem naturalem temperatarum, an. ℥. j. & si præcordia sint tensa & potissimum sinistrum, accipies corticis rad. cappar. median. fraxin. & tamaris. an. ℥. s. herb. capil. bugl. cum toto, borrag. cicor. endiuæ, scabiolæ, absynth. pontici, an. m. j. fol. camedr. camepith. & mercur. an. m. s. sem. melon. ℥. j. sem. anisi & maratri, an. ℥. ii. vuar. passul. à g. gartis mundat. par. vi. fiat decoctio ad ℔. ii. & in colat. dissol. syr. acetos. de bisant. an. ℥. iii. fiat apozema mediæ decoctionis addendo syr. capill. ven. & de cicoreo compos. an. ℥. ii. clarificetur & aromatizetur, cum cinnamomi electi & santali rub. an. ℥. j. s. pro sex dosib. matutinis

matutinis capiat longè ab accessionibus; vbi materia peccans concocta apparebit hoc cathartico purganda erit.

℞. agarici recenter troch. ʒ j ʒ. zinziber. & salis gem. in oxymelite infus. an. ʒ. ʒ. cathol. ʒ ʒ elect. de citro solut. ʒ. iii. syr. capil. v. n. ʒ. j. Misce, & cum præscripta decoctione apozematis q. ʒ. fiat potio quæ detur cum custodia & regimine artis.

Nota quod loco elect. de citro solut. poteris dissoluere diaph. diacarth. elect. indi maior & id genus soluentia, quæ vim habent educendi bilem cum pituita mucilaginosa & viscida.

Bolus.

Rec. pul. ros. nouel. & diarrh. abb. ex descriptione communi, an. ʒ. j. conser. capil. ven. & flor. cicor. an. ʒ. j. sacchari albi parum, misce fiat bolus qui detur post diem medicamenti purgantis cum aquis sequentibus.

Rec. aq. scabios. gramin. & end. an. ʒ. ʒ. Misce, vtatur vt dictum est. *Notãdũ præterea quod in hac febre prosũt opiata iã diu fermõtata vt rubia trochiscata ex descriptione Nicol. & lipopirous vocata & alia eiusmodi symptomata q̄ solet huic feбри supuenire sũt rigor vehemens cũ frigiditate insigni, præterea tẽsio præcordiorũ, prostratio appetitus, cachexia, malus corporishabitus, tumor pedum, & alia id genus quæ febres diuturnas, equũtur, pro quorum omnium curatione recurrẽdum est ad propria remedia, si tamẽ*

rigor insignis infuset cum frigiditate, inungatur
ager per duas horas circiter ante accessionem
unguento sequenti.

Vnguentum

℞. olei de pi perib. & de euphorbio an. ℥ iii.
olei nardini & keirini, an. ℥ ii. ceræ citrin. q.
ss. Misce, fiat vnguentum quo inungatur spi-
na dorsi distrahendo à renibus residueatque
ager in lecto & cubili calido neque dor-
miam, nunquam enim est dormiendum si fieri
potest, in principio accessionum neq; in augmen-
to, sed in vigore & declinatione. Animaduer-
tendum etiam est, quod si oboriatur sudor circa
finem status, est ille accuratè obseruandus, an sit
vniuersalis nec ne, interim ager caueat ab aère
frigido & vento, & ubi sudor reficuerit, non
antea diligentissime resicetur & abstergatur.
Atq; hac de tertiana proportionata, quam con-
tinuatam vocant, qua illi proportionè respon-
det, qua dum curanda suscipitur maiori cum
solicitudine debet tractari; praterea si causus a-
liquis sit ex eodem humore, periculosus esse solet,
nec nisi cum maxima diligentia tractari debet.

De tertiana notha & minoris fame.

Pro huius curatione nota quod solet
hæc febris trifariam fieri, aut enim pars
exuriat & transit in atram & minimè à
priori

priori bile separatur, & hæc sæpè solet acci-
dere vel circa finem æstatis, vel principium
Autumni, & solet, si quispiam error commit-
tatur, vel ab ægrotante, vel à medico facilè
in quartanam mutari.

Alia species tertianæ nothæ minoris fame
est, dum miscetur flava bilis cum atra tenui,
tertia est, dum permiscetur cum atra bile
crassa & terrestri, & omnes hæc febres mini-
ma de causa in quartanas mutantur.

*Pro curatione prima speciei oportet primum
incipere à clystere iam sæpè prescripto, nec non à
minoratiuo, syrupi verò disponentes peccantem
materiam, & coquentes, hoc modo prescribi po-
terunt.*

Iulepus.

℞. syr. de end. compol. ℥.iii. syrup. cap. ven.
& de scolop. an. ℥.ii. ss. aquar. bugloss. fum. &
lup. an. ℥.v. misce, fiat iulep. clarific. pro qua-
tuor dosibus mane incipiendo post minora-
tiui assumptionem, deinde

Tabella.

℞. elect. diamargar. frigi ℥.j. capiat tessel-
lam vnam, post quamlibet syrupi assumptio-
nem.

Porio.

℞. Cathol. & diasen. sol. an. ℥.iii. rhabarb.
elect. in aqua end. per diem naturalem infusi
& expressi, ℥.ii. interioris cinnamomi elect.

Bb

eodem modo infasi & expressi, ꝑ j. syr. viol.
 ꝑ j. aquar. bugloss. & acetos. an. q. i. fiat potio,
 danda post usum syruporum in die electa
 mane cum custodia, deinde:

Bolus.

℞. pulu. elect. triasantali & de gemmis
 an. ꝑ j. conf. viol & radic. bugloss. an. ꝑ j. sac-
 chari albi s. modicum, misce, fiat bolus, qui
 detur post diem medicinæ cum sequentibus
 aquis:

℞. aquar. end. bugloss. acetos. an. ꝑ j. s. mis-
 ce, vtatur vt dictum est.

*Nota quod in hac febre nulla occurrunt alia
 symptomata, quæ non sint communia aliis febribus,
 quocirca illis erit prouidendum, vt in supe-
 rioribus dictum est. Si autem accidat circa fi-
 nem æstatis aut principium autumnii, solet fa-
 cile verti in quartanam vel in erraticam, quæ
 est quartana initium, itaque maximè prou-
 idendum est, vt euechymis alatur, caueatq; ab i-
 macundia & ab omnibus motibus insigniter ca-
 lorificis, debetq; teneri venter laxus, &
 omnes meatus aperti, vt sit libera
 omnium excrementorum
 expulsio.*

De

*De secunda specie, id est, quando miscetur
flava bilis cum atra tenui.*

SI autem interueniat aut subeat secunda
Species febris tertianæ minoris famæ, ini-
tio si alius sit durus, poteris vti enemate præ-
scripto, & deinde dato illo propinabis mino-
ratiuum sequentis descriptionis.

Minoratiuum.

℞. medull. cassiæ nuper extractæ & ca-
thol. an. ℥.iii. diasennæ solut. ℥.ss. sacchari al-
bissimi modicum, misce, fiat bolus, qui detur
in die electa mane cum custodia, ex se, vel
dissoluendo in aquis capil. ven buglossi & a-
cetosæ, deinde:

Iulepus.

℞. syr. de edend. compos. & de bugloss. an.
℥.iii. syr. cap. ven. ℥.ii. aqu. bugloss. fum. ace-
tosæ an. ℥.v. misce, fiat iulep. clarif. & aroma.
cum pul. diamarg. frigid. & electuar. de gem-
mis, an. ℥.j. pro quatuor dosibus mane in-
choando post minoratiui operationem,
deinde:

Potio.

℞. diasenn. solut. ℥.vj. rhabarb. elect. in a-
qua end. per diem naturalem infusi & ex-
pressi, ℥.ii. interioris cinnamomi electi si-
mili modo infusi & expressi, ℥.j. aquar. bug-

℞

glossi & acetosæ, infusionis epithymi Cre-
tensis cum paucò thymo, an. q. ß. misce, fiat
potio, quæ detur statò tempore, post vsum
syruporum cum castodia, deinde

Bolus.

℞. pul. elect. de gemmis & triasant. an. ℥.
j. confer. rad Buglossi. & flor. cichorii, an. ℥. j.
sacchari albiss. modicum, misce, fiat bolus,
qui detur post diem medicamenti purgan-
tis cum sequentibus aquis.

℞. aq. buglossi. fum. & acetos. an. ℥. j. ß. mis-
ce, quibus utatur, ut dictum est.

*Et hæc etiam febris potest facile verti in erra-
ticam, aut in quartanam. Porro quæ circumfert
symptomata, habet aliis communis: quare ad
dicta remedia erit recurrendum.*

*De tertia specie tertianæ spurie, hoc est,
quando flaua bilis miscetur cum
atra & terrestri.*

Tertia autem species tertianæ nothæ sic
profligari potest, maximè si venter sit con-
stipatus.

Clyster.

℞. decoct. commun. clysteris, 4. v. in qui-
bus dissolue catholici & diasennæ sol. an. ℥.
vj. mellis viol. & succi mercur. an. 4. ß. olei
viol. 4. j. misce, fiat clyster, qui iniiciatur rei-
terando

gerando, quoties ex usu erit. Porro quia superior venter variis recrementis est infartus, vtile erit sequenti minoratiuo illum expurgare.

Minoratiuum.

℞. Cathol. ʒ. vj. dial. fol. ʒ. ʒ. sacchari albissimi. modicum, misce, fiat bolus, qui detur in iusculo decoctionis folior. acetos. & Borrag. postea ad disponendum humorem peccantem purgationi, his syrupis vtendum erit.

Iulep.

℞. syr. de end. compos. & oxysacchar. compos. an. ʒ. ij. ʒ. syr. capill. ven. & de bugloss. an. ʒ. j. ʒ. aquar. oxal. bugloss. & capill. ven. an. ʒ. v. misce, fiat iulep. clarif. pro quatuor dosibus à minoratiuo, deinde

Tabella.

℞. Electuar. diamarg. frigid. ʒ. j. capiat tessellam j. post quamlibet serapii assumptionem.

Porro vbi concocta erit materia, dandum erit solutiuum sequentis descriptionis.

Solutiuum.

℞. quatuor sem. frigid mai. contus. an. ʒ. j. sem. anisi & maratri, an. ʒ. ʒ. prunor. dulc. pasul. à gigartis mundat. an. par. vj. polypod. querni recentis, glycirr. rasæ & folliculor. sennæ orient. mundat. an. ʒ. iiii. epithymi. Cys-

rensis, ʒ. ii. flor. thymi, ʒ. ʒ. trium flor. comm.
 an. p. ii. fiat decoctio ad ʒ. iiii. in colatura dis-
 sol. cathol. & dialennæ tol. an. ʒ. iiii. rhabarb.
 electi in aqua end. & vino albo per diem na-
 turalem infusi, ʒ. ii. lyr. capil. ven. ʒ. j. fiat po-
 tio, quæ detur post usum syruporum in die
 electa mane cum optima custodia, deinde:

Bolus.

℞. pul. electuar. diamarg. frig. ʒ. j. pulu. e-
 lect. diarrho. abb. & de gemmis, an. ʒ. ʒ. conf.
 cap. ven. & viol. an. ʒ. j. lacchari albiss. modi-
 cum, misce, fiat bolus, qui detur post diem
 medicamenti cum sequentibus aquis.

℞. aquar. end. bugl. & capil. ven. an. ʒ. j. ʒ.
 misce, vtatur vt dictum est.

*Nota quod dum differimus de hisce febribus
 tertianis spuris, tot sunt differentia continua-
 rum, qua illis proportione respondent, prater ea
 tot causarum genera, qua omnia erunt curanda
 remediis antea prescriptis vel similibus, sed cum
 magna prouidentia & sagacitate, itaque dum
 causi erunt, vel tertiana proportionales pradi-
 ctorum generum, si quando viris collabuntur,
 oportet aliquoties recurrere ad instauratina,
 qua facile concoquuntur, & euidentissimè vi-
 res resciumt, vt v. g. si sit causus spuris, vel
 tertiana continua, cum imbecillitate virium
 & presertim vitalium, tunc:*

Instaurans.

℞.

℞. pulu. elect. diamarg. frigid. pulu. elect. diarrh. abb. & de gemmis an. ʒ. ij. misce, & cum carnibus capi mundatis à pinguedine & pelle, & lotis cum aqua buglossi & acetosæ, fiat instauratiuum in balneo Mariæ, addendo, si velis, folia auri, & cætera id genus.

Similia instauratiua poterunt fieri addendo carnes perdicis, & cætera id genus, præterea secundum maiorem vel minorem ardorem, vel secundum ardoris speciem poterunt facillimè pulveres transmutari, ut v. g. si fiat causus spurius cum virium imbecillitate, tunc poteris facere instauratiuum per sequentem modum.

Instaurans.

℞. pul. elect. triasant. & diamarg. frig. an. ʒ. ij. pul. elect. de gemmis & diarrhod. abb. an. ʒ. j. misce, & cum carnibus capi præparati, ut prius, & carnibus perdicis fiat similiter instauratiuum in balneo mariæ, de quo capiat per se, vel in iusculis tanto tempore quanto solet æger egere.

Dantur præterea potiones cordiales, qua simul somnifera esse solent, id quod semper minimè necessarium est, si enim agrotans benè dormiat, non est illi opus medicamentis somnum conciliantibus. faciamus igitur potionem somniferam per sequentem modum.

Potio somnifera.

℞. Confect. Alkerm. ʒ. ʒ. pulu. elect. diamarg. frig. & pul. electuar. de gemmis an. ʒ. j.

fyrup. de papau. ꝑ. j. ꝑ. fyrup. cap. ꝑ. ꝑ. aquar.
Bugloff. capil. ven. acetose, an. q. ꝑ. misce, fiat
potio, quæ detur hora decima nocte.

Potio non somnifera.

℞ puluer. electuar. de gemmis & diamar-
gar. frigid. an. ꝑ. j. confect. alkerm. ꝑ. ꝑ. fyrup.
cap. ven. ꝑ. ꝑ. aq. bugloff. capill. vend. & end.
an. q. ꝑ. misce, fiat potio, quæ detur hora de-
cima de nocte.

C A P V T I V.

*De Febris continentibus, quæ à
sanguine proueniunt.*

HArum duplex est differentia: una enim est
ex sanguine minimè putrescente: altera
verò ex putrescente. & prima adhuc diuiditur:
nam altera est à multitudine sanguinis lauda-
ti, altera à sanguine supercalefacto, sed non pu-
trescente, & hæc febrium differentias posuit Ga-
lenus medias inter ephemeræ & putridas. Sit
igitur nobis propositus febriens à multitudine
sanguinis laudati sine vlla cruditate, sed cum
alui duritia, hanc enemate præsentî reparabis.

Clyster.

℞. Decoctionis communis clysteris, 4 v.
in quibus dissolue medullæ cassiæ recent. ex-
tract. ꝑ. j. mellis viol. & sacchari rub. an. ꝑ. j. ꝑ.
olsi

olei viol. ℥. ii. fiat clyster, qui statim detur, & ubi emissus est, mox secanda est iecoraria vena dextri brachij, & extrahendus sanguis ad lypothymiam vsque, si vires agrotantis sufficiant, alioqui periculum erit, ne vena simul & arteria intercipientur, & enecetur agrotans. Quod si sufficiens sanguinis quantitas fuerit extracta, mox liberabitur ager, eò quod omnes morbi qui à plenitudine fiunt, vacuatione sanantur. In talibus febribus solet precipi inedia, nec sine causa, atque si cruditas aliqua sit in primis venis & in ventriculo, tum maius imminet periculum, eò quod necessum est perendinari & protrahi sanguinis missionem, quousque cruditas illa sublata fuerit. Id quod tantum inedia corrigi potest & clystere leniente, aut saltem minorante admodum leui: non enim eo in casu debet agitari sanguis sine vacuatione eiusdem, alioqui pericula maxima emergunt, si autem sanguis supercalefactus sit cum alui duritia, poterit sequens enema dari.

Clyster.

℞. decoctionis præscripti clysteris quart. v. in quibus dissolue cassiæ & diapr. simpl. an. ℥. vj. sacch. rub. & succi siclæ, an. ℥. j. olei viol. ℥. ij. fiat clyster, quo reiecto mittatur sanguis è basilica dextri brachij ad lypothymiam si vires agrotantis sufficiant, deinde utatur alterantibus sequentibus.

Iulep.

℞. Syrup. de end. compos. & oxifaccharæ simpl. an. ℥.iii. syr. nymph. ℥.ij. aq. end. acetosæ & scariol. an. ℥.v. misce, fiat iulep. clarific. pro quatuor dosibus mane, *deinde si aliqua purgatione egere videbitur.*

Potio.

℞. Medull. cass. recent. extract. ℥.vj. rhab. electi, in aqua end. per diem naturalem infusi & expressi, ℥.j. β. interioris cinamomi electi eodem modo infusi, ℥.β. syr. rosar. solutiui ex infusione rosar. sine scammono. ℥.j. β. aqua. acetosæ & scariol. infusionis tamarindorum elector. an. q. β. misce, fiat potio, quæ detur post usum Syruporum in die electa mane cum custodia, deinde:

Bolus.

℞. pul. elect. triasantal. & diamarg. frig. an. ℥.j. conf. nenupharis & flor. cichorij, an. ℥.j. sacchari albif. modicum, misce, fiat bolus, qui detur post diem medicamenti cum aquis sequentibus.

℞. Aquar. acetosæ scariol. & end. an. ℥.j. β. misce, quibus utatur ut dictum est:

Si antea sitiat extra mensam poterit bibere per sequentem modum.

℞. Oxifaccharæ simplicis, ℥.iiii. syr. nenupha. ℥.ij. misce, quibus utatur tempore sitis cum aqua bullita, aut laudari fontis.

Ratio victus debet esse tenuis, parca & humida, unde utilis est cremor hordei, utilia sunt pruna cocta, &c.

Si autem sit à putredine sanguinis, debemus perspicere maximè, num sanguis ille putrescens sit impactus in aliquo viscere interno, de quo in presentia disputandum non est, sed ad propria capita recurrendum, ut cum adest phrenitis, vel angina, vel peripneumonia, vel pleuritis &c. Si autem sanguis putrescat, periculosior febris esse dicitur, & in biliosam febrem facillè transmütatur, hinc testatus est Galenus febres synochos à bile ortum habere, quorum triplex est genus ἀκρῶς κρῶς, ἡδὲ γαμψῶς κρῶς, ἢ ἰμῶς τοῦτον. Maximè periculosa est ἀκρῶς κρῶς, deinde ἰμῶς τοῦτον. salubris ἡδὲ γαμψῶς κρῶς: si igitur nulla adsit cruditas, qua sanguinis missionem impediatur, sed sit alvus ascripta, mox in di debet clyster similis descriptionis.

℞. ut supra, quo deiecto mittatur sanguis à basilica dextri brachij ad animi deliquium, si vires & ætas consentiant. Die autem sequenti poterit dari medicamentum sequentis descriptionis.

Bolus.

℞. Medull. cassiæ recenter extract. ʒ. v. diapr. simpl. & pulpæ tamarindor. elector. an ʒ. ij ʒ. sacchari modicum, misce, fiat bolus, qui detur in crastinâ per se, vel di-

Soluendo in aqua oxalid. infusionis tamarindor. deinde:

Iulepus.

℞. syr. de end. comp. & oxifaccharæ simpl. an. ℥. ij. β. syr. lymon. & nenuph. an. ℥. j. β. a-
quar. end. oxal. scariolæ an. ℥. v. misce, fiat
iulep. clarific. pro 4. dosib. de mane incipien-
do post minoratiui assumptionem, deinde:

Tabella.

℞. elect. triasant. ℥. j. capiat tabulam j. post
quamlibet syrupi assumptionem.

Potio.

℞. trium flor. communium an. p. j. qua-
tuor sem. frig. maior. contusor. an. ℥. j. sem. a-
nisi & maratri, an. ℥. β. prunor. Damascen.
passul. à gigartis mundatar. an. par. vj. tamar-
indor. elector. ℥. β. fiat decoctio ad ℥. iiii. in
colatura dissolue medullæ cassiæ recenter
extractæ, & tripheræ persicæ, an. ℥. iiii. rhab.
electi in aqua endiuix per diem naturalem
infusi & expressi. ℥. ij. interioris cinamomi e-
lecti, eodem modo infusi, ℞. β. syr. ros. solu-
tiui ℥. j. misce, fiat potio, quæ detur post usum
syrup. in die electa mane cum custodia, id
quod est intelligendum, si nulla à natura tente-
tur crisis, si autem sit magnus aestus in hac fe-
bre, & signa concoctionis appareant frigida po-
tio assatim data solet esse ex usu: porro si sitiunt,
possunt

possunt per sequentem modum bibere.

Conditum.

℞. conf. viol. nenuph. & bugloss. an. ʒ. j. pul. electuar triasant. & diamarg. frig. an. ʒ. j. ʒ. quatuor fem. frig. maior. mundator. & minutim concisorem, an. ʒ. ʒ. sacchari albissimi modicum, misce, fiat conditum, de quo capiat cochlear vnum, tempore sitis per se, vel cum modico aquæ bullitæ, deinde:

℞. syrup. de lim & nymph. an. ʒ. iiii. misce, cum aqua bullita aut fontis & bibat.

Nota quando in media curatione tam in hisce feb. quam in alijs appareat alui astrictio, oportebit adhibere clysteres emollientes, quales sunt multi ex præscriptis, quòd si aliqua superuenerint symptomata, erunt instar supra scriptorum percuranda, quemadmodum de instantia vigiliarum, de dolore capitis, de nausea, de subuersione superius dictum est, oportet autem prospicere maxima cum attentione febribus, qua inducunt animi deliquia, quales sunt illa qua à practicis vocantur syncopales minuta, quandoquidem in talibus nunquam est propinandum medicamentum solutiuum, sed oportet, ut ait Gal. 12. methodi summè prouidere deliquijs animi, & expectare quousq; humor tenuis increpescat & coctionem suscipiat. Ut igitur minimè fiat syncope ab humoribus tenuibus & morda-

cibus solemus prescribere ea quæ sunt gratissimæ ori ventriculi in hunc modum.

℞. carnium cydoniorum conditorum cum saccharo, conf. rosar. & nenuphar. an. ℥. j. pul. electuar. diamarg. frig. & elect. triasant. an. ℥. j. ℞. pul. coralli rub. & ras. eboris, an. ℥. ℞. quatuor semina frigid. maior. mundat. & minutim concisor. an. ℥. j. sacchari rosati tabulati modicum, misce de mixtura, capiat cochlear. j. tempore sitis, & etiam eo tempore quo solent superuenire deliquia per se, vel cum modico aquæ bullitæ, deinde

℞. syrup. de granat. acetos. ℥. vj. quo utatur tempore sitis cum aqua laudata post assumptionem conditi, valet præterea in hoc casu syrupus de agresta, syrup. de berberis, grana berberis etiam in cibis vtilia sunt. Solent etiam fieri auersiones per frictiones, & cætera id genus.

C A P V T V.

De Febris Phlegmaticis.

P*hlegmaticarum februm multiplices sunt differentia secundum varietatem humoris putrescentis, nam pituita quandoque crassa est, quandoque tenuis, quandoque dulcis, insipida, acida, & quandoque salsa, & aliquoties hi humores faciunt febres continuas, quandoque intermit-*

tes, sis.

res, sic tamen ut intermissio falsa appareat, ferè
 èd quod aegritudo non peruenit ad perfectam in-
 febricitationem. In causa est abundantia pitui-
 tosi humoris, qui cum sit frigidus & humidus,
 difficillime discutitur. Supponamus igitur ut sit
 febris intermittens ab humore pituitoso eodemq;
 tenui, & insipido, aut acido, aut dulci, poteris
 incipere curationem in hunc modum, si alvus
 sit astricta.

Clyster.

℞. decoct. communis clysteris in aqua
 hordei 4. s. in colatura dissolue catholici, ʒ.
 x. mellis rosati colati, & sacchari rubri, an. ʒ.
 j. olei violati, ʒ. j. fiat clyster, qui detur, ut di-
 ctum est, deinde;

Bulus.

℞. cathol. ʒ. x. sacchari albiff. modicum,
 misce, fiat bulus, qui detur per se, vel dissol-
 uendo in aquis graminis & betonicę, deinde

Iulep.

℞. syr. de stœcade & mellis ros. col. an. ʒ. ij.
 s. syr. compos. acetosi, & syr. cap. ven. an. ʒ. j. s.
 aquarum beton. buglos. & end. an. ʒ. iiii. mis-
 ce, fiat iulep. clarific. pro quatuor dosibus de
 mane incipièdo post minoratiui assumptio-
 nem, & continuando quousq; appareant si-
 gna cōcoctionis, nō enim hic humor vacua-
 ri debet antequam sit cōcoctionis, deinde;

Tabella.

℞. Electuarium aromaticum ros. ℥.j. capiatur tabellam vnam post quamlibet syrupi assumptionem.

Potio.

℞. agarici optimi in melicrato infusi, ℥.j. ℞. zinziberis & salis gemmæ, an. gran. vii. cathol. ℥.vj. syrup. ros. sol. ℥.j. ℞. aq. beton. gram. & end. an. q. ℞. misce, fiat potio, quæ detur post usum syruporum in die electa, de mane cum optima custodia extra accessionem.

Bolus.

℞. pulu. aromat. ros. & pul. diamb. an. ℥.j. conferv. flor. roris. cap. ven. an. ℥.j. sacchari albiss. modicum, misce, fiat bolus qui detur post diem medicamenti, de mane, cum sequentibus aquis, & differendo cibum per tres horas.

℞. aqu. gram. beton. & cap. ven. an. ℥.j. ℞. misce, quibus utatur, ut dictum est. *Et nota quod hæc febris non solet curari unica purgatione, ac solet produci ad quadragesimum diem, præterea solet oboriri maxima imbecillitas in ventriculo, propterea in progressu poteris coquere materiam per sequentem modum.*

Iulep.

℞. syrup. stercados, & mellis rosati colati, ℥.iii. syrup. de byzantiis & oximelitis diure-

diuretici, ad ℥. ii. aquar. beton. mentæ cap-
ven. & end. an. ℥. v. misce, fiat iulep. clarifico.
pro sex dosibus manè.

℥. elect. diamb. ℥. j. cap. tabulam j. post
quamlibet syrupi assumpt.

℥. turbith. electi, ℥. iiiii. zinziberis, ℥. ii.
sacchari albissimi, ℥. ii. misce, fiat pul. qui dil-
soluatur in iusculo cicerum nigrorum deco-
ctionis foliorum hyslopi, fiat potio, quæ de-
tur post usum syruporum in die electa mane
cum custodia,

Bolus.

℥. pulu. elect. diamb. & arom. ros. an. ℥. j.
conf. flor. si œcados & corticis citri cum sac-
charo conditi, an. ℥. j. sacchari albissimi mo-
dicum, misce, fiat bolus qui detur post diem
medicamenti de mane cum sequentibus a-
quis differendo partum per tres horas.

℥. aq. beton. bugloss. & mentæ, an. ℥. i. mi-
sce, utatur ut dictum est.

*Porro à parte exteriori roborandus erit ven-
tricusulus per sequentem modum.*

Vnguentum.

Recipe, olei nardini, olei de menta, $\frac{\text{ss}}{\text{ss}}$
 $\frac{\text{ss}}{\text{ss}}$ iii. olei muscatellini, ℥. iiiii. ceræ citrinæ,
 $\frac{\text{ss}}{\text{ss}}$ ii. s. pul. mastich. ℥. j. styracis calam. la-
dan. puriss. an. ℥. s. garioph. cinnamomi &
coralli rub. aa. ℥. j. misce, fiat vnguentum.

in duplici vase quousque reducantur in formam cerati & eo inungatur regio ventriculi vt prius.

Nota similiter quod huic feбри solent sapissime accidere sopores profundi καὶ ἄλλα καὶ ἄλλα & lethargi, in quibus oportet medicum maxime esse prudentem & debet recurrere ad propria capita.

*De curatione quotidiane phlegmaticæ
provenientis à phlegmate falso,
primum si aluus sit a-
stricta.*

Clyster.

℞. Decoctionis communis clysteris 4. v. in qua dissolue catholici, ʒ. x. mellis rosati colati & sacchari rubri, an ʒ. j. olei viol. ʒ. ii. fiat clyster qui detur circa initia reiterando quoties erit opus; sed nota quod in progressu vbi signa concoctionis apparuerint loco catholici poterit immitti vel benedicta descriptione Nicolai vel hiera pic. Galeni descriptione & cætera id genus quæ habent vim purgandi pituitam: porro vbi datus erit clyster, poterit dari minoratiuum sequentis descriptionis.

Bolus.

℞. Cathol. ʒ. x. sacchari albiss. modicum
mille.

miscē, fiat bolus qui detur in die electa mane cum custodia per se vel dissoluendo in aquis graminis acetosæ, deinde.

Iulep.

℞. Syr. de end. compos. & oxisaccharæ compos. an. ℥. iii. syr. conf. cortic. citri, ℥. ii. aquar. cap. ven. gram. & end. an. ℥. v. miscē, fiat iulep. clarificatum pro quatuor dosibus incipiendo post minoratiui assumptionem.

Tabella.

℞. Electuar. rosatæ nouellæ, ℥. j. capiat tab. j. post quamlibet syrupi assumptionem, & nota quod debes continuare digestiua, quousq; appareant signa concoctionis manifesta, deinde poteris purgare per sequentem modum.

Potio.

℞. Agar. opt. in mellicrato infusi per diem naturalem, ℥. j. β. zinziberis & salis gemmæ, an. gra. v. cathol. ℥. vi. syr. rosar. sol. ex infusione rosar. sine scammonio. ℥. j. β. aqu. gram. capil. ven. & mentæ, an. ℥. i. miscē, fiat potio, quæ detur post usum syruporum in die electa mane cum optima custodia, deinde:

Bolus.

℞. pulu. diambrae & diarrhod. abb. an. ℥. j. confex. flor. stæcad. & cortic. citri cum

faccharo conditi. an. ʒ. j. facchari albiss. modicum, misce, fiat Bolus, qui detur post diem medicamenti cum sequentibus aquis & differendo pastum per tres horas.

℞. Aquar. gram. fœnic. & bugloss. an ʒ. j. misce quibus utatur ut dictum est.

Et nota quod in hac febre eientia vomitum possunt etiam conducere. Quocirca in principio accessionis si insit nausea vel fastidium poteris dare vomitorium sequentis descriptionis.

Potio vomitoria.

℞. Oximellis simpl. ex aceto fortissimo ʒ. ii. aquæ raphani ʒ. iiii. misce, fiat potio tepida quæ detur tempore nausæ, & deinceps ad horam immittatur digitus, & vomitus prouocetur.

Nota præterea in hac febre laborantes infestari siti, quæ tamen sedanda non est potione frigida, sed potius calida, ut faciebat Gordionius.

Nota similiter quod hisce febribus phlegmaticis solet in accessionibus accidere animi deliquium quod corrigi debet per frictiones, ligaturas, & cæteris id genus quæ possunt auertere humores: Quod si vinum dare cogamur, illud erit robustum & perquam generosum: ab eo enim symptomate vocata sunt syncopales humorosa, in quibus prouidentissimum oportet esse medicum. Porrò hæc febres respondent febribus continuis procedentibus à materia phlegmatica, quæ

si aliquando emergant, cautiùs erunt curanda, eo quod maius imminet periculum.

Nota similiter ex pituita salsa simul & putrescente in regionibus propinquis cordi potest generari causus omnino aduersus illi, qui sit à bile sincera & flaua, in hoc enim ingens est sitis, sed exigua caliditas: praterea solent esse angustia uehementes propter nequitiam humoris, nec breuiter liberantur ab hisce causis: quia à pituita eos perpetiuntur.

Est praterea febris procedens à pituita crassa, simul & viscida, qua multa longaque coctione eget, nec debet in principio euacuari. Si tamen tibi veniat curanda, facies per sequentem modum, dando clysterem si aluus sit astricta, fiat clyster, ut supra qui reiterari poterit si aluus fuerit astricta: si apparuerint signa concoctionis poteris addere benedicta, ℥. ℥. vel diaphœn tantumdem & cetera qua habent vim purgandi pituitam.

Si autem velis dare minoratiuum ut ea duntaxat soluantur, qua continentur in intestinis, poteris facere per sequentem modum.

Bolus.

Recipe, cathol. ℥. x. sacchari modicum, misce, fiat bolus qui detur in die electa, de mane cum custodia per se vel dissoluendo in decocto foliorum mercurial. recentium postea.

Iulepus

℞. syr. de end. compositi, & compositi acetosi. an. ℥. ii. β. mellis ros & syr. capill. ven. an. ℥. j. β. aquar. fœnic apii, & gram. an. ℥. v. misce, fiat iulep. clarific. & arom. cum interioris cinamomi electi, ℥. ii. pul. rosatæ nouellæ, & pulu. diambrae, an. ℥. β. pro quatuor dosibus de manè incipiendo post minoratiui assumptionem. Et nota quod hic syrupus digestius debet longiori tempore continuari, quum in tam breui tempore humor crassus & viscidus minimè tenuari & disseccari poterit, potro vbi concocta tibi videbitur esse materia, poteris dare pharmacum sequentis descriptionis.

Potio.

℞. trium flor. communium, an. p. j. quatuor semin. frig. maior. contus. an. ℥. j. sem. anisi, maratri, apii & petroselini, an. ℥. β. passul. à gigartis mundat. par. x. polipodii querni recentis, glyc. rasæ, an. ℥. vi. medul. sem. carthami, ℥. iii. flor. genistæ & cicerum rub. an. p. ii. rad. asari, ℥. ii. fiat decoctio ad ℥. iiii. in colatura dissolue diaphœnici, ℥. s. electuar. dia carthami, ℥. ii. syrup. cap. ven. ℥. j. fiat potio, quæ detur post vsu syrupor. in die electa, manè cum custodia, & apparentibus signis coctionis, poteris similiter dare diaturbith. & cetera

id

id genus quæ valenter humorem pituitosum extrahunt, postea:

Bolus.

℞. pul. diambreæ & rosatæ nouellæ an. ʒ. ʒ. conf. flor. stœcad. & cap. ven. an. ʒ. j. sacchari albiss. modicum, misce, fiat bolus, qui detur die sequenti manè, cum sequentibus aquis.

℞. aquar. hyssopi, cap. ven. & fœnic. an. ʒ. j. ʒ. misce, quibus vtatur vt dictum est.

Nota similiter quod vix vnica purgatione poterit hic humor purgari: sed reiteranda est per ea interualla, quibus natura ferre medicamentum incolumiter possit. Præterea roborandus est ventriculus vt in superioribus dictum est, & concoctio maximè procuranda adhibendusque victus qui attenuandi vim habeat.

Similiter febris facta à pituita minime salsa, qua latica appellatur, habetque maximam convenientiam cum hectica, & medici parum exercitati sapissime existimant febrem hecticam esse, cum non sit ea re vera: namque sua habet discrimina, qua sunt peritis medicis nota, & ea collige ex differentiis febrium & notis earundem, sed potissimum discrimen uest quod essentia caloris in hectica est semper cum squaliditate coniuncta, in alius verò, nempe patientibus laticam febrem videtur esse calor fuliginosus.

Quocirca si eam febrem curandam susceperis,

procedendum per enemata si alius sit astricta, qualia sunt multa prescripta, datoque ¹⁰⁰ & 700, & postea concoquito humorem, secundum eius propriam naturam, & poteris postea purgare per sequentem modum, ubi apparuerint signa concoctionis.

Potio.

℞. agarici optime in oximellite scillitico. infusi, ℥. ii. zinziberis & salis gemmæ, an. gr. vi. elect. de citro solut. ℥. iii. syr. cap. ven. ℥. i. aquar. gram. fœnic. end. an. q. s. misce, fiat potio quæ detur in die electa mane cum decenti custodia post usum syruporum.

In cæteris regatur perinde ac alia febres phlegmatica, hoc tamen habito in maxima, quod continua sit propterea maiore procuratione indiget: fiant frictiones & cætera id genus quæ possunt his humorem pituitosum excutere.

Febres lipireæ ^{ἰπικαί} & nocturna maxima ex parte etiam à pituita prodeunt, nec aliam subeunt curandi rationem, modo nos prospexerimus semper symptomatibus quæ vim causarum habent, ad quæ attentissimum oportet esse medicum.

Et hæc de phlegmaticis sufficiant.

CAPVT VI.

De Febribus à Melancholia.

Febrium melancholicarum duæ sunt differentia prima, alia enim sunt intermittentes, alia

continua, qua illi proportione respondent, & intermittentiū alia sunt ab humore melancholico puro, & non ab alio humore generata, alia sunt ex atrabile aliunde genita, nempe à flava bile alio humore. curanda igitur febris quartana, qua est ab humore melancholico genuino per sequentem modum, primo si aluus sit astricta.

Clyster.

℞. decoctionis communis clysteris, quatuor quinque, & in ea dissolue catho. & diasen. sol. an. ʒ. vi. mell. viol. & succi mercur. an. ʒ. i. olei viol. ʒ. j. fiat clyster qui detur, ut dictum est. Et nota quod reiterari poterit semel vel bis in hebdomada, mane si aluus fuerit dura postridie ab assumpto clystere, modo non sit dies accessionis poterit dari minorans sequentis descriptionis.

Minorans.

℞. diasen. sol. sine scammonio, ʒ. vi. catholici, ʒ. i. syrup. cap. ven. ʒ. j. decoctionis fol. mercurialis recentium q. s. misce, fiat potio quæ detur in die electa mane cum custodia, poterit autem postea parari per sequentem modum.

Inlep.

Recipe, syrup. de end. compositi & de buglossio, an. ʒ. iii. syr. cap. ven. & de scolopendr. an. ʒ. ii. aquar. Borragin. Bugloss. & cap. ven. an. ʒ. x. aquar. meliss. & scabios. an. ʒ. ii. s.

misce, fiat iulep. clarifi. & aromatiz. cum pul-
uere electuar. de gemmis & diarhod. abb.
an. ʒ. j. ʒ. pro sex dosibus mane incipiendo
post minoratiui assumptionem.

Potio.

℞. trium flor. communium, an p. j. quatuor
sem. frig. maior. contusor. an. ʒ. j. sem. anisi &
maratri & cuscute, an. ʒ. ʒ. passul. mundat. par.
vi. polipod. querni recentis, glyccirr. rasæ,
follic. iennæ Orient. mund. an. ʒ. iii. epithymi
Cretensis, ʒ. ii. flor. thymi, ʒ. ʒ. fiat decoctio
ad ʒ. iii. & in colatura dissolue diasennæ sol.
ʒ. vi. conf. ct. hamec. ʒ. iii. syr. cap. ven. ʒ. j. mi-
sce, fiat potio, quæ detur post usum syrupor.
in die electa mane cum custodia, deinde:

℞. pulu. elect. de gemmis & diarhod. abb.
an. ʒ. j. confer. rad. bugl. & capil. ven. an. ʒ. j.
sacchari albiss. modicum, misce, fiat bolus,
qui detur post diem medicamenti cum se-
quentibus aquis.

℞. aq. capill. ven. borrag. & bugloss. an. ʒ. j.
ʒ. misce, quibus utatur vt dictum est.

*Et nota quod in hac febre debemus semper
prospicere ne obstruantur lien, quocirca poteris
hoc unguento uti.*

℞. olei de capparib. tamarisc. & de fraxi-
no, an. ʒ. iii. olei liliior & de absynthio an. ʒ. j.
ʒ. gummi ammoniaci recentissimi & disso-
luti in aceto, bdellii pariter recentissimi &

dem modo in aceto scillitico dissoluti, an. \mathfrak{z} . j. sem. viticis, pul. iridis, fol. & flor. chamæmel. subtilissimè tritorum, an. \mathfrak{z} iii. ceræ citrinæ, q. s. misce, fiat unguentum in duplici vase quo inungatur regio lienis sinistri præcordii.

Adde in super hanc febrem non esse contentam unica purgatione, nec etiam potest breuiter peccans humor concoqui eo quod crassus & faculentus sit, propterea assueti sumus recurrere ad apozemata quæ sunt similis descriptionis.

\mathfrak{z} . rad. rusci, asparagi & gram. temperatar. in vino albo per diem naturalem, an. \mathfrak{z} . j. cort. rad. capp. mediani, corticis fraxini, & tamarisci, an. \mathfrak{z} . β . herbar. capillar. bugloss. cum propriis radicibus, borrag. cum rad. cichorii end. scabiosæ, & melissæ, an. m. j. fol. chamæd. chamep. & mercurial. an. m. β . quatuor sem. frig. maior. contul. an. \mathfrak{z} . β . anisi & maratri, an. \mathfrak{z} . j. sem. cuscute & viticis, an. \mathfrak{z} . ii. passul. à gigartis mundatarum & caricarum pinguium, an. par. vi. polipod. querni recentis, glycir. rasæ & follic. sennæ Orient. mundat. an. 4. β . epithymi Cretensis \mathfrak{z} . vi. flor. thymi \mathfrak{z} . β . flor. genistæ, stœcados & eicerum nigror. an. p. ii. trium flor. communium, an. p. j. fiat decoctio ad \mathfrak{lb} . ii. & in colatura dissolue syrupi cap. ven. & de bugloss. an. \mathfrak{z} . iii. sacchari \mathfrak{z} . iiii.

fiat apozema, mediæ decoctionis clarificatū
& aromatizatum cum pulu. elect. de gemmis
& diamargar. frigid. an. ʒ. j. s. pro sex dosibus
da mane incipiendo in progressu morbi &
præcedente clystere, & cauendo à die acces-
sionis, deinde

℞. diasen. sol. ʒ. vi. confect. hamech. & e-
ctuar. de citro sol. an. ʒ. ii. syrup. cap. ven. ʒ.
j. decoctionis præscripti apozemaris, q. s. mi-
sce, fiat potio, quæ detur post usum apoze-
matum in die electa mane cum custodia,
deinde:

℞. pul. elect. diarrhod. abb. ʒ. j. conf. capil.
ven. & conf. flor. borrag. an. ʒ. j. sacchari albis-
simi modicum, misce, fiat bolus qui detur
post diem medicamenti cum sequentibus
aquis.

℞. aquar. Borrag. cap. ven. & Buglof-
si, an. ʒ. j. ʒ. misce, quibus utatur, ut dictum
est.

*Et nota quod non est diu persistendum in illis
purgantibus: corpus enim imbecillius reddere-
tur, & coctio humoris impediretur, Est enim pur-
gatio coctioni contraria, itaque melius est expe-
ctare signa coctionis, quæ dum apparebunt, pur-
gandum est corpus propriis medicamentis, dan-
daque postea theriaca antiqua ex doctrina Gal.
continuandique sunt clysteres, in quibus utilissi-
mum est ponere succum mercurialis, utendum-*

quæ

que semper frictionibus tempore matutino, ut continuo discutiatu vitiatu humor, praterea sudores sunt diligenter abstergendi exsiccandique, si qui sunt, & quia solet in principio accessionis rigor vehemens agrotantes infestare optimum erit, ut si quando ille permolestus sit, ut ante accessionem inungatur regio spinalis medulla à cervice ad caudam usque sequenti unguento vel simili.

℞. Olei keirini & irini, an. ℥. iii. olei de spica seu nardini, ℥. iiiii. piperis albi & euphorbii tenuissime tritorum, an. ℥. s. styracis calamitæ & ladani purissimi, an. ℥. vi. ceræ citrinæ, ℥. ii. misce, fiat unguentum, quo inungatur regio spinæ duabus horis ante accessionem, ut dictum est: possunt similiter fieri sequentia decocta.

℞. fol. origani, tragorigani calament. pulg. hyssop. serpill. & saturciæ, an. m. j. flor. chamæmeli, meliloti & sambuci. an. p. iii. fiat decoctio in vino & ex decocto feruente impleantur cucurbitæ tres, quarum duæ lateribus apponantur & tres pedibus ut vaporem calidum persentiscat.

Solet etiam dari succus Tyrenaicus ad quantitatem fabæ quod non aded tutum existimo, nec fieri debet, nisi quando morbus est in vigore & appareant manifesta signa coctionis quo tempore conceduntur alia, & cætera id genus, qua nō de-

bent, nisi à peritissimo Medico præscribi. Et hæc sufficiant de quartana, quæ est ex sincera melancholia.

Alia autem quartana est, quæ solet fieri ex cõuersione aliorum humorum, & quando v. g. bilis vitellina seu alia exassatur & vertitur in atrâ bilem, inde putreſcit & quartanam efficit, pro qua oportet notare semper naturam bilis, quæ excuritur & vertitur in atram bilem: nam eo tẽpore non solû concoquendus est humor atrabilia-rius, sed etiam is ex quo generatur atque etiam uterque generãdus Si igitur sincera bilis seu vitellina, quæ à Galeno describitur, vertatur in atram bilem, & quartanam efficit, procedes per sequentem modum si aluus sit astricta.

℞. decoctionis communis clysteris in aqua hoidei 4. v. in quibus dissolue catho. & medullæ cassiæ recenter extract. an. ʒ. vi. mellis viol. & succi mercur. an. 4. β. olei viol. ʒ. iii. fiat clyster. qui detur vt dictum est.

℞ medull. cassi. nunc extractæ, ʒ. v. cathol. & diasenn. sol. an. ʒ. ii. β. sacc. albiss. modicum, misce, fiat bolus, qui detur in die electa manè cum custodia, ex se vel dissoluen-do in aqua decoctionis fol. mercur. & acetosæ, d. inde:

℞ Syr. de end. comp. ʒ. iii. syr. cap. ven. & de bugloss. an. ʒ. iii. aquæ fum. bugloss. & lupulor. an. ʒ. v. aq. oxalid. & end. an. ʒ. .

fi. s. misce, fiat in lep. clarifi. pro sex dosib. de manè incipièdo post minoratiui assumptionem.

Tabella.

℞. electuarium diarrhod. abb. ℥. j. capiat tabellam j. post quamlibet syrup. assumptionem.

Potio.

℞. med. cassiæ nunc extract. & diasen. sol. an. ℥. iii. rhab. electi in aqua endiu per diem naturalem infusi & expressi, ℥. j. β. interioris cinamomi electi gr. vii. confect. hamec. ℥. ii. syr. cap. ven. ℥. j. aquar Bugl. & fum. an. q. s. misce, fiat potio, quæ detur post vsum syrup. in die electa manè cum custodia.

Bolus.

℞. pulu. triasantali & diarrhod. abb. an. ℥. j. conf. viol. & rad. bugloss. an. ℥. j. sacchari albiss. modicum, misce, fiat bolus, qui detur post diem medicamenti cum sequentibus aquis.

℞. aquar. fum. bugloss & acetosæ, an. ℥. j. β. misce vratur vt dictum est.

Et nota quod hac febris non solet esse contenta unica purgatione quocirca in progressu reiterando clysterem, quoties erit opus, nec non minoratiuum poterit praescribi apozema sequentis descriptionis.

Apozema.

Recipe, rad. rusci, asparagi & gram. temperatarum in vino albo per diem naturalem, an. ℥. j. cort. rad. capp. median. cort. fraxini & tamarisci an. ℥. s. fol. fumar. summitatum lupul. asparagorum, bugloss. & berrag. cum propriis rad. oxalid. cum rad. cichorii, end. & herbar. capil. an. m. j. fol. mercur. m. ii. quatuor seminum frig. maior. contusorum, an ℥. s. seminis anisi & maratri, an. ℥. j. prunorum Damascenorum & passularum mundatarum, an. par. x. polipod. querni recentis, glycirr. rasæ, & folliculorum sennæ Orient. mund. an. 4. s. epithymi, ℥. vi. flor. genistæ, stœcados, & cicerum nigrorum, an. p. ii. trium flor. communium, an. p. j. fiat decoctio ad ℔. ii. in colatura dissolue syrupi de fumo terræ & end. composit. an. ℥. iii. syrup. cap. ven. & oxisacchar. simplic. an. ℥. ii. fiat apozema mediæ decoctionis, clarific. & aromatiz. cum pulu. elect. triasantali, ℥. ii. pul. elect. de gemmis & diarr. ad abb. an. ℥. j. pro sex dosibus mane incipiendo post minoratiui assumpt.

Potio.

Recipe, medullæ cassiæ nunc extractæ & cathol. an. ℥. iii. rhabarb. electi in aqua end. per diem naturalem infusi & expressi

ʒ. j. ꝑ. interioris cinnamomi electi, eodem modo infusi & expressi, gran. vii. electuar. de citio sol. & confectionis hamech. an. ʒ. j. syr. viol. ʒ. j. decoctionis præscripti apozematis, q. s. misce, fiat potio, quæ detur post usum apozematis in die electa mane cum custodia.

Bolus.

℞. pulv. elect. triasant. ʒ. j. pul. elect. de gen. mis & diarhod. abb. an. ʒ. s. conf. viol. 82. bugl. an. ʒ. j. sacchari albiss. modicum, misce, fiat bolus, qui detur post diem solutiui cum sequentibus aquis.

℞. aquar. acetosæ, bugloss. & fumar. an. ʒ. j. s. misce, utatur ut dictum est.

Et nota quod in hac febre poteris etiam dare iheriacam, ubi apparuerint signa cōcoctionis: sed qua debeat temperari cum conserua florum cichorij aut viol. vel cæteris idgenus. Reliqua autem symptomata erunt cum tertianis & quar-tanis communia, & serè per eundem modum erit illis prouidendum.

Theraica in quartana febre quando propinanda.

Si autè quartana sit ex atrabile per adustionem bilis spuria, debet prospicere medicus num atrabilis sit tenuis an crassa, & flaua bilis similiter, & secundum consistentiã cuiusque debebit

Dd.

magis aut minus attenuare aut diffecare.
 Et hæc de Quartanis sufficiant.

CAPVT VII.

De Febre Pestilenti.

Febres pestilentes habent duplicem tractandi modum, nam qui correpti ab illis non sunt, præseruari debent si cogantur morari inter eos qui pestilentia corripuntur, & degere in eodem aëre pestilenti: ut igitur præseruentur, dedit præceptum vniuersale Galen. dum dicit corpora si qua conseruabantur humida, exsiccabamus: notum enim est siccitatem putrefactioni resistere, propterea dantur catapota Ruffi Ephesii, qua possunt in hunc modum præcautionis gratia præscribi hyeme

Pillula ad præcautionem pestilentia.

℞. aloës succotrinae electæ, ʒ. j. myrrhæ opt. ʒ. β. gummi Ammon. recentis ʒ. ii. croci, ʒ. j. malaxentur simul cum melle rosato colato, fiat massa pillular. ex qua formentur pill. vii. pro ʒ. de quibus capiat tres semel in hebdomada post primum somnum, vel tempore matutino.

Et nota quod vehementer soluentia dari non debent tempore pestilentia, eo quod humores turbent, confundant & concoctionem impediant. Porro æstate, in biliosis præsertim, laudare tripheram

pheram persicam, vel mixturam sequentis descriptionis.

Opiata.

℞. medull. cass. recenter à canna extracta & diaprun. simplicis, an ʒ. j. β. tamarind. elect. ʒ. j. rhabar. opt. in aqua end. quousque mollecat infusi, ʒ. β. interioris cinnamom. electi, ʒ. β. misce, & cum syrup. rosar. sol. reduc in formam opiatae de qua capiat semel in hebdomada circiter, ʒ. j. pers. vel dissoluen- do in aq. bugl. & acet. Pot. est præterea præscribi mixtura sequentis descriptionis.

Opiata pro tempore pestilentia.

℞. granor. iuniperi nigror. & infusor. in aceto scillitico per diem naturalem ʒ. β. sem. acetosæ, portul. & end. an. ʒ. ii. sem. citri mund. & card. ben. an. ʒ. iii. rad. gentiana, tormentill. & radicis herbæ tanicis an. ʒ. j. β. zedoaria, gaiophyllor. infusor. in aceto rosato, an. ʒ. ii. margaritarum elect. raseboris, & ossis de corde cerui, an. ʒ. iiii. been. albi & rub. an. ʒ. ii. pul. omnium san- talor. an. ʒ. β. fragment. quinque lapidum pretios. an. ʒ. j. conf. viol. cap. ven. & rad. bugloss. an. ʒ. j. coal. nymphae, & corticis citri cum saccharo conditi, an. ʒ. β. misce, & cum syrup. de limonibus aut de acetosita: e citri reduc in formam opiatae, de qua

Dd 2

capiat singulis matutinis ad quantitatem nucis & differat partum per duas horas aut amplius.

Possunt item præscribi pastilli qui teneantur in ore, possunt præterea de ferri odorata, quæ poma umbra vocantur, item suffitus ex rebus calidis & odoratis, idque præsertim hyemè & in tempore frigido. Cauendum est ab omnibus motibus, tam corporis quàm animæ, qui possunt repente corpus calfacere.

Et hæc sufficiant pro præseruatione à pestilentia.

Nunc de curatione.

Vbi accedis ad aliquem qui febrem pestilentem perpetiatur, primùm prospicere debes, num febris illa sit ex carbone & phlegmone in emunctoriis, deinde debes similiter prospicere, an vis sit imbecilla, necne, & si notæ omnino sint malæ: malæ enim semper perniciem significant, bonæ non semper salutem. Dixit enim Auicē. fen. i. 4. tractatu de febr. pestilent. quod patiens sæpè cum bono pulsu & bona vrina tendit ad mortem, quocirca consideratum oportet esse Medicum antequam curationem aggrediatur. Si igitur sit febris pestilens cum carbone, carbonemque sequatur phlegmone in emunctoriis, sit præterea vocatus circa initia, primò

indito.

indito clystere descriptionis prius in terti-
nis appositæ.

Quo deiecto si cætera consentiant, auer-
te per sanguinis missionem *ꝛꝑ. d. i. §. iv.*, vt vo-
luit Hippocrates. Nec credendum illis sen-
tio, qui diiudicant missionem sanguinis fieri
ex parte laborante, tantisper dum humor
est in fluxu, si enim tumor constiterit per
partem propinquissimam, vacuatio fit opti-
ma & facillima, vbi autem facta fuerit san-
guinis missio, quæ minimè debet fieri ad a-
nimi deliquium vsque ad imbecillitatem vi-
rium, poteris dare purgatiuum sequentis de-
scriptionis.

Potio.

℞. trium florum commun. an. p. j. quatuor
sem. frigid. maior. contus. an. ʒ. j. seminis anisi
& maratri, an. ʒ. ʒ. pomorum dulcium, & pas-
sularum à gigartis mundatarum, par. vi. pul-
pæ tamarindorum electorum, ʒ. vi. fiat deco-
ctio ad ʒ. iiii. & in colatura dissolue tripheræ
perficæ, ʒ. vi. rhabar. electi in aqua endiuizæ
per diem naturalem infusi & expressi, ʒ. ii.
interioris cinnamomi electi eodem modo
infusi & expressi, ʒ. ʒ. syrup. viol. ʒ. ʒ. fiat
potio, quæ detur die sequenti manè cum cu-
stodia.

Et nota quod si nolis dare rhabarbarū, poteris

minoratiui loco facere per sequentem modum.

Bolus.

℞. thiphæræ perficæ, ʒ. v. medull. cass. recent. extract. & diaprun. simpl. an. ʒ. ii. ꝑ. sacchari albillimi modicum, misce, fiat bolus qui detur in die electa de mane cum custodia per se vel dissoluendo in aquis buglossi & oxalidis infusionis tamarindorum.

Nec debet quispiam mirari quod tam imbecilla præbeamus medicamenta, cum vires propter venenum etiam ab initio celerimè prosternantur, vt mirandum etiam non est, si demus ea quæ potius extrahunt bilem è sanguine, quàm alios humores, cum sanguis omnis dum effervesceat subeat naturam bilis secundum partes tenues, cum partes crassæ etiam maximè induant caliditatem extraneam & putredinalem. Porrò dato minoratiui poteris præscribere syrupum concoquentem sequentis descriptionis.

Iulep.

℞. syr. de end. compos. & oxifacchar. simplicis, an. ʒ. ii. ꝑ. syr. limon. & de acetositate citri, an. ʒ. j. f. aquar. oxalidis, morsus diab. an. ʒ. vi. misce, fiat iulep. clarificatum pro quatuor dosibus de mane incipiendo post minoratiui assumpt. deinde:

Potio.

Potio.

℞. rhabar. opt. in aqua end. per diem naturalē infusi & expressi, ℥. ii. interioris cinnamomi electi eodē modo infusi, ℥. s. tripherae perficæ, ℥. vi. syr. rosar. sol. ex infusione rosarum sine scammon. ℥. j. s. misce, fiat potio, quæ detur post usum syraporum in die electa de manè cum custodia.

Bolus.

℞. pulu. elect. diamarg. frigid. ℥. j. pulu. elect. de gemmis & triasantal. an. ℥. s. conf. flor. cichor. & rosar. an. ℥. j. sacchari albiss. modicum, misce, fiat bolus qui detur post diem medicinæ cum sequentibus aquis.

℞. aquarum oxalid. buglossi. & nymphaeæ, an. ℥. j. s. misce, quibus utatur ut dictum est.

Et nota quod ferè semper hæc febres pestilentes sunt coniuncta cum virium imbecillitate & cum frequentib. lypothymijs, quocirca siue dormiat ager, siue non dormiat, optimum erit uti sequenti remedio per sequentem modum.

Potio.

℞. pulu. elect. diamargar. frigid. ℥. ii. pulu. elect. de gemmis triasantal. an. ℥. j. confect. alker. ℥. s. syr. limon. ℥. j. aquarum acetos. & buglossi. an. q. s. si autem dormire non possit, dabis loco syrapi

limonum, syrapi de papau. ℥. j. vel ℥. j. ℞. & ad-
de tyrup. limonum vel de acetofitate citri,
℥. ℞. Præterea poteris vti restauratiuo se-
quenti.

Restaurans in pestilentia tempore.

℞. pulu. diamargar. frigid. ℥. ℞. puluer. ele-
cti de gemmis & diarrhod. abbat. an. ʒ. ii. mi-
sce, & cum carnibus capi euiscerati munda-
tisque pinguedine & pelle lotis cum aqua
rosarum oxalidis & bugloss. fiat instaurati-
uum quod coquatur in balneo Mariæ per
spatium sex vel septem horarum, de quo ca-
piat cochlearia aliquot per se vel in iusculo
pro roborando corde.

*Solet etiam fieri epithema sequentis descri-
ptionis.*

Epithema in peste.

℞. fragmentorum quinque lapidum pre-
tiosiorum, ad. ʒ. j. pulu. omnium santalorum,
an. ʒ. j. ℞. granor. alkerm. ʒ. iiii. ossis de corde
cerui, rasuræ eboris & margaritarum electa-
rum, an. ʒ. ii. trochiscorum de camphora, ʒ.
℞. aquarum bugloss. nenupharis & rosarum,
an. ʒ. v. acceti rosati, ℥. j. ℞. misce, fiat epithe-
ma, in quo infundatur panni tincti in granis
alkermes, & tepidè cordi applicetur, reno-
uando quoties erit opus. Super carbonem
nihil est melius, quam apponere ab initio
Galenii remedia, quorum alterum.

Em-

Emplastrum.

℞. troch. *Cels. lib. 6. c. 14.* Andronii (constant ex alumine, squama æris rubri, atramēto, galla) an. ʒ. j. dissol. in sapa seu in vino cocto, & reduc in formam mellis, fiat emplastrum quod apponatur super locum vlceris. Et quoniam illi trochisci rarò præparati reperiuntur, solent vti Chirurgi loco illorum trochiscorum asphodelorum, quos appellāt trochiscos de asphodolis, qui possunt applicari per eundem modum, qui si præparati minimè reperiantur, solent vti ruptorio sequenti.

Ruptorium.

℞. Calcis viuæ & non extinctæ, ʒ. j. saponis mollis, q. β. formetur in formam vnguenti solidi, & fiat emplastrum in formam vlceris, & super vlcus applicetur.

Non laudo quod chirurgi imperiti faciūt, qui cū prædicto emplastro addunt argentum viuum, sublimatū, quoniam in vniuersim corpus operatur: testimonio sunt qui patiūtur morbū neapolitanum, qui si applicarent illud circa partem aliquam, largum mittunt sputum, præterea gingiua inflammantur, quocirca illud apponendum nusquam censuerim in dispositione febrili, loco

eius tamen poni potest calcantum, vel calcytis, vel cetera id genus: ut melantheria, psori, misy.

Porrò in circuitu vlceris non debet poni vnguentum de rubrica fabrili, quod appellant de bolo, cum bolum armen. minimè habeamus, sed eius loco debet poni cataplasma de arnogl. quod potest fieri per sequentem modum.

Cataplasma de arnogl. pro carbunculo.

℞. fol. plantag. m. iii. farinae lentium, ℞. j. s. medull. pab. domestici qui nec omnino furfuraceus sit, nec omnino furfuris expers ℞. j. contendantur omnia simul & coquantur in aqua fontis laudatissimi & fiat cataplasma quod partibus circumiacentibus carbunculo applicetur, quæ inflammationem sentiunt.

Et in hac cura debes procedere tantisper dum perdurabit inflammatio, vbi autem eschara erit omnino exusta, tunc est procurandus eius casus per sequentem modum.

℞. butyri non saliti, ℥. iii. vitellos ouorum. n. iii. reducantur in formam vnguenti, quod super escharam apponatur, postea curerur vt vlcus utridum, diligenter abstergendo; & in ea re tener principatum Mundificatiuum de Apio, quod vocant, cuius forma talis est.

Mun-

Mundificatiuum de apio.

℞. succi folior. apii depurati ℥ j. succi
 absynthii, plantag. & crassulæ siue teucrii
 an. ℥.iiii. thuris, mastich. myr. hęc, an. ℥.ii. the-
 rebent. abietis ℥. iii. farinæ hordei fabar. &
 orob. an. ℥. iii. s. mellis optimi ℥. j. s. coquan-
 tur simul ad spissitudinem mellis, vtatur vt
 dictum est.

Hactenus de formâ curationis febrium.
 Quod superest, Deum Optimum Maxi-
 mum oro, vt studia & consilia nostra be-
 nè fortunet; vt in hoc nostro vitæ ge-
 nere hominibus opitulari pos-
 simus.

*Aeterno, soli sapienti, & cuncta regenti,
 Laus in perpetuum, gloria, sanctus honos.*

FINIS LIBRI QVARTI.



SCD Lyon 1



TRACTATUS
 DE MEDICAMEN-
 TIS TVM SIMPLICIBVS
 TVM COMPOSITIS ADVER-
 sus morbos, tum simplices, tum
 compositos quibus medici vtun-
 tur, atque de ipsorum dosibus, in
 gratiam eorum qui pra-
 xim adeunt.

In plures classes digesti.

CLASSIS PRIMA.

CONTINET hæc prima classis
 medicamenta simplicia & com-
 posita bilem flauam purgan-
 tia, & eorum doses præscri-
 bens. Corpora enim perfecte
 sana nequaquam sunt purganda propter pur-
 gationis difficultatem, quæ varia incommo-
 da adfert, cuiusmodi sunt dolor ventriculi,

morsus cordis, tormina intestinorum, vomitus, vertigo, lypothimia, syncope. Contra vero corpora imperfectè sana, sunt purganda quo natura iuuari & subleuari possit, à présente spontanea lassitudine, reliquiis morbi præcedentis, habitu athletico, cacochimia, à morbo per interualla incurrente. Purgantur autem commodè verno tempore omnes humores, sed maxime biliosi & serofsi, autumnali verò pituitosi & melancholici præcipuè.

Medicamenta simplicia bilem flauam purgantia.

Cassia datur ab ʒ.ʒ. ad ʒ.ʒ. Aloë datur in substantia à ʒ.ʒ. ad ʒ.ii. in infusione verò à ʒ.ʒ. ad ʒ.iii. Pruna damascen. dulc. dantur ab ʒ.ʒ. ad ʒ.iii. Manna datur ab ʒ.ʒ. ad ʒ.ii. Tamarindi dantur ab ʒ.ʒ. ad ʒ.ii. Myrabolani citrini dantur in infusione à ʒ.ʒ. ad ʒ.iii. in substantia verò à ʒ.ʒ. ad ʒ.ii. succus vel infusio ros. ab ʒ.ʒ. ad ʒ.ii. rhabarb. in infusione à ʒ.ʒ. ad ʒ.iii. in substantia à ʒ.ʒ. ad ʒ.ii. Therbint. à ʒ.ii. ad ʒ.iiii. scammonium seu diagridium à gr.iiii. ad gr.vii.

Medicamenta composita flauam bilem purgantia.

Electuarium catholicum & diaprunor. solut. dantur à ʒ.ii. ad ʒ.ʒ.ʒ. electuarium de

de succo ros. & elect. rosar. mes. dantur à ʒ. j. ad ʒ. iiii. electuar. de citro solut. electuar. de psillio, triphera persica, diasebesten, hiera simpl dantur à ʒ. ʒ ad ʒ. v. Syrupus de cicoreo cum rhabarb. & syrup. violar. dantur ab ʒ. ʒ. ad ʒ. ii. pillulæ de aloë, de assaiaret, pillulæ ruffi, pillulæ sine quibus, pillul. de rhabarb. dantur à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. ʒ.

Pillulæ aggregat. aureæ, lucis dantur à ʒ. ʒ. ad ʒ. iiii.

Nota raro pillulis astate esse utendum propter aloës caliditatem & siccitatem, rarius adhuc cum metus fluxionis sanguinis adest.

C L A S S I S I I.

IN hac secunda classe describuntur medicamenta simplicia & composita, & eorum doses præscribuntur: Notandum tamen pituitam crassam, lentam & viscidam ante purgationem esse præparandam incidentibus, præparantibus sæpius repetitis, ut radicibus apii, fœniculi graminis, asparagi, hyssopi, thymi, decoctis & seminibus additis flatus discutientibus.

Medicamenta simplicia pituitam purgantia.

Animaduertendum in obstructionibus vi-

tandos esse myrabolanos, tribus autem speciebus communiter vtimur.

Mirabolanorum speciebus.

Mirabolani chebuli dicati sunt hepati & cerebro, bellirici cordi & hepati, emblici sple ni & ventriculo, dantur in substantia, à ʒ. ʒ. ad ʒ. iii. in infusione à ʒ. j. ad ʒ. vi.

Mitioribus plegmagogis addeoda sunt quæ bilem vacuant, vt sunt semen carthami quod datur ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. Galen. dat cum caric. pinguium æquali pondere. Nitrosa vi pituitam expurgat decoctum galli gallinacei decrepiti cū hyssopo vel thymo ad ʒ. vi. Saccharum & mel rosatum adduntur iusculis dandis paulo ante cibum iuuenibus & senioribus ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. ʒ. sthecas arabica datur in substantia à ʒ. ʒ. ad ʒ. ii. in infusione à ʒ. j. ad ʒ. iii. Polipodium coctum ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. Agaricus & turbith vtrumque datur in substantia à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. ʒ. in infusione à ʒ. j. ad ʒ. ii. in coctione ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. f. hermodactili à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. colocynthis & euphorbium dantur à gran. iii. ad gran. viii. cataputiæ puluis datur à ʒ. ii. ad ʒ. j. sarcocolla, scilla, brionia, aristolochia rotunda dantur à ʒ. j. ad ʒ. j. cum hydromelite vel decocto

con-

conuenienti : Azarum, bdellium, styrax pinguis & flauus dantur ʒ. ij.

Medicamenta composita pituitam purgantia.

Agaricus datur à ʒ. ʒ. ad ʒ. ii. Hie ra pira Gal. datur à ʒ. j. ad ʒ. iiii. electuarium catholicum datur ab ʒ. ʒ. ad ʒ. v. electuarium diacarthami, diaphenicum, elect. Indum, benedicta lax. dantur à ʒ. ii. ad ʒ. vj. Trochisc. alhādā. & trochisci de colocynthide præscribuntur à gr. iiii. ad gr. viii. Pillulæ de hiera simpl. elephanginæ, stomachicæ, mastichinæ dantur à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. Pillulæ de agarico, aggregatiuæ, coccinæ, arthreticæ, fœtidæ, sine quibus, lucis maiores & minores, dantur à ʒ. ʒ. ad ʒ. iiii.

CLASSIS III.

HAec tertia classis, continet medicamenta simplicia & composita melancholicum humorem purgantia ipsorumque doses, cum autem hic humor melancholicus eadem ferè præparatione, qua pituita, imo longiori indiget antequam euacuetur, imo per interualla repeti debet & præparatio & euacuatio, præcipuè enim autūno & hyeme euacuari debet, præparatur quemadmodum pituita decoctis aperientibus & incidentibus.

E e

cuiusmodi sunt decocta parata ex corticibus radic. cappar. tamarisc. sambuc. cortic. medianæ fraxini, fumaris, lupuli, cetherac, adianthos, thymi, epithymi, cuscute, borrag. buglossi, pimpin. & aliis eiusmodi.

Medicamenta simplicia melancholiam purgantia.

Polipodii decoctum exhibetur à ʒ. ii. ad ʒ. j. senna orientalis datur in substantia à ʒ. j. ad ʒ. iii. in infusione à ʒ. ii. ad ʒ. vj. raro infunditur, decoquitur ad ʒ. j. epithimum & cuscuta dantur ex sero lactis aut alio quouis decocto conuenienti à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. decoquuntur ad ʒ. j. lapis armenus & lazuli præpar. dantur à ʒ. j. ad ʒ. j. Radix ellebori nigri ex decocto conuenienti datur à ʒ. j. ad ʒ. j. Elleborus albus non est in vsu. Decoctum omnium myrabol. dantur ab ʒ. iii. ad ʒ. viij.

Composita medicamenta melancholiam purgantia.

Oximel compositum datur ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. electuarium catholicum omnes humores purgat, plus tamen illius debetur pituitæ & melancholiæ quàm bili, datur ab ʒ. j. ad ʒ. x. diasenna simplex, triphera sarraceni- ca, hiera Russi dantur à ʒ. iii. ad ʒ. vj. confectio hamec. elect. diacarthami, elect. de epithymo, electuar. indum maius dantur à ʒ. j. ad ʒ. vj. Diacatholicum cum scammonio,
cathar-

Catharticum imperiale, dantur à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. ʒ.
 Pillulæ indæ, de fumaria, de epithymo, de
 bdellio, de lapide lazuli, de quinque generi-
 bus myrabolanorum fœtidæ dantur à ʒ. ʒ.
 ad ʒ. iiii. Notandum præterea sæpius vten-
 dum esse decoctis quàm pillulis: nam calidus
 succus sicco remedio non facilè cedit, cum
 autem exhibentur pillulæ melancholicis in
 affectibus capitis, humidum aliquod deco-
 ctum illico est propinandum. Et hæc de tri-
 bus primis Classibus dicta sufficiant.

Sequuntur modo aliæ classes, quarum pri-
 ma medicamenta continet contra frigidam
 intemperiem, eaque simplicia per gradus
 caliditatis ordine distincta.

Classis prima de radicibus calidis.

Radix aritholochiæ, vtriusque borraginis
 & buglossi calidæ sunt in primo gradu.

In secundo gradu.

Radices pœoniæ, cyperi, centaurei minoris,
 scillæ, azari.

In tertio gradu.

Betonicæ, galangæ, chelidonii, fœniculi,
 pyrethri.

Semina calida in quarto gradu.

Synapi, ocymi, sylvæ montani, raphani,
 pœoniæ, abrotani, seseleos, massil. linguæ
 quis.

Ligna & cortices.

Xiloaloes, macis.

Fructus.

Cubebæ, Anacardi, nux moschata, cucumeragrestis.

Herba in primo gradu calida.

Camæmelum, malua, melilotus.

In secundo gradu.

Pæonia, polium, primula veris, anethum, laurus, camepithis, ocymum, ver-bena.

In tertio gradu.

Betonica, ruta hortensis, salvia, mentha, pulicaria, sthœcas, eufrafia, rosmarinus, fœniculus, filer mont. sampfucus, acorus, myrthus, balsamita, chelidonium, centaur. min. camædriis, hyssopus, nigella, thymus, serpillum, ruta siluestris.

Flores calidi in quarto gradu.

Anthos, sthœchados vtriusque chelidoni, schenantos, salvia, meliloti, epithimi, spicæ vtriusque.

Gummi.

Styrax, calamynth. ladanum, thus. opobalsamum.

Ex animalibus.

Castoreum, moschus, ambra.

CLAS-

C L A S S I S I V.

IN hac quarta classe proponuntur medicamenta composita & electuaria calida aduersus intemperiem frigidam capitis.

Theriaca, aurea alexandrina, mithridatum confectio anacardina.

Electuaria solida.

Diarrhodon Iulii, diacastoreum, elect. de gemm. elect. rosatum Gabrielis, diambra Democ. diaprassium, dianthos cum moscho diamargar. calid. elect. dulce ex moscho, aromat. ros. diaireos.

Syrupi.

De sthécade, acetum scilliticum, vinum maluaticum, syrup. de corticibus citri, oximel scilliticum.

Sacchara.

Lauendulæ, Pœoniæ, rorismarini, betonicæ, anthosatum.

Aqua stillatitia.

Melissæ, saluiæ, maioranæ, violæ, betonicæ, fœniculi, iuæ moscharæ, Hierapicra Galeni, Hermetis, Archigenis, Ruffi.

Conserua.

Anthos, lauendulæ, radic. Pœoniæ, acori, betonicæ.

Olea.

Amygdalarum dulcium, irinum, lauri

E c 3

num, mastichinum, costinum, de lateribus, de cucumere asinino, de sambuco, nardinum, camamelin. myrthinum, rutaceum, de euphorbio, de piperibus, croci, citrium vel cydoniorum.

Vnguenta.

Aragon, Martianum, de bdellio.

Pillula.

Coccia, & hiera compos. de euphorbio.

C L A S S I S V.

IN hac classe agitur de medicamentis simplicibus aduersus intemperiem calidam capitis.

Radices calidæ in primo gradu.

Endiuia, Scariolæ.

In secundo gradu.

Lactucæ, Arnoglossi.

Folia in primo gradu calida.

Scariolæ, endiuia, salicis, politrisci, myrthi, acetosæ, violariæ, adianti vtriusque.

In secundo gradu.

Lenticulæ aquaticæ, cydoniorum, cucumeris, ribes, lactucæ, cucurbitæ, melonum, citruli.

In tertio.

Hyosciami, portulacæ, vermicularis, nymphaeæ, papaueris albi, plantaginis, semperuiui, mandragoræ.

Gummi

Gummi seu liquores.

Camphora, tragacantha, gummi arabicum.

Semina.

Cucumeris, endiviæ, portulacæ, psyllii, papaveris albi, barbæ Iouis, mandragoræ, melonum, cydoniorum, citrulli, scariolæ, solani, cucurbitæ, rosæ, violæ.

Ligna & cortices.

Santalum album, citrinum, rubrum, cortex falicis.

Flores.

Violarum, rosarum, nenupharis.

Fructus.

Berberis, hordeum, amygdalar. dulc. ribes, maura, mala cidonia, fabæ fractæ.

C L A S S I S V I.

Medicamenta composita in hac sexta classe complectuntur, aduersus intemperiem calidam capitis.

Electuaria liquida.

Diamanna, diarrhodon abbat.

Electuaria solida.

Diatrium santalon, diacorallium, diatrachacan. frigid. electuar. rosar. diarrhod. abbat. manus Christi, electuar. diapapau. diapenidium.

Ec 4

Conserua.

De nymphaea, de prunella, violarum, rosarum.

Sacchara.

Rosarum, persica condita, cydonia condita, violaceum, pruna condita.

Aqua stillaritia.

Violarum, solatri, lupuli, lactucae, nymphaeae, hordei.

Syrupi.

De iniubis, de portulaca, rosarum, acetosae, de succo cucurbitae, de papauere, violarum, nymphaeae.

Olea.

De nymphaea, de Mandragora, Cydoniorum, violaceum, omphacinum, rosaceum.

Vnguenta.

Populeum, refrigerans Galeni, rosaceum, sandalinum.

Cerata.

Ceratum Galeni.

Pillula.

Elephantinae, Silurus probat aureas Nicolai, & aggregatiuas Mesuæi in cephalalgia à sanguine.

Trochisci.

De caphura, oxiacanthae, de spodio, sandalorum.

Con-

*Contra impertem frigidam pectoris
simplicia medicamenta.*

C L A S S I S VII.

Radices calidæ in primo gradu.

Althææ, Glycyrrhizæ.

Calidæ in secundo.

Ireos, fileris montani, scillæ, vngulæ cæ
ballinæ.

Calidæ in tertio.

Enulæ campanæ, gentianæ, betonicæ.

Herba calidæ in primo gradu.

Maluæ, melilotus, chamæmelon, branca
vrsina.

In secundo gradu.

Polium, ocimum, anethum.

Calidæ in secundo gradu.

Calamentum, origanum, pulegium, mar-
rubium album, satureia, cuminum.

Ligna.

Liquiritiæ, zinziberis, cinamomi.

Fructus.

Vuæ passæ, caricæ, pinea nux, amygdal,
dulc. dactili.

Semina.

Vrticæ, lini, pulegii, bombacis, nasturtii,
althææ, fœnugræci.

Flores.

Hyssopi, ireos, camæmeli.

*Gummi.*Myrrha, opopanax, serapium, galbanum,
ammoniacum.*Succi concreti.*

Amylum, melanacardinum.

Metallica.

Autipigmentum, sulphur.

*Contra intemperiem frigidam pectoris
medicamenta composita.*

C L A S S I S V I I I.

*Electuaria solida.***E**lectuarium ex moscho, diacarmomeli,
diahysopi, diazinziberis, diaireos salo-
monis, diacalaminthæ, diaprassium, diape-
nidium.*Conserua.*Enulæ campanæ, conseruæ ireos, conser-
uæ capil. veneris.*Looch & elegmata purgantia.*Looch de scilla, de pino, de brassica, de
pulmone vulpis.*Syrupi.*Ex prassio, capil. veneris, oxymel simplex,
syrupus ex hyssopo, ex calaminta, oximel
scilliticum.*Aqua*

Aqua stillatitia.

Calamenti, hyssopi, verbenæ, prassii, enulæ
campanæ, maluæ, scabiosæ, capil. veneris.

Pillule.

Ex agarico, elephanginæ.

Olea.

Liliðrum, irium, rutaceum.

Vnguenta.

Martiatum, resumptium, de althea.

Emplastra.

Zachariæ, ceroneum.

*Contra intemperiem. solidam pectoris
medicamenta sim-
plicia.*

C L A S S I S I X.

Radices frigida in primo gradu.

Scariola, endiuia.

In secundo gradu.

Arnoglossi.

Herba frigida in primo gradu.

Violaria, scariola, endiuia, adianthum, v-
trumque polythricum.

Herba frigida in secundo gradu.

Folia citrinorum, cucurbitæ, citruli, folia
melonum, cucumeris, psilii.

In tercio gradu.

Vermicularis, plantago, peru'aca.

Flores.

Violæ, nenupharis.

*Fructus.*Hordeum, fabæ fractæ, mora, iuiubæ, se-
besten, amygd. dulc.*Semina.*Citrinorum, cucumeris, citrulli, endiuia,
psillij, cidoniorum, cucurbitæ, scariolæ.*Gummi.*

Tragacanthum, Arabicum, acacia.

*Succi.*Cydoniorum, cucumeris, citrinorum, ci-
trulli, cucurbitæ, bursæ pastoris.

*Contra intemperiem calidam pe-
ctoris composita medi-
camenta.*

C L A S S I S X.

Electuaria solida.

Diarrhodon abb. diamargar. frigid. dia-
prassium sine speciebus, diaphœni-
con, Electuarium resumptium seu refi-
ciens.

*Conserua.*Rosarum, violarum, nenupharis, radicis
lucæ.

SAC-

Sacchara.

Rosaceum, violaceum.

Looch.

Diamoron, diapapauerinum.

Syrupi.

De granatis, violatus, de iuiubis, de papauere, myrtilorum, adianthinum, de succo cucurbitæ, rosatus.

Iulapia.

Rosatum, violatum, de iuiubis.

Aqua stillatitia.

Scariolæ, capill. ven. hordei, endiuia, cichorii, cucurbitæ, vngul. caball.

Pillule Belchica.

Trochisci, hamech, carabe.

Olea.

Violaceum, de nenuphare, leucoium marinum, de papauere.

Emplastra de gallia, de cerusa cerata.

Violaceum, populeum, rosatum.

*Contra intemperiem frigidam cordis
simplicia.*

C L A S S I S X I.

Radices calida in primo gradu.

Buglossi, Borraginis.

In secundo gradu.

Valerianæ, Cyperi.

In tertio gradu.

Enulæ campanæ, galagæ, zedoariæ.

Herba calida in primo gradu.

Borrago, Buglossum.

*In secundo.*Menta, ocymum, melissa, polium, maio-
rana.*In tertio.*Betonica, rosmarinus, hypericon. pule-
gium, origanum, ballamita, satureia, abrota-
num, calamintha.*Ligna & cortices.*Xilaloës, cortex citri, cinnamomum, ma-
cis, calamus arom.*Fru ctus.*

Cubebæ, nux moschata, cariophillum.

Semina.

Cardamomi calaminthæ, origani, pu-

*Flores.*Borraginis, croci, Buglossi vtriusque, spi-
ricæ nardi.*Ex animalibus.*

Ambra, moschus.

Con-

*Contra intemperiem calidam cordis
composita medica-
menta.*

CLASSIS XII.

Electuaria liquida.

Confectio alkermes, aromaticum ros.
confectio ligni aloës, confectio anacar-
dina.

Electuaria solida.

Aromaticum ros. ex Gabrielis descriptio-
ne, de gemmis de citro, diacodion. diacant.
diambra, latificans Gal. diamarg. frigidum.

Trochisci.

Ligni aloes.

Conserua.

Buglossi, de pomis odoratis, zinziber con-
ditum, Borriginis, citria condita, mel rosa-
rum.

Aque stillatitia.

Melissæ, sambuci, mentæ, calaminthæ,
rorismar. enulæ camp. Borriginis, Hyperici,
Buglossi.

Olea.

Nardium, de piperibus, de absyn-
thio.

*Contra intemperie calidam cordis
medicamenta simplicia.*

C L A S S I S X I I I .

In primo gradu frigida.

Scabiosæ, acetosæ.

In secundo gradu.

Lactucæ, hortensis, & sylvestris.

In tertio.

Arnoglossi.

Ligna & cortices.

Santalum album rubrum, citrinum.

Herba frigida in primo gradu.

Acetosæ, myrchi, violaria, atriplex.

In secundo gradu.

Lactuca, pentaphyllon.

In tertio.

Nenuphar, portulaca, plantago.

*Contra intemperiem calidam cordis
medicamenta composita.*

C L A S S I S X I V .

Electuaria liquida.

Diamannæ, confectio hamech, dia-
ciennæ.

Solida

Solida electuaria.

Diarrhodon siue diatrium(santalum), dia-
marg. frigid. diarrhod. abbat.

Syrupi.

De corticibus citri conditi, acetosus, vio-
laceus, de agresta, de succo limon. nenupha-
ris, de pomis aridis.

*Contra intemperiem frigidam stomachi
simplicia.*

CLASSIS XV.

Radices calide in primo gradu.

Melissæ, centaurii vtriusque, scylla.

In secundo gradu.

Raphani, zinziberis, gentianæ, zedoariæ,
galangæ.

Herba calida in primo gradu.

Absinthium, cuscuta, folia myrthi, cupa-
torium.

In secundo gradu.

Fumus terræ, marrubium album, ocy-
mum, pulegium regale, siler montanus, cen-
taurea vtraque, folia lauri, laueudula, melif-
sa, scabiosa, betonica, ruta, hyssopus, salvia,
dictamnus, rosmarinus,

In tertio gradu.

Amium, cuminum, costus, thymus, rapha-

mus.

F. F.

SCD Lyon 1

Fructus.

Carpobalsmi, baec. iuniperi, myrabolani,
cariophilli, nux moschata, cubebæ.

Flores.

Schœnanthos, anthos, saluiæ, spica vtra-
que.

Cortices & ligna.

Santalum triplex, calaminta aromat. po-
ma citri, macis, cinnamomum, xyloaloës,
xylobalsammu.

Gummi & resina.

Mastiche, thus, styrax.

Semina.

Amomi, anisi, fœniculi, cardamomi, co-
tiandri, carui.

Ex animalibus.

Castoreum.

*Contra intemperiem frigidam stomachi
medicamenta composita.*

CLASSIS XVI.

Electuaria liquida.

Triphera magna, triphera moschata, tri-
phera Galeni, hiera picra Ruffi, Galeni, Phi-
lonis, confectio ligni aloës, triphera minor,
confectio anacardina, athanasia magna, ro-
satæ nouella.

Electuaria solida.

Diacurcuma, elect. stomach. de gemmis,
de

de citro diamarg. calidum diambra, diatriumpipercon diaciminum, dialcea, arom. ros. exhilarans Gal. diagalanga, diacinnamomum, dianthos, diacydonites, diazinziber.

Pulveres.

Ligni aloës, arom. ros. diarrhod. baccarum lauri, pulveres ex supradictis electuariis.

Cerata.

Stomachicum Andromachi.

Emplastra.

Martiatum, aragon.

Conserua seu condita.

Enulæ camp. zinziber conditum, chebulæ conditæ, citra condita, myrabolani, mel rosatum.

Syrupi.

Deabsynthio, de cort. citri cond. oxymel simpl. de fumo terræ, vinum mulsum, oxymel scylliticum.

Aqua stillatitia.

Sampfuci, rorism. betonicæ, absynthij, mentæ, fumariz, hyssopi, raphanorum.

Trochisci.

Diarrhodon, cyperi, ligni aloës.

Pillula.

De hier. simpl. de aromat. elephanginæ, de hier. simpl. ante cibum, de aloë, stomachicæ.

℞ 2

METHODVS

Olea.

Laurinum, absynthii, costinum, liliorum,
rutaceum, de kerua, cyperi.

Emplastra.

De baccis lauri, ad stomachum, ceroneū.
*Contra intemperiem calidam stomachi
simplicia medicamen-
ta.*

CLASSIS XVII.

Radices frigida in primo gradu.

Endiuia, scariola.

In secundo gradu.

Lactuca, polygoni.

In tertio gradu.

Arnoglossi, eichorii.

Herba frigida in primo gradu.

Endiuia, folia myrthi, scariola, sonchus.

In secundo gradu.

Cichorium, lentigo aquat. fol. sumach. la-
ctuca, rostrum porcinum, polygonum,

In tertio gradu.

Nymphaea, portulaca, plantago, semper-
uium.

Flores.

Violarum, rosarum, balaustiorum, conso-
lida regalis.

Fructus.

Cydonia, cerasa, mala granata, yuae ma-
sura;

turæ, cucumer, melones, mala arantia, pyra,
limones, poma acetosa, fraga, ribes, oliuæ
recentes.

Semina.

Coriandri, cucumeris, scariolæ, melonum,
citri, citrulli, cucurbitæ, lactucæ, portulacæ.

Succi.

Citri, berberis, acetum, vmbicili veneris,
myrthilli, glycirrhizæ.

Ex animalibus.

Spodium.

*Contra intemperiem calidam stomachi me-
dicamenta composita.*

CLASSIS XVIII.

Electuaria liquida.

Triphera persica, diamanna.

Electuaria solida.

Diacydonium, diamarg. frigid. diarrho-
don. abb. triasantala.

Conserua.

Violarum, rosarum, cydonia condita.

Condita.

Ex prunis, forbis, pomis, ribes.

Sacchara.

Rosatum, violatum.

Syrupi.

Nenupharis, portulacæ, acetosus, viola-
tus, myrthinus, rosatus, acidus de pomis,
de cydoniis.

Trochisci.

Santalorum, hamech.

Pillula.

Communes, aureæ, stomachicæ.

Olea.

Myrrhinum, ex cydoniis, rosatum.

Vnguenta.

Rosatum, populeum, violatum.

Ceratum.

Santalinum Galeni.

Emplastrum.

De cerufa.

Contra intemperiem calidam hepatis medicamenta simplicia.

CLASSIS XIX.

Radices calide in primo gradu.

Borraginis, agrimonix.

In secundo gradu.

Scyllæ, consolidæ vtriusque, fœniculi, graminis, asparagi, calami arom.

In tertio gradu.

Enulæ camp. betonicæ, gentianæ, dauci, zedoariæ.

Herba calida in primo gradu.

Pescolumbinus, sambucus, cuscuta, beta, eupatorium, absynth. pontic.

In secundo gradu.

Absynthium, asparagus, maiorana, fumarica,

maria, camepithis, gramen, bruscus, fœniculus, scabiosa.

Intertio gradu.

Amni, betonica, hyssopus, costus, origanum, menta vtraque.

Flores.

Scœnanthos, centaurei min. iunci odorati, cariophyllor. camomillæ, betonicæ.

Fructus.

Amygdala amara, vuc passæ, nux myristica, pistacia, pineæ, nuclei persic. baccæ iuniperi.

Semina.

Brusci, asparagi, fœniculi, amomi, cardamomi, anisi, fœnugræci, apii, ameos.

Gummi & liquores.

Oprobalsamum, ammoniacum, bdellium.

Ex animalibus.

Ambarum.

Contra intemperiem frigidam hepatis medicamenta composita.

CLASSIS XX.

Electuaria liquida.

Magna moschata, athanasia magna, mina aromatica, hiera picra Galeni, rosata nouella, antidotus Philonis.

Electuaria solida.

Diacarennia, diacydonium, dianisum sine

Ff 4

Speciebus, diacuminum, de aromatibus, xiloaloes, de rhabarbaro, dialacca, diarrhodon simpl. diacostus, diacalamintha, de gemmis, latificans Galeni: de citro.

Conserua.

Enulæ camp. zinzib. condit. sambuci, cydon. condit. citri.

Syrupi.

De absynthio, tumiterræ, oximel diureticum, de eupatorio, oxifacchara, oximel compos.

Trochisci.

De eupatorio, rhabarbari, berberis Rhasis, anisi, de absynthio, capparis, ligni aloes.

Pillule.

De rhabarbaro, de eupatorio.

Olea.

Irinum, de absynthio, de eupatorio, costinum, balsaminum, laurinum, nardinum, sambucinum.

Vnguenta.

Martiatum, aragon.

Emplastra.

De baccis lauri, diachylon alb. ceroneum, de meliloto.

Cerata.

Diapenidion, stomach. cum,

Col-

*Contra intemperiem calidam hepatis
simplicia.*

C L A S S I S X X I.

Radices frigida in primo gradu.

Endiuia, scariolæ.

In secundo gradu.

Lactuca, oxalidis.

Herba frigida in primo gradu.

Endiuia, cichorium, hepatica, atriplex,
fragaria, scariola, violaria, folia myrthi.

In secundo gradu.

Lentigo aquæ, folia sumach, adianthum
alb. lactuca, plantag. rostrum porcinum, o-
xyacantha, adianthum nigrum, solanum.

In tertio gradu.

Portulaca, plantago, vermicularis, nym-
phea.

Flores.

Rosarum, cichorii, violarum, nymphaeæ.

Fructus.

Vuæ immaturæ, pruna, cucumeres, berbe-
ris, ribes.

Semina.

Quatuor semina frigida maiora, melo-
num, cucurbitæ, cucumeris, citrulli.

Quatuor semina frigida minora, endiuia,
lactuca, acetosa, portulacæ.

Ligna & cortices.

Santali omnes.

Succi.

Vinum mali granati, aqua hordei, omphacium, acetum.

Gummi seu lachryma.

Camphora.

Ex animalibus.

Rasura eboris, spodium.

*Contra intemperiem calidam hepatis
medicamenta composita.*

CLASSIS XXII.

Electuaria, liquida.

Triphera minor, triphera persica.

Electuaria solida.

Diarragacant, frigidum, diaborraginatum, diatriosantalorum, diarrhodon abbatis sine peciebus, de psillio.

Conserua.

Cichorii, rosarum, radix lactucae, pruna condita, violarum, flor. borraginis, persica condita.

Syrupi.

Rosatus, de endiuia, acetosus, de papaue-
re, oxysaccharum, de fumo terrae, de portu-
laca.

Aqua Stillatitia.

Violarum, endiuiae, berberis, cichorii, len-
tig. aquae, scariolae, plantaginis, capillorum
vener. portulacae, lupulorum.

Sacchara.

Rosatum, violatum.

Trochisci.

De rosis, de spodio, de iuiubis, sandalorum.

Pillule.

Aggregatiuz.

Olea.

Rosaceum, nenupharinum, cydoniorum, violaceum, myrrhinum, omphacinum.

Cerata.

Santalinum, album Galeni.

Vnguenta.

Rosatum, populeum.

*Contra intemperiem frigidam lienis,
medicamenta simpli-
cia.*

CLASSIS XXIII.

Radices calida in primo gradu.

Scolopendriæ, aristoloch. rotundæ.

*In secundo gradu.*Fœniculi, asphodeli, acori, azari petrofe-
lini, valerianæ, ireos, scyllæ.*In tertio gradu.*-Apii, azari, capparorum, gentianæ, vi-
ticæ.

Herba calida in primo gradu.

Buglossum, lingua auis, melilotus, borrago, camæmelum, althea, beta.

In secundo gradu.

Centaurea, gramen, fumus terræ, pentaphylon, melissa, ocymum, scordium, rubia vtraque, azarum, scabiola, maiorana camepithis, lupus salictarius.

In tertio gradu.

Thymus, chamedris, lapatum vtrumque, pulegium, saturcia, ciclamen, fenna, hypericon, epithymum, centaur. min. calamenthum, siler montan. origanum, lauendula, hyssopus, ruta, balsamites, vrtica.

Flores.

Genistæ, stœcados vtriusque, hyperici, vrticæ, epithymi, borraginis.

Fructus.

Amygdala amara, cappares.

Ligna & cortices.

Cortex rad. capparis, tamarisci, genistæ, cortic. mediani fraxini, sambuci.

Gummi & liquores.

Ammoniacum, bdellium.

Ex animalibus.

Castoreum.

Con-

Contra intemperiem frigidam lienis medicamenta composita.

C L A S S I S X X I V.

Electuaria liquida.

Athanasia magna, diacatholicon, confectio hameck.

Electuaria solida.

Diafenna, diasulphur, diacalamentum, dianthos, diacurcuma, diacuminum, ex rhabarbaro, ex eupatorio.

Conserua.

Radicum personatae, radicum ireos.

Syrupi.

Acetosus simplex, ex scolopendria, oxifaccharum, ex calamento, oximel compositum, acetum scylliticum.

Trochisci.

De capparibus.

Pillula.

De quinque generibus myrabolanorum.

Aqua Stilliticia.

Melissae, sambuci, calamenti, betonicae, graminis, scolopendriae, radicis hyssopi, fumarariae, hyperici.

Olea.

Amygdalarum, balsaminum, de lateribus, de capparibus, de euphorbio, laurinum, tamarisici, irinum, spicae, nardinum.

Emplastra.

Demeliloto, ceroneum, Andromachi, stomachicum.

Cerata.

Epipalmon, diapente.

Contra intemperiem calidam lienis, medicamenta simplicia.

C L A S S I S X X V.

Radices frigida in primo & secundo gradu.

Scariolæ, intybi vtriusque, arnoglossi, lactuæ.

Herba frigida in primo gradu.

Cichorea scariola, fol. salicis, endiuia, violaria, acetosa.

Herba frigida in secundo gradu.

Hepatica, adianthum album & nigrum, polythicum, salvia vitæ, barba hirci, capill. veneris ceterac.

In tertio gradu.

Portulaca, nymphaea, folia vitis, plantago, virga pastoris, portulaca.

Flores.

Buglossi vtriusque, violarum, cicorei.

Semina.

Lactuæ, portulacæ, scariolæ, melonum, quatuor semina frigida maiora.

Ligna

Ligna & cortices.

Tamarisci, fraxini, genistæ, santali omnes, salicis.

Liquores.

Lachrymæ vitis, aqua ferrea, succus malorum fragrantium, acetum.

Ex animalibus.

Spodium.

Contra intemperiem lienis calidam composita.

CLASSIS XXVI.

Electuaria liquida.

Diaprunum, hiera ruffi, triphera sarracenicæ.

Electuaria solida.

Diatrium santalon, de psillio, diaborraginatum, ex cichorio.

Sacchara.

Violaceum, rosaceum.

Conseruæ.

Florum borraginis, buglossi, rosarum rubrarum, violarum.

Aqua stillatitia.

Endiuixæ, capii. ven. oxylacchar. acetum album, nenupharis, cichorii, de agresta, scabiosæ, borraginis scolopendriæ, lupuli, portulacæ, tamarisci, buglossæ.

Olea.

Balsaminum, viola.

Cerata.

Sandalinum.

Contra intemperiem renum & vesicae frigidam, medicamenta simplicia.

CLASSIS XXVII.

Radices calida in primo gradu.

Eringii, althææ.

In secundo gradu.

Fœniculi, consol. maior, asparagi, apii, abrotani, cyperi, petroselini, centaurei, saxifragæ, brassicæ, pimpinellæ.

Herba calida in primo gradu:

Camamelum, calcuta, tribulus marinus, folia glasti.

In secundo gradu.

Pimpinella, crista marina, abrotanum, betonica, polium, scolopendria, pentaphylum, folia pœoniæ, parthenium.

In tertio gradu.

Filipendula, lithospermon, apium, saxifraga, resta bouis, eruca, staphysagria: folia lauri, daucus, vitica.

Flores.

Hyperici, spicæ vtriusque, genistæ, schænanthos, iuniperi, iunci odorati, meliloti.

Fructus.

Fructus.

Baccæ iuniperi, grana milij solis, cubebæ,
lentiscus, officula mespilorum, zizipha, bac-
cæ lauri, amygdal. amar. capparitis, vuæ passæ,
eicer primo gradu calid.

Semina.

Veratri, brusci, petroselini, cardamomi, a-
meos, cumini, erucæ, anisi, amomi, vrticæ, a-
sparagi, graminis, seseleos, fœniculi, apii,
dauci.

Ligna & cortices.

Cortex eapparitis, lignum sanctum, geni-
stæ, cortex lauri, guaiacum.

Gummi.

Resina, abietina, resina therebintina.

*Contra intemperiem frigidam renum
& vesicæ, medicamenta
composita.*

CLASSIS XXVIII.

Electuaria solida.

Diacurcuma, diasulphur, dianisum, in-
dum maius, diasatyriion, diacalamenthes, de
aromatibus, dialacca.

Conserua.

Eryngiorum, iridis, zinziberis, satyrionis.

Syrupi.

De absynthio, de scolopend. de quinque
radicibus, oxymel scillitie. de eupatorio,

acetosus compos. oxyfaccharum, capillor.
vener.

Aquæ:

Saxifragæ, milij solis, hypericonis, apij.

Oleæ:

Laurinum, rutaceum, nardinum, de lateribus, de styrace, enulatum.

Virgulentæ:

Agrippæ, martiatum, aragon:

Emplastrum.

De baccis lauri.

*Contra intemperiem calidam renum
& vesicæ, medicamenta
simplicia.*

C L A S S I S X X I X.

Radices frigida in primo gradu.

Scariolæ, endiuicæ.

In secundo gradu.

Glycyrrizæ, lactucæ, scolopendriæ, graminis.

In tertio gradu.

Arnoglossi, plantaginis.

Herba frigida in primo gradu.

Acetosæ, scariolæ, folia salicis, violæ.

In secundo gradu:

Lactuca, papau. alb. hepatica, ceterac, ariaria, scolopendria, adianthum, lingua avis, parietaria.

In tertio gradu.

Portulaca, semperuium, bursa pastoris,
plantago, nymphaea.

Flores.

Cameterulis, rosar. falicis, nenupharis,
violarum.

Semina.

Cucumerum, melonum, psilij, portulacæ,
intybi, peponum, citrulli, cucurbitæ, planta-
ginis, hordei.

Ligna & cortices.

Santal. omnium, cortex falicis.

Gummi.

Myrrha.

Ex animalibus.

Spodium.

Contra intemperiem calidam renum
& vesicæ, medicamenta
composita.

CLASSIS XXX.

Electuaria liquida.

Triphera persica minor.

Electuaria solida.

Triasantalorum, diarrhodon abb. sine
speciebus, diatragacanthum frigidum, de
psillio.

Conserua.

Nenupharis, conditum rad. lactucae, rad. eryngii, violarum, rad. cichorii.

Trochisci.

De rhabarbaro, diarrhodon, de terra sigil. de spodio, santalorum.

Aqua.

Parietariae, portulacae, violarum, nenupharis, matris syluae, caudae equinae, plantaginis, maluarum, capill. ven. myrth.

Olea.

Rosatum, violatum, amygdalar. dulc. de nenuphare, myrthinum.

Cerata

Santalinum album Galeni. §

*Contra intemperiem frigidam artuum
& neruorum, medicamenta
simplicia.*

C L A S S I S X X X I.

Radices calidae in primo gradu.

Scyllae, azari, liliorum, paeoniae, acori, raphani, lauri.

In secundo gradu.

Enulae camp. ebuli, capparis, sambuci.

In tertio gradu.

Chelidonii, acori, scyllae, porri, zinziberis.

Herba calida in primo gradu.

Mercurialis, camæmelum, melilotus, absinthium.

In secundo gradu.

Camædris, folia azari, camepitis, eupatorium.

In tertio gradu.

Origanum, calamentum, salvia, costus, pulegium, hypericum, ruta.

In quarto gradu.

Nasturtium, pyrethrum, cicuta in forma fomenti apposita.

Flores.

Hypericonis, geniftæ.

Fructus.

Hermodactyli, baccæ lauri, iuniperi.

Ligna & cortices.

Lignum aloës, cortex radicum lauri, caparis.

Gummi & liquores.

Terebinthina, opopanax, myrrha, styrax, euphorbium calidissimum, ammoniacum, bdellium, sagapenum, galbanum, colophonia.

Succi.

E pomis calidis, succus racemorum, succus sambuci, sapa, succus ebuli, coctus in furno.

Ex animalibus.

Castoreum, axungia humana, æsippus,
 Mac humanum, molchus, stercus vaccinum,
 vitella ouorum, stercus caprinum.

*Contra intemperiem frigidam artuum
 & neruorum, medicamenta
 composita.*

CLASSIS XXXII.

Electuaria liquida.

Miua aromatica, rosata nouella.

Electuaria solida.

Diacydonium, indum maius, diacostum
 episcopi.

Conserua.

Anthos, enulæ camp. radic. irid. zinzib.
 conditum.

Syrupi.

De stœcade, oxymel scyllitic. de absyn-
 thio, oxifacchar.

Pillula.

De quinque generibus myrabol. fœtidæ
 maiores, de hermodactylis, arthritice, de eu-
 phorbio, de colocynthide.

Liquores seu decocta.

Aqua mulla, acetum scillitic. decoctum
 stœchad. colocynthidos.

Aque.

Iuæ arthriticæ, enulæ camp. sambuci,
 saluiæ,

saluix, asparagi, primulæ veris, hypericonis,
graminis, a cori, rusci.

Olea.

Anethinum, laurinum, balsaminum, sem.
arantior. è lapide gagatis philosophorum,
guaiaci, de stœchade, sampfuci, lumbrico-
rum, irinum, auellanarum, colocynthidos,
de euphorbio, lini, ebuli, iuniperi, nucis
mosch. rutaceum, anethinum.

Vnguenta.

Aragon, martiatum, agrippæ, de althea.

*Contra intemperiem calidam artuum &
neruorum, medicamenta
composita.*

CLASSIS XXXIII.

Radices.

Endiuix, pentaphylli, scariolæ, lactuæ.

Herba frigida in primo gradu.

Endiuia, fol. myrthi, acetosa, herba Iouis.

In secundo gradu.

Lactuca, solanum, gramen, psilium, lenti-
ca, aquat. heliotropium.

In tertio gradu.

Semperuium, nymphaea, hyosciami fe-
lia, cicuta, vermicularis, portulaca.

G g 4.

Semina.

Plantaginis, lactucae, cotonei mali, portulacae, melonum, cucumeris.

Fructus.

Limones, mala cydonia, pruna, pyra.

Gummi & liquores.

Caphura, acacia, opium.

Terra.

Bolus armenia, terra figillata.

Contra intemperiem calidam artuum & nervorum, composita.

CLASSIS XXXIV.

Electuaria liquida.

Triphera persica.

Electuaria solida.

Rosarum, triasantali, diarrhod. sine speciebus, de psilio, diamarg. frig.

Conserua.

Violarum, nenupharis, persica condita, rosarum, radicis lactucae.

Syrupi.

Limonum, endiuiae, nenupharis, acetos. simpl. portulacae, oxyfacchar.

Trochisci.

De carabe, santalorum, de spodio, halicababi.

Aqua

Aqua Stillatitia.

Portulacæ, endiuia, parietariæ, caudæ equinae, plantaginis, myrthi, matris fyluæ, barbæ hirci.

Olea.

Myrthinum, de floribus horariis.

Vnguenta.

Populeum rosatum.

*Contra intemperiem frigidam matricis,
medicamenta simplicia.*

C L A S S I S X X X V.

Radices calida in primo gradu.

Aristolochiæ, althææ.

In secundo gradu.

Liliorum, asphodeli, iridis florent. valerianæ, consolid. maior. cyperi.

In tertio gradu.

Enulæ camp. gentianæ, dictamni, smyrnij, galangæ, sabinæ, azari.

Herba calida in primo gradu.

Absynthium, lysimachia, cuscuta.

In secundo gradu.

Arthemisia, ocymum, centaurea, melissophylon, asparagus, bruscus, polium mont. matricaria, vrtica, mentastrum, raphanus, folia lauri, scordium.

In tertio gradu.

Calamentum, origanum, sampucus, apium, nigella, filer mont. hypericon, senna, nepeta, pulegium, seseli, saturcia, amni, rosmarin. hyssopus, sabina, iuniperus, ruta.

Flores.

Scœnanthos, spicæ viriusque, anthos.

Fructus.

Nux moschata, baccaë lauri, lupini, baccaë iuniperi.

Semina.

Dauci, petroselini, agni casti, sisimbrij, distamni, nasturtij, anisi.

Gummi.

Opopanax, styrax calam. sagapenum, assa foetida, thus, galbanum, benioinus.

Ex animalibus.

Ambra, moschus.

*Contra intemperiem frigidam matricis,
medicamenta composita.*

C L A S S I S X X X V I.

Electuaria liquida.

Antidotus philonis, triphera magna sine opio, hiera Gal.

Ele-

Electuaria solida.

Dianisum, diambra, de gemmis, diasati-
rium, diacalamentum, aromatic. ros. de mos-
cho, diacuminum, diamarathrum.

Conserua.

Eryngiorum, zinziber conditum, maiora-
næ, rad. ciceris, satyriorum, radix personatæ,
melissæ, condita eryngii.

Syrupi.

Ex calamintha, ex arthemisia, ex quinque
radicibus, ex mentha, ex hyssopo, oxymel
diureticum.

Trochisci.

Ligni aloës, de absynthio, cyperi.

Pillula.

Fœtidæ maiores, lucis maior.

Aqua Stillatitia.

Arthemisæ, saluiæ, raphani, nepetæ, ab-
synthij, sambuci, acori, brusci, melissæ, ca-
lamenti, hyssopi, rosmarini, enul. camp. hy-
perici.

Olea.

Liliorum, irinum, laurinum, de styrace,
de piperibus, keirinum, cinnamomi, philo-
sophorum, anethinum, rutaceum, nardi-
num, fœniculi, acori, amygdalarum, enu-
latum.

Cerata.

Oesipatum, diapente.

Emplastra.

De baccis lauri, pro matrice, ceroneum.

*Contra intemperiem calidam matricis
medicamenta simplicia.*

CLASSIS XXXVII.

Radices frigida in primo & secundo gradu.

Endiuiæ, scariolæ.

In tertio gradu.

Lactucæ, arnoglossi.

Herba frigida in primo gradu.

Quinqueneruia, violaria, endiuiæ.

In secundo gradu.

Folia papaueris, adianthum vtrumque,
fumach, ceterac.

In tertio gradu.

Plantago, semperuium, virga pastoris,
nymphæa, portulaca, philonium vtrumque.

Folia.

Oliua stri, rosæ caninæ, salicis, lauri, acetosæ.

Flores.

Balaustiorum, stœcad. citrinæ, stœcad. arabic. nenupharis.

Ex mari.

Corallus albus, corallus niger.

Con-

*Contra intemperiem calidam ma-
triciſ, medicamenta ſim-
plicia.*

C L A S S I S X X X V I I I .

Electuaria liquida.

Triphera perſica.

Solida.

Diatriaſantali, de pſilio, diarrh. abb. dia-
marg. frig.

Syrupi.

Acetofus ſimplex, nympheæ, oxyſacchar.
endiuiæ, de agreſta.

Trochiſci.

De carabe, alkekeng. de terra figillata.
diarhod.abb.

Aqua ſtillatitia.

Parietarix, plantaginis, violarum, nenu-
pharis, caudæ equinæ, portulacæ, malua-
rum.

Olea.

Nympheæ, cucurbitarum, cydoniorum,
amygdal. dulcium, amygdal. amar. myrthi-
num.

Cerata.

Sandalinum.



C L A S S I S

S E C V N D A.

IN hac classe ea medicamenta tam simplicia, quam composita continentur quæ obstructionem expediunt, emolliunt, discutunt, & suppurant, viscosa incidunt, adstricta relaxant, fluentia constringunt, sordida detergunt, dolorifica anodynis sedant, deleteria venena repugnantibus curant.

*Medicamenta simplicia calida aperitiua
per gradus caloris distincta.*

Radices calida in primo gradu.

Aristoloch. rot. agaric. borraginis, rubiæ,
graminis.

In secundo gradu.

Acori, asparagi, cyperi, asphodeli, pœoniæ,
peucedani, porri.

In tertio gradu.

Zinziberis, dauci, cyclaminis, centaur.
maiongentianæ, spondilij, capparis, azari.

In quarto gradu.

Allium, nasturtium, cepa.

Herba calida in primo gradu.

Absynthium, brassica, borrago, cryngium, cuscuta, eupatorium, buglossum.

In secundo gradu.

Scolopendria, anethum, rubia, polium, marathrum, chamæpitis, arthemisia, ocy-mum, fumus terræ, camædis, melissophy-lum.

In tertio gradu.

Hyssopus, pulicaria, apium, sampucus, smyrnium, thymus, petroselinum, ciclamen, coltus, calamentum, abrotanum, fol. iuni-per. hypericon, mentastrum, origanum, ver-bena.

In quarto gradu.

Chelidonium, allium, cepa.

Flores.

Acorus, spica, stræchas.

Fructus.

Amygdal. amar. cappares, eubebæ, racemi, orobum, pistacia, baccæ lauri, baccæ iuniperi, lupini, hederæ, nuclei cerasorum, pini.

Semina.

Capparis, vrticæ, ameos, synapi, napi, anisi, fœniculi, granam. sol. nigellæ.

Ligna & cortices.

Xylobalsamum, cinnamomi, xylocassia,
cappares, petroselini, macis.

Gummi.

Myrrha, pix liquida, pareia.

Ex animalibus.

Sanguis hirci terrestris, apes vstæ, mel.

*Medicamenta composita calida
aperientia.*

Electuaria liquida.

Dianisum, diacalamentum, diacumi-
num, diaprassium.

Conserua & condita.

Florum hyperici, cappares conditæ, inci
conditi.

Syrupi.

De fumo terræ, de absynthio, oxymel scil-
liticum, diureticum.

Aqua stillatitia.

Fœniculi, petroselini, brusci, asparagi, be-
conicæ, saxifragæ, scolopendriæ, tamarisci,
anisi.

*Medicamenta simplicia frigida
aperitiua.*

Radices frigida in primo gradu.

Endiuia, Scariola.

In secundo gradu.

Liquiritiæ, cichorii, oxalidis, atriplicis.

Herba calida in primo gradu.

Endiuix, cichorii, atriplicis, foliorum myrthi, scariolæ, oxalidis.

In secundo gradu.

Capill. ven. polytric. hepatica, scolopendria, ceterac, adiantum, saluia vita, persicaria.

In tertio gradu.

Semperuiuum, solanum, vermicularis, plantago.

*Medicamenta composita frigida
aperitiua.*

Syrupi.

Acetosus, cichorii, laxatiuus, portulacæ, capill. ven. rosaceus, oxysaccharum simpl. & compos.

Medicamenta attenuantia simplicia.

Radices attenuantes in primo gradu.

Aristolochiæ, absynthii, agarici.

In secundo gradu.

Acori, cyperi, peucedani, asphodeli, pœoniæ, arthemisiæ.

In tertio gradu.

Capparis, elenii, ireos, gentianæ, ari, arthemisiæ.

Hh

In quarto gradu.

Allium, radícula, cepæ.

*Herba calida in primo gradu.*Cuscuta, melilotus, brassica, camomilla,
absinthium, quinquefolium.*In secundo gradu:*Arthemisia, pœonia, melissa, polium, mar-
rubium, eupatorium.*In tertio gradu.*Camæpythis, hypericum, petroselinum,
origanum, laurus, pulegium, sabina herba,
finzimbrium, abrotanum, anethum, hyssop-
us, camædris, dictamnus, mentastrum, pu-
licaria, iris.*In quarto gradu.*

Tapfia, ruta.

*Frigida herba.*Scolopendria, populus nigra, scabiosa,
bugloss. vtrumque adianthum, fumaria,
pimpinella.*Flores.*

Stœchados vtriusque camomillæ, cepæ.

*Fructus.*Vuæ passæ, cappares, baccæ iuniperi, pi-
næ, grana citri, coryzæ.*Semina.*Coriandri, fœnugræci, lini, ameos, anisi,
dauci, crucæ, viticæ, petroscl, amomi, cumi-
ni, seseleos.*Digna*

Ligna & cortices.

Cinamomum, xylobalsamum.

Gummi & metalla.

Balsami, opopanax, serapium, assa foetida, fax vini, nitrum galbanum, pix naualis, euphorbium, ammoniacum, sulphur, squama aris.

Olea.

Amygdal. amar. laurinum, anethinum, rutaceum, nardinum, hypericinum, de scorpionibus, de capparib. de therebintina.

Ex animalibus.

De scorpionibus, sanguis mustellæ, pinguis leonis, canis, castoreum, stercus muris, vrsi.

*Medicamenta incrassantia.**Radices.*

Arnoglossi, plantaginis.

Herba.

Malua fol. falicis berberis, fol. myrthii, nymphaeæ, cydoniorum, semperuium, psillium, lactuca siluest. violaria, atriplex, lactuca, portulaca, acetosa, endiuia.

Flores.

Rosarum, violarum, nenupharis.

Fructus.

Amygdal. dulc. iuiubæ, cucumer, moræ, pineæ, sebesten, cucurbitæ, melones & caeterum succi.

Semina.

Papaueris, citrulli, bismaluxæ, cydonior.
maluxæ, cucurbitæ.

Gummi.

Tragacanthum, arabicum, hypocistis.

*Notandum medicamenta indurantia & in-
crassantia, tam simplicia, quàm composita, qua
renues ac liquidos humores compactiores red-
dunt se sua ac terrena substantia illis permis-
cendo dicta fuisse tria in classe de intemperie
cordis & hepatis, ea autem, aut sunt frigida,
aut temperata citra acrimoniam.*

*Medicamenta emollientia.**Radices.*

Altheæ, cepa cocta, cucumer agrestis,
seyllæ, buglossi, lauri, maluxæ, sigillum beatæ
mariaæ.

Herba.

Camemelum, cypressus, nigella, beta, li-
jium, melilotus, atriplex, malua.

Flores.

Croci, violæ, maluxæ, liliorum.

Semina & fructus.

Ficus sicca, fœnugr. maluxæ, vuzæ passæ, li-
ni, loti siluestris.

Liquores & adipēs.

Butyrum, œsippus, resinæ omnes, peuce-
danum, cera, opopanax, bdellium, galba-
num,

num, pix, styrax, therebintina, vitella ouorum, seuum caprinum, Taurinum, hircinum, lac, mel, medulla, ceruina, vitellina, amurca.

Medicamenta discutientia calida.

Radices calida in primo gradu.

Aristolochiæ, althææ, agarici.

In secundo gradu.

Cameleon albus & niger, asphodelus, radix rhodia, ciliij, pœoniæ.

In tertio gradu.

Raphani, petrosel. ciclamini.

Herba calida in primo gradu.

Cameleon, althæa, melilotus.

In secundo gradu.

Ebulus, palmæ fol. personata, camædritis, marrubium, lybanotis, campepitis.

In tertio gradu.

Abrotanum, anethum, apium, maiorana, nepeta, pleunica, origanum, nigella, dictamnus, mentastrum, sabina, smyrnium, petroselinum.

In quarto gradu.

Linaria, nasturtium, lepidium.

Flores.

Camemeli, anethi, meliloti.

Semina.

Fœnugræci, dauci, cumini, anisi, coriandri,

lini, nigellæ, fœniculi, vrticæ, ricini.

Liquores seu resina.

Strytax, succinum, galbanum, satyrium, ladanum, tragacantha, pix sicca, rapfia, thus.

Olea.

Melanthinum, verus, resininum, raphaneum.

Terra.

Semina, sal, cimolia, testæ fornacæ.

Ex animalibus.

Pinguedo, œsippus, butyrum, spodium, stercus omne, viperæ carnes.

Medicamenta discatientia frigida.

Herba frigida in primo gradu.

Atriplex, endinia, lactuca, tribulus viridis, cucumer, psillium, malua, portulaca, pepones, blitum, lens palust. sempervium.

Fructus.

Perfica, poma, pruna, mandragora.

Medicamenta suppurantia.

Radices.

Althææ, lilior. stœchas vtrumque, capita liliorum, crocus, ficus.

Semina.

Amomi, fœnugræci, lini.

Farina.

Farina.

Triticæ, hordeacæ, lolii.

Adipes.

Adeps porcinus, vitulinus, œsippus, butyrum.

Liquores.

Ladanum, thus, styrax, pix, resina, cera.

*Medicamenta roborantia.**Herba.*

Eupatorium, camæpitis, camædris, petrosel. iris, ruta, verbena, galbanum, salvia, menta, valeriana minor, polium montan. centauryum.

Radices.

Scyllæ, fœniculi, licii rutæ, aristoloch. vtraque, cyperi, rusci, peucedanum, eryngium.

Metalla.

Nitrum.

Semina.

Anisi, petrosel. sesel. os, anethi, dauci.

Farina.

Orobi, cubebæ, ius ciceris, piper.

*Medicamenta rarefacientia.**Herba.*

Camemelum, abrotanum, buglossa, costus, melilotum, borrago, branca vrsina.

Hh 4

Radices.

Altheæ, cucumeris agreſtis.

Olea.

Verus oleum camomillæ.

*Medicamenta ſemen generantia & libidinem mouentia.**Radices, herba, fructus.*

Radix acori, ſatyrii, nuclei pinci, ficus, orminum, lini ſemen, galangæ, cicer, faba, eruca, nux Indica. Ea etiam quæ flatuoſa & calida, tum ſimplicia, tum compoſita, & confectio ſatyrii & cryngiorum.

*Medicamenta ſemen reprimentia quæ inſrigidant & incrassant.**Herba & fructus.*

Laſtuca, atriplex, mora, pepones, moræ, cucurbit. blitum, melones, cucumeres.

*Medicamenta lac generantia.**Herba & folia.*

Anethum, fœniculus, eruca, apium, briou. rad. ſmyrnum, ſemen ſeſami, cucumeriſtuc-cus, cucum. cortices.

Lac reprimentia ſunt illa omnia quæ refrigerant & ſiccant: ſub medicamentis lantibus poſſunt comprehendi ſemen generantia, vt ſub astringentibus ſemen prohibentia. Eadem ferè erit materia generantium & reprimentium.

Medi.

*Medicamenta astringentia & sanguinem
primò sistentia, tum narium, tum
matricis fluxum, simplicia.*

Herba & folia.

Myrthi, salicis, lentisci, pētaphyli. sanguinariae, summit. sumach, fol. prunel. siluestriū, virga pastoris, portulaca, semperuiuum, oleastri, arbusi, paliuri, quinqueneruiæ, brassicæ biscoctæ, nymphaeæ, plantago.

Radices.

Salicis, cysti.

Flores.

Balaustia, stœccas, rosæ caninæ.

Ex animalibus.

Mumia, stercus asini, porci, sanguis vacca, columbae cinis, cornu vacca, cerui.

Gummi liquores & metalla.

Corallus, gummi arab. arago, hiacynthus, tragacanthum, argilla, gypsum, antimonium, carabe, hypocistis, atramentum vstum, hæmatitis, tuthia, alumen, thus.

*Medicamenta astringentia & sanguinem
sistentia narium & matricis, composita.*

Electuar.

Diacorallum, diatragac. frigid. diapenid. diacydoniten sine speciebus, diapapauer.

Conserua.

Rosarum, conditum cydon. sacchar. ros.
tab. nymphaeæ.

Trochisci.

De carabe, diacorallium, de terra sigill.
Alkekengi.

*Medicamenta simplicia ventrem sistentia
eadem ferè cum sanguinem
sistentibus.*

Radices.

Salicis, cysti.

Herba.

Summitates cupressi.

Folia.

Arbuti, sumach, lentisci, oleastri, menta
eum aceto, summitates vitium, sanguinaria,
summit. rubi, plantago, semperuium, ver-
micularis, auricularis.

Ligna & cortices.

Fraxini, cupressi, sandali omnes, salicis,
mali granati.

Fructus.

Cydonia, mala pontica, cubebæ, glans,
farina tritici, corua, galla, succinum, faba,
mala gran. siluest. sorba, acacia, ricini, berbe-
ris, amygdalæ.

Flores.

Balaustia, rosa, calamenti, cariophyllor.

Gummi

Gummi, liquores, metallica.

Bolus armena, maltix, gumm. arabic. sang.
 dracon. lithargyrum, bdellium, terra sigilla-
 ta, cerallus, hypocistis, alumen, tragacanthum.

Ex animalibus.

Testæ cochilior. lac decoctum, coagu-
 lum leporis, cancri, locustæ marinæ, spodiū.

*Medicamenta composita ven-
 trem sistentia.**Electuar.*

Athanasia magna, diacydonium, diar-
 rhod. abb. manus christi, diatriasantali.

Syrupi.

Myrthinus, rosaceus cum aquis matris
 syluæ, plantaginis, portulacæ, rosæ caninæ.

Trochisci.

De Caphura, de violis, de spodio.

*Medicamenta simplicia flatum
 discutientia.**Radices.*

Apii, galangæ, iunci odorati, eryngii, allii,
 croci, dauci.

Herba.

Absynthium, ruta, cuminum, nigella, pe-
 trosel. fesceli, anethum, costus, camemelum,
 maiorana, organum, spica vtraque, lymo-
 nium.

Semina.

Anisi, petrosel. dauci, apii, fœniculi.

Fructus.

Cappares, baccæ lauri, iuniperi, piper.

Flores.

Epithymus, stœchas vtraque.

Gummi.

Bdellium & ladanum.

Ex animalibus.

Castoreum, carnes viperarum, steruus humanum.

*Medicamenta composita flatibus
discutientia.**Electuar.*

De aromatib. episcopi, hiera ruffi, theriaca, de citro, Indum, diateffaron, triphera faracenicæ, moschata.

Pillula.

Auræ.

Pulveres.

Ligni aloës, aromat.

Syrupi.

De thymo, vinum mulsum, de euphorbio.

Aqua.

Thymi, anethi, rutæ, absynthii.

Trochisci.

Xyloaloës, & de cappasib. cyperi.

Olea.

Nardinum, de piperibus, de lilio, enulatum, de absynthio.

Emplastra.

De bæcis lauri, de itercoribus.

*Medicamenta simplicia mitigantia
dolorem à causa calida.*

Radices.

Scabiosæ, lactuæ, salicis.

Ligna & cortices.

Santali omnes, cortex & ligna salicis.

Herba.

Violaria, nymphaea, semperuiuum, solanum, portulaca, plantago.

Folia.

Salicis, myrthi, vitis, mespili, oxalis, virga pastoris, lactuca.

Flores.

Rosæ, violæ, nenupharis.

Succi.

Violar. agrest. solatri, nymphaeæ.

Olea.

Rosatuna, myrthinum.

Vnguenta.

Populeum, de cerusa,

Medicamenta simplicia dolorem mitigantia à causa frigida.

Herba.

Absynthium, lentiscus, nigella, sambucus,
ebulus, calamintha, pulegium, hypericum,
petroselinum, maiorana, ruta, nasturtium.

Radices.

Enulæ camp. pyrethri, centaurii maior.

Ligna & cortices.

Xylobalsamum, petroselinum.

Fructus.

Baccæ lauri, piper.

Semina.

Nigellæ, centaurii, sinapi.

Gummi & liquores.

Euphorbium, sulphur, opoponax, opobal-
samum, assa fœtida, serapium.

Ex animalibus.

Castoreum, stercus columbinum.

*Medicamenta composita dolorem mi-
tigantia à causa frigida.*

Electuaria.

Antidotus philonis.

Olea.

De nucibus, limonum, de absynthio.

*Medicamenta mitigantia dolorem ab u-
traque causa frigida & calida.*

Herba.

Camomilla, melilotum & eorum olea.

Quæ

Quædam sunt medicamenta quæ nimia frigiditate obstupefaciunt membrum, ob id sedant dolorem ex vtraque causa, sed cum mitigant non curant, qualia sunt.

Poma mandragoræ composita, capita papaueris, opium, hyosciamus.

Quæ applicanda sunt in dolore intolerabili & maximo.

*Medicamenta applicanda in maximis
vigiliis stupefacientia.*

Apium, hyosciamus, semen papauer. semperuium, portulaca, mandragora, nymphaea, lactuca, lentigo aquæ, psillium, oleum mandragoræ cum nenupharino.

*Medicamenta simplicia venenis
repugnantia.*

Radices.

Aristolochiæ, asparagi, cyperi, porri, brioniæ, allij.

Herba.

Absinthium, brassica, polium, ciclamen, camædri, ruta, betonica, dictamnus, adianthum, hypericum, apium, marubium, abrotanum, nasturtium.

Fructus.

Nuclei pinci, ficus.

Gummi.

Euphorbium, sal, balsamum, acetum.

Ex animalibus.

Lacasinæ, testiculi cerui, & asini butyrum, vrina pueri, sanguis leporis, rasura cornu vnicornis.

Medicamenta abstergentia composita.

Theriaca, diateffaron.

Radices.

Asphodeli maris, valerianæ, ari, ellebori vtriusque, iridis, scyllæ.

Herba.

Anagallis, asparagus, absynthium, cornu cerui, cuscuta, parietaria, folia salicis, abrotanum, atriplex, beta, camepitis, marrubium staphysagria, brionia.

Fructus.

Amygdala, hordeum, semen vrticæ, fabæ, lupini, cortex ligni Indici & radice.

Gummi & lachryma.

Mastix, sapa, tragacanthum nigrum, saganenum, therebintina.

Ex animalibus.

Propolis, mel, serum lactis, fimus leporinus & caprinus.

*Medicamenta glutiuantia.**Radices.*

Aristolochiæ, centaurii, Iridis, althææ, gentianæ, lymphit. maior.

Herba

Herba.

Anagallis, camædris, ebulus, equiferum,
 fragaria, lycium, plantago, sambucus, camæ-
 pitis, draculus, eupatorium, pentaphylum, i-
 satis, myrthus, verbenæ, perforata, tormentil-
 la.

Gummi, succi, metallica.

Aloë, corallum, æs vstum, hydragyrum,
 spongia, papy: us vsta, terra lemnia, sanda-
 raca, stimmium, plumbum vstum & lotum,
 sanguis dracon. stynchus, alumen, bdel-
 lium, gypsum, pumex, thus, amylum, cadmia
 gummi acaciæ, sarcocolla, bolus
 armena, testa
 oui.





C L A S S I S
T E R T I A .



N qua agitur de medica-
mentis digerentibus, co-
quentibus & purgantibus hu-
mores.

*Medicamenta simplicia pituitosum humo-
rem digerentia & coquentia.*

Herbae.

Borrago, absinthium, camomilla, maio-
rana, maratrum, eupatorium, cappar. fol. ar-
themisia, melilotum, mentha, balsamita, ra-
marisci, matricaria, vrtica, anethum, lingua
auis, cariophyllata, polium mont. pimpinella
ocymum, calamentum, rutha, hystopus, sa-
tureia, buglossa, primula veris, scabiosa, pu-
legium, sabina, serpillum.

Ligna & cortices.

Guaiacum, agnus castus, haredæ radix, &
cortex, iuniperus, radix capparidis, sambuci,
cortex genistæ.

Fructus

Fructus.

Chebuli, piper, pistacia, cubebæ, cappares, bellirici, ficus, auellanæ, dactili.

Radices.

Liquiritiæ, aristoloch. vtriusque petroselinii, apii, pœoniæ, tamarisci, lili, valerianæ, capparorum, azari, genistæ, enulæ camp. polypodii, buglossi, bursæ pastoris, asparagi scyllæ, iridis, rubiæ tinctorum, acori, saxifragæ.

Semina.

Pœoniæ, matrissyluæ, linguæ auis, brassicæ, saxifragæ, erucæ, abrotani, anethi, iuniperi, quatuor semina calida, quatuor semina frigida maiora, absynthii, fœnugr. fiaxini, nigellæ.

Flores.

Saluiæ, sthæchados, buglossi, anthos, borraginis, scabiosæ.

Medicamenta composita pituitosum humorem digerentia & concoquentia.

Electuar.

Aromaticum, diaxis salom. diasulphur, dianthos cum moscho, diatrion pipercon, diamenta, diacariophyllatum, diagalanga, myua cydon. ex speciebus, diarthod. iulii, diaprassium, diacosti, diazinziber.

Conserua.

Acori, citrulli, anthos, zinziber viride, saluix, enulæ camp. cort.citr. virid.eryngii, capparis.

Syrupi qui cum digestionephlegmatis subtiliant & incidunt.

Mel rosatum, syrupus de hyssopo, de prassio, de absynthio, de arthemisia, mel violatum, de 2. radicibus, de mentha, de calamentio.

Syrupi lenitini & phlegmatis digestiui.

De cichorio, deliquiritia, oximel simp. oximel compos.

Syrupi phlegmatis digestiui & opilationem aperientes.

Mel, rosatum, violatum, syrupus acetosus compos. simplex, oximel compos. simplex, syrupus de duabus radicibus, de calaminta, de cichorio, de eupatorio, de prassio.

Syrupi digestiui phlegmatis in capite.

Mel.rosatum, syrup.de stœchade, cum aquis betonicæ, saluix.maioiranæ,rorism.

Syrupi digestiui phlegmatis in thorace.

Mel rosatum, violatum, syrupi de hyssopo, de liquirit. syrupi de prassio, de calaminta, de duabus radicibus, oxymel scylliticum cum aquis capilli veneris, polytrici, vngulæ caballinæ, prassii; scabiosæ, hyssopi,

hyssopi, saluiæ, buglossi, enul. camp.

Syrupi digestiui phlegmatis in ventriculo.

De absynthio, de menta, mel rosatum, cum aquis cuscutæ, absynthii, apii, scolopendriæ, florum genistæ.

Syrupi digestiui phlegmatis in liene.

De eupatorio, de thymo, de calamento, oxymel simplex. compositum, cum aquis genistæ, scolopendriæ, calamenti, cuscutæ, buglossi.

Syrupi digestiui pituita in utero.

De absynthio, de eupatorio, oxymel simplex compositum, cum aquis arthemisiæ, matricariæ, melissæ, lini, lentisci, nepetæ.

Syrupi digestiui pituita in renibus.

De duabus radicibus, acetosus compos. oxymel simpl. compositum cum aquis saxifragæ, asparagi, agrimonix, euphrasiæ, e-lenii.

Syrupi digestiui pituita & confortantes cor.

Mel rosatum, de bizantiis, de cortice citii, de pomis redolentibus, cum aquis buglossi, borraginis, scabiosæ, melissæ, cardui benedicti.

Medicamenta simplicia humorem biliosum digerentia.

Radices sua frigiditate incrassantes choleram.

Cichoreæ, tormentillæ, lactucæ, portulacæ, arnoglossi.

Radices qua sua frigiditate subtiliant bilem.

Apii, brusci, eleonii, altheæ, asparagi, buglossi, graminis, salicis.

Herba incrassantes bilem.

Violaria, portulaca, scariola, folia cucurbitæ, & melonum, papauer, lupulus, endiua, lactuca, plantago, vermicularis, acetosa, lenticula aquatica, capill. veneris, psyllium, folia salicis, solanum hortense, nymphaea, hepatica.

Herba qua subtiliant bilem.

Althea, asparagus, tamariscus, fumaria, melilotus, buglossa, polytricum, scolopendria, camomilla, ablynthium.

Cortices & ligna.

Cortex salicis, tamarisci, fantali omnes, cortex radic. apii, & capparidis, liquiritiæ.

Fructus.

Fruētus.

Caricæ, sebesten, tamarindi, pruna, pas-
fulæ, myrabolani citrini, chebuli, bellirici,
emblici.

Semina.

Quatuor. frig. mai. scariolæ, lactucæ, al-
theæ, fraxini, cardui bened. baccæ hœderæ,
hordei, endiuia, asparagi, atriplicis, anethi,
absynthii, fœniculi.

Flores.

Violarum, cichorii, borraginis, rosarum,
camomillæ, buglossi.

His omnibus miscere potes ex illis quæ
pituitosos humores concoquunt prout bilis
crassior videbitur requirere.

*Medicamenta composita humorem bilio-
sum concoquentia, digeren-
tiaque.*

Electuaria.

Diapruni, rosata nouella, myua cydo-
nior. diacydoniorum, triasantala, diacy-
doniten, de gemmis, diatragac. frig. dia-
margar. sine speciebus, diapenidion, diar-
rhod.abb.

Conserua.

Violar. nenupharis, acetosæ, cort. citr.
cond. pranor. condit. carnis cydon. rad. la-
ctuc. cond. ros. bugloss. capill. ven.

Syrupi digestiui & subtiliantes bilem.

De glycyrrhiza, acetosus simp. compos.
de cichorio cum rhabarb. de duabus radici-
bus, de endiuiā, oxymel simplex.

Syrupi digestiui subtiliantes bilem.

Viol. ex infus. rosar. de agresta, de nym-
phea, oxysaccharum, iulep. violatus, de li-
monibus, de papauere, de myrthillis, de
ribes.

Syrupi digestiui bilis in capite.

De nymphaea, de papauere, cum aquis la-
ctuca, nenupharis, plantaginis, arnoglossi.

Syrupi digestiui bilis in iecore.

De succo endiuiā, de cichorio, de bizan-
tiis, acetosus simplex, cum aquis acetosā, en-
diuiā, cichorii, portulacā, lupuli.

Syrupi digestiui bilis in renibus.

Acetosus simplex & compositus, de dua-
bus radicibus, cum aquis malue, endiuię, la-
ctuca, portulacā, solani, plantaginis.

Syrupi digestiui bilis in ventriculo.

Iulep. violatum, oxysaccharum, acetosus,
syrupus violat. de granatis.

*Syrupi digestiui bilis in thorace & omnes
opilationes aperientes.*

Violatus, de iuiubis, de papauere, ace-
tosus compos. de cichorio cum rhabarba-
ro,

ro, oxysaccharum simplex & compositum.

Syrupi digestiui bilis in liene.

De bizantiis de duabus radicibus, acetosus simplex, de scolopendria, endiuia, rosarum, cum aquis buglossi, scolopendriae, portulacae, borraginis.

In ventriculo.

Oxalidis, de cydoniis, de acetositate citri, myrthinus, de agresta.

Syrupi digestiui bilis & sedantes sitim.

Iulep. violatum, syrup. violatus, oxysaccharum, de granatis, de acetositate citri, de agresta, cum aquis lactucae, endiuia, portulacae, cichorii violarum, cucurbitae.

Medicamenta simplicia humorem melancholicum concoquentia & digerentia.

Herba.

Borrago, thymus, scabiosa, rosmarinus, agrimonia, serpillum, absinthium, pimpinella, valeriana, ocymum, origanum, calamentum, capparis, buglossa, cariophyllata, laudula, satureia, melissa, abrotanus, mentha, capillares omnes, salvia, pulegium, polium, tamariscus.

Summitates.

Sambuci, lauri, dactamni, scolopendriæ,
geniftæ, ciclamini, brioniæ.

Radices.

Buglossæ, cariophyllatæ, peoniæ, enul.
camp. tamarif. dictamni, scolopendriæ, af-
phodeli, centaurii vtriusq; aconi, ebuli, cap-
parorum, brioniæ.

Ligna & cortices.

Lignum hœderæ, & fraxini, cortex radi-
cis capparis.

Fruetus.

Passulæ, cappares, quinque genera myro-
bolan. caricæ, tamarindi.

Flores.

Anthos, scabiosæ, tamarisei, stœcha-
dos, borraginis, thymi, saluiæ, buglossæ.

Semina.

Quatuor semina calida maiora & mi-
nora, peoniæ, ocymi, anethi, rutæ, iuni-
peri, nasturtii, capparis peucedani, petrose-
lini, absynthii, hyperici, sileris mont. rapha-
ni, nigellæ.

Medi-

*Medicamenta composita humorem melan-
cholicum concoquentia & dige-
rentia.*

Electuaria liquida.

Lætitia Galeni diacassia.

Electuaria solida.

Diambra, triasantali, diamargar. calid. de
gemma, diarrhod. abb.

Quod si non habueris hæc elect. cape
eorum pulueres quorum dosis erit ℥. j. po-
nantur simul cum saccharo ℥. j. elect. vel
cum melle.

Conserua.

Borraginis, fol. genista, anthos, capparis,
saluia, rosar. capil. ven. bugloss. acori.

*Syrupi mitescentes & bilem atram
digerentes.*

De epithymo, de thymo, de calamento, de
pomis redol. de scolopendria.

Syrupi digestiui & aperitiui opilationis.

Mel rosatum, de calamento, de scolopen-
dria, oxymel simplex, compositum, de eupa-
torio, de bizantiis.

Syrupi digestiui atra bilis in capite.

De buglossa, de bizantiis, de lupulis, de
pomis comp. de fumo terræ, oxymel simp.
compos. cum aquis, melissa, buglossi, bor-
rag. saluia, maiorana, betonica, rosmar.

In thorace.

Mel rosatum, de corticibus citri, de absynthio, mel violatum, de duabus radicibus cum aquis callitrici, polytrici, melissæ, absynthii, fumarie.

In hepate.

De bizantiis, de duabus radicibus, de eupatorio, acetosus compos. cum aquis culcutæ, flor. genistæ, elenii, apii, flor. tamarisci.

In ventriculo.

Mel rosatum, de mentha, de absynthio, cum aquis absynthii, menthæ, melissæ, fœniculi.

In liene.

Mel rosatum, de thymo, de fumararia, de scolopendria, cum aquis melissæ, fumarizæ, scolopendriæ, borraginis, buglossi.

Syrupi digerentes phlegma digerunt & melancholiam, exceptis iis quibus ingreditur acetum. |

Medicamenta simplicia humorem pituitosum purgantia.

Radices.

Iridis, pyrethri, agarici, turbith, ellebori vtriusque, brionizæ, cucumer. agrest. polypodii, scyllæ, serpentariæ, azari, zinziberis, hermodactyli, esulæ.

Herba.

Been vtrumque, eupatorium, sambucus, thymus, vitica, chamelea, cētaurium vtrumque, laureola, ebulus, cuminum, cuscuta, thymelæa.

Ligna & cortices.

Xyloaloes, lignum Indicum cortex radicis, cucumeris agrestis, dosis ℥.j.

Semina.

Carthami, nasturtii, ℥.ii. nigellæ, genistæ, à granis vi. ad. xv.

Fructus.

Cassia fistularis, colocynthis, stœchas, myrabolani, epithimi, chebuli, bellirici, emblici.

Gummi & lachryma.

Sarcocolla, opoponax. ℥. iiii. dosis est, saganum, euphorbium à gr. vi. ad xii. succus rad. ireos, ℥.iii. succ. cucum. à gr. ℥.ii. aloes ℥. j. in infus. ℥. iii. aqua caulis siue succus scammonii ℥.iii.

Medicamenta que primario humorem pituitosum purgant.

Myrabol. chebuli, emblici, bellirici, colocynthis, euphorb. polipod. rad. aristol. vtr. cucume. agrest. sem. carthami, nasturtii, turbitib, agaricus, hermodaetyli, azari, brionia, folia lauri, nigellæ, genistæ.

Medicamenta composita humorem pituitosum purgantia.

Electuaria liquida.

Diaphœnicum, hiera picra, hiera Ruffi, logodii.

Electuaria solida.

De citro ꝑ. ß. indum maius, diacydoniten, diaturbith. elect. theodoricum, stomachicum laxat. à ꝑ. ii. ud ꝑ. vi. elect. indicum ꝑ. ß. benedi. laxat. diasenna ab ꝑ. ß. ad ꝑ. j. diacarthami.

Trochisci.

'Alhandal, colocintid. de agarico, hos trochiscos miscemus cum pillulis sequentibus, aureæ, asajaret, hieræ simpl. ꝑ. j. aut ꝑ. iiii. cocciæ, de agarico, arthriticæ, fætida min. & maiores, de hermodact. de cærapio ꝑ. ii. de euphorbio ꝑ. ii. de opoponace ꝑ. ii. de sarcocolla, sine quibus ꝑ. ii.

Medicamenta simplicia humorem cholericum purgantia.

Radices.

Rhei, polypodii, rhapontici.

Herba.

Absynthium, mercurialis, fumus terræ, dictamnus, sambucus, & ebuli folia, psyllium, eupatorium, lupulus, folia saluiæ & herbæ, sampscucus, thymus.

Fructus.

Fructus.

Cassia fistul. pruna damasc. cucumer a-
greft. thamarindi. myrobalani citr. colocyn-
this.

Semina.

Thlaspi, pepi, sambfuei, ebuli, sambu-
ci.

Flores.

Rosæ incarnatæ, violæ purpureæ.

Lachryma seu liquores.

Manna, scammonium, succus rosæ, aloë, a-
qua costi.

Quæ potissimum coquuntur pro bile purganda.

Polypodium, eupatorium, thymus, my-
robal. citr. lupulus, absynthium, fumus terre,
senna, tamarindi, mercurialis.

*Medicamenta composita choleram
purgantia.*

Electuar.

Diacatholicum, diaprunum simplex non
solutium, diamanna, triphera, hiera picr.
gal. triphera persica, diacassia saracenicæ,
diaprunum solut.

Syrupi.

Iulep. violat. syrup. violat. de succo ros.
de rhabarb. de eupatorio, de fumarina, de eu-
phorbio, de hiera simpl. ireos ꝑ. ii. de quin-
que generib. myrobal.

Medicamenta simplicia humorem melancholicum purgantia.

Radices.

Elleborus vterque, polypodium, radix centaur. maior. rad. ebuli.

Herbe.

Folia sennæ, origanum, lupulus, calam. mont. cuscuta, fumus terræ, polium mont. thymus, pulegium, buglossa, camædris volubilis maior. eupatorium.

Fructus.

Myrobalani Indici, thamarindi, genistæ, passulæ, epithymi.

Flores.

Genistæ, stœchados.

Lapides.

Armenus, lazuli.

Succi.

Fumiterræ, buglossi, lupuli, radicis ebuli, sambuci.

Que potissimum coquuntur pro purganda melancholia.

Elleborus vterque, radix ebuli, origanum, senna, thamarindi, flores genistæ, stœchad. polipodium, centaur. maius, centaur. min. pulegium, fumus terræ, lupulus.

Medi-

*Medicamenta composita humorem
melancholicum purgantia.*

Electuaria liquida.

De cassia, ℥. j. confect. hamech. ℥. vj. triphera
saracen. ℥. j. hiera ruffi, ℥. j. catholicum, ℥. j.
hiera logod. ℥. vj. triphera persica. ℥. x.

Electuaria solida.

Diafenna ab ʒ β. ad ℥. j. de epithymo. ℥. vj.
iuniperi, catholici, ℥. j.

Pillula.

De lapide lazuli, de lap. armeno, de eupa-
torio à ʒ. β. ad ʒ j. de fumo terræ, lucis maio-
res, minores ʒ. ij. de quinque generibus my-
rabolanorum.

*Medicamenta simplicia aquam ci-
trinam purgantia hydropi
conuenientia.*

Radices.

Ircos, ebuli, lili, sambuci, cucumer. a-
grest. azari, agrimonix, turbith, brionix, e-
sulæ.

Herba.

Endiuix, chamelei, soldanellæ, lauri, ca-
mepytheos, t. thymalli, scariolæ, thymelæ,
camedios, ricini, eupatorij.

Fructus.

Hermodactyli, baccæ lauri, & iuniperi.

Ligna & cortices.

Cortex rad. cappar. radix cucum. agr. thamarisici.

Semina.

Carthami, cucum. agrest. nigel. dof. 3. iij.

Gummi seu lachryma.

Ireos, ebuli, sambuci, rad. brion. lac tithimali, cucumer. agr. sagapeni, euphorbii, æris vsti & loti, æris flos, opopanax, cadmiæ, scammonæ.

Ex animalibus.

Stercus vaccæ, capræ, rasura eboris.

*Medicamenta composita aquam:
citrinam purgantia.**Electuaria solida.*

Diacarthami, Theodoricum, diaturbith, anacardinum.

Electuaria liquida.

Diaphœnicum, hiera ruffi, logodij.

Conserua.

Rad. ireos, acori, florum genistæ, florum anthos.

Trochisci.

Alhandal.

Pillule.

De agarico, de hermodactylis, maior, mi-

nor.

not. de agarico, de sarcocolla, de euphorbio,
de sagapeno, de opopanace, de mesereo.

Olea.

Laurinum, de thymelæa, iuniperi, ex tar-
taro, de cucum. agr.

Unguenta.

De stercoreibus, agrippæ, ciclaminis, ma-
rathri.

Emplastræ.

De baccis lauri, ceroneum.

*Medicamenta simplicia sangui-
nem mundificantia.*

Radices.

Ebuli, azari, asphodeli, rhei, sambuci, po-
lypodii, agrimonix, aristolochix vtriul-
que.

Ligna & cortices.

Lignum iuniperi, guaiaci, ebuli, cortex
staxini, sambuci.

Fructus.

Pruna, iuubæ, cassia fistul. thamarindi, se-
rafa, sebesten, myrabolani.

Herbæ.

Capill. vener. adiantum, vrtica, fucus
terræ, eupatorium, althea, vermicularis, hyf-
sopus, camepitis, folia fennæ, polytricum,

ceterac, absynthium, borrago, atriplex, pulegium, origanum, camædris, thymus, malua siluestris.

Fructus.

Ficus, passulæ.

Flores.

Pulegij, stæchados, genistæ, epithymi.

Semina.

Carthami, anisi, genistæ, raphani vtriusque, lentisci, nigellæ.

Liquores.

Manna.

Succi.

Rosarum, Eupatorij, fumiterræ, asphodeli.

Medicamenta composita sanguinem mundificantia.

Electuaria liquida.

Triphera sarracenicæ, persicæ, hiera ruffi, logodij, confect. hamech. diaprunum simpl. diasenna.

Conserua.

Rosarum, pruna condita, mirab. cond. conditum persicorum, cerasa sacch. cond.

Syrupi.

De fumo terræ, rosatus solutius, de succo acetosæ, de limonibus, de epithymo, de granatis, acetosus simplex, oxysaccharum.

CLAS-



C L A S S I S

Q V A R T A,

TRACTANS DE MEDI-
CAMENTIS A QVOLIBET MEMBRO
materiam in eo peccantem v-
niuersim educentibus.

*Simplicia medicamenta è capite
educentia.*



GARICVS, epithymus, myrabolani,
chebuli, Indi, aloe, sal Indus,
colocynthis, scylla, stœcas, lazulus,
armenus.

Composita medicamenta ad idem.

Catholicum imperiale, hiera picra logodii,
triphera sarracenicæ, pillulæ coccia, de
agarico, stomachicæ.

*Simplicia medicamenta à pectore
educentia.*

Agaricus, thymus, volubilis, colocynthis,
manna, iris, hyssopus, cassia fistul. sarco-
colla.

Composita ad idem.

Catholicum, Theodoricum, Anacardi-
um, diaturbith.

*Simplicia medicamenta è stomacho &
intestinis educentia.*

Absynthium, aloë, pimpinella, myrabola-
ni, eupatorium.

Composita.

Hiera picra Galeni, electuar. ducis, dia-
prunis, catapotia stomachica, stomachicum
laxatiuum, catarticum imperiale, pillulæ au-
ræ, coccia.

*Simplicia medicamenta ab hepate &
vicinis partibus educentia.*

Agaricus, iris, fumus terræ, eupatorium,
esula, thamarindi, succus rosar. æs vstum,
laureola, rhabarb. absynth. volubilis min.
myrabolani, aqua casei, eupatorium, sarco-
colla.

Composita ad idem.

Diarhabarbarum, triphera sarrac. diacar-
thami euacuant, ab hepate & à stomacho,
diaprunum, pillulæ de rheo.

*Medicamenta simplicia à liene
educentia.*

Agaricus, absynthium, senna, elleborus
niger, daucus, cubebæ, parietaria, petrosel.
maced.

maced. semina quatuor frigida maiora,
schœnanthos.

Composita ad idem.

Benedicta, pillulæ è benedicta.

*Simplicia medicamenta à iuncturis &
aliis partibus educentia.*

Turbith, opopanax, polypodium, cuscuta, colocynthis, serapium, sal Indus, hermodactyli, elleborus niger, centaurea, absinthium, sarcocolla, euphorbium.

Composita.

Elect. de succo ros. pill. arthriticæ, benedictæ, fœtidæ, de hermodactylis, de euphorbio.

*Medicamenta simplicia per os purgantia
cerebrum apophlegmatismis, masti-
catoris destinata.*

Radices.

Cichorii, valerianæ, pyrethri, costi, zedoariæ, scyllæ, ellebori vtriusque, genistæ, galangæ, zinziberis.

Ligna & cortices.

Ebuli, macis, raphani, lauri, sambuci, xyloaloës.

Herba.

Hyssopus, eruca, ablynthium, origanum,
staphisagria, raphanus.

Fructus.

Capparis, cubebæ, amygd. amar. baccæ
lauri, vuæ passæ sine acinis, nux moschata.

Flores.

Sœchados, carthami, genistæ, schœnan-
thos.

Gummi & liquores.

Ammoniaci, castoreum, ladanum, fœx v-
sta, mastix, mel, elaterium.

*Medicamenta per nares cerebrum pur-
gantia errhinis & mastica-
toris destinata.*

Radices.

Pyrethri, cucumer. asin. scyllæ, zinziberis,
ellebori albi, nigri.

Herba.

Hyssopus, apium, origanum, daucus, ocy-
mum, coltus, ruta, pulegium, maiorana, po-
lium montanum.

Ligna & cortices.

Macis, cortex balsami, xyloaloes, cortex
lauri.

Fructus.

Cassia fistularis, cubebæ, mala granata,
nux moschata, piper.

Semi-

Semina.

Erucae, staphysagriae, nasturtii, genistae, baccæ lauri, sinapi, nigellæ, grana paradisi, raphani.

Flores.

Sthœchados, genistae, centaurij, spicæ nardi.

Lapides.

Hæmatites, sulphur, salis genera omnia.

Succi.

Betæ, brassicæ, organi, marrubii, hyssopi, erucæ, ciclamini, fol. cucum. asin.

Aqua stillatitia.

Sampfuci, ma. oranæ, raphani.

Olea.

De castoreo, rutaceum, de iunipero, de euphorbio, axungia gallinæ, oleum vetus, de piberibus, laurinum, de cucumer. agr. omphacinum, adeps anseris.

*Medicamenta sternutamentum
mouentia.*

Piper, elleborus vterque, nasturtium, castoreum, eruca, semina sinapi contusa, staphysagria, sagapeni.

Et quæ dicta sunt simplicia magna ex parte sternutamentum mouent.

Omnia acra & amara purgant aures.

*Medicamenta simplicia quæ per pe-
ctus & canales pulmonum ma-
teriam educunt pec-
cantem.*

Radices.

Altheæ, asparagi, graminis, iridis apij,
porri, liquiritiæ, fœniculi, enulæ campanæ,
feseleos.

Herba.

Althea, hyssopus, fœniculus, calamen-
tum, daucus, adianthum, nasturtium, serpil-
lum, capill. vener. polium, pulegium, origa-
num, gramen, prassium, brassica, caryophil-
lata, scabiosa.

Ligna & cortices.

Liquiritia, cortex radicis capparorum, ta-
marischi, amygd. amar. & dulcium.

Fructus.

Iuiubæ, ficus, pruna, dactyli dulc. cubebæ,
baccæ lauri, caricæ, cappares, vuæ passæ, pi-
stacia, pineæ recentes.

Flores.

Violarum, anthos, ireos, cichoreæ, sca-
biosa.

Semina.

Nasturtij, lini, amomi, cumini, apij, iuni-
peri, carthami, fœniculi, fœnugræci, ameos,
anisi, carui.

Medi-

*Medicamenta composita que per pe-
ctus & canales pulmonum
materiam peccantem
educunt.*

Eleſtuaria.

Diaphœnicum cum & sine speciebus,
diatreos, diatragacanthum calidum, diaca-
lumentum.

Conserua.

Violarum, capill. ven. enulæ campanæ, mel
rosatum, violatum, cichoreæ, acori, florum
anthos, rosarum.

Eclegma siue looch.

De pino, looch sanum & expertum, de
caulibus, de brassica, de scylla.

Trochisci.

De violis, de galla, de moschata, de cap-
paribus.

Syrupi.

De endiuia simpl. compos. capil. ven. de
liquiritia, oxymel simpl. compos. de cala-
mento, de prassio, de bizantiis, de iuiubis, de
hyslopo.

Aqua stillatitia.

Capill. veneris, prassii, vngulæ caballinæ,
hyslopi, scabiosæ, verbenæ.

*Medicamenta vomitiua simplicia
& leuia.*

Pulegium mont. perficaria, succi cort. ebulli, acetum cum aq. marin.

Vomitiua composita leuia.

Hydromel cum aq. communi, hiera cum aq. hordei, oxymel simplex, comp.

Vomitiua mediocria simplicia.

Radices.

Atriplicis, cucumeris, betonicæ, scyllæ, azari, melonum, raphani, erucæ, centaurii vtriusque, nasturtii.

Herba.

Elleborus albus, nux vomica, rapfia maxima, castaneæ, nux Indica.

Semina.

Pentaphyli, melonum, raphani, ebulli, semen & flos anethi, lac ficuum, atriplicis, rapæ, nasturtij, succus cumini, agrestis.

Vomitiua mediocria composita.

Hiera picra Galeni, qua raro vtimur ad vomitum.

Vomitiua simplicia fortiora.

Radix ebulli, raphani siluest. ciclamini, elleborus vterque, polium pastinaca, nux vomica, cucumer agrestis, cepa, apium & eius succus, daucus, flores ebulli, cortex genista,

stæ, quatuor semina frigida maiora. Fel tauri, canis, porci, debent apponi super stomachum.

Vomitiua fortiora composita.

Oxymel scylliticum, hiera ruffi, diaphœnicum quo rarò vtimur ad vomitum.

Medicamenta simplicia ventrem euacuantiâ, mollificantia, & stercoſis deijcientia.

Herba.

Malua, atriplex, borrago, branca vrsina, lactuca, valeriana, portulaca, bera, nasturtium, bismalua, parietaria, buglossum, scylla, mercurialis, lapathum, lencio, spinacia.

Radices.

Altheæ, raphani, lilij, porri, atriplicis, cepe, maluæ.

Semina.

Lini, fœnugræci, melonum, nasturtij, cucumeris, papaueris, altheæ, sinapi, hordei, cucurbitæ.

Fructus.

Cassia fistul. mel, ficus, melonum, pruna, cicer, cucurbita, mora celsi, tamarindi.

Liquores.

Succus mercurialis, ius caulium, aqua

piscium recens, cucurbitæ, vinum, ficuum
vinum.

Ex animalibus.

Pisces salsi, caseus, intestina pinguia, lac,
caro porci.

*Medicamenta composita ventrem
euacuantia.*

Electuaria grata & incunda.

Diaprunum simplex, composit. hiera pi-
cra, confectio hamech, diacatholicum, be-
nedict. laxatiua.

Electuaria solida.

-^{II} Diasenna, diacydoniten, diaindum maius,
de succo ros.

Trochisci.

Alhandal, de agarico.

Syrupi.

Rosar. laxat. cassia cum melle condita,
cassia fistularis, cum sacch. condita.

*Medicamenta simplicia que per vesicam
proprie euacuant, & urinas prori-
tant, arenulas propellant &
calculos rumpunt.*

Radices.

Eryngij, apij, tamarisci, pœniæ, rusci,
petroscl. satyrj, saxifragæ, filer montan.
iuiubæ,

iuiubæ, asparagi, althææ, gentianæ, graminis, raphani, porri, centaureæ, enulæ campan. falicis.

Fructus.

Alkekengi, amygdal. amar. capparis, piper.

Flores.

Iuniperi, hyperici, genistæ, anthos, althææ.

Herba.

Lauri, fol. dauci, agni casti, pastinaca, agrimonia, asparagus, capill. ven. lupulus, petroselin. lingua auis, hepatica, menta, marrubium, balsamum, absinthium, apium, daucus, althæa, fœniculus, scolopendria, millefolium, betonica, pimpinella, pulegium, fenecio, ceterac, anethum, adianthum, saluia, vita, saxifraga, polium mont. hypericum, serpillum, polytricum.

Semina.

Quatuor semina calida maiora, althææ, apij, asparagi, hœderæ, erucæ, vrticæ, saxifragæ, nasturtij, ciceris rubri, nigri, millefolij, raphani, fraxini, carthami, genistæ, palmæ, iuniperi, peucedani, fileis montani, petroselini, grana paradisi.

Ex animalibus.

Rasura eboris, pili leporis, cornu cerui vsti, priapus tauri.

*Medicamenta composita ad eun-
dem vsum.*

Electuaria liquida.

Athanasia magna, aurea alexandrina, lithronitibon, antidotus philonis, electuarium philanthropos.

Electuaria solida.

Diasatyrium, diatriumpipereon, diafulphur, de aromatibus, diacurcuma, dialacca.

Syrupi.

Acetosus simplex, compos. de bizantiis, de iuiubis, de liquiritia, oxyfacchar. compos. capill. vener. de eupatorio, oxymel scylliticum, aqua mulsa.

Conserua.

Rad. ireos, flor. hyperici, flor. anthos, enulae camp. eryngiorum.

Aqua.

Lilij, raphani siluestris, asparagi, rusci, graminis, restae bouis.

Trochisci.

De capparibus, de gallia moschata.

Olea.

Amygdalarum, scorpionum.

Medi-

*Medicamenta simplicia per vuluam men-
ses prouocantia.*

Radices.

Aprii, acori, brionia, centaur. vtriusq; di-
ctamni, gentiana, asphodeli, aristoloch. v-
triusque, cyperi, cyclaminis, caryophyllata,
galanga, iiris, zinziberis, lili, rubia tin-
ctorum, galanga, petroselini, valeriana.

Herbae.

Asarum, camædris, dictamnus, malua, pe-
troselinum, sabina, abrotanum, calametum,
eruca, mentastrum, polium, saluia, arthem-
isia, cuscuta, cariophyllata, origanum, pule-
gium, satureia, betonica, daucus, hyssopus,
prassium, peucedanum, serpillum.

Ligna & cortices.

Calamus aromat. cassia lignea, petropi-
lon, maron, iuniperi lignum, macis, xylobal-
samum.

Fructus.

Cappares, cubeba, piper, ficus cum oleo
amygd. dulc. infusa.

Flores.

Anthos, spica vtriusque, epithymi, saluia,
schœnanthos.

Semina.

Iuniperi, petrosel. aristoch. nigella, na-
sturtii, peucedani, quatuor semina frig. ma-
ior.

Gummi & liquores.

Ladanum, benioinus, myrrha, ammoniacum, bdellium, opoponax, styrax liquida, sagapenum.

Ex animalibus.

Castoreum, ambra, gallia moschata, moschus, gallia.

*Composita ad eundem usum.**Electuar.*

Theriaca, aurea alexandrina, thiphera magna sine opio, diacalamentum, dialacca, mithridatium, athanasia, diacurcuma.

Syrupi.

De calamento, de arthemisia, de bizanthis, de prassio.

Aqua.

Arthemisia, calamenti, racemorum, fabinae, serpentariae, samplici.

Trochisci.

De gallia moschata, de myrrha.

Nota quod ex iis medicamentis cataplasmata apposita super ventrem, vel per os assumpta, vel etiam coxis appensa, vel pessis in vuluam iniectis abundanter per vuluam menstrua purgant.

Medicamenta euacuantia per haemorrhoidas.

Radices.

Brioniae, iridis, scyllae, pyrethri, ebuli,
pouis

porri, cepæ, vitis agrest.

Herbæ.

Spargula, capri folia, mercurialis, ficus folia, anagallidis folia, millefo. perficaria, menta, staphysagria, lupulus, fragaria.

Fructus.

Amygdal. amar. farina fab. piper.

Succi.

Ciclamini, centaurii mai. cepæ, rad. bionix, iridis, valerianæ, elaterium.

Ex animalibus.

Stercus columb. bubulum, fel, hirudines.

Pulmo arietis minutim incisus dolorem sedat & postea sanat.

Terra.

Nitrum, aphronitrum, fuligo, ferrum, carta ysta & additur ignis.

Medicamenta simplicia sudorem prouocantia & per eundem euacuantia.

Calida sunt hæc.

Radices.

Iridis, asparagi, apii, lili, enulæ camp. graminis, acoi.

Herbæ.

Apium, pulegiū, calamentum, abrotanum, camomilla, arthemisia, scabiola, fœniculus.

Ll 2

SCD Lyon 1

terpillum, chelidonium folia lauri, rosmari-
ni, hyssopus, origanum, anethum, satireia,
eupatorium, nigella, nepeta, melilotus, her-
ba paralyfis, salvia, sabina.

Ligna & cortices.

Lentisci, radicis ebuli, iuniperi, sambuci
cortex.

Fructus.

Passulæ, citri, cydoniorum, cubebæ, ficus,
galbani, caricæ.

Semina.

Semina quatuor calida maiora & mino-
ra, lentisci, ciceris nig. sinapi, fraxini, anethi,
fœnugræci.

Flores.

Citri, enul. camp. limonum, ireos, amygda-
læ, flos bdellii.

Ex animalibus.

Adeps hœdi, porci recentis, corui, canicu-
læ, ciconiæ, milui, bubonis, picæ, leonis, cu-
niculi, vulturis, noctuæ, lupi.

Simplicia frigida ad eundem usum.

Radices.

Lactucæ, oxalidis, leariolæ.

Herba.

Atriplex, portulaca, volubilis, violaria, la-
ctuca, bismalua, arnoglossa.

Folia.

Salicis, cannæ, populi, pampini, malua,
airo-

arnoglossum, parietaria, branca vrsina, palea hordei.

Semina.

Lactucæ, oxalidis, papaueris, portulacæ, atriplicis, coriandri.

Flores.

Violarum, papaueris, branca vrs. volubilis, ceraforum, altheæ.

Ex animalibus.

Adeps anserinus, murenæ, gallinæ, anseris syluest. anatis, cygni, galli, merule fluuialis, testudinis aquaticæ.

*Medicamenta composita ad eundem
usum.*

Elect.

Diaireos simplex, salomonis.

Trochisci.

De rhabarbaro, de eupatorio.

Syrupi.

De bizantiis, hydromel, decoctum cina-
momi, de hyssopo, aqua hordei.

Olea.

Anethinum.

Aqua qua calida pota statim sudorem prouocet.

Volubilis, lilii, flores amygd. dulc. ceraforum, limoniorum, violarum albar. maluæ, prunorum dulc. citrium, camomillæ, ~~ireos~~, branca vrsinæ, papaueris.

Medicamenta quæ facile virtutem medicamenti laxat. ad caput deducunt.

Radices.

Pœoniæ, a cori scyllæ, gentianæ.

Ligna.

Xylobalsamum, macis.

Flores.

Spicæ, scœnanthos.

Herba.

Balsamum, Camædris, thymus, maiorana, hyssopus, camœpitis.

Fructus.

Nux moschata, piper, grana pini, anacardi.

Mineralia & lachryma.

Salindus, sagapenum, ladanum, sal gemmæ, myrrha.

Ex animalibus.

Castoreum, moscus.

Quæ ad pectus medicamenta laxatiua deducunt.

Radices.

Iridis, liquiritiæ, raphani, scyllæ, feseleos, aristolochiæ.

Herba.

Thymus, prassium, fol. lauri, hyssopus, libium, calamentum, saluia, capill. ven. nasturtium.

Semi-

Semina.

Fœnu-græci, moræ, pineæ, auellana.

Ligna & cortices.

Calamus aromar.

Gummi & liquores.

Gummi arab. opoponax, mora magna, mel, succus liquir. saccharum, olibanum, sagapenum, tragacanthum, succus caulium, ius galli antiqui.

*Quæ ad hepar medicamenta laxatiua deducunt.**Radices.*

Azari, asparagi, scyllæ, iræos, dauci, fœniculi.

Herbæ.

Daucus, eupatorium, fumus terræ, poliū, fœniculus, cuscuta, absynthium, endiuiā a-grestis, petrosel. asparagus, lupulus, camœdris, scariola, folia lauri, camœlea.

Semina.

Quatuor semina frigida mai. scariolæ, petroselini.

Flores.

Camomillæ, spicæ, schœnanthos.

Liquores.

Succus fœniculi, eupatorii, aqua ciceris.

Quæ medicamenta purgantia ad lienem deducunt.

Radices.

Acetosæ, ebuli, sambuci, azari, ireos, tamarisci, scyllæ, capparitis.

Herba.

Daucus, calamentum, rubia tinctorum, scolopendria, absynthium, camepitis, eupatorium, fœniculus, cuscuta, prassium, panis porcinus, agnus castus, asparagus, volubilis.

Ligna & cortices.

Tamarisci, salicis, capparitis.

Semina.

Agni casti, anisi.

Fructus.

Amygdal. dulc. cappareis.

Ex terra.

Sal Indum, gemmæ.

Ex succis.

Scordium.

Que ad iuncturas medicamenta purgantia deducunt.

Radices.

Zinziberis, acori, azari, porri.

Herba.

Tapfia, thymus, camædris, camæpitis.

Semina.

Colocinthidos.

Succi.

Opoponax, aqua porri, succus caulis, scordium.

CLAS-

SCD Lyon 1



CLASSIS

QVINTA,

DE MEDICAMENTIS confortantibus, roborantibus & vires instaurantibus.

*Symplicia roborantia & vires instauran-
tia calidis morbis destinata.*

Radices.



Rndiuæ, cichorii, arnoglossæ,
tormentillæ. *Herba.*

Violaria, tormentilla, polytri-
cum, ceterac, hepatica, endiuia,
scolopendria, lentigo aquatica, lupulus.

Ligna & cortices.

Cortex salicis, sandali omnes, liquiritia.

Fructus.

Pruna, berberis, sebesten, passulæ, cerasa,
mala punica.

Semina.

Quatuor. frig. maiora, hœderæ, rosarum,

oxalidis, frazini, hordei.

Gummi.

Arabicum, tragacanthum, succinum.

Metallica.

Folia auri & argenti.

Succi.

Hypocystis, sanguis draconis, mastiches, a cacia, caphura.

Lapides & gemmae.

Hæmatites, corallus albus, rub. vniones, margaritæ, pumex qui raro vsurpatur.

Terra.

Sigillata, bolus armena.

Ex animalibus.

Rasura eboris, rasura cornu cerui, cancrorum cinis, cera, rasura vnicornu, os de corde cerui, os sepia.

Medicamenta composita iisdem vsibus destinata calida.

Electuaria liquida.

Nouella rosata, manus christi cum, vel sine speciebus.

Electuaria solida.

Diapenidion sine speciebus, diarrhod. abb. diatragacanth. diamargar. frig. diacydoniten sine speciebus, diacorallum.

e.t.

Olea.

Myrthinum, violatum, nenupharis, rosatum, rosaceum.

Vnguenta.

Pomata, populeum, citrium, somniferum, rosaceum.

Conserua.

Rosar. sacch. ros. tab. sacch. viol. cerasa condita, violar. persica condita, cichorii, conditum cydoniorum, oxymel simplex.

Trochisci.

De camphora, despodio, alkekengi, de violis, diaspodium, de terra sigillata.

Aqua Stillatitia.

Aquositas citri, succus acetosæ, malorum granatorum, cydoniorum nenupharis, violarum, cichorii, acetum, omphac. aqua ros.

Confortantia simplicia frigidis morbis destinata.

Radices.

Lilii, acori, chelidonii, scyllæ, genistæ, zinziberis.

Herba.

Maiorana, satureia, thymus, hyssopus, balsamita, artemisia, borrago, melilotus, buglossum, primula veris, camomilla.

Flores.

Saluix, buglossæ, borraginis, stœchados,

anthos, scabiosæ.

Fructus.

Amygdalæ, capparidis, passulæ, auellanae, ficus, iuiubæ, dactyli, pistacia.

Semina.

Brassicæ, anethi, erucæ, absynthii, abrotani, nigellæ, fraxini.

Composita confortantia frigidis morbis destinata.

Elect.

Diamarg. calid. diacalamentum, diaprasium, Elect. ducis, diacaryophyllatum, diacuminum, diatriumpipereon, diacostum Iulii, diagalanga.

Conserua.

Acori, eryngiorum, bugloss. florum anthos, borraginis, corticis citri.

Aqua Stillatitia.

Borraginis saluiæ, scabiosæ, enulæ camp. melissæ, succ. rad. ireos, satureiæ, succ. rad. a-cori.

Trochisci.

Galliæ sebellenæ mesuæ, moschatae, de absynthio, xyloaloës, cyperi, capparidis.

Olea.

Anethinum, de absynthio, camemeli, de croco, de stœchade, de capparibus, de menha.

Vnguenta

SCD Lyon 1

Unguenta.

De althea, martiatum, aragon, resumpti-
uum.

Emplastra.

De granis lauri, de meliloto.

*Simplicia vires instaurantia calidis & fri-
gidis morbis communia.*

Radices.

Altheæ, atriplicis, cichorii, tamarisci, bu-
glossi, borraginis, salicis, tormentillæ.

Herba.

Buglossa, ceterac, brancha vrsina, borra-
go, gramen, asparagus, hepatica, polytri-
cum, cameleum, adianthos, scolopendria,
melilotus.

Fructus.

Iuiubæ, amygdalæ, pistacia, passulæ, pru-
na, sebesten, pineæ.

Semina.

Maluæ, fraxini, atriplicis, cardui bened.
altheæ, asparagi, fœnugreci.

Ligna & cortices.

Sandali omnes, tamarisci, cortex liquiri-
ciæ.

Flores.

Rosar. camemeli, buglossi, viola, meliloti.

Gummi.

Arabicum, mastiche, tragacanthum, thus.

Succi & liquores.

Acetositas citri, penidii, amyli, saccharum,
succus liquiritiæ, ladanum, manna, caphura.

Metallica.

Auri & argenti folia.

Lapides.

Hyacinthus, granatus, smaragdus, rubi-
nus, saphyrus.

Ex animalibus.

Os de corde cerui, lac, moscū, algalis, cā-
rorū cinis, cerebrū leporis, butyrum, ambra.

*Composita confortantia & vires instau-
rantia frigidis & calidis morbis com-
munia.*

Electuaria liquida.

Alipta moseata lætificans Galeni.

Electuaria solida.

Diarrh. abb. de gemmis, diatria sandali dia-
tragac. frigidum, diaphœnicum, myrobala-
num conditum, mel violatum.

Sacchara.

Rosatum violatum, buglossatum, malua-
tum borraginatum.

*Et hæc de simplicibus medicamentis dicta suffi-
ciant, quæ si grata fuerint ad Dei gloriam &
communem utilitatem in posterum typis com-
mittemus.*


FINIS



SCD Lyon 1

SCD Lyon 1

SCD Lyon 1



SCD Lyon 1