

PROPOSITIONES
reliquorum Librorum
Geometriæ Euclidis, Græcè,
& Latinè, in vsum eorum,
qui volumine Euclidis
carent.

*Per Cunradum Dasypodium, scholæ
Argentinenſis profefſorem.*



ARGENTORATI APVD
Christianum Mylium.

M. D. LXIIII.

SCD LYON 1
Mathématiques

ILLVSTRISSIMO
 PRINCIPI, ET DOMI-
 NO, DOMINO NICOLAO
 CHRISTOPHERO RADZEVVIL, DV-
 CI OLICAE ET NIESVVISI, COMITI
 IN SCHIDLOVVIEZ, &c. PRAECLA-
re indolis, & optima spei Principi, ac
Domino suo clementiff: S. D.
Conradus Dasypodius.



DVplicem finem, Illustriff:
 Princeps, sibi in his Ele-
 mentis proposuit Eucli-
 des: alterũ quidem vt illas
 solidas figuras, ex quibus Platonis iu-
 dicio, mundus hic suas habet descri-
 ptas partes, traderet & explicaret; al-
 terum verò, vt discantis animum ad
 quæuis Mathematica percipienda o-
 mnibus modis informaret, & erudi-
 ret. idcirco primum de simplicissimis
 quibusq; rebus geometricis agit: de-
 inde sensim κατὰ σὺνθεσιν progreditur
 ad magis composita: deniq; eo perue-
 nit;

PRÆFATIO.

nit, vt omnis aperiatur figurarum simplicium varietas, & copia, separatim quidem vnamquamq; prius constituendo: deinde eius proprietates & affectiones, quas cum per se, tum ad alias illæ habent examinando, tandem simul omnes vni eidemq; globo includendo. adhæc exponit omnes proportionés, quas lineæ ad lineas, anguli ad angulos, superficies ad superficies, corpora ad corpora habere compertum est, atq; hinc videmus, Euclidem suum affectum esse finem, quem sibi in rerum geometricarum copia, & varietate explicanda proposuerat. Quantum verò ad illud, quod discantis animum his elementis geometricis erudiri diximus, ita intelligendum est: quod quicumq; his diligenter incumbit, ita tandem intelligentia animum imbuit suum; & quasi harum rerum habitum sibi comparat: vt eo facilius ad quamuis Geometricam tractationem

PRÆFATIO.

nem sibi ipsi sufficiat. cum enim ab his tanquam in itīs incipimus: cæterarum omnium huius scientiæ partium cognitionem assequi, rerumq; geometricarum varietatem percipere poterimus, neq; id tantum, quin & illud verissimè dici potest sine iisdem illis elementis reliquorum omnium non obscuram tantum, sed penitus nullam esse intelligentiam. Sicuti enim nullus neq; Poëtarum, neq; Rhetorum, aut Dialecticorum, aut alterius cuiusq; auctoris scripta intelliget: nisi prius grammaticorum teneat elementa: sic etiam in his disciplinis Mathematicis quædam sunt elementa, sine quibus reliqua percipi nequeunt. Eiusmodi Euclides noster simplicissima habet theoremata, & quæ primis hypothesebus sunt proxima, eaq; in hos congestit libros, tam eleganti ordine, & tam apta collocatione, vt verè dicere possimus, in nulla re ordinem convenien-

PREFATIO.

tiorem ostendi posse. His autem elementis reliqui vtuntur mathematici: ad confirmanda suarum demonstrationum fundamenta: ex quorum numero precipue sunt Archimedes Syracusanus, Apollonius Pergæus, & ceteri non Geometrae solum, sed & Astronomi, Theodosius Tripolites, Ptolemæus Alexandrinus, & quicumque mathematicorum nomen tueri possunt. Euclidis igitur lectio non tantum ad elementorum cognitionem utilis & necessaria est, quæ in eodem genere sunt scripta, & γεωμετρικὰ, aut ἐκ γωνιᾶς ἡ γεωμετρίας sunt: sed & ad quamuis mathematicam scientiam & disciplinam percipiendam. vnde ex hac σοιχειώσῃ, tanquam ex vrbe aliqua populosa, plurimæ deductæ sunt coloniæ. Nunc itaque satis sit dictum de fine Elementorum geometricorum, qui in eo consistit, vt discentes absolutam sibi comparent rerum mathematicarum cognitionem,

& vt

PRÆFATIO.

& vt figurarum proprietates, & differ-
 rentias omnes intelligamus : eaq; om-
 nia ad mundi vniuersi, eiusq; partium
 contemplationem accommodemus. Sed
 dicat aliquis, quonã modo hæc accom-
 modatio intelligenda est: aut quæ est
 illa convenientia figurarum Geome-
 tricarum cum mundi partibus: id pau-
 cis sic percipite. Geometræ quinque
 habent solidas figuras, quas nominant
 corpora regularia, vt sunt *πύραμις*, *ὀκ-
 τάεδρον*, *εἰκοσάεδρον*, *κύβητος*, *δωδεκάεδρον*:
 Astronomi, & Physici, cœlum, &
 quatuor elemēta, ignem, aërem, aquã,
 & terram: iam si figuras has cum mun-
 do, eiusq; partibus conferas; tum *ἀνα-
 λογία* quadam *πύραμις* igni conuenit,
 propter eius cum acumine ignis simi-
 litudinem. *ὀκτάεδρον* aëri: sicut enim
 aër igni, ita *ὀκτάεδρον* *πυράμιδι* leuita-
 te formæque proximum est: eodem
 modo *εἰκοσάεδρον* potest aquæ compa-
 rari, propter mobilitatem, qua talis fi-

PRÆFATIO.

gura huic elemento est consimilis: terra etiam cubus assimilatur, propter stabilitatem, & huius corporis firmam plenitudinem. denique cœlo comparatur *δωδεκάεδρον*, quemadmodum enim cœlum duodecim signis zodiaci cingitur: ita duodecim habet bases dodecaedron quibus consistit: item, sicut cœlum suo ambitu reliqua in se comprehendit elementa, ita dodecaedron inter quinque ista corpora regularia, quæ in eandem includi possunt sphaeram, omnium est maximum, & quod reliqua omnium aptissime circumscribit. Quare hæc est Platoniorum accommodatio figurarum geometricarum ad mundi partes: quam cum Euclides, qui & ipse Platonicus fuit, optime nosset, eò etiam in suis respexit elementis, etsi priora essent cogitatione: tamen in elementorum contextu facta sunt posteriora, præmittenda enim erant ea, sine quibus hæc percipere non possumus,

PRÆFATIO.

mus, quod facile ἀναλυτικῶς demonstrabimus, hæ figuræ superficiebus equalibus, lateribus etiam & angulis equalibus continētur, & eidem spheræ includuntur: quod quidem qua ratione fiat, nec sciri, nec intelligi poterat: nisi prius ostēderetur, quanto diameter spheræ longior esset vnoquoque latere vniuscuiusque figuræ, cum verò neque illud absque cognitione rationalitatis, & irrationalitatis linearum, & superficieum percipi posset: libro decimo de linearum συμμετρία, & ἀσυμμετρία tradit: atque hæc tractatio requirebat cognitionem numerorum, sine qua sane nihil poterat intelligi. itaque quantum satis erat in elementis, & quantum sufficiebat ad hoc negotium, tribus libris nono, octavo, & septimo diligentissime omnia persequitur. quia verò simplicitate circulorum, & figurarum rectilinearum doctrina prior erat, & solidorum corporum cognitio ex hac

a 5 dema-

PRÆFATIO.

demanat : sex libris prioribus suæ *χειώσεως* tradit *γεωμετρικὰ* : & demonstrat, quæ quibus sint æqualia, quæ inæqualia, quæ proportionem habeant aliquam, quæ minus, quæ similia, quæ verò dissimilia. denic̄ omnem rerum geometricarum persequitur varietatem. Ex his arbitror quemuis facile videre, non solum quæ & qualis sit illa geometrarū methodus, sed & quid in his contineatur elementis : eāq̄ paulò prolixius explicare volui, quia adolescentibus harum rerum imperitis hæc scribo, vt quasi per transennam conspiciant totam *οικονομίαν τῶν γεωμετρικῶν λόγων*. vt inde vtilitatem videre, τάξιν admirari : subtilitatē perspicere : denic̄ singulare ingenij acumen eius, qui hæc conscripsit, suspicere possint. Quare vt in duobus prioribus libellis quos in lucē edidi, bonos adolescentes adhortatus sum ad studium Geometriæ, ita & hoc in loco faciam, & semper fa-

PRÆFATIO.

per facturum sum : cum sciam quàm v-
tile, & quàm necessarium sit hæc per-
cepisse. Verum ne hortator solum, sed
& adiutor essem: volui in gratiam stu-
diosorum propositiones reliquorum
Euclidis librorum Græcè & Latinè e-
dere: eo sane cōsilio, quòd cogitarem,
mutilatum quippiam esse, si primus &
secundus liber tantum imprimeretur,
reliquis omisis. inde enim fieret, vt
contextus, & συνέχεια harum proposi-
tionum percipi nō possit. deinde quia
sepenumero in meis accidit prælectio-
nibus, vt mentionem faciam nunc hu-
ius, nunc illius Euclidæ proposi-
tionis, cumq; illis destituantur mei disci-
puli: quomodo quæ doceo percipiant
non video, nisi magna cum difficulta-
te: & meo quidem iudicio nihil aliud
est, quàm obscura obscurioribus velle
explicare. adhæc eò respexi etiam, vt
cum hæc sint mathematicarum disci-
plinarum elementa, & idcirco menti-
bus

PRÆFATIO.

bus nostris benè imprimenda, necesse est, vt eadem frequenti lectione sibi quisq; faciat familiaria; molestum verò est integrum Euclidis volumẽ perpetuò hinc & inde circumferre: arbitrabar igitur, si in libellum redigeretur minorem: commodius esse omnibus geometriæ studiosis, hæc percipere elementa: in primis verò ijs, qui iam aliquousq; in mathematicis disciplinis progressi sunt. Atq; hoc meum factũ neminem sano iudicio præditum improbatum spero, cum non alio fiat animo, quàm vt quacuncq; ratione fieri possit, adolescentes ad fontes Geometriæ deducantur, ex quibus si salubriorem hauserint cognitionem, sibi rerum mathematicarum veriorem, imò solidiorem comparent intellectũ: nec desistam pro tenuitate mei ingenij studiosis perspicua reddere ea, quæ videntur obscuriora: atq; idcirco *ὀνομαστικὸν γεωμετρικὸν*, quod superioribus mensi-

PRÆFATIO.

mensib. promisi, Deo Opt. Max. auxiliante, breui ad finem perducam, vt habeant harum disciplinarum studiosi in quo se exercent. scio quantopere vocabula illa scientiarum propria impediunt lectorem, si non intelligantur: quæ certè si nunc fient planiora, facili me ad puerorum græcorum gymnasia illa perueniemus, omniaq; ista nobis familiaria reddemus. Hæc sunt quæ hoc tempore in lucem exire volui, quum tamen nihil minus haberem in animo, & cogitassem primum Euclidis librum tantum pro meis discipulis, scholaq; nostra in publicum edere: sed amor ille, quo harum disciplinarum studiosos persequor, tantum potuit apud me, vt hæc adiunxerim, & reliqua quæ promisi, Deo iuuante, additurus sim: præsertim cum intelligam, hac mea quali acq; studia non paucis viris bonis & literatis placere: & quia I. T. C. tam benignè, & tanta cum humanitate acbe-

PRÆFATIO.

ac beneficentia priora mea scripta excepit, illisq; patrocinari dignata est, nō potui non hæc eadem sub I. T. C. tutelam tradere, id profecto verè dicere possum, in I. T. C. multa apparere singularia naturæ dona, quæ I. T. C. bene collocat, & ita ijs vtitur, vt in hac I. T. C. ætate iam appareant prudentiæ, & pietatis non parvæ scintillæ, & nisi vererer, ne adulandi gratia me hæc scribere quispiam diceret: prolixius ea persequerer: sed res ipsa prædicat, I. T. C. indolem ingenij singularem: humanitatem Principe dignam: studium bonarum artium & linguarum tale vt I. T. C. cæteris sit exemplo, quo discipulos nostræ scholæ ad maiorem excitat diligentiam, quia I. T. C. vident nullum tempus prætermittere, quod non studijs bonarum artium & disciplinarum optimè impendat. Quare cū eiusmodi sint hæc, de quib. dixi dona, imò maiora, quã ut hoc loco celebrari pos-

PRÆFATIO.

possint aut debeant, meritò I. T. C. in
patrocinium studiorum est roganda,
quia si vnquam bonæ literæ indiguerunt
ope, & auxilio, hoc sanè tempore,
quo rabies illa ignorantia adeò in-
festat bonas artes, & disciplinas, vt nisi
Mecœnates sint multi & potentes, de
literis iam actum videatur. Rogo itaq;
I. T. C. ne in malam accipiat partem,
quòd denuò compellem I. T. C. &
Mecœnatem meorum studiorum es-
se velim. His me, mea;q; studia I. T. C.
commendo. id enim non alio, quàm
ingenuo & bono facio animo, & quòd
I. T. C. dignetur me mea;q; studia
in suum recipere patrocini-
um, etiam atq; etiam
exopto.

I. T. C. deditis:

Cunradus Dasypodius.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ-
ΣΕΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Ισοι κύκλοι εἰσιν, ὧν αἱ διαμέτροι εἰσὶν ἴσαι· ἢ ὧν αἱ ἐκ τῶν κέντρων ἴσαι εἰσιν.

Ευθεῖα κύκλος ἐφάπτεσθαι λέγεται, ἢ πρὸς ἀπιόμενη τῷ κύκλῳ, καὶ ἐκβαλλομένη ἔτεμνη τὸν κύκλον.

Κύκλοι ἐφάπτεσθαι ἀλλήλων λέγονται, οἵ πινες ἀπιόμενοι ἀλλήλων, ἔτεμνεσιν ἀλλήλους.

Ἐν κύκλῳ ἴσον ἀπέχον τῷ κέντρῳ εὐθεῖαν λέγονται: ὅταν αἱ ἀπὸ τῷ κέντρῳ ἐπὶ αὐτὰς κάψτοι ἀγόμεναι ἴσαι ὦσι. μείζον δ' ἀπέχον λέγεται ἐφ' ἧ ἢ μείζων κάθετος πίπτει.

Τμήμα κύκλος ἐστὶ τὸ περιεχόμενον ᾠμά, ὑπόπτε εὐθείας καὶ κύκλος περιφερείας.

Τμήμα \odot δὲ γωνία ἐστὶν, ἢ περιεχομένη ὑπόπτε εὐθείας, καὶ κύκλος περιφερείας.

Ἐν τμήματι δὲ γωνία ἐστὶν, ὅταν ᾠπὶ τῆς περιφερείας τῷ τμήματι \odot , ληφθῆ π σημάιον, καὶ ἀπὸ αὐτοῦ ᾠπὶ τὰ πέρατα τῆς εὐθείας

EVCLIDIS ELEMEN-
TORVM GEOMETRIÆ
LIBER TERTIVS.

Definitiones.

Circuli illi æquales sunt, quorum dia-
metri erunt æquales: vel qui æquales
habent ex centrīs ductas lineas rectas.

Illā rectā lineā dicetur circulum tange-
re, quæ cum tangit circulum, et producta fue-
rit, tamen non secat circulum.

Circuli dicuntur sese mutuo tangere, qui
dum sese tangunt, nō tamen sese mutuo secant.

Rectæ in circulo æqualiter à centro di-
stare dicuntur: quando perpendiculares à
centro ad illas ductæ, æquales fuerint, longi-
us verò illa distare dicitur, in quam maior
cadit perpendicularis.

Segmentum circuli, est figura quæ lineā
rectā & circuli circumferentia continetur.

Angulus verò segmenti est, qui lineā re-
ctā, & circuli circumferentia continetur.

Angulus verò in segmento est, quando in
circumferentia segmenti sumptum fuerit ali-
quod punctum, & rectæ quædam ab eo pun-

A Et

Ὁθείας ἥτις ἐστὶ βάσις τῆς τμήμας Θ ἐπι-
 ζυχθῶσιν Ὁθείαι: ἡ περιεχομένη γωνία ὑ-
 πὸ τῶν Ὀπιζυχθῶσιν Ὁθῶν. ὅταν δὲ αἱ
 περιέχουσαι τὴν γωνίαν Ὁθείαι, ἀπολαμ-
 βάνουσι τίνα περιφέρουσαν ἐπὶ ἐκείνης λέγε-
 ται βεβηκέναι ἢ γωνία.

Τοιαύτῃ δὲ κύκλος ἐστὶν, ὅταν πρὸς τὰ κέν-
 τρω αὐτοῦ τῆς κύκλου σταθῆ ἢ γωνία, τὸ περι-
 χόμενον σχῆμα ὑπότῃ τῶν τὴν γωνίαν πε-
 ριεχουσῶν Ὁθῶν, ἢ τῆς ἀπολαμβανομέ-
 νης ἐπὶ αὐτῶν περιφερείας.

Ὁμοια τμήματα κύκλου ἐστὶν, τὰ δεχόμε-
 να γωνίας ἴσας: ἢ ἐν οἷς αἱ γωνίαι ἴσαι ἀλλή-
 λαις εἰσὶν.

Πρότασις α. Πρόβλημα.
 Τοῦ δοθέντος Θ κύκλου τὸ κέντρον εὐρεῖν.

Πρότασις β. Θεώρημα.

Ἐὰν κύκλος Ὀπὶ τῆς περιφερείας ληφ-
 θῆ δύο τυχόντα σημεῖα, ἢ Ὀπὶ τὰ αὐτὰ ση-
 μεῖα Ὀπιζυγνυμένη Ὁθεία, ἐντὸς πεσεῖται
 τῆς κύκλου.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Ἐὰν

LIBER III.

puncto ad extrema lineæ rectæ, quæ basis segmenti est, ductæ fuerint, angulus qui duabus illis ductis lineis rectis continetur, erit in segmento. Quando verò rectæ angulum continentés, absumpserint aliquam circumferentiæ partem, in illa dicetur angulus constitutus esse.

Sector circuli est, quando angulus fuerit ad centrum circuli constitutus, illa inquam figura, quæ continetur lineis rectis, angulum facientibus, & circumferentiæ parte, quæ lineis rectis istis est intercepta.

Similia segmenta circuli sunt, quæ æquales habent angulos, aut in quibus anguli sunt æquales.

Propositio 1. Problema.

Dati circuli centrum inuestigare.

Propositio 2. Theorema.

Si in circuli circumferentiâ sumantur duò puncta, recta quæ duo puncta ista coniungit, intra circulum cadit.

Propositio 3. Theorema.

A 2

Si

Εὰν ἐν κύκλῳ ὁρθὰ πῆς διὰ τῶ κέντρου,
ὁρθίαν πῆνὰ μὴ διὰ τοῦ κέντρου δίχα τέμνη,
καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῷ περὶ: καὶ εἰὰ πρὸς ὀρ-
θὰς αὐτῷ τέμνη, ἔ δίχα αὐτῷ περὶ.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Εὰν ἐν κύκλῳ δύο ὁρθίαι τέμνωσιν ἀλ-
λήλας, μὴ διὰ τῶ κέντρου ἴσαι, ἔ τέμνωσιν
ἀλλήλας δίχα.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλας, ὅπ-
ῃ ἴσαι αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων ἐν
τῶς: ὅπ ἴσαι αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ὅπ τῆς διαμέτρου ληφθῆ
πὶ σημείον, ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον τῶ κύκλου, διὰ
δὲ ἔ σημείον περὶ αὐτῶν ὁρθίαν πῆνὲς πρὸς
τὸν κύκλον, μεγίστη μὲν ἴσαι ἐφ' ἧς τὸ κέν-
τρον, ἐλαχίστη δὲ ἡ λοιπὴ: τῶν δὲ ἄλλων ἀπὸ
ἢ ἔγχιον τῆς διὰ τοῦ κέντρου, τῆς ἀπώτερον
μείζων ἐστὶ. δύο δὲ μόνον ὁρθίαι ἴσαι διὰ τῶ
αὐτῶ

LIBER III. 5

Si in circulo recta quaedam per centrum ducta, aliam quandam rectam per centrum non ductam in duas secuerit partes, ad angulos rectos illam secabit: & si ad angulos rectos secat: etiam in duas partes æquales secabit.

Propositio 4. Theorema.

Si in circulo duæ rectæ sese mutuò secuerint, quæ tamen per centrum non sunt ductæ: non secant sese mutuò in duas partes æquales.

Propositio 5. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò secant, non habent vnum idemq; centrum.

Propositio 6. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò internè secant: non habent vnum, idemq; centrum.

Propositio 7. Theorema.

Si in diametro circuli sumatur aliquod punctum, quod non est centrum circuli, & à puncto isto ad circulum ductæ sint quædam lineæ rectæ, longissima erit illa, in qua est circuli centrum: reliqua verò omnium breuissima: ex alijs verò semper ea quæ rectæ per centrum ductæ proximior est, longior erit ea quæ longius ab ea distat. duæ verò solummodo sunt rectæ æ-

A 3 quales

αὐτῶ σημείου *περασεσῶν*) πρὸς τὸν κύκλον,
ἐφ' ἑκάτερα τῆς ἐλαχίστης.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆ π σημεῖον ἐκτός ἀπὸ
δὲ τῶ σημείων πρὸς τὸν κύκλον *διαχθῶσι*
ὄρθαι πινες, ὧν μία μὲν *διαξ* κέντρα, αἱ δὲ
λοιπαὶ ὡς ἔτυχε, τῶν μὲν πρὸς τῷ κοίλῳ
περιφέρειαν *περασιπασῶν* ὄρθῶν, μεγί-
στη μὲν ἢ *διαξ* κέντρα, τῶ δ' ἄλλων, αἰεὶ ἢ ἕγ-
χιον τῆς *διαξ* τῶ κέντρα, τῆς ἀπώτερον μεί-
ζων ἔσται. τῶν δὲ πρὸς τῷ κυρτῷ περιφε-
ρείαν *περασιπασῶν* ὄρθῶν, ἐλαχίστη μὲν ἔ-
σιν ἢ μεταξὺ τούτων σημείων, καὶ τῆς *διαμέτρου*
τῶν δ' ἄλλων αἰεὶ ἢ ἕχιον τῆς ἐλαχίστης τῆς
ἀπώτερον ἔσιν ἑλαπίων. δύο δὲ μόνον ὄρθαι
ἴσται *περασεσουῶνται* ἀπὸ τῶ σημείων πρὸς τὸν
κύκλον ἐφ' ἑκάτερα τῆς ἐλαχίστης.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆ π σημεῖον ἐκτός, ἀπὸ
δὲ τῶ σημείων πρὸς τὸν κύκλον *περασιπῶσι*
πλάγεις ἢ δύο ὄρθαι ἴσται, τὸ ληφθὲν σημεί-
ον κέντρον ἐστὶ τῶ κύκλου.

Πρό-

quales ductæ ab eodem isto puncto ad circum-
lum ex utraq; parte lineæ breuissimæ.

Propositio 8. Theorema.

Si extra circumulum aliquod sumatur pun-
ctum, & ab eo puncto ad circumulum ducantur
quædam lineæ rectæ, quarum vna per cen-
trum sit ducta, reliquæ verò quouis modo, ex
quibus quæ ad concavam circumferentiam
cadunt, illa quæ per centrum est ducta, lon-
gissima erit, aliarum verò vnaquæq; quæ re-
ctæ per centrum ductæ proximior est, longi-
or erit remotiore. illarū verò quæ ad conue-
xam circumferentiam cadunt, breuissima est
quæ cadit inter punctum istud, & diametrum,
reliquarum verò semper ea, quæ proximior
erit breuissimæ, breuior erit remotiore. duæ
verò solummodo rectæ ab isto puncto, ad cir-
culum ex utraq; parte breuissimæ lineæ ca-
dent.

Propositio 9. Theorema.

Si punctum aliquod intra circumulum sumatur, &
ab eo puncto ad circumulum ducantur plures quàm duæ
rectæ æquales, punctum istud assumptum, centrum
est circuli.

A 4 Circulus

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Κύκλος \odot ἔ τέμνει κύκλον κ $\tilde{\epsilon}$ πλείονα ση-
μεῖα ἢ δύο.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι ἐφάπωνται ἀλλήλων ἐκ-
τός, καὶ ληφθῇ αὐτῶν τὰ κέντρα: ἢ ὅτι τὰ
κέντρα αὐτῶν ὀπίσθινυμένη ὀθεῖα, ἔσθι
βαλλομένη, ὅτι τὴν συναφῶν πεσεῖται τῶν
κύκλων.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι ἀπλωνται ἀλλήλων ἐκτός,
ἢ ὅτι τὰ κέντρα αὐτῶν ὀπίσθινυμένη, ἀφ'
τῆς ἐπαφῆς ἐλθούσεται.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Κύκλος κύκλου ὅκ ἐφάπτεται κατὰ πλεί-
ονα σημεῖα ἢ καθ' ἓν, ἕαντε ἐντός, ἕαντε ἐκτός ἐ-
φάπτηται.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Ἐν κύκλῳ αἰῖσται ὀθεῖαι, ἴσον ἀπέχουσι
ἀπὸ τῶν κέντρων, καὶ αἰῖσον ἀπέχουσι ἀπὸ τῶν
κέντρων, ἴσται ἀλλήλαις εἰσίν.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Ἐν κύκλῳ μεγίστη μὲν ἐστίν ἡ ἀμέμετρος, ἢ
ἄλλο

Propositio 10. Theorema.

Circulus circulum non secatur in pluribus punctis, quàm in duobus tantum.

Propositio 11. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò tangent intus, & eorum sumantur centra: recta quæ per centra illarum ducta fuerit, & extensa etiam cadet in contactum circulorum.

Propositio 12. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò tangent extra, recta quæ illorum centra coniungit, per contactum transit.

Propositio 13. Theorema.

Circulus circulum non tangit pluribus in punctis, quàm in vno tantum: siue intus id fiat, siue extra tangat.

Propositio 14. Theorema.

In circulo rectæ æquales, æqualiter à centro distant: & rectæ quæ æqualiter à centro distant, æquales inter se sunt.

Propositio 15. Theorema.

In circulo longissima est illa, quæ diamet.

A 5 ter

ἢ ἄλλων αἰεὶ ἢ ἕγχιον τῶ κέντρῳ τῆς ἀπώπε-
ρον μείζων ἐστίν.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Ἡ τῆ Διαμέτρω τοῦ κύκλου πρὸς ὀρθὰς
ἀπὸ ἀκρας ἀγομένη, ἐκτὸς πεσεῖται τῶ κύ-
κλου, καὶ εἰς τὸν μέλαξυ τόπον τῆς τε Διθείας
καὶ τῆς περιφερείας ἐτέρα Διθεῖα ἔπαρεμ-
πεσεῖται, καὶ ἡ μὲν τῶ ἡμικυκλίου γωνία, ἀ-
πώσεως ὀξείας γωνίας Ὀρθογώνιου μείζων
ἐστίν: ἡ δὲ λοιπὴ ἐλαττωμένη.

Πρότασις ιζ. Πρόβλημα.

Ἀπὸ τῶ δοθέντος σημείου, ἔδοθέντος
κύκλου ἐφαπτομένην Διθεῖαν γράμμην ἀ-
γαγεῖν.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Ἐὰν κύκλος ἐφαπῆται πρὸς Διθεῖαν, ἀπὸ
δὲ τῶ κέντρου ἴσῃ τῶ ἀφῶ ἴσῃ ἀχθῆ πρὸς
Διθεῖαν: ἡ ἴσῃ ἀχθεῖσα, κάμπτῃ ἐστὶ ἴσῃ
τῶ ἀπτομένην.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Ἐὰν κύκλος ἐφαπῆται πρὸς εὐθείαν, ἀπὸ δὲ
τῆς ἀφῆς τῆ ἐφαπτομένη πρὸς ὀρθὰς γω-
νίας Διθεῖαν γράμμην ἀχθῆ, ἴσῃ τῆς ἀχθεῖσης
ἐστὶ τὸ κέντρον τῶ κύκλου.

ter est, reliquarum verò illa semper, quæ proximior est centro, longior erit remotiore.

Propositio 16. Theorema.

Recta quæ ab alterutro extremo diametri ducta fuerit diametro ad angulos rectos, extra circumulum cadet: & alia linea recta non cadet inter ipsam, & circumuli circumferentiã: angulus verò semicirculi maior est quouis angulo acuto rectilineo, reliquus verò quouis acuto angulo rectilineo minor.

Propositio 17. Problema.

A dato puncto ducere lineam rectam, quæ datum circumulum tangat.

Propositio 18. Theorema.

Si circumulum aliqua linea recta tangat, & à centro ad contactum ducta fuerit quedam linea recta: illa quæ ducta est linea, erit perpendicularis ad eam quæ circumulum tangit.

Propositio 19. Theorema.

Si recta quedam circumulum tangat: à contactu verò ducatur quedam linea recta, quæ ad angulos sit rectos lineæ quæ circumulum tangit: centrum circumuli est in ea linea, quæ à contactu ad angulos rectos ducta est.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εν κύκλῳ ἢ πρὸς τῷ κέντρῳ γωνία, διπλασίων ἐστὶ τῆ πρὸς τῇ περιφερείᾳ, ὅταν πῶ αὐτῷ περιφερείαν βάσιν ἔχωσιν αἱ γωνία.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Εν κύκλῳ αἱ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνία ὅσαι ἀλλήλαις εἰσὶν.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Τῶν ἐν τοῖς κύκλοις τετραπλεύρων, αἱ ἐπ' ἐναντίον γωνία δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύο τμήματα κύκλων ὅμοια καὶ ἄνισα, εἰ συσταθήσονται ὅπῃ τὰ αὐτὰ μέρη.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Τὰ ἐπ' ἴσων εὐθειῶν ὅμοια τμήματα κύκλων ἴσα ἀλλήλοις εἰσὶν.

Πρότασις κε. Πρόβλημα.

Κύκλος τμήματι \odot δοθέντι \odot , περιγράψαι τὸν κύκλον ἕως ἐς τὸ τμήμα.

Πρότασις

Propositio 20. Theorema.

In circulo angulus ad centrum constitutus duplus est ad angulum qui ad circumferentiã constituitur, tum scilicet, quando anguli eandẽ circumferentiã pro basi habuerit.

Propositio 21. Theorema.

In circulo anguli qui in eodem sunt segmento, sunt inter se æquales.

Propositio 22. Theorema.

Quadrilaterarum figurarum in circulo descriptarum anguli oppositi duobus rectis sunt æquales.

Propositio 23. Theorema.

Super eandem lineam rectam duo circulorum segmenta similia, & inæqualia non statuentur in easdem partes.

Propositio 24. Theorema.

Similia circulorum segmenta, quæ supra æquales rectas constituuntur, æqualia sunt.

Propositio 25. Problema.

Dato segmento circuli adscribere, & delineare circulum, cuius quidem sit datum segmentum.

Propo-

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις, αἱ ἴσαι γωνίαι ἐπὶ ἰσῶν περιφερῶν βεβήκασι, ἐάντε πρὸς τοῖς κέντροις, ἐάντε πρὸς ταῖς περιφερείαις ὡς βεβηκῆαι.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ ἐπὶ ἴσον περιφερῶν βεβηκῆαι γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ἐάντε πρὸς τοῖς κέντροις, ἐάντε πρὸς ταῖς περιφερείαις ὡς βεβηκῆαι.

Πρότασις κη. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ ἴσαι εὐθεῖαι ἴσας περιφερείας ἀφερῶσι, πῶ μὲν μείζονα τῇ μείζονι, πῶ δὲ ἐλάττονα τῇ ἐλάττονι.

Πρότασις κθ. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις ὑπὸ τὰς ἴσας περιφερείας, ἴσαι εὐθεῖαι ὑπολείπασιν.

Πρότασις λ. Πρόβλημα.

Τῶ δοθεῖσαν περιφέρειαν δίχα τεμεῖν.

Πρότασις λα. Θεώρημα.

Εν κύκλῳ ἢ μὲν ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθὴ ἐστίν, ἢ δὲ ἐν τῷ μείζονι τμήματι ἐλάττων ὀρθῆς· ἢ δὲ ἐν τῷ ἐλάττονι, μείζων ὀρθῆς.

καὶ

Propositio 26. Theorema.

In circulis equalibus, anguli æquales, equalibus in circumferentijs constituuntur, siue ad centra, siue ad circumferentias constituuntur.

Propositio 27. Theorema.

In circulis equalibus, anguli qui consistunt in circumferentijs equalibus, æquales inter se sunt: siue ad centra, siue ad circumferentias constituuntur.

Propositio 28. Theorema.

In circulis equalibus, rectæ æquales, etiã æquales auferent circumferentias, maiorem maiori æqualem, & minorem minori.

Propositio 29. Theorema.

In circulis equalibus, rectæ æquales, subtendunt etiam circumferentias æquales.

Propositio 30. Problema.

Data circumferentiã secare in duas partes æquales.

Propositio 31. Theorema.

In circulo angulus qui est in semicirculo est rectus, qui verò in maiore est segmento, minor erit recto: qui verò in minore segmento
consti-

καὶ ἐπὶ ἡ μὲν τῶν μείζονων τμημάτων γωνία μείζων ἐστὶν ὀρθῆς, ἡ δὲ τῶν ἐλάττωνος τμημάτων γωνία, ἐλάττων ἐστὶν ὀρθῆς.

Πρότασις λβ. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ἐφάπῃται πρὸς εὐθείᾳ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀφῆς ἵπὶ τὸν κύκλον διαχθῆ πρὸς εὐθείᾳ τέμνεται ὁ κύκλος, ἃς ποιεῖ γωνίας πρὸς τῇ ἐφάπτομένη ἴσας ἔσονται ταῖς ἐν τοῖς ἐναντία ἀλλὰ τῶν κύκλου τμημάτων γωνίας.

Πρότασις λγ. πρόβλημα.

Επὶ τῆς δοθείσης εὐθείας γράψαι τμήμα κύκλου δεχομένου γωνίαν ἴσλη, τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ ἐνυψογράμμου.

Πρότασις λδ. πρόβλημα.

Απὸ τῆς δοθέντος κύκλου τμήμα ἀφελῆν δεχομένου γωνίαν ἴσλη τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ ἐνυψογράμμου.

Πρότασις λε. Θεώρημα.

Εὰν ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὸ ὑπὸ τῶν τῆς μίας τμημάτων περιεχομένων ὀρθογώνιον: ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν τῆς ἑτέρας τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ.

Πρότα-

constituetur maior recto. præterea angulus segmenti maioris, maior recto, minoris verò segmenti, minor recto erit.

Propositio 32. Theorema.

Si recta quaedam circulum tangat, à contactu verò ad circulum ducatur quaedam recta circulum secans: quoscunq; fecerit angulos ad lineam contingentē: æquales erunt angulis q̄ in segmentis sunt p̄mutatim sumptis.

Propositio 33. Problema.

Super datam lineam rectam describere segmentum circuli, quod contineat angulum dato angulo rectilineo æqualem.

Propositio 34. Problema.

A dato circulo auferre segmentum, quod contineat angulum æqualem, dato angulo rectilineo.

Propositio 35. Theorema.

Si in circulo dua rectæ sese secant: re-ctangulum quod continetur segmentis vnus; æquale est re-ctangulo, quod continetur segmentis alterius:

B Propo-

Πρότασις λς. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆ τι σημεῖον ἐκτός, καὶ ἀπ' αὐτῶ πρὸς τὸν κύκλον παραπίπτωσι δύο εὐθείαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνη τὸν κύκλον, ἡ δὲ ἐφαπτήται: ἔσται τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης τεμνύσεως καὶ τῆς ἐκτός ἀπολαμβανομένης μεταξὺ τούτων σημεῖα καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης τετραγώνῳ.

Πρότασις λζ. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆ τι σημεῖον ἐκτός, ἀπὸ δὲ τῶν σημεῖα πρὸς τὸν κύκλον παραπίπτωσι δύο εὐθείαι, Ἐἢ μὲν αὐτῶν τέμνη τὸν κύκλον, ἢ ἢ παραπίπτῃ, ἢ δὲ τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης τεμνύσεως, καὶ τῆς ἐκτός ἀπολαμβανομένης μεταξὺ τῶν σημεῖα καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας, ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς παραπίπτουσης, ἢ παραπίπτουσα ἐφαπτήται τῷ κύκλῳ.

Τέλος τῶν β. βιβλίων.

ΕΥΚΛΕΙ-

Propositio 36. Theorema.

Si in circulo aliquod sumatur punctum extrinsecus: & ab eo ad circulum cadant duæ lineæ rectæ, quarum altera circulum secet, altera circulum tangat: rectangulum quod continetur à tota recta secante, & recta quæ extrinsecus intra punctum & conuexam circumferentiam intercipitur, æquale est quadrato lineæ rectæ tangentis.

Propositio 37. Theorema.

Si in circulo punctum aliquod extrinsecus sumatur, & à puncto ad circulum cadant lineæ duæ rectæ, quarum altera circulum secet, altera verò incidat in circulum: fit verò rectangulum, quod à tota secante, & ea quæ intra punctum & conuexam circumferentiã ponitur æquale quadrato lineæ rectæ incidentis: recta ista quæ incidit, tanget circulum.

Finis libri tertij elementorum.

B 2

EV

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Σχῆμα εὐθύγραμμον εἰς σχῆμα εὐθύ-
γραμμον ἐγγραφέαται λέγεται, ὅταν ἐ-
κάστη τῶν τῷ ἐγγραφομένῳ σχήματι γω-
νιῶν ἐκάστης πλῆρᾶς τῷ εἰς ὃ ἐγγραφέαται ἀ-
πλήται.

Σχῆμα δὲ ὁμοίως πρὸς σχῆμα πειρα-
δαί λέγεται. ὅταν ἐκάστη πλῆρᾶς τῷ πειρα-
δομένῳ, ἐκάστης γωνίας τῷ πρὸς ὃ πειρα-
δαί ἀπλήται.

Σχῆμα δὲ εὐθύγραμμον εἰς κύκλον ἐγ-
γραφέαται λέγεται, ὅταν ἐκάστη γωνία τῷ ἐγ-
γραφομένῳ ἀπλήται τῆς τῷ κύκλῳ περιφε-
ρείας.

Σχῆμα δὲ εὐθύγραμμον πρὸς κύκλον πει-
ραδαί λέγεται, ὅταν ἐκάστη πλῆρᾶς
τῆς τῷ κύκλῳ περιφερείας τοῦ πειρα-
δομένου ἐφάπληται.

Κύκλος δὲ ὁμοίως εἰς σχῆμα λέγεται ἐγ-
γραφέαται ὅταν ἢ τῷ κύκλῳ περιφερεία ἐ-
κάστης πλῆρᾶς τῷ εἰς ὃ ἐγγραφέαται ἀπλήται.

Κύκλος

EVCLIDIS ELEMENTO-
RVM LIBER QVARTVS.

Definitiones.

Figura rectilinea dicetur in figuram rectilineam inscribi, quando vnusquisq; angulus eius figuræ, quæ inscribitur, tangit vnumquodq; lat^{us} figuræ, in quam est inscripta.

Figura etiã dicetur similitudine quadam circa figuram describi: quando vnumquodq; latus figuræ circũscriptæ tangit vnumquemque angulum eius figuræ, circa quam describitur.

Figura rectilinea in circulum inscribi dicetur: quando vnusquisq; angulus figuræ inscriptæ tangit circuli circumferentiam.

Figura rectilinea dicetur circa circulum describi, quando vnusquisq; angulus tangit circuli circa quem describitur figura, circumferentiam.

Circulus verò similiter dicetur in figuram inscribi, quando circuli circumferentia tangit vnumquodq; latus figuræ eius, in quã inscribitur.

B 3 Cir-

Κύκλος δὲ πρὸς γῆμα περιγράφεσθαι λέγεται, ὅταν ἡ τῷ κύκλῳ περιφέρεια ἐκείνης γωνίας τῷ πρὸς ὃ περιγράφεῖ ἀπληται.

Ευθεῖα εἰς κύκλον ἐναρμόζουσα λέγεται ὅταν τὰ πέρατα αὐτῆς ἐπὶ τῆς περιφέρειας ἢ τῷ κύκλῳ.

Πρότασις α. Πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον τῇ δοθείσῃ ευθείᾳ μὴ μείζονι ἔσῃ τῆς ἑκείνου κύκλου διαμέτρου ἴσῃ ευθείαν ἐναρμόσαι.

Πρότασις β. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον, τῷ δοθέντι τριγώνῳ, ἰσογώνιον τρίγωνον ἐγγραψαι.

Πρότασις γ. πρόβλημα.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον, τῷ δοθέντι τριγώνῳ, ἰσογώνιον τρίγωνον περιγράψαι.

Πρότασις δ. πρόβλημα.

Εἰς τὸ δοθέν τρίγωνον κύκλον ἐγγραψαι.

Πρότασις ε. πρόβλημα.

Περὶ τὸ δοθέν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι.

Πρό-

Circulus verò dicitur circa figuram describi, quando circuli circumferentia tangit unumquemq; angulum figuræ, circa quam circulus describitur.

Recta linea dicitur in circulum coaptari, quando eius extrema fuerint in circumferentia circuli.

Propositio 1. problema.

In datum circulum, datæ lineæ rectæ, quæ non maior est diametro circuli æqualem rectam applicare.

Propositio 2. problema.

In datum circulum dato triangulo, triangulum æquales habentem cum dato triangulo angulos, inscribere.

Propositio 3. problema.

Circa datum circulum dato triangulo circumscribere triangulum, qui æquales habeat angulos cum dato triangulo.

Propositio 4. problema.

In datum triangulum inscribere circulum.

Propositio 5. problema.

Circa datū triangulū circulū circūscribere.

Πρότασις ε. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον, τετράγωνον ἐγ-
γράψαι.

Πρότασις ζ. πρόβλημα.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον, τετράγωνον πε-
ριγράψαι.

Πρότασις η̄. πρόβλημα.

Εἰς τὸ δοθέν τετράγωνον κύκλον ἐγγράψαι.

Πρότασις θ. πρόβλημα.

Περὶ τὸ δοθέν τετράγωνον, κύκλον περι-
γράψαι.

Πρότασις ι. πρόβλημα.

Ἰσοσκελὲς τρίγωνον συστήσασθαι, ἔχον ἐκά-
περαν τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν διπλασί-
να τῆς λοιπῆς.

Πρότασις ιᾱ. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον, πεντάγωνον
ἰσοπλευρὸν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον, πεντάγωνον ἰ-
σοπλευρὸν τε καὶ ἰσογώνιον περιγράψαι.

Πρότασις ιγ. πρόβλημα.

Εἰς τὸ δοθέν πεντάγωνον, ὁ ἐστὶν ἰσόπλευ-
ρὸν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον ἐγγράψαι.

Propositio 6. problema.

Circulo dato inscribere quadratum.

Propositio 7. problema.

Circulo dato circumscribere quadratum.

Propositio 8. problema.

Dato quadrato inscribere circulum.

Propositio 9. problema.

Dato quadrato circulum circumscribere.

Propositio 10. problema.

Triangulum duo equalia habentem latera constituere, qui habeat alterutrum angulorum ad basin duplum reliqui anguli.

Propositio 11. problema.

Dato circulo inscribere pentagonon, quod & latera equalia, & angulos aequales habeat.

Propositio 12. problema.

Dato circulo pentagonon circumscribere, quod & latera equalia, & angulos aequales habeat.

Propositio 13. problema.

Dato pentagono quod latera equalia, & angulos aequales habet, circulum inscribere.

Πρότασις ιδ. πρόβλημα.

Περὶ τὸ δοθέν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευ-
ρόν τε καὶ ἰσογώνιον κύκλον περιγράψαι.

Πρότασις ιε. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον ἐξάγωνον ἰσο-
πλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγράψαι.

Πρότασις ις. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον πεντεκαμδεκάγω-
νον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγράψαι.

Τέλος τοῦ δι' Εὐκλεῖ-
δου σοιχεῖος.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Μεῖζον ἐστὶ μέγεθος μεγέθους τὸ ἐλάσ-
σον τῷ μείζονι, ὅταν καταμετρηῖ τὸ
μείζον.

Πολλαπλάσιον δὲ τὸ μείζον τῷ ἐλάσσονι,
ὅταν κτμετρηῖται ὑπὸ τῷ ἐλάσσονι.
Λόγος

Propositio 14. problema.

Dato pentagono, quod & equalia latera,
& angulos æquales habet, circumscribere cir-
culum.

Propositio 15. problema.

Dato circulo hexagonon quod equalia ha-
bet latera, & angulos æquales inscribere.

Propositio 16. problema.

Dato circulo figuram rectilineam quinde-
cim angulorum, quæ equalia latera, & angu-
los æquales habent, inscribere.

Finis libri quarti Elementorum
Euclidis.

EVCLIDIS ELEMEN-
TVM QVINTVM.

Definitiones.

Magnitudo alterius magnitudinis mi-
nor maioris est pars, quando minor
exactè metitur maiorem.

Magnitudo alterius magnitudinis mul-
tiplex est maior minoris, cum sub minoris ca-
dit mensuram.

Ra-

Λόγος ἔστι δύο μεγεθῶν ὁμογενῶν ἢ κατὰ
 πληκικότητά, πρὸς ἀλλήλα ποιά σχέσις.

Λόγον ἔχον πρὸς ἀλλήλα μεγέθη λέγεται
 ἂ διώαται πολλαπλασιαζόμενα, ἀλλήλα
 ὑπερέχον.

Ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι
 πρῶτον πρὸς δεύτερον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον,
 ὅταν τὰ ἔξ πρῶτα καὶ τρίτα ἰσάνικι πολλαπλα-
 σια, ἢ τὰ δεύτερα καὶ τέταρτα ἰσάνικι πολλα-
 πλασίῳ καθ' ὁποιοῦν πολλαπλασιασμοῦ
 ἐκάτερον ἐκάτερον, ἢ ἅμα ἐλλείπη, ἢ ἅμα ἴσῃ,
 ἢ ἅμα ὑπερέχη ληφθέντα κατ' ἀλλήλα.

Τὰ δὲ τὸν αὐτὸν ἔχοντα μεγέθη λόγον, ἀ-
 νάλογον καλεῖσθαι.

Ὅταν δὲ τῶν ἰσάνικι πολλαπλασίῳ, τὸ
 μὲν τῶν πρῶτων πολλαπλασίῳ, μὴ ὑπερέ-
 χη τοῦ τῶν δευτέρων πολλαπλασίῳ, τὸ δὲ τῶν
 τρίτων πολλαπλασίῳ, μὴ ὑπερέχη ἔξ τῶν τε-
 τάρτων πολλαπλασίῳ, τότε τὸ πρῶτον πρὸς
 τὸ δεύτερον, μείζονα λόγον ἔχον λέγεται εἶναι
 τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον.

Αναλογία δὲ εἰσὶν ἢ τῶν λόγων ὁμοιότης.

Αναλογία δὲ ἐν τρισὶν ὅροις ἐλαχίστις
 εἰσὶν.

Ὅταν

Ratio est duarum magnitudinum homogenearum secundum quantitatem inter se quaedam habitudo.

Magnitudines inter se rationem habere dicuntur, quæ multiplicatae possunt sese mutuo excedere.

Magnitudines dicuntur in eadem ratione esse prima ad secundam, & tertia ad quartam, quando primæ & tertiæ æquè multiplicæ, secundæ & quartæ æquè multiplicæ, iuxta quamvis multiplicationem utraq; utramq; vel unâ deficit, vel unâ assequitur, vel unâ superat sumptæ inter se.

Eandem autem habentes rationem vocentur proportionales.

Quando autem æqualiter multiplicium, primæ quidem multiplex exuperat secundæ multiplicem, tertiæ autem multiplex non exuperat quartæ multiplicem: tunc prima ad secundam maiorem habere dicitur rationem, quàm tertia ad quartam.

Proportio verò est similitudo rationum.

Proportio autem in tribus terminis minima est.

Quan-

Οταν δὲ τριὰ μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχῃ λέγεται ἤως πρὸς τὸ δεύτερον.

Οταν δὲ τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τέταρτον τριπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται: ἤως πρὸς τὸ δεύτερον, καὶ αἰ ἐξῆς ἐνὶ πλείον, ἕως αὐτῆ ἀναλογίᾳ ὑπάρχῃ.

Ομόλογα μεγέθη λέγεται εἶναι, τὰ μὲν ἡγεύματα τοῖς ἡγεμένοις, τὰ δὲ ἐπόμενα τοῖς ἐπομένοις.

Εναλλάξ λόγῳ ἐστὶ, λήψις τῶν ἡγεμένων πρὸς τὸ ἡγεύματον, καὶ τῶν ἐπομένων πρὸς τὸ ἐπόμενον.

Ανάπαλιν λόγῳ ἐστὶ, λήψις τῶν ἐπομένων, ὡς ἡγεμένων, πρὸς τὸ ἡγεύματον ὡς ἐπόμενον.

Συνήθεσις λόγῳ ἐστὶ, λήψις τοῦ ἡγεμένου μὲν τῶν ἐπομένων ὡς ἐνὸς πρὸς αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

Διαίρεσις δὲ λόγῳ ἐστὶ, λήψις τῆς ὑπεροχής, ἢ ὑπερέχει τὸ ἡγεύματον τῶν ἐπομένων πρὸς αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

Quando autem tres magnitudines proportionales fuerint prima ad tertiam, duplā rationem habere dicitur, quā ad secundam.

Quando autē quatuor magnitudines proportionales fuerint, prima ad quartam triplam rationem habere dicitur, quā ad secundam: & semper deinceps vna plus, quam diu proportio fuerit.

Homologae magnitudines esse dicuntur, antecedentes antecedentibus, & consequentes consequentibus.

Alternata ratio est assumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

Inuersa ratio est assumptio consequentis, ut antecedentis, ad antecedentem, tanquam consequentem.

Compositio rationis est assumptio antecedentis cum consequente tanquam vnius, ad ipsum consequens.

Diuisio rationis est assumptio exuperantiae, qua maior est antecedens consequente, ad ipsum consequens.

Reuer-

Αναστροφὴ λόγος ἐστὶ λήψις τῶν ἡγεμέων
πρὸς τὴν ὑπεροχλήν ἢ ὑπερέχει τὸ ἡγε-
μέων τῶν ἐπομένων.

Δύο λογισμοὶ ἐστὶ, πλειόνων ὄντων μεγα-
θῶν, καὶ ἄλλων αὐτοῖς ἴσων τὸ πλῆθος σὺν
δυο λαμβανομένων, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγοσι-
ται ἢ ὡς ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσι τὸ πρῶτον
πρὸς τὸ ἕχαλον: οὕτως ἐν τοῖς δευτέροις μεγα-
θεσι τὸ πρῶτον πρὸς τὸ ἕχαλον, ἢ ἄλλως λή-
ψις τῶν ἄκρων καθ' ὑπεξείρεσιν τῶν μέσων.

Τεταραγμένη ἀναλογία ἐστὶν ὅταν ἢ ὡς ἡ-
γεμέων πρὸς ἐπόμενον ἕτος ἡγεμέων πρὸς
τὸ ἐπόμενον: ἢ δὲ καὶ ὡς ἐπόμενον πρὸς ἄλλο-
τι, ἕτως ἐπόμενον πρὸς ἄλλοτι.

Τεταραγμένη δὲ ἀναλογία ἐστὶν, ὅταν τοῖς
ὄντων ὄντων μεγεθῶν, καὶ ἄλλων ἴσων αὐτοῖς τὸ
πλῆθος γίνεται, ὡς μὲν ἐν τοῖς πρώτοις με-
γέθεσιν, ἡγεμέων πρὸς ἐπόμενον: οὕτως ἐν
τοῖς δευτέροις μεγέθεσιν ἡγεμέων πρὸς ἐ-
πόμενον: ὡς δὲ ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσιν
ἐπόμενον πρὸς ἄλλοτι * οὕτως ἐν τοῖς δευτέ-
ροις μεγέθεσιν ἡγεμέων πρὸς ἄλλοτι.

* *Aliter*, ἕτως ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσιν ἄλλοτι πρὸς
ἡγεμέων.

Reuersio rationis est assumptio antecedentis ad exuperantiam, qua maior est antecedens consequente.

Ex equo ratio est pluribus positis magnitudinibus, & alijs eas equantibus multitudine, binis sumptis, & in eadem ratione, cum est, vt in primis magnitudinibus prima ad ultimam, sic in secundis magnitudinibus prima ad ultimam, aut aliter assumptio extremorum per subductionem mediorum.

Ordinata proportio est, quando est vt antecedens ad consequentem, sic antecedens ad consequentem, erit autem etiam vt consequens ad aliam quandam, sic consequens ad aliam quandam.

Perturbata proportio autē est, quando tribus positis magnitudinibus, & alijs equalibus eis multitudine, fit vt in primis magnitudinibus antecedens ad consequentem, sic in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem. vt autem in primis magnitudinibus consequens ad aliam quandam, sic in secundis magnitudinibus alia quaedam ad antecedentem.

C Pro

Πρότασις α. Θεώρημα.

Εὰν ἡ ὁπόσοι ἡ μεγέθη, ὁπόσων ἔν μεγ-
θῶν ἴσων τὸ πλῆθος, ἕκαστον ἕκαστα ἴσάκις
πολλα πλάσιον: ὅσα πλάσιον ἔσιν ἐν τῶν με-
γεθῶν ἕν: ποσὴ πλάσια ἔσται καὶ τὰ πάν-
τα τῶν πάντων.

Πρότασις β. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον δῦτέρου ἴσάκις ἢ πολλα-
πλάσιον, καὶ τρίτον τετάρτη, ἢ δὲ καὶ πέμ-
πτον δῦτέρου ἴσάκις πολλαπλάσιον, καὶ ἐκ-
τὸν τετάρτη, καὶ σωπτεθὲν πρῶτον ἢ πέμ-
πτον, δῦτέρου ἴσάκις ἔσται πολλαπλάσιον,
καὶ τρίτον καὶ ἐκτὸν τετάρτη.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον δῦτέρου ἴσάκις ἢ πολλα-
πλάσιον, καὶ τρίτον τετάρτη: ληφθῆ ἡ ἴσα-
κις πολλαπλάσια τῶν πρῶτου καὶ τρίτου, καὶ
δύο τῶν ληφθέντων, ἑκάτερον ἑκατέρου
ἴσάκις ἔσται πολλαπλάσιον, τὸ μὲν, τῶν δῦ-
τέρου, τὸ δὲ, τοῦ τετάρτου.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον πρὸς δῦτερον ἢ αὐτὸν ἔχη λό-
γον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, καὶ τὰ ἴσάκις
πολλα

Propositio 1. Theorema.

Si sint quotlibet magnitudines, quotlibet magnitudinum equalium multitudine unaquæq; unius cuiusq; æque multiplex, quotuplex est una magnitudinum unius, totuplices erunt omnes omnium.

Propositio 2. Theorema.

Si fuerit magnitudo prima magnitudinis secundæ equaliter multiplex, & tertia quartæ: fuerit item quinta secundæ equaliter multiplex, & sexta quartæ: erit coniuncta magnitudo prima cum quinta, equaliter multiplex secundæ, & tertia cum sexta quartæ.

Propositio 3. Theorema.

Si fuerit magnitudo prima magnitudinis secundæ equaliter multiplex, & tertia quartæ: & si sumptæ fuerint equaliter multiplices magnitudines primæ & tertiæ: erit etiam ex æquo altera alterius equaliter multiplex: illa quidem secundæ, hæc verò quartæ.

Propositio 4. Theorema.

Si magnitudo prima ad magnitudinem secundam eam habuerit proportionem, quam

C 2 tertia

πολλαπλάσια ἢ τε πρῶτε ἢ τρίτε πρὸς
τὰ ἰσάκεις πολλαπλάσια τῆ δούτερη καὶ π-
τάρτε καὶ ὅποιοι ἂν πολλαπλασιασμοί
τὸν αὐτὸν ἐξ ἑλ λόγον ληφθέντα κατὰλληλα

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν μέγεθ^{ος} Ⓞ μεγέθεις ἰσάκεις ἢ πολλα-
πλάσιον, ὅπως ἀφαιρεθέν ἀφαιρεθέν^{τα} Ⓞ καὶ
τὸ λοιπὸν τῆ λοιποῦ ἰσάκεις ἔσση πολλαπλά-
σιον ὅσα πλάσιόν ἐσι τὸ ὅλον τῆ ὅλη.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη δύο μεγεθῶν ἰσάκεις ἢ πλ-
λαπλάσια, καὶ ἀφαιρεθέντα πινὰ τῶν αὐτῶν
ἰσάκεις ἢ πολλαπλάσια. Ἐτὰ λοιπὰ τοῖς αὐ-
τοῖς ἢ τοῖς ἰσοῖς ἐσὶν, ἢ ἰσάκεις αὐτῶν πολλα-
πλάσια.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Τὰ ἴσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον,
καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὰ ἴσα.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Τῶν ἀνίσων μεγεθῶν τὸ μείζον πρὸς τὸ
αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ ὡς τὸ ἔλαττον, καὶ
τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ ἔλαττον, μείζονα λόγον ἔχει
ἢ ὡς πρὸς τὸ μείζον.

Πρότα-

tertia ad quartam: etiam æqualiter multiplici-
ces magnitudines primæ & tertiæ, ad æqua-
liter multiplici-ces magnitudines secundæ &
quartæ, iuxta quamvis multiplicationem e-
andem habebūt proportionē, inter se collatæ.

Propositio 5. Theorema.

Si magnitudo magnitudinis æqualiter fue-
rit multiplex, ut ablata ablatæ: erit etiã reli-
qua reliquæ æqualiter multiplex, ut tota totius.

Propositio 6. Theorema.

Si duæ magnitudines duarum magnitu-
dinum æqualiter fuerint multiplici-ces: et abla-
ta quædam earūdem fuerint æqualiter mul-
tiplici-ces: erunt etiam reliquæ eisdem vel æ-
quales, vel earundem æqualiter multiplici-ces.

Propositio 7. Theorema.

Æquales magnitudines ad eandem, ean-
dem habent proportionē, & eadē ad æquales.

Propositio 8. Theorema.

Magnitudinum inæqualium maior ad e-
andem maiorem habet proportionem quàm
minor: & eadem illa magnitudo ad minorem
habet proportionem maiorem, quàm ad ma-
iorem.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Τὰ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶ, καὶ πρὸς ἂν τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχῃ λόγον, καὶ ἐκεῖνα ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶν.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Τῶν πρὸς τὸ αὐτὸ λογὸν ἐχόντων, τὸ τὸ μείζονα λόγον ἔχον, ἐκεῖνο μείζον ἐστὶ, πρὸς ὃ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἐκεῖνο ἐλάττω ἐστὶν.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Οἱ τὰ αὐτὰ λόγῳ οἱ αὐτοὶ, καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ αὐτοί.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Εὰν ἢ ὅποσοιῦ μεγέθη ἀνάλογον, ἔσται ὡς ἐν τῶν ἡγεμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, ἔστω ἅπαντα τὰ ἡγεόμενα, πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τρίτον δὲ πρὸς τέταρτον μείζονα λόγον ἔχη, ἢ ὡς πέμπτον πρὸς ἕκτον, καὶ πρῶτον πρὸς δεύτερον μείζονα λόγον ἔξει, ἢ ὡς πέμπτον πρὸς ἕκτον.

Πρό-

Propositio 9. Theorema.

Magnitudines ad eandem, eandem habentes proportionem, æquales sunt inter se, & ad quas eadem, eandem habet proportionem: etiam illæ sunt inter se æquales.

Propositio 10. Theorema.

Quæ ex magnitudinibus ad eandem, proportionem habentibus maiorem habet proportionem, illa est maior: & ad quam eadem maiorem habet proportionem, illa est minor.

Propositio 11. Theorema.

Quæ eidem proportioni sunt eadem: illæ etiam inter se sunt eadem.

Propositio 12. Theorema.

Si fuerint magnitudines quotlibet proportionales: erit quemadmodum vna precedentium, ad vnâ consequentium: sic omnes præcedentes ad omnes consequentes.

Propositio 13. Theorema.

Si magnitudo prima ad secundam, eam habuerit proportionem, quam tertia ad quartam: tertia vero ad quartam maiorem habuerit proportionem, quam quinta ad sextam: tum etiam prima ad secundam maiorem habebit proportionem, quam quinta ad sextam.

C 4 Pro-

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Εάν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τὸ δὲ πρῶτον τῷ τρίτῳ μᾶλλον ἢ, καὶ τὸ δεύτερον τῷ τετάρτῳ μᾶλλον ἔσται. καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλαστον, ἔλαστον.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Τὰ μέρη, τῶν ὡσαύτως πολλαπλασίοις, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ληφθέντα κατ'ἀλληλα.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρα μεγέθη, ἀνάλογον ἢ, καὶ ἐναλλάξ, ἀνάλογον ἔσται.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν συγκείμενα μεγέθη, ἀνάλογον ἢ, καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον ἔσται.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Εὰν διηρημένα μεγέθη, ἀνάλογον ἢ, καὶ ζυωθέντα ἀνάλογον ἔσται.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Εὰν ἢ, ὡς ὅλον, πρὸς ὅλον, ἔτιως ἀφαιρεθέν, πρὸς ἀφαιρεθέν, καὶ τὸ λοιπὸν, πρὸς τὸ λοιπὸν ἔσται, ὡς ὅλον πρὸς ὅλον.

Εὰν

Propositio 14. Theorema.

Si magnitudo prima ad secundam eam habuerit proportionem, quam tertia ad quartam: & si prima maior fuerit quàm tertia, etiam secunda erit maior quàm quarta, & si equalis equalis, & si minor minor.

Propositio 15. Theorema.

Partes inter se collatæ, eã habent proportionem, quam suæ equaliter multiples.

Propositio 16. Theorema.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, etiã alternatim pportionales erũt.

Propositio 17. Theorema.

Si magnitudines cõiunctæ fuerint proportionales, etiam separatæ proportionales erũt.

Propositio 18. Theorema.

Si magnitudines separatæ fuerint proportionales, etiam cõiunctæ erũt proportionales.

Propositio 19. Theorema.

Si fuerit totius alicuius magnitudinis, ad totam aliquam magnitudinem proportio ea, quæ ablatæ ad ablatam: erit etiam reliquæ ad reliquam proportio ea, quæ totius ad totam.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εὰν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος, σιῶδου λαμβανόμενα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, δίσσοι δὲ τὸ πρῶτον τῶ τρίτῳ μείζον ἢ, καὶ τὸ τέταρτον τῶ ἐκλου, μείζον ἔσται, καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλασσον, ἔλασσον.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Εὰν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος, σιῶδου λαμβανόμενα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, ἡ δὲ τετραραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, δίσσοι δὲ τὸ πρῶτον τῶ τρίτῳ μείζον ἢ, καὶ τὸ τέταρτον, τῶ ἐκλου, μείζον ἔσται, καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλασσον, ἔλασσον.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν ἡ ὀποσαιού μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος, σιῶδου λαμβανόμενα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, καὶ δίσσοι, ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ ἔσται.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Εὰν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος, σιῶδου λαμβανόμενα ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, ἡ δὲ τετραραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, καὶ δίσσοι ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ ἔσται.

Πρότα-

Propositio 20. Theorema.

Si fuerint tres magnitudines, & aliæ totidem, & binæ in eadem proportione, & si ex æquo prima fuerit maior quàm tertia, erit etiam quarta maior quàm sexta, & si æqualis, æqualis: & si minor, minor. Hoc est:

Si fuerit proportio primæ magnitudinis ad secundam eam, quæ tertiæ ad quartam: fuerit verò etiam proportio secundæ ad quintam, quæ quartæ ad sextam. tum si fuerit prima maior quàm quinta, erit etiam tertia maior quàm sexta, &c.

Propositio 21. Theorema.

Si fuerint tres magnitudines, & aliæ totidem, binæ in eadem proportione, etiamsi fuerit confusa ipsarum proportio: tamen si ex æquo prima fuerit maior quàm tertia, erit etiam quarta maior quàm sexta: & si æqualis, æqualis, & si minor, minor:

Propositio 22. Theorema.

Si fuerint quotlibet magnitudines, & aliæ totidem binæ in eadem proportione, etiã ex æquo in eadem erunt proportione.

Propositio 23. Problema.

Si fuerint magnitudines tres, & aliæ totidem binæ in eadem proportione, etiamsi fuerit confusa illarum proportio: tamen ex æquo in eadem erunt proportione.

Πρότασις κδ. θεώρημα.

Εὰν πρῶτον πρὸς δῦτερον, τὸν αὐτὸν ἔχει
λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον: ἔχει δὲ καὶ
πέμπτον πρὸς δῦτερον τὸν αὐτὸν λόγον: καὶ
ἕκτον πρὸς τέταρτον: καὶ σωτεθέν πρῶτον
πέμπτον πρὸς δῦτερον, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον,
καὶ τρίτον ἕκτον πρὸς τέταρτον.

Πρότασις κε. θεώρημα.

Εὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ μέ-
γιστον ἔστω ἐλάχιστον δύο τῶν λοιπῶν, μέγ-
στα ἔστι.

Τέλος τῶν πέμπτων στοιχείων

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
ΕΚΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Ομοια σχήματα ὀρθόγραμμά ἐστιν, ὅταν
τὰς τεγωνίας ἴσας ἔχῃ κατὰ μίαν, καὶ
τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλάγους, ἀνά-
λογον.

Ἀνῆκεπονθότα δὲ σχήματά ἐστιν, ὅταν ἐκα-
τέρω

Propositio 24. Theorema.

Si magnitudo prima ad magnitudinem secundam, eam habuerit proportionem, quam tertia ad quartam, habuerit verò etiam quinta ad secundam eam proportionem: quam sexta ad quartam: tum coniuncta magnitudo prima cum quinta, eam habebit proportionem ad secundam, quam habet tertia cum sexta ad quartam.

Propositio 25. quinta.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, earum maxima & minima reliquis duabus erunt maiores.

Finis libri quinti.

EVCLIDIS ELEMENTO-
rum Geometriae liber sextus.

Definitiones.

Similes figurae rectilineae sunt, quae aequales habent angulos ad unum: & latera aequales angulos continentia aequalia.

Reciprocae figurae sunt, quando in utraque
figura

τέρω τῶν σχημάτων, ἡγέρμοί τε καὶ ἐπόμενοι λόγοι ὄσιν.

Ἀκρον καὶ μέσον λόγον, ὁθεῖα τριμήδου λέγεται, ὅταν ἢ, ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μείζον τμήμα, ἔτως τὸ μείζον πρὸς τὸ ἔλασσον.

ΥΨΘ ἐστὶ πάντος σχήμα Θ, ἡ ἀπὸ τῆς κρυφῆς ὀπί τῶν βάσεων, κάθητ Θ ἀγομένη.

Λόγ Θ ἐκ λόγων συγκείσθ λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πληκότητες, ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιασθεῖσαι, ποιῶσιν πινας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. θεώρημα.

ΤΑ τριγωνα, καὶ τὰ παραλληλόγραμματα ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα, πρὸς ἀλληλά ἐσιν, ὡς αἱ βάσεις.

Πρότασις β. θεώρημα.

Εὰν τριγώνον παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν ἀχθῆ τις ὁθεῖα παράλληλη Θ, ἀνάλογον περὶ τὰς τῶν τριγώνων πλευρῶν. Καὶ εἰάν αἱ τῶν τριγώνων πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσιν, ἢ ὀπί τὰς ἑμᾶς, ὀπί ζυγνυμένη ὁθεῖα, παρὰ τῶν λοιπῶν ἔσται τοῦ τριγώνου πλευρῶν, παράλληλη Θ.

figura sunt antecedentes, & consequentes rationis termini.

Secundum rationem extremam & mediã dicitur linea recta esse secta, quando sic se habet ratio, vt tota ad maius segmentum, sic maius segmentum ad minus.

Vniuscuiusq; figuræ altitudo dicitur linea recta perpendicularis, ducta à vertice ad basim vsq;.

Ratio ex rationibus dicitur composita esse, si rationum quantitates inter se multiplicatae aliquas fecerint.

Propositiones.

Propositio 1. Theorema.

TRIANGULI, & parallelogramma, quæ sub eadem sunt altitudine, proportionem inter se habent, vt & ipsæ bases.

Propositio 2. Theorema.

Si ad trianguli alicuius latus, ducta fuerit quedam linea recta æquedistans, tum ea proportionaliter secabit trianguli latera. Et si trianguli latera fuerint proportionaliter secta: tum linea recta ad sectiones ducta ad reliquum trianguli latus, erit æquedistans.

Pro-

Πρότασις γ. Πρόβλημα.

Εὰν τριγώνῃ γωνία δίχα τμηθῆ, ἡ δὲ τέμνουσα τὴν γωνίαν, ὀρθεία, τέμνη καὶ τὴν ἑξῆς τῶν ἰσογώνων, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, ταῖς λοιπαῖς, τῶν τριγώνων πλοῦραῖς. Καὶ ἐὰν τὰ τῆς βάσεως τμήματα, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ταῖς λοιπαῖς τῶν τριγώνων πλοῦραῖς, ἢ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ὅτι τὴν τμήτῃ ὅτι τριγώνου ὀρθεία, δίχα τέμνει τὴν τῶν τριγώνων γωνίαν.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Τῶν ἰσογωνίων τριγώνων, ἀνάλογον εἰσὶ αἱ πλοῦραί, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας: καὶ ἰσόμολογοι, αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι πλοῦραί.

Πρότασις ε. πρόβλημα.

Εὰν δύο τρίγωνα, τὰς πλοῦρας ἀνάλογον ἔχῃ: ἰσογώνια ἔσται τὰ τρίγωνα, καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὑφ' αἷς, αἱ ἰσόμολογοι πλοῦραί ὑποτείνουσιν.

Πρότασις ς. Πρόβλημα.

Εὰν δύο τρίγωνα, μίαν γωνίαν, μίαν γωνία ἴσῃν ἔχῃ, περὶ δὲ τὰς ἴσας γωνίας, τὰς πλοῦραί.

Propositio 3. Theorema.

Si trianguli alicuius angulus fuerit dissectus in duas partes æquales : ipsa^q recta secans angulum , ipsam etiam basin secet : tum segmenta basis eandē habebūt proportionem cum reliquis trianguli lateribus. Et si segmenta basis eandem habuerint proportionem cū reliquis trianguli lateribus : recta à vertice trianguli ad sectionem ducta : secat angulum trianguli in duas partes æquales.

Propositio 4. Theorema.

Trianguli qui æquales habent angulos : latera eorum quæ æquales continent angulos sunt proportionalia : latera æquales angulos subtendentia, sunt homologa.

Propositio 5. Theorema.

Si duo trianguli habuerint latera proportionalia , illi etiam æquianguli erunt , & anguli, quos latera homologa subtendūt, sunt æquales.

Propositio 6. Theorema.

Si alicuius trianguli vnus angulus fuerit æqualis vni angulo alterius trianguli : & la-

D
tera

πλευρὰς ἀνάλογον, ἰσογώνια ἔσται τὰ τρί-
 γωνα, καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὑφ' αἷς αἱ ὁμοί-
 οιοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Ἐὰν δύο τρίγωνα, μίαν γωνίαν, μιᾶ γωνία
 ἴσην ἔχη, ὡς καὶ τὰς ἄλλας γωνίας, τὰς πλευ-
 ρὰς ἀνάλογον, τῶν δὲ λοιπῶν ἐκατέρωθεν ἅμα
 ἢ ἑστὶ ἐλάσσονα, ἢ μὴ ἐλάσσονα ὀρθῆς, ἰσογώνια
 ἔσται τὰ τρίγωνα, καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας,
 ὡς καὶ ἀνάλογον εἰσὶν αἱ πλευραὶ.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Ἐὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ, ἀπὸ τῆς ὀ-
 θῆς γωνίας, εἴπῃ τὴν βᾶσιν κάθετὸν ἀχθῆναι,
 τὰ πρὸς τῇ καθέτῳ τρίγωνα, ὁμοία ἔσιν τῷ π-
 ὅλῳ καὶ ἀλλήλοις.

Πρότασις θ. Πρόβλημα.

Τῆς δοθείσης ὀθείας, τὸ περιγεχθῆναι μί-
 ρον ἀφελῆν.

Πρότασις ι. Πρόβλημα.

Τὴν δοθεῖσαν ὀθείαν ἀτμήσον, τῇ δοθεί-
 σῃ ὀθείᾳ τετμημένη, ὁμοίως τεμεῖν.

Πρότα-

tera æquales illos angulos continentia sint proportionalia: eiusmodi trianguli æqualium sunt angulorum, & angulos quos homologa latera subtendunt, habent æquales.

Propositio 7. Theorema.

Si duorum triangulorum angulus vnus vni angulo fuerit æqualis: & latera alios angulos continentia sint pportionalia: & alterũ ex reliquis angulis vel minorem vel non minore angulo recto habuerint: isti duo triaguli erunt æqualium angulorum, & angulos quos latera pportionalia continet, habent æquales.

Propositio 8. Theorema.

Si in triangulo rectangulo, ab angulo recto, ad basin ducta fuerit perpendicularis: tũ trianguli qui ad perpendicularem sunt positi, sunt similes toti triagulo, atq; etiã inter se.

Propositio 9. Problema.

Auferre ex data linea recta, eam partem, qua auferenda præcipitur.

Propositio 10. Problema.

Datam lineam rectam non sectam similiter secare vt sectam.

Πρότασις ια. πρόβλημα.

Δύο δοθεισῶν ὀρθῶν, τρίτῳ ἀνάλογον
προσδρεῖν.

Πρότασις ιβ. Πρόβλημα.

Τριῶν δοθεισῶν ὀρθῶν, τετάρτην ἀνάλο-
γον προσευρεῖν.

Πρότασις ιγ. Πρόβλημα.

Δύο δοθεισῶν ὀρθῶν, μέσσην ἀνάλογον
προσδρεῖν.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων τε, καὶ μίαν μιᾶ ἴσην, ἐχόντων
γωνίαν παραλληλογραμμῶν, ἀντιπεπόν-
θασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας.
Καὶ ὧν παραλληλογραμμῶν, μίαν μιᾶ ἴσην
ἐχόντων γωνίαν, ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλε-
υραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἴσαι ἐσὶν ἑκάστα.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων, καὶ μίαν μιᾶ ἴσην ἐχόντων γω-
νίαν, τριγώνων, ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλε-
υραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας. Καὶ ὧν τριγώ-
νων μίαν μιᾶ ἴσην ἐχόντων γωνίαν, ἀντιπε-
πόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γω-
νίας, ἴσαι ἐσὶν ἑκάστα.

Πρότα-

Propositio 11. problema.

Duabus propositis lineis rectis tertiam proportionalem inuenire.

Propositio 12. Problema.

Tribus lineis rectis datis, quartam proportionalem inuenire.

Propositio 13. Problema.

Duabus datis lineis rectis mediam proportionalem inuenire.

Propositio 14. Theorema.

Parallelogrammorum equalium, & habentium vnum angulum vni angulo equali latera equalia angulos continentia reciproca sunt. Et quorum parallelogrammorum habentium vnum angulum vni angulo equali, reciproca sunt ea latera, quae equalia angulos continent, illa etiam sunt equalia.

Propositio 15. Theorema.

Triangulorum equalium, & habentium vnum angulum, vni angulo equali: latera equalia angulos continentia reciproca sunt. Et quorum triangulorum habentium vnum angulum vni angulo equali, reciproca sunt latera equalia angulos continentia, equalia etiam erunt illi trianguli.

D 3 Pro-

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ὀρθογώνιαι, ἀνάλογον ᾧσι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἔσῃ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ. Καὶ εἰ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἦ, τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ, αἱ τέσσαρες ὀρθογώνιαι ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν τρεῖς ὀρθογώνιαι ἀνάλογον ᾧσι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἔσῃ, τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ. Καὶ εἰ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἦ, τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ, αἱ τρεῖς ὀρθογώνιαι ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις ιη. Πρόβλημα.

Ἀπὸ τῆς δοθείσης ὀρθογώνιας, τῷ δοθέντι ὀρθογώνιῳ, ὁμοίον τε καὶ ὁμοίως κείμενον ὀρθογώνιον ἀναγράψαι.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Τὰ ὅμοια τρίγωνα πρὸς ἀλλήλα, ἐν διπλασίονι λόγῳ ἔσῃ, τῷ ὁμολόγων πλ. δυνάμει.

Πρό-

Propositio 16. Theorema.

Si quatuor lineæ rectæ fuerint proportionales, rectangulum quod continetur duabus extremis, æquale est rectangulo, quod duabus medijs continetur. Et si rectangulum quod duabus extremis continetur, fuerit æquale rectangulo, quod continetur duabus medijs: quatuor istæ lineæ rectæ proportionales erunt.

Propositio 17. Theorema.

Si tres lineæ rectæ proportionales fuerint, rectangulum quod continetur duabus extremis: æquale est quadrato quod describitur à linea media. Et si rectangulum quod continetur duabus extremis, æquale est quadrato à media linea descripto, tres illæ rectæ proportionales erunt.

Propositio 18. Problema.

A data linea recta, dato rectilineo describere simile, & similiter positum rectilineum.

Propositio 19. Theorema.

Similes trianguli in dupla sunt ratione homologorum laterum.

D 4

Pro-

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Τὰ ὅμοια πολύγωνα, εἰς τὰ ὅμοια τρίγωνα διαιρεῖται, καὶ εἰς ἴσου τὸ πλῆθος, καὶ ὁμολογα τοῖς ὅλοις, καὶ τὸ πολύγωνον, διπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ ὡς ἡ ὁμολογος πλάρᾳ, πρὸς τὴν ὁμολογον πλάρᾳ.

Πρότασις κᾶ. Θεώρημα.

Τὰ τῶ αὐτῷ ὀρθογώνιῳ ὅμοια, καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν ὅμοια.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ὀθεῖαι, ἀνάλογον ᾧσιν, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν ὀρθογώνια, ὁμοιά τε, καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ἀνάλογον ἔσται. Καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν ὀρθογώνια, ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ἀνάλογον ἦ, ἢ αὐταὶ αἱ ὀθεῖαι, ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Τὰ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα, πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχει, τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλάρῶν.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Παντὸς παραλληλογραμμοῦ τὰ ὡς ἑπὶ τῶν δια-

Propositio 20. Theorema.

Figuræ multorum angulorum diuiduntur in similes triangulos, & numero æquales, & homologos totis, & figura multorum angulorum, ad figuram multorum angulorū duplicem habet rationem, quam latus homologon, ad latus homologon.

Propositio 21. Theorema.

Quæ eidem rectangulo sunt similia, etiam inter se sunt similia.

Propositio 22. Theorema.

Si quatuor lineæ rectæ fuerint proportionales, etiam rectilineæ figuræ similes, similiterq; ab eis descriptæ proportionales erunt. Et si rectilineæ figuræ similes, & ab his lineis rectis similiter descriptæ fuerint proportionales, etiã ipsæ lineæ rectæ pportionales erūt.

Propositio 23. Theorema.

Parallelogramma æquales angulos habentia, proportionem inter se habent, ex lateribus compositam.

Propositio 24. Theorema.

Omnis parallelogrammi, quæ circa dia-

D 5 metrum

διάμετρον παραλληλόγραμμου, ὁμοιά ἐστι,
τὰ τε ὅλα, καὶ ἀλλήλοις.

Πρότασις κε. πρόβλημα.

Τῷ δοθέντι ὀρθογώνῳ, ὁμοιον, καὶ ἄλ-
λῳ τῷ δοθέντι ἴσον τὸ αὐτὸ συστήσασθαι.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ παραλληλογραμμοῦ, παραλ-
ληλόγραμμον ἀφαιρεθῆ, ὁμοίον τε τῷ ὅλῳ,
καὶ ὁμοίως κείμενον, κεινὴν γωνίαν ἔχων αὐτῷ
ὡς ἡ γωνία αὐτῷ διάμετρον ἐστὶ τῷ ὅλῳ.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Πάντων τῶν παρὰ τῷ αὐτῷ ὀρθῆαι
παραβαλλομένων παραλληλογραμμῶν, καὶ
ἑλλειψῶν τῶν εἰδεσι παραλληλογραμμοῖς, ὁ-
μοίοις τε, καὶ ὁμοίως κείμενοις, τὰ ἀπὸ τῆς
ἡμισείας ἀναγεφόμενα, μέγιστόν ἐστι, τὸ ἀ-
πὸ τῆς ἡμισείας παραβαλλόμενον παραλλη-
λόγραμμον, ὁμοιον ὄν, τῷ ἑλλείμματι.

Πρότασις κη. πρόβλημα.

Παρὰ τῷ δοθέντι ὀρθῆαι, τῷ δοθέντι
ὀρθογώνῳ, ἴσον παραλληλόγραμμον πα-
ραβαλεῖν, ἑλλειπὸν εἶδος παραλληλογραμ-
μῶ ὁμοίῳ ὄντι τῷ δοθέντι. Δεῖ δὴ τὸ διδόμενον
εὐθύ-

metrū sunt parallelogramma, similia sunt toti parallelogrammo, & inter se.

Propositio 25. Problema.

Data figuræ rectilineæ similem, & aliæ figuræ rectilineæ datæ eandem æqualem figuram rectilineam constituere.

Propositio 26. Theorema.

Si auferatur ex parallelogrammo aliud parallelogrammon simile, & similiter positum toti parallelogrammo, ita vt etiam communem cum ipso habeat angulum: erit circa eandem cum ipso diametro.

Propositio 27. Theorema.

Omnium parallelogrammorum quæ ad eandem lineam rectam applicantur, & deficiunt parallelogrammis figuris, similibus & similiter positis, parallelogrammon quod à dimidia describitur, atq; defectui simile est, erit maius eo, quod à dimidia describitur.

Propositio 28. problema.

Data lineæ rectæ, dato rectilineo æquale parallelogrammon applicare deficiens figuræ parallelogramma, simili datæ figuræ. Sed oportet illud rectilineum, cui æquale parendum

εὐθύγραμμον, ὧ δ' αἶ ἴσον παραβαλεῖν, μὴ
 μείζον εἶναι, τῶ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβα-
 λομένω, ὁμοίων ὄντων τῶν ἐλλημάτων, τοῦ
 τε ἀπὸ τῆς ἡμισείας, καὶ ὧ δ' αἶ ὁμοιον ἐλλεί-
 πων.

Πρότασις κθ. πρόβλημα.

Παρά τιῶ δοθεῖσαν εὐθείαν, τῶ δοθέντι εὐ-
 θυγράμμω, ἴσον παραλληλόγραμμον πα-
 ραβαλεῖν, ὑπερβάλλον εἶδη παραλληλο-
 γράμμω ὁμοίω τῶ δοθέντι.

Πρότασις λ. πρόβλημα.

Τιῶ δοθεῖσαν εὐθείαν πεπερασμένω, ἄ-
 κρον, καὶ μέσον λόγον τεμεῖν.

Πρότασις λα. θεώρημα.

Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις, τὸ ἀπὸ τῆς
 τιῶ ὀρθῆν γωνίαν, ὑποτέξεως πλῆρᾶς εἰ-
 δεῖ, ἴσον ἐστὶ, τοῖς ἀπὸ τῶν, τιῶ ὀρθῶν γω-
 νίαν περιεχουσῶν πλῆρᾶν εἶδεσι, τῆς ὁμοί-
 οῦς, ἢ ὁμοίως ἀναγραφόμενοις.

Πρότασις λβ. θεώρημα.

Ἐὰν δύο τρίγωνα ζυγῶνται, καὶ αἰ μίαν γω-
 νίαν, τὰς δύο πλῆρᾶς, τὰς δυσὶ πλῆρᾶς,
 ἀνάλογον ἔχοντα, ὡς τε, τὰς ὁμολόγους αὐ-
 τῶν

dum & applicandum est non esse maius rectilineo, quod à dimidia describitur istis defectibus existentibus similibus, eius quod à dimidia describitur, & eius cui simile deficere oportet.

Propositio 29. problema.

Datæ lineæ rectæ dato rectilineo applicate æquale parallelogrammon, quod excedit figura parallelogramma simili datæ figuræ rectilineæ.

Propositio 30. problema.

Datam lineam rectam extrema & mediâ ratione secare.

Propositio 31. Theorema.

In datis triangulis rectangulis, figura quæ describitur à latere subtendente angulum illum rectum, æqualis est figuris, quæ describuntur à lateribus angulû illum rectum continentibus, similibus similiterq; descriptis.

Propositio 32. Theorema.

Si duo trianguli coniuncti ad vnum angulum, habentesq; duo latera duobus lateribus proportionalia: ita vt latera homologa sint æque-

τῶν πλῆρῶν, καὶ παραλλήλους εἶναι, αἰ-
λοιπαὶ τῶν τριγώνων πλῆρῶν, ἐπ' εὐθείαι
ἴσονται.

Πρότασις λγ'. Θεώρημα.

Ἐν τοῖς ἴσοις κύκλοις, αἱ γωνίαι, τὸν αὐτὸν
λόγον ἔχουσι, ταῖς περιφερείαις ἐφ' ὧν βε-
βήκασιν, εἰάντε πρὸς τοῖς κέντροις, εἰάντε πρὸς
ταῖς περιφερείαις, ὥσι βεβηκῆται. ἔτι δὲ ἐξ
οἰτομεῖς, ἅτε πρὸς τοῖς κέντροις σινησάμενοι.

Τέλος τοῦ ἐκτοῦ στοιχείου.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
ΕΒΔΟΜΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Μονάς ἐστὶ, καθ' ἣν ὁ ἕκαστος τῶν ὄντων
ἐν λέγεται.

Ἀριθμὸς δὲ, τὸ ἐκ μονάδων συγκεῖμενον
πλήθος.

Μέρος ἐστὶν ἀριθμὸς ἀριθμῶν, ὁ ἐλάσσων
τοῦ μείζονος, ὅταν καταμετρηῖ τὸν μείζονα.
Μέρη δὲ, ὅταν μὴ καταμετρηῖ.

Πολλὰ

æquedistantia: tum reliqua triangulorum latera $\epsilon\omega$ $\epsilon\upsilon\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma$ sunt posita.

Propositio 33. Theorema.

In circulis æqualibus anguli eandem habent rationem quam circumferentiæ in quibus consistunt: siue sint ad centra, siue ad circumferentias constituti, præterea & sectores ad centra scilicet constituti.

Finis libri sexti.

EVCLIDIS ELEMENTO-
rum Liber Septimus.

Definitiones.

Vnitatis est secundum quam unumquodque unum dicitur.

Numerus verò multitudo ex unitatibus composita.

Numerus alterius numeri pars esse dicitur minor maioris: quando maiorem exactè metitur.

Numerus verò alterius numeri partes esse dicitur, quando non exactè metitur maiorem.

Nume

Πολλαπλάσι Θ δὲ, ὁ μείζων τῶν ἐλάττω
 ν Θ , ὅταν καλαμετρῆται ὑπὸ τῶν ἐλάττω.

Ἀρι Θ δὲ ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ δίχα διαμερό-
 μεν Θ .

Περσιπτος δὲ, ὁ μὴ διαμερόμεν Θ δίχα καὶ
 μονάδι διαφέρων δευτέρου ἀριθμοῦ.

Ἀρπιάκις ἀρπι Θ ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ ὑπὸ
 δευτέρου ἀριθμοῦ μετερόμεν Θ , κατ' ἀρτιον ἀ-
 ριθμὸν.

Ἀρπιάκις δὲ περισπτος ἐστίν, ὁ ὑπὸ ἀρτίου
 ἀριθμοῦ μετερόμεν Θ , καὶ πρῶτον ἀριθμὸν.

Περσιπτος δὲ περισπτος ἐστίν ἀριθμὸς, ὁ ὑπὸ
 πρῶτον ἀριθμοῦ μετερόμεν Θ , κατὰ περι-
 σπτον ἀριθμὸν.

Πρῶτος ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ μονάδι μόνη με-
 τερόμεν Θ .

Πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοί εἰσιν, οἱ μὴ
 μονάδι μόνη μετερόμενοι κοινῶν μέτρων.

Συμμετροὶ ἀριθμοὶ ἐστίν, ὁ ἀριθμῶν πρὸς με-
 τερόμεν Θ .

Συμμετροὶ δὲ πρὸς ἀλλήλους, ἀριθμοί εἰσιν,
 οἱ ἀριθμῶν πρὸς μετερόμενοι κοινῶν μέτρων.

Ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέ-
 γεται,

Numerus alterius numeri multiplex esse dicitur maior minoris: quando minor maiorem exactè metitur.

Numerus par est, quem in duas partes æquales diuidere possumus.

Numerus verò impar, qui non potest diuidi in duas partes æquales: vel is qui vnitatem differt à numero pari.

Numerus pariter par est, quem par numerus per partem metitur.

Numerus pariter impar est, quem numerus par metitur per numerum imparem.

Numerus impariter impar est, quem impar numerus per imparem metitur.

Numerus primus est, quem sola metitur vnitatis.

Numeri inter se primi sunt, quos sola vnitatis communi mensura metitur.

Numerus compositus est, quem numerus aliquis metitur.

Numeri inter se compositi, quos numerus aliquis communi metitur mensura.

Numerus numerum multiplicare dicitur,

E quan-

γεταί, όταν ὅσαι εἰσὶν ἐν αὐτῇ μονάδες, ποσιν
τάκεις συντεθῆ ὁ πολλαπλασιαζόμενος Θ , καὶ
γένηται τις.

Ὅταν δὲ δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσωνται
ἀλλήλους, ποιῶσιν πνα, ὁ γινόμενος Θ , ἐπίπτε
δ Θ καλεῖται.

Πλῆραι δὲ αὐτῶν, οἱ πολλαπλασιάσαντες
ἀλλήλους ἀριθμοὶ.

Ὅταν δὲ τρεῖς ἀριθμοὶ, πολλαπλασιά-
σαντες ἀλλήλους, ποιῶσιν πνα, ὁ γινόμενος Θ ,
σερεὸς καλεῖται.

Πλῆραι δὲ αὐτῶν, οἱ πολλαπλασιάσαν-
τες ἀριθμοὶ.

Τετραγώνος Θ ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ ἰσάκεις ἴσας
ἢ ὁ ὑπὸ δύο ἴσων ἀριθμῶν περιεχόμενος Θ .

Κύβου Θ δὲ, ὁ ἰσάκεις ἴσους ἰσάκεις. ἢ ὁ ὑπὸ
τρεῶν ἴσων ἀριθμῶν περιεχόμενος Θ .

Ἀριθμοὶ ἀνάλογόν εἰσιν, ὅταν ὁ πρῶτος
τοῦ δευτέρου, καὶ ὁ τρίτος Θ , τοῦ τετάρτου
ἰσάκεις ἢ πολλαπλάσιος Θ , ἢ τὸ αὐτὸ μέρος Θ ,
ἢ τὰ αὐτὰ μέρη ᾖσιν.

Θμμ

quando quot in ipso multiplicante fuerint unitates, toties componitur numerus multiplicandus & producitur aliquis numerus.

Quando verò duo numeri sese mutuo multiplicantes producunt aliquem, numerus qui producitur appellatur planus.

Latera vero eius sunt, numeri sese mutuo multiplicantes.

Si verò tres numeri sese mutuo multiplicantes produxerint aliquem numerum: is qui fit solidus nominatur.

Eius verò latera sunt numeri, sese mutuo multiplicantes.

Numerus quadratus est, qui æqualiter est equalis: vel qui ex duorum æqualium numerorum multiplicatione fit.

Numerus verò cubus dicitur qui æqualiter equalis est, æqualiter: id est qui fit ex multiplicatione trium æqualium numerorum.

Numeri proportionales sunt, quando primus secundi, & tertius quarti æqualiter fuerit multiplex, aut eadē pars, aut eadē partes.

E ij Simi-

Ομοιοι ἐπίπεδοι καὶ στερεοὶ ἀριθμοὶ εἰσὶν
οἱ ἀνάλογον ἔχοντες τὰς πλάτους.

Τέλει Θ ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ τοῖς ἑαυτῷ μέγιστον
ἴσος ὢν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν ἀνίσων ἐκκεκμημένων, αὐ-
θυφαιρξμένον αὐτῷ ἔλασσον Θ ἀπὸ τοῦ μεί-
ζονος, ὁ λοιπὸν Θ , μηδέποτε κέρειρη, τὴν
πρὸς ἑαυτῷ, ἕως ὅτε ληφθῆ μονάδα, οἱ ἐξ ἄρχῆς
ἀριθμοὶ, πᾶσι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται.

Πρότασις β. πρόβλημα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων, μὴ πρώτων πρὸς
ἀλλήλους, μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον δεῖν.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων, μὴ πρῶτοι
πρὸς ἀλλήλους, τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέ-
τρον εὐρεῖν.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Πᾶς ἀριθμὸς, παντὸς ἀριθμοῦ, ὁ ἐλάσσων
τοῦ μείζονος Θ , ἢ τοῦ μέρους Θ ἐστίν ἢ μέρος.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ μέρους Θ ἢ, καὶ ἕτερος Θ

Similes plani & solidi numeri sunt, qui latera habent proportionalia.

Numerus perfectus est, qui partibus sui ipsius est æqualis.

Propositiones.

Propositio 1. Theorema.

Si duobus numeris inæqualibus propositis, semper minor à maiore auferatur: & tandem is qui relinquitur, præcedentem nõ amplius exacte metiatur, donec sumatur vnitas, numeri ab initio propositi primi inter se sunt.

Propositio 2. problema.

Duobus propositis numeris non primis inter se: inuenire mæximam eorum communem mensuram.

Propositio 3. problema.

Trib⁹ ppositis numeris nõ primis inter se: mæximam eorũ communẽ mēsuram inuenire.

Propositio 4. Theorema.

Omnis numerus, omnis numeri minor maioris: vel est pars, vel partes.

Propositio 5. Theorema.

Si numerus numeri pars fuerit, & alter al-

E ij terius

ἑτέρας, τὸ αὐτὸ μέρος, καὶ ζυγαμφοτέρως σι-
 ναμφοτέρως, τὸ αὐτὸ μέρος ἔσται, ὅπως ὁ εἰς ἑ-
 ἑνός. Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρη ἦ, καὶ ἕτερον
 ἑτέρας, τὰ αὐτὰ μέρη ἦ, καὶ ζυγαμφοτέρον
 σιναμφοτέρως, τὰ αὐτὰ μέρη ἔσται, ὅπως ὁ εἰς
 ἑνός. Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς, ἀριθμῶν μέρη ἦ, ὅπως ἀφα-
 ρεθείς ἀφαιρεθέντι, καὶ ὁ λοιπὸς τῶν λοιπῶν,
 τὸ αὐτὸ μέρος ἔσται, ὅπως ὁ ὅλον τῶν ὅλων.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρη ἦ, ὅπως ἀφα-
 ρεθείς ἀφαιρεθέντι, καὶ ὁ λοιπὸς τοῦ λοι-
 ποῦ, τὰ αὐτὰ μέρη ἔσται, ὅπως ὁ ὅλον τοῦ
 ὅλου. Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρη ἦ, καὶ ἕτε-
 ρον ἑτέρας, τὸ αὐτὸ μέρος, καὶ ἐναλλάξ, ὁ μέρ-
 ρον ἔσιν ἢ μέρη, ὁ πρῶτον τῶν τρίτων, τὸ αὐ-
 τὸ μέρος ἔσται, ἢ τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ ὁ δευτέ-
 ρον ἢ τετάρτων.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρη ἦ, καὶ ἕτερον
 ἑτέρας τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ ἐναλλάξ, ἂ μέρη
 511,

terius eadem pars etiam additus additi eadē
pars erit, quæ vnus vnus.

Propositio 6. Theorema.

Si numerus numeri partes sit, & alter al-
terius eadem partes, etiam additus additi eā
dem partes erit, quæ est vnus vnus.

Propositio 7. Theorema.

Si numerus numeri pars sit, quæ pars est
numerus ablati, numeri ablati: etiam reli-
quus reliqui eadē pars erit, quæ totus totius.

Propositio 8. Theorema.

Si numerus alterius numeri fuerit partes,
quæ partes est numerus ablati, numeri ab-
lati, etiam reliquus numerus reliqui numeri
eadem partes erit, quæ partes est totus totius.

Propositio 9. Theorema.

Si numerus alterius numeri pars fuerit,
& alter alterius eadē pars, tum permutatim
quæ pars est, vel partes primus tertij: eadem
pars vel partes est, secundus quarti.

Propositio 10. Theorema.

Si numerus alterius numeri fuerit partes,
et alter alterius eadē partes, etiam permuta-

E iij tim

εἶν, ὁ πρῶτος τῶ τρίτῃ, ἢ μέρῳ, τὰ αὐτὰ μέ-
ρη ἔσται, καὶ ὁ δεύτερῳ τῶ τετάρτῃ, ἢ μέρος

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Εὰν ἡ ὡς ὅλος πρὸς ὅλον, ἔτως ἀφαιρεθεῖς
πρὸς ἀφαιρεθέντα, ἢ ὁ λοιπὸς πρὸς τὸν λοι-
πὸν ἔσται, ὡς ὅλῳ, πρὸς ὅλον.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Εὰν ὡσιν ὁποσοιοῦ δριθμοὶ ἀνάλογον, ἔ-
σται ὡς εἰς τῶν ἡγμένων, πρὸς ἓνα τῶν ἐπι-
μένων, ἔτως ἅπαντες οἱ ἡγμένοι, πρὸς ἅ-
παντας ἑστὺ ἐπομένους.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες δριθμοὶ, ἀνάλογον ὡσι, καὶ
ἐναλλάξ ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Εὰν ὡσιν ὁποσοιοῦ δριθμοὶ, καὶ ἄλλοι αὐ-
τοῖς ἴσοι τὸ πλῆθῳ, σὺ δύο λαμβανόμενοι,
καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ δίσσοι, ἐν τῷ αὐτῷ λό-
γῳ ἔσονται.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν μὴ μὲν δριθμὸν πῖνα μετρήῃ, ἰσάκεις δὲ
ἕτεροῦ ἀριθμοῦ, ἄλλον πῖνα ἀριθμὸν μετρήῃ,
καὶ ἐναλ-

rim quæ partes est primus tertij vel pars, eadem partes secundus erit quarti vel pars.

Propositio 11. Theorema.

Si fuerit vt numerus totus ad numerum totum, ita ablati numerus ad ablatum: etiam reliquus ad reliquum erit vt totus numerus ad numerum totum.

Propositio 12. Theorema.

Si quotcunq; fuerint numeri proportionales, erit vt unus ex antecedentibus: ad vnum ex consequentibus: ita omnes antecedentes, ad omnes consequentes.

Propositio 13. Theorema.

Si quatuor numeri fuerint proportionales, etiam permutatim proportionales erunt.

Propositio 14. Theorema.

Si fuerint quotcunq; numeri, & alij his æquales numero bini collati & in eadem proportione & iam ex æquo in eadem erunt proportione.

Propositio 15. Theorema.

Si vnitas aliquem metitur numerum, æqualiter verò alius quispian numerus, alium

E v nume-

καὶ ἐναλλάξ, ἰσάκεις ἢ μονὰς, τὸν τρίτον ἀριθμὸν μετρήσῃ, καὶ ὁ δεύτερος τέταρτον.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους, ποιῶσιν ἴνας, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, ἴσοι ἀλλήλοις ἔσονται.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς, δύο ἀριθμοὺς πολλαπλασιάσῃ, ποιῶσιν ἴνας, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσι τοῖς πολλαπλασιασθεῖσιν.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, ἀριθμὸν ἴνα πολλαπλασιάσαντες, ποιῶσιν ἴνας, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον, τοῖς πολλαπλασιασθεῖσιν.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ᾖσιν, ὁ ἐκ τοῦ πρώτου καὶ τεταρτου, γινόμενος ἀριθμὸς, ἴσος ἔσται, τῷ ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου γινόμενῳ ἀριθμῷ. Καὶ ἐὰν ὁ ἐκ τοῦ πρώτου καὶ τεταρτου, γινόμενος ἀριθμὸς, ἴσος ἔσται

numerum metiatur: tum permutatim vni-
tas æqualiter metietur numerum tertium, &
secundus quartum.

Propositio 16. Theorema.

Si duo numeri sese mutuò multiplicantes
produxerint aliquos, numeri ex eiusmodi
multiplicatione facti, æquales inter se sunt.

Propositio 17. Theorema.

Si numerus aliquis duos numeros multi-
plicat, tum numeri ex eiusmodi multiplica-
tione facti, eandem habebunt quam multipli-
cati rationem.

Propositio 18. Theorema.

Si duo numeri aliquem multiplicauerint
numerum, & producant aliquos, numeri pro-
ducti ex horum multiplicatione eandem quã
multiplicantes, habebunt rationem.

Propositio 19. Theorema.

Si quatuor numeri fuerint proportiona-
les, numerus qui fit ex multiplicatione primi
in quartum, erit æqualis ei qui producitur ex
multiplicatione secundi in tertium: & si nu-
merus ex multiplicatione primi in quartum
factus

τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου ἢ τρίτου, οἱ τέσσαρες ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εάν τρεῖς ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ᾧσιν, ἢ ὑπὸ τῶν ἄκρων, ἴσθ' ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν μέσων. ἐὰν δὲ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσος ἦ, τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου, οἱ τρεῖς ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Οἱ ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ, τῶν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων αὐτοῖς, μετρεῖσι, ὅσῳ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντας αὐτοῖς, ἰσάκις, ὅ, τε μείζων τὸν μείζονα, καὶ ὀλίγων, τὸν ὀλίγονα.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εάν ᾧσι τρεῖς ἀριθμοὶ, καὶ ἄλλοι αὐτοῖς ἴσοι τὸ πλῆθος, σὺν δύο λαμβανόμενοι, καὶ ἐν τῶν αὐτῶν λόγῳ, ἢ δὲ τετραγμένη αὐτῶν ἢ ἀναλογία, καὶ δίσσου ἐν τῶν αὐτῶν λόγῳ ἔσονται.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Οἱ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ, ἐλάχιστοί εἰσι, τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων αὐτοῖς.

Πρότα-

fuerit equalis ei, qui fit ex multiplicatione secundi in quartum, tum quatuor illi numeri erunt proportionales.

Propositio Vigesima.

Si tres numeri fuerint proportionales, numerus ex multiplicatione extremorum factus equalis est quadrato numeri medij, & si numerus ex multiplicatione extremorum factus, equalis est quadrato numeri medij, tres illi numeri erunt proportionales.

Propositio 21. Theorema.

Minimi numeri eandem habentes rationem metiuntur numeros eandem cum ipsis habentes rationem equaliter: maior maiorem, & minor minorem.

Propositio 22. Theorema.

Si fuerint tres numeri & alij numeri aequales, bini collati & in eadem ratione, sic vero illorum proportio perturbata: tum ex aequo in eadem erunt ratione.

Propositio 23. Theorema.

Numeri primi inter se, sunt minimi eorum qui eandem cum ipsis habent rationem.

Pro-

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Οἱ ἐλάττωσι δριθμοὶ, τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων αὐτοῖς, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Εὰν δύο δριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ᾖσιν, ὁ τὸν ἓνα αὐτῶν μετρῶν δριθμὸς, πρὸς τὸν λοιπὸν, πρῶτος ἔσται.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εὰν δύο δριθμοὶ, πρὸς ἕνα δριθμὸν πρῶτοι ᾖσιν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν γνόμῳ \odot , πρὸς τὸν αὐτὸν πρῶτος \odot ἔσται.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Εὰν δύο δριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ᾖσιν, ὁ ἐκ τῶν ἐνὸς αὐτῶν γνόμῳ \odot , πρὸς τὸν λοιπὸν, πρῶτος \odot ἔσται.

Πρότασις κη. Θεώρημα.

Εὰν δύο δριθμοὶ, πρὸς δύο δριθμὸς, ἀμφοτέρω, πρὸς ἑκάτερον, πρῶτοι ᾖσι: καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν γνόμῳ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται.

Πρότασις κθ. Θεώρημα.

Εὰν δύο δριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ᾖσι,

Propositio 24. Theorema.

Numeri minimi eorum qui eandem cum
 ipsis habent proportionē: primi inter se sunt.

Propositio 25. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint: is qui
 unū ex illis metitur: primus erit ad reliquū.

Propositio 26. Theorema.

Si duo numeri ad unum fuerint primi: tū
 is qui producitur ex horum multiplicatione
 ad eundem quoq; primus erit.

Propositio 27. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint, is qui
 fit ex multiplicatione vnus illorum duorum:
 primus erit ad reliquum.

Propositio 28. Theorema.

Si duo numeri ad duos numeros vterq; ad
 vtrunq; primi fuerint: tum qui ex horum fi-
 unt multiplicatione etiā primi inter se erunt.

Propositio 29. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint: &
 vterq;

ὡς, καὶ πολλαπλασιάσας ἐκάτερον ἑαυτῶν, ποιῆτινα, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται. Καὶ οἱ ἐξ ἀρχῆς, οὐ γινόμενος πολλαπλασιάσαντες, ποιοῦσίν τινα, κακῆνοι ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται, καὶ αἱ ὡς οὐ ἀκρὸς τούτῳ συμβαίνει.

Πρότασις λ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ὡς, καὶ ζυγαμφοτέρῳ πρὸς ἐκάτερον αὐτῶν, ὡς ᾧτι ἔσται. καὶ εἰάν σγαμφοτέρῳ πρὸς ἓνα τινὰ αὐτῶν ὡς ᾧτι ἢ, καὶ οἱ ἐξ ἀρχῆς ἀριθμοὶ, ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται.

Πρότασις λᾶ. Θεώρημα.

Ἄπας πρῶτῳ ἀριθμῷ, πρὸς ἅπαντα ἀριθμοὺς, ὃν μὴ μετρεῖ, πρῶτός ἐστιν.

Πρότασις λβ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιοῦσίν τινα, τὸν δὲ γινόμενον ἐξ αὐτῶν, μετρεῖ τις πρῶτῳ ἀριθμῷ, καὶ ἓνα τῶν ἐξ ἀρχῆς μετρεῖσθαι.

Πρότασις λγ. Θεώρημα.

Ἄπας σῶθεται ἀριθμῷ, ὑπὸ πρώτου τινὸς ἀριθμοῦ μετρεῖται.

Πρότι-

utrumque seipsum multiplicet ac producat aliquem numerum tum producti ex his numeri etiam primi inter se erunt, & si ab initio propositi numeri hos multiplicantes producant alios: etiam illi primi inter se erunt, id perpetuo circa extremos contingit numeros.

Propositio 30. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint, & utrumque simul ad utrumque illorum erit primus, & si utrumque simul ad unum aliquem illorum est primus, etiam numeri ab initio propositi, primi inter se erunt.

Propositio 31. Theorema.

Omnis numerus ad omnem numerum quem non metitur primus est.

Propositio 32. Theorema.

Si duo numeri sese multiplicantes producant aliquem, eumque metiatur aliquis numerus primus, tum etiam unum ex ijs qui ab initio erant propositi metietur.

Propositio 33. Theorema.

Omne compositum numerum, aliquis primus numerus metitur.

F Pro-

Πρότασις λδ. Θεώρημα.

Ἄπας ἀριθμὸς, ἥτοι πρῶτός ἐστιν, ἢ ὑπὸ
πρώτου ἴνου ἀριθμοῦ μετρεῖται.

Πρότασις λε. Θεώρημα.

Ἀριθμῶν δοθέντων ὀπισθωνοῦ, ὄρεῖν
εἶναι ἐλάχιστος, τῶν τ' αὐτὸν λόγον ἐχούσιν
αὐτοῖς.

Πρότασις λς. Θεώρημα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων, ὄρεῖν ὄν ἐλάχι-
στον μετρεῖσιν ἀριθμόν.

Πρότασις λζ. Θεώρημα.

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ, ἀριθμόν ἴνα μετρεῖσιν,
καὶ ὁ ἐλάχιστος, ὑπὸ αὐτ' μετρεῖται, τὴν
αὐτὸν μετρήσῃ.

Πρότασις λη. Θεώρημα.

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων, ὄρεῖν ὄν ἐλά-
χιστον μετρεῖσιν ἀριθμόν.

Πρότασις λθ. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀριθμὸς, ὑπὸ ἴνου ἀριθμοῦ μετρεῖ-
ται, ὁ μετρεῖται, ὁμῶνυμον μέρ' ἔξει τῷ
μετροῦσιν.

Πρότασις μ. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀριθμὸς, μέρ' ἔχη ὀμοιωῦ, ὑπὸ ὁ-
μοιω-
μῶνυ-

Propositio 34. Theorema.

Omnis numerus, aut primus est, aut primus numerus eum metitur.

Propositio 35. Theorema.

Quotcunq; numeris datis, inuenire minimos eandem cum ipsis habentes proportionē.

Propositio 36. Theorema.

Duobus propositis numeris inuenire minimum quem metiantur.

Propositio 37. Theorema.

Si duo numeri metiantur vnum aliquem numerum, tum minimus quem illi metiuntur metietur etiam eundem.

Propositio 38. problema.

Tribus propositis numeris, inuenire minimum quem metiantur.

Propositio 39. Theorema.

Si aliquem numerum metiatur aliquis alius numerus is quem alter metitur habebit cum eo qui metitur alterum numero partem denominationis eiusdem.

Propositio 40. Theorema.

Si numerus aliquis quamcūq; habuerit par

F ij

6036

μωνύμου ἀριθμοῦ μετρηθήσεται τὰ μέρη.

Πρότασις μα. πρόβλημα.

Ἀριθμὸν δοῦναι, ὃς ἐλάχιστος ᾖν, ἐξ ἧ τὰ
δοθέντα μέρη.

Τέλος τοῦ ἐβδόμου βιβλίου.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ὈΓΔΩΘΟΝ.

Πρότασις α. θεώρημα.

Ε Αν ᾧσιν ὅσοιδηποτῶν ἀριθμοὶ ἐξ ἧς ἀνά-
λογον, οἱ δ' ἄκροι αὐτῶν πρῶτον πρὸς
ἀλλήλους ᾧσιν: ἐλάχιστοι εἰσὶ τῶν τὸν αὐτὸν
λόγον ἐχόντων αὐτοῖς.

Πρότασις β. πρόβλημα.

Ἀριθμὸς δοῦναι ἐξ ἧς ἀνάλογον ἐλαχί-
στους, ὅσους ἑπιπέσειεν ἐν τῷ δοθέντι λόγῳ.

Πρότασις γ. θεώρημα.

Ἐὰν ᾧσιν ὅποιοῦν ἀριθμοὶ ἐξ ἧς ἀνάλο-
γον, ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων
αὐτοῖς, οἱ ἄκροι αὐτῶν, πρῶτον πρὸς ἀλλή-
λους εἰσιν.

Πρότα-

tem tum aliquis alius numerus eiusdem cum parte denominationis metietur eum.

Propositio 14. problema.

Numerum inuenire, qui cum sit minimus, habeat in se partes datas.

Finis Libri Septimi.

EVCLIDIS ELEMENTO-
RVM LIBER OCTAVVS.

Propositio 1. Theorema.

SI fuerint quotcunq; numeri continue proportionales, atq; numeri extremi eorum inter se sint primi: tum erunt minimi eorum, qui eandem habent rationem.

Propositio 2. problema.

Numeros continue proportionales minimos inuenire, quotquot aliquis volet, in data proportione.

Propositio 3. Theorema.

Si aliquot numeri continue proportionales fuerint, minimi eorum qui in eadem sunt proportione, extremi eorum primi inter se sunt.

F ij

Pro

Πρότασις δ. πρόβλημα.

Λόγων διθεθέντων ὁποσωνῶν ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς ἀριθμὸς εὐρεῖν ἐξῆς ἐλαχίστος ἐστὶ τοῖς δοθεῖσι λόγοις.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Οἱ ἑπίπεδοι ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσι τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλῶρων.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν ᾧσιν ὁποσίουῶ ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον, ὁ δὲ πρῶτος τὸν δεύτερον μὴ μετρεῖ· ἢ δὲ ἄλλος εὐδαίς εὐδένα μετρήσῃ.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν ᾧσιν ὁποσίουῶ ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον, ὁ δὲ πρῶτος τὸν ἕχαιον μετρεῖ, καὶ τὸν δεύτερον μετρήσῃ.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν μεταξὺ καὶ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπῃωσιν ἀριθμοὶ, ὅσοι εἰς αὐτὸν μεταξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπῃωσιν ἀριθμοὶ, τοσούτοι, καὶ εἰς αὐτὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντας αὐτοῖς, μεταξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπεισῃωσιν.

πρότασις

Propositio 4. problema.

Datis proportionibus aliquot in minimis numeris, inuenire numeros continue minimos in datis proportionibus.

Propositio 5. Theorema.

Numeri plani proportionem inter se habent ex lateribus eorum compositam.

Propositio 6. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continue proportionales & primus non metiatur secundum: neq; quispiam alius quempiam metietur.

Propositio 7. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continue proportionales, & primus metiatur postremum: etiam metietur secundum.

Propositio 8. Theorema.

Si inter duos numeros continue proportionales incidant numeri: quocumq; inter ipsos incident continue proportionales, totidem incident inter eos qui continue proportionales cum ipsis eandem habent proportionem.

F iij Pro-

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὡς, καὶ εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές ἀνάλογον ἐμπίπωσιν ἀριθμοὶ, ὅσοι εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές ἀνάλογον ἐμπίπωσιν ἀριθμοὶ, τοσοῦτοι καὶ ἑκατέρω αὐτῶν καὶ μονάδῳ ἐξῆς μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπέσωται.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν καὶ μονάδῳ μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπωσιν ἀριθμοὶ, ὅσοι ἑκατέρω αὐτῶν, ἑκαστὸν καὶ εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπωσιν ἀριθμοὶ, τοσοῦτοι καὶ εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπέσωται.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Δύο τετραγώνων ἀριθμῶν, εἰς μέσῳ ἀνάλογός ἐστιν ἀριθμὸς. καὶ ὁ τετράγωνος πρὸς τὸν τετράγωνον, διπλασίου λόγον ἔχει, ἢ ὡς ἡ πλάτος πρὸς τὴν πλάτος.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Δύο κύβων ἀριθμῶν, δύο μέσοι ἀνάλογον εἰσὶν ἀριθμοὶ: καὶ ὁ κύβος πρὸς τὸν κύβον,

βον,

Propositio 9. Theorema.

Si duo numeri primi inter se sunt, & inter ipsos continue proportionales incidant numeri: quot inter ipsos continue proportionales incidunt numeri, tot et inter utrunq; ipsorum & vnitatē continue proportionales incident.

Propositio 10. Theorema.

Si inter duos numeros & vnitatem continue proportionales incidant numeri: quot inter vtrunq; ipsorum & vnitatem continue proportionales incidunt numeri: tot inter ipsos continue proportionales incident.

Propositio 11. Theorema.

Duorum quadratorum numerorum unus est numerus medius proportionalis: & quadratus ad quadratum duplicatam habet rationem, quam latus ad latus.

Propositio 12. Theorema.

Duorum cuborum numerorum, duo medij proportionales numeri sunt, & cubus ad cubum

F v bum

Βον, τριπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ πρὸς ἢ πλάτρου
πρὸς τὴν πλάτρου.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν ὦσιν ὅσοιδη πόσοι ἄριθμοὶ ἐξ ἑξ ἀνάλογον, καὶ πολλαπλασιάσας ἕκαστος ἑαυτὸν, ποιῆ πινας, οἱ ἄριθμοὶ ἐξ αὐτῶν, ἀνάλογον ἔσονται. Καὶ εἰάν οἱ ἐξ ἀρχῆς, ὅσῳ ἡμετέρας πολλαπλασιάσαντες, ποιῶσιν πινας, καὶ αὐτοὶ ἀνάλογον ἔσονται. Καὶ αἰεὶ περὶ ὅσῳ ἀκροῦς τοῦτο συμβαίνει.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Εὰν τετράγωνον \odot τετράγωνον μετρήῃ, καὶ ἢ πλάτρου τὴν πλάτρου μετρήσῃ. Καὶ εἰάν ἢ πλάτρου, τὴν πλάτρου μετρήῃ, καὶ ἢ τετράγωνον \odot τὸν τετράγωνον μετρήσῃ.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν κύβον \odot ἀριθμὸς, κύβον ἀριθμὸν μετρήῃ, καὶ ἢ πλάτρου τὴν πλάτρου μετρήσῃ. Καὶ εἰάν ἢ πλάτρου τὴν πλάτρου μετρήῃ, καὶ ἢ κύβον \odot τὸν κύβον μετρήσῃ.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν τετράγωνον \odot ἀριθμὸς, τετράγωνον ἀριθμὸν μὴ μετρήῃ, εἰδὲ ἢ πλάτρου τὴν πλάτρου
ραὶ

bam triplicatam rationem habet quam latus ad latus.

Propositio 13. Theorema.

Si fuerint quotcunq; numeri continue proportionales, & quisq; eorum seipsum multiplicet, producatq; aliquem numerum, tum producti ex ipsis proportionales erunt. & si illi qui ab initio positi fuerant, multiplicantes eos, qui iam sunt producti, aliosq; producant: etiam illi proportionales erunt: idq; semper in extremis fit numeris.

Propositio 14. Theorema.

Si quadratus numerus numerum quadratum metitur: tum etiam latus metietur alterum latus: & si latus metitur alterum latus: etiam quadratus quadratum metietur.

Propositio 15. Theorema.

Si numerus cubus numerum cubum metitur, etiam latus metietur alterum latus: & si latus, alterum metitur latus: etiam cubus cubum metietur.

Propositio 16. Theorema.

Si quadratus numerus numerum quadratum non metitur: neq; latus alterum latus

εἴαν μετρήσῃ: καὶ ἢ πλάρὰ τῷ πλάρῳ καὶ
μετρήῃ, ἔδ' ὁ πετράγων Θ τ' πετράγωνον με-
τρήσῃ.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν κύβος Θ ἀριθμὸς κύβον ἀριθμὸν καὶ
μετρήῃ, ἔδ' ἢ πλάρὰ τῷ πλάρῳ καὶ μετρήσῃ
καὶ ἢ πλάρὰ τῷ πλάρῳ μὴ μετρήῃ ἔδ'
ὁ κύβος Θ τὸν κύβον μετρήσῃ.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Δύο ὁμοίων ἑπιπέδων ἀριθμῶν, εἰς μέσους
ἀνάλογος εἰς ἀριθμὸς, καὶ ὁ ἑπίπεδος Θ πρὸς
τὸν ἑπίπεδον διπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ ὡς
ἢ ὁμόλογος Θ πλάρὰ, πρὸς τῷ ὁμόλογον
πλάρῳ.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Δύο ὁμοίων σφαιρῶν ἀριθμῶν δύο μέσοι ἀ-
νάλογον ἐμπίπτεσιν ἀριθμοὶ, καὶ ὁ σφαιρὸς πρὸς
τὸν ὁμοιον σφαιρὸν τριπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ
ὡς ἢ ὁμόλογος Θ πλάρὰ, πρὸς τῷ ὁμόλο-
γον πλάρῳ.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν εἰς μέσος Θ ἀνάλογον
ἐμπίπτεαι ἀριθμὸς: ὁμοιοί, ἑπίπεδοι εἰσὶν ἀ-
ριθμοὶ.

metietur: & si latus alterum latus non metietur: neq; quadratus quadratum metietur.

Propositio 17. Theorema.

Si cubus numerus, numerum cubum non metitur: neq; latus metietur alterum latus: et si latus alterum latus non metitur neq; cubus metietur cubum.

Propositio 18. Theorema.

Duobus numeris planis similibus vnus est medius proportionibus, & numerus planus ad numerum planum rationem habet duplicatam quam habet latus homologon, ad latus homologon.

Propositio 19. Theorema.

Duobus numeris solidis similibus duo medij sunt interpositi proportionales numeri: et numerus solidus ad similem solidum numerũ triplicatam habet rationem, quam latus homologon, ad latus homologon.

Propositio 20. Theorema.

Si inter duos numeros vnus medius intercedit proportionalis numerus: illi numeri similes plani erunt.

Propo-

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Εάν δύο ἀριθμῶν, δύο μέσοι ἀνάλογον ᾧ
πίπῳσιν ἀριθμοὶ, ὁμοίοι τερεοὶ ἔσονται
ἀριθμοὶ.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εάν τρεῖς ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ᾧσιν,
δὲ πρῶτ[Ⓞ] τετράγων[Ⓞ] ἢ χ[Ⓞ] ὁ τρίτ[Ⓞ] τε-
τράγων[Ⓞ] ἔσται.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Εάν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ᾧ-
σιν, ὁ δὲ πρῶτ[Ⓞ] κύβος ἢ, καὶ τέταρτ[Ⓞ] κύ-
βος ἔσται.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Εάν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔ-
χωσιν, ὃν τετράγων[Ⓞ] ἀριθμὸς, πρὸς τετρά-
γωνον ἀριθμὸν, ὁ δὲ πρῶτ[Ⓞ] τετράγωνος ἢ
καὶ ὁ δεύτερ[Ⓞ] τετράγων[Ⓞ] ἔσται.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Εάν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔ-
χωσιν, ὃν κύβος ἀριθμὸς, πρὸς κύβον ἀριθ-
μὸν, ὁ δὲ πρῶτος κύβ[Ⓞ] ἢ, καὶ ὁ δεύτερ[Ⓞ]
κύβ[Ⓞ] ἔσται.

Πρό-

Propositio 21. Theorema.

Si inter duos numeros duo medij proportionales numeri interciderint: illi numeri similes solidi erunt.

Propositio 22. Theorema.

Si tres numeri continue proportionales fuerint, & primus eorum sit quadratus, etiã tertius quadratus erit.

Propositio 23. Theorema.

Si quatuor numeri continue proportionales fuerint, & primus eorum sit cubus: etiam quartus cubus erit.

Propositio 24. Theorema.

Si duo numeri proportionem inter se habeant, quam quadratus ad quadratum, & primus eorum sit quadratus, etiam secundus quadratus erit.

Propositio 25. Theorema.

Si duo numeri proportionem inter se habeant, quam numerus cubus ad numerum cubum: primus verò sit cubus: etiam secundus cubus erit.

Pro-

Πρότασις κς Θεώρημα.

Οι ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλή-
λους λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνον \odot ἀριθμὸς
πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Οι ὅμοιοι στερεοὶ ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους
λόγον ἔχουσιν ὃν κύβον \odot ἀριθμὸς πρὸς κύβον
ἀριθμὸν.

Τέλος \odot τῶν ὀγδόων στοιχείων.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥΤ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΝΝΑΤΟΝ.

Ε Πρότασις α. Θεώρημα.
Αν δύο ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πολλα-
πλασιάσαντες ἀλλήλους, ποιῶσι πινὰ, ὁ γνό-
μῳ \odot τετράγωνον \odot ἔσται.

Πρότασις β. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντες ἀλ-
λήλους ποιῶσι τετράγωνον, ὅμοιοι ἐπίπεδοι
εἰσὶ.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Εὰν κύβον \odot ἀριθμὸς ἐαυτὸν πολλαπλα-
σιάσῃ

Propositio 26. Theorema.

Numeri similes plani inter se proportionem habent, quam quadratus ad quadratum.

Propositio 27. Theorema.

Numeri similes solidi proportionem inter se habent: quam cubus ad cubum.

Finis Libri Octavi.

EVCLIDIS ELEMENT.
LIBER NONVS.

Propositio 1. Theorema.

SI duo numeri similes plani sese mutuo multiplicauerint ac producant aliquem numerum: is numerus erit quadratus.

Propositio 2. Theorema.

Si duo numeri sese mutuo multiplicantes; producant numerum quadratum: erunt illi duo numeri similes plani.

Propositio 3. Theorema.

Si numerus cubus seipsum multiplicauerit,

Grit,

στιάσας ποιῆ τινὰ ὁ γρόμμι $\textcircled{\ominus}$ κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἔσται.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Εὰν κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἀριθμὸς, κύβον ἀριθμὸν πλά
πλαστιάσας ποιῆ τινὰ, ὁ γρόμμι $\textcircled{\ominus}$ κύβου
ἔσται.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἀριθμὸς, ἀριθμὸν τινὰ πλά
πλαστιάσας κύβον ποιῆ, καὶ ὁ πλάσπλαστιά
σθεις κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἔσται.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἑαυτὸν πλάσπλαστιάσας
κύβον ποιῆ, καὶ αὐτὸς κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἔσται.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν συνθετ $\textcircled{\ominus}$ ἀριθμὸς, ἀριθμὸν πλά
πλαστιάσας ποιῆ τινὰ, ὁ γρόμμος εν
ρεὸς ἔσται.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μονάδ $\textcircled{\ominus}$ ὅποσιζν ἀριθμοὶ ἔξῃ
ἀνάλογον ὦσιν, ὁ μὲν τρίτ $\textcircled{\ominus}$ ἀπὸ τῆς μονά
δ $\textcircled{\ominus}$ τετράγων $\textcircled{\ominus}$ ἔσιν, καὶ οἱ ἐνά Διγλείπι
τες πάντες: ὁ δὲ τέταρτ $\textcircled{\ominus}$ κύβ $\textcircled{\ominus}$: καὶ οἱ δὲ
Διγλείπιτες πάντες: ὁ δὲ ἑβδόμ $\textcircled{\ominus}$ κύβ $\textcircled{\ominus}$
ἅμα καὶ τετράγων $\textcircled{\ominus}$ καὶ οἱ πέντε Διγλείπι
τες πάντες.

rit, & producat aliquem numerum: is qui produ-
 dicitur erit cubus.

Propositio 4. Theorema.

Si cubus numerus, numerum cubum mul-
 tiplicauerit, & produxerit aliquem, tum nu-
 merus productus erit cubus.

Propositio 5. Theorema.

Si numerus cubus, numerum aliquem mul-
 tiplicet: & producat cubum: & numerus mul-
 tiplicatus erit cubus.

Propositio 6. Theorema.

Si numerus aliquis seipsum multiplicet ac
 producat cubum etiam ipsemet cubus erit.

Propositio 7. Theorema.

Si numerus compositus, numerum aliquem
 multiplicauerit & producat aliquem: nume-
 rus productus solidus erit.

Propositio 8. Theorema.

Si ab vnitae aliquot numeri cōtinuè pro-
 portionales fuerint, & tertius ab vnitae sit
 quadratus, etiam vno intermisso omnes: quar-
 tus verò cubus & duobus intermissis omnes,
 septimus verò etiam est cubus, & quadratus,
 & quinq; intermissis omnes.

G 2

SCD LYON 1

sancti
 marci
 lyonesis

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ Θ ὀποσίουῦ ἀριθμοὶ ἑξῆς ἀνάλογον ᾧσιν ὁ δὲ μετὰ τῷ μονάδα πετράγων Θ ἤ, καὶ οἱ λοιποὶ πάντες τετράγωνοι ἔσονται : καὶ εἰάν ὁ μετὰ τῷ μονάδα κύβ Θ ἤ, ἔοι λοιποὶ πάντες κύβοι ἔσονται.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ Θ ὀποσίουῦ ἀριθμοὶ ἀνάλογον ᾧσιν, ὁ δὲ μετὰ τῷ μονάδα μὴ ἢ πετράγωνος, ἢ δ' ἄλλ Θ ἑδεῖς τετράγων Θ ἔσται, χωρὶς τῶ τρίτε ἀπὸ τῆς μονάδ Θ , καὶ τῶν ἑνα διαφύπώντων πάντων : καὶ εἰάν ὁ μετὰ τῷ μονάδα κύβ Θ μὴ ἢ, ἢ δ' ἄλλ Θ ἑδεῖς κύβ Θ ἔσται, χωρὶς τῶ τετάρτε ἀπὸ τῆς μονάδ Θ , καὶ τῶν δύο διαφύπόντων πάντων.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ Θ ὀποσίουῦ ἀριθμοὶ ἑξῆς ἀνάλογον ᾧσιν, ὁ ἐλάττων τὸ μείζονα μετρεῖ, κατὰ πινὰ τῶν ὑπαρχόντων ἐν τοῖς ἀνάλογον ἀριθμοῖς.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ Θ ὀποσίουῦ ἀριθμοὶ ἀνάλο-

Propositio 9. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri continue proportionales fuerint: Is verò qui post unitatem sequitur fuerit quadratus: etiam reliqui omnes quadrati erunt: & si is qui unitatem sequitur fuerit cubus: etiam reliqui omnes erunt cubi.

Propositio 10. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri proportionales fuerint: is verò qui unitatem sequitur non fuerit quadratus: neq; quispiam insequentium quadratus erit, exceptis tertio ab unitate & vnum intermittentibus omnibus: & si qui unitatem sequitur non fuerit cubus: neque alius quispiam cubus erit, exceptis quarto ab unitate & duo intermissis omnibus.

Propositio 11. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri continue fuerint proportionales minor maiorem metietur per numeros, qui inter illos numeros proportionales fuerit.

Propositio 12. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri proportionales

G 3

nales

ἀνάλογον ὦσιν: ὑφ' ὅσων ἀν' ὄρατα Θ πρῶ-
των ἀριθμῶν μετρεῖται, ὑπὸ τῶν αὐτῶν, καὶ
ὁ παρὰ τὴν μονάδα μετρηθήσεται.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μονάδ Θ ὀποσοῖσιν ἀριθμοὶ ἐ-
ξῆς ἀνάλογον ὦσιν: ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα
πρῶτ Θ ἢ ὁ μέγιστ Θ ὑπὸ ἑδενὸς ἄλλου με-
τρηθήσεται πᾶρεξ τῶν ὑπαρχόντων ἐν τῆς
ἀνάλογον ἀριθμοῖς.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Εὰν ἐλάχιστ Θ ἀριθμὸς ὑπὸ πρῶτων ἀ-
ριθμῶν μετρηῆται, ὑπὸ ἑδενὸς ἄλλου ἀριθ-
μοῦ μετρηθήσεται πᾶρεξ τῶν ἐξ ἀρχῆς με-
τροῦτων.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν τρεῖς ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ὦσιν, ἐ-
λάττωσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς,
δύο ὀποιοῖσιν σωληθέντες, πρὸς τὸν λοιπὸν
πρῶτοι εἰσιν.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους
ὦσιν, ἕκαστὸς ὡς ὁ πρῶτ Θ πρὸς τὸν δεύτε-
ρον: οὕτως ὁ δεύτερ Θ πρὸς ἄλλον τινα.

Πρότα-

nales fuerint: quot extremum numerum, numeri primi metiuntur: ijdem etiam eum qui unitatem sequitur metientur.

Propositio 13. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri continue proportionales fuerint: is verò qui unitatem sequitur fuerit primus: tum maximum numerum nullus alius numerus metietur quam qui ex numeris fuerint cum ipso proportionalibus

Propositio 14. Theorema.

Si minimum numerum primi numeri metiuntur: tum nullus alius eum metietur, præterquam qui ab initio eum metiebantur.

Propositio 15. Theorema.

Si tres numeri continue proportionales fuerint: minimi eorum qui eandem cum eis habent proportionem duo quicumq; sunt compositi ad reliquum primi erunt.

Propositio 16. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint: non erit proportio ut primus ad secundum, ita secundus ad aliquem alium.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν ὦσιν ὅσοιδηπόσω ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον: οἱ δὲ ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὦσιν: ὅση ἐστὶ ὡς ὁ πρῶτος πρὸς τὸ δεύτερον: ἔτι ὡς ὁ ἕνατος πρὸς ἄλλον τινα.

Πρότασις ιη. Πρόβλημα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων, ἴσωςκέψασθαι εἰ δυνατὸν ἐστὶν αὐτοῖς τρίτον ἀνάλογον προσδεῖν.

Πρότασις ιθ. Πρόβλημα.

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων, ἴσωςκέψασθαι εἰ δυνατὸν ἐστὶν αὐτοῖς τέταρτον ἀνάλογον προσδεῖν.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ, παντὸς τε προτεθέντος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Εὰν ἄρτοι ἀριθμοὶ ὅποσοι ἐν στωτεθῶσιν, ὅλον ἄρτι ἐστί.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν περισοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοι ἐν στωτεθῶσιν: τὸ δὲ πλῆθος αὐτῶν ἄρτιον ἢ, ὅλον ἄρτι ἐστὶ.

Πρότα-

Propositio 17. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continue proportionales, & illorum extremi sint inter se primi: non erit ut primus ad secundum, ita extremus ad aliquem alium.

Propositio 18. Problema.

Duobus propositis numeris contemplari an tertius proportionalis inueniri possit.

Propositio 19. Problema.

Tribus datis numeris contēplari an quartus proportionalis inueniri possit.

Propositio 20. Theorema.

Plures sunt numeri primi: quàm quæuis primorum numerorum multitudo proposita.

Propositio 21. Theorema.

Si numeri pares quotquot illorū sint componantur: tum totus numerus erit par.

Propositio 22. Theorema.

Si numeri impares quotcunq; illorum fuerint componantur, & par illorū fuerit multitudo: tum totus numerus par erit.

G v Pro-

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Εάν περισοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοιῦν σωτηθῶ-
σιν: τὸ δὲ πλῆθος αὐτῶν περισοῦν ἢ, καὶ ἴ-
σος περισοῦς ἔσται.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ ἀρτίον ἀφαι-
ρηθῇ, καὶ ὁ λοιπὸς ἀρτίος ἔσται.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ, περισοῦς ἀφαι-
ρηθῇ, καὶ ὁ λοιπὸς περισοῦς ἔσται.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ περισοῦ ἀριθμοῦ περισοῦς ἀ-
φαιρηθῇ καὶ ὁ λοιπὸς ἀρτίος ἔσται.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ περισοῦ ἀριθμοῦ ἄρτιος ἀφαιρη-
θῇ, ὁ λοιπὸς περισοῦς ἔσται.

Πρότασις κη. Θεώρημα.

Εάν περισοῦ ἀριθμὸς ἄρτιον πολλαπλα-
σιάσῃ πινὰ, ὁ γενόμενος ἀρτίος ἔσται.

Πρότασις κθ. Θεώρημα.

Εάν περισοῦ ἀριθμὸς περισοῦν ἀριθ-
μὸν πολλαπλασιάσῃ πινὰ, ὁ γενόμενος
περισοῦς ἔσται.

πρότα-

Propositio 23. Theorema.

Si aliquot numeri impares componantur,
& illorum multitudo fuerit impar: totus eti-
am numerus impar erit.

Propositio 24. Theorema.

Si à numero pari auferatur numerus par,
etiam reliquus numerus par erit.

Propositio 25. Theorema.

Si à numero pari, numerus impar aufera-
tur: etiam reliquus impar erit.

Propositio 26. Theorema.

Si à numero impari auferatur numerus
impar: etiam reliquus par erit.

Propositio 27. Theorema.

Si à numero impari auferatur numerus
par: etiam reliquus numerus impar erit.

Propositio 28. Theorema.

Si numerus impar numerum parem mul-
tiplicauerit: ac fecerit aliquem, is qui fit nu-
merus, par erit.

Propositio 29. Theorema.

Si numerus impar numerum imparem
multiplicauerit ac produxerit aliquem: is qui
producitur est impar.

πρώτασις λ. θεώρημα.

Εὰν περισοῦς ἀριθμὸς ἄρτιον ἀριθμὸν
μετρῆ, καὶ τὸν ἡμισὺ αὐτῶ μετρῆσθ.

πρώτασις λᾶ. θεώρημα.

Εὰν περισοῦς ἀριθμὸς πρὸς τινὰ ἀριθ-
μὸν πρῶτῶ ἢ, καὶ πρὸς τὸν διπλασίον αὐ-
τῶ πρῶτῶ ἔσται,

πρώτασις λβ. θεώρημα.

Τῶν ἀπὸ δυάδῶ διπλασιαζομένων ἀ-
ριθμῶν ἀρτιάκις ἄρτιῶ ἐστὶ μόνον.

πρώτασις λγ. θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς τὸν ἡμισὺ ἔχη περισοῦς,
ἀρτιάκις περισοῦς ἐστὶ μόνον.

πρώτασις λδ. θεώρημα.

Εὰν ἄρτιος ἀριθμὸς μήτε τῶν ἀπὸ δυά-
δῶ διπλασιαζομένων ἢ, μήτε τὸν ἡμισὺ
ἔχη περισοῦς: ἀρτιάκις τε ἄρτιῶ ἐστὶ: καὶ
ἀρτιάκις περίσῳ.

πρώτασις λε. θεώρημα.

Εὰν ὅσιν ὀσοιδηποιοῦν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνά-
λογον, ἀφαιρεθῶσι δὲ ἀπὸ τε τῶ δεύτερου,
καὶ δ' ἐσχάτῳ ἴσος τῶ πρώτῳ: ἔσται ὡς ἡ δ' ἀνά-
τερος ὑπεροχὴ πρὸς τὸν πρώτον, ἔτι ὡς ἡ δ' ἐ-

σχάτῳ

Propositio 30. Theorema.

Si numerus impar numerum parem metietur: etiam dimidium eius metietur.

Propositio 31. Theorema.

Si numerus impar ad aliquem numerum fuerit primus, & ad eius duplum primus erit.

Propositio 32. Theorema.

Numeri qui per binarium numerum duplicantur solum pariter pares sunt.

Propositio 33. Theorema.

Si numerus aliquis dimidium sui habuerit imparem: is erit pariter impar tantum.

Propositio 34. Theorema.

Si numerus par neq; ex ijs erit qui per binarium sunt duplicati: neq; ex ijs qui dimidium sui habent numerum imparem: is erit pariter par: & erit pariter impar.

Propositio 35. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continuè proportionales, & à secundo atq; postremo auferatur numerus, primo æqualis: tum erit ut excessus secundi ad primum, sic excessus postremi

χάτις ὑπεροχὴ πρὸς τὰς πρὸ ἑαυτῶν ἀπείρους.
 Πρότασις λς. θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μονάδος Θ ὅποσοις ἀριθμοὶ ἐξῆς ἐκλεθῶσιν, ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογία ἕως οὗ ὁ σύμπασις σωτεθεὶς πρῶτος Θ γένῃ· καὶ ὁ σύμπασις ἑπὶ τὸν ἕχατον πολλαπλασιασθεὶς ποιῇ τινα ὁ γινόμενος Θ τέλει Θ ἔσται.

Τέλος τῆς ἐπιπέδου στοιχείου.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Συμμετρα μεγέθη λέγεται, τὰ τῶν αὐτῶν μέτρῳ μετρεῖσθαι.

Ἀσύμμετρα δὲ, ὧν μηδὲν ἐνδέχεται κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

Ευθεῖαι διωμάς συμμετροὶ εἰσὶν, ὅταν τὰ ὑπὸ αὐτῶν τετραγῶνα, τῶν αὐτῶν χωρίῳ μετρηθῆται.

Ἀσύμμετροι δὲ, ὅταν τοῖς ὑπὸ αὐτῶν τετραγῶνοις, μηδὲν ἐνδέχεται χωρίον κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

Τέτων

stremi ad omnes qui eum præcedunt.

Propositio 36. Theorema.

Si ab unitate exponantur aliquot numeri continuè proportionales in proportione dupla: donec totus compositus primus fiat: & totus numerus ille in extremum multiplicatus producat aliquem: numerus qui fit erit perfectus.

Finis Libri Noni Elementorum Euclidis.

EVCLIDIS ELEMENTO-
RVM LIBER X.

Definitiones.

Commensurabiles magnitudines illæ dicuntur esse, quas eadē mensura metitur.

Incommensurabiles verò illæ magnitudines dicuntur: quarum nullam cōmunem mensuram contingit inuenire.

Lineæ rectæ potentia cōmensurabiles sunt quarum quadrata vna eademq; superficies metitur.

Lineæ verò rectæ incōmensurabiles sunt, quarum quadrata quæ metiatur ea, nulla inueniri potest.

His

Τῶν ὑποκείμενων, δείκνυται ὅτι τῆ
 παρεθείση δθεία ὑπάρχουσιν δθεία πῶλη
 Ἡάπειροι συμμετροί τε, καὶ ἀσύμμετροι, αἰ
 μὲν, μήκει καὶ δυνάμει, αἰ δὲ δυνάμει μόνον.

Καλείδω ἔν ἡ μὲν παρεθείσα δθεία ρη-
 τή. καὶ αἰ ταύτη σύμμετροι εἶτε μήκει, καὶ
 δυνάμει, εἶτε δυνάμει μόνον, ρηταί.

Αἰ δὲ ταύτη ἀσύμμετροι ἄλογοι καλεί-
 δωσαν. καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς παρεθείσης δ-
 θείας τετραγωνον, ρητόν.

Καὶ τὰ τῶν σύμμετρα ρητὰ. Τὰ ἢ τῶ-
 ν ἀσύμμετρα ἄλογα καλείδω, καὶ αἰ δυ-
 νάμει αὐτὰ, ἄλογοι. Εἰ μὲν τετραγωνο-
 εἶη, αὐτὰ αἰ πλάται, εἰ δὲ ἕτερα πινὰ δθύ-
 γραμμα, αἰ ἴσῃ αὐτῶν τετράγωνα ἀναγνά-
 φουσα ἄλογον καλείδω.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Δ Το μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκείμενων, ἐὰν ἀπὸ
 τῶ μείζονος ἀφαιρεθῆ μείζον, ἢ τὸ ἡμι-
 συ, καὶ τῶ καλαλῆπομένῃ, μείζον ἢ τὸ ἡμισυ, καὶ
 τῶ ἂν γίγηται. λειφθήσεται τι μέγεθος, ὁ
 ἐστὶν ἔλασσον ἐκκείμενον ἐλάσσονος μεγέθους.

Πρότα-

His sic se habentibus ostenditur quod lineæ rectæ datæ, existant aliæ lineæ rectæ innumerabiles partim cōmensurabiles, partim incommensurabiles, aliæ quidem longitudinis et potentia, aliæ verò potentia tantum.

Vocetur igitur linea recta data, $\rho\eta\rho\eta$, rationalis: quæ verò huic lineæ sunt commensurabiles, siue longitudine & potentia, siue potentia tantum: & ipsæ vocentur rationales.

Quæ autem huic lineæ rectæ incommensurabiles sunt, nominentur irrationales.

Quadratum etiam quod à linea proposita rationali describitur, appelletur rationale. Quæ etiam huic sunt commensurabilia nominentur rationalia. Quæ verò ei sunt incommensurabilia nominentur irrationalia aut surda. Lineæ deniq; quæ illa describunt irrationales dicantur, si sit quadratum ipsa latera sunt irrationalia, si verò aliæ figuræ rectilineæ tum lineæ quæ describunt quadrata figuris rectilineis æqualia vocentur irrationales.

Propositio 1. Theorema.

Dubus magnitudinibus in æqualibus propositis, si de maiori detrahatur plus dimidio: & rursus de reliquo iterum detrahatur plus dimidio, idq; semper fiat: relinquetur quædam magnitudo minor altera minore ex duabus propositis.

H. PRO.

Πρότασις β. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγεθῶν ἑκκεκμένων ἀνίσων ἀνι-
θυφαιρμένον αἰετὸν ἔλασσον Θ ἀπὸ τοῦ
μείζονος Θ , τὸ κατὰ τὸ ἴσον μηδέποτε κα-
ταμετρήσῃ τὸ πρὸς ἑαυτῶν, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ
μεγέθη.

Πρότασις γ. πρόβλημα.

Δύο μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων, τὸ μέ-
γιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

Πρότασις δ. πρόβλημα.

Τριῶν μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων, τὸ μέ-
γιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Τὰ σύμμετρα μεγέθη πρὸς ἀλλήλα λό-
γον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη πρὸς ἀλλήλα, λόγον ἔχη
ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, σύμμετρα ἔσται τὰ
μεγέθη.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Τὰ ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς ἀλλήλα,
λόγον οὐκ ἔχει ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν.

Πρό-

Propositio 2. Theorema.

Duabus magnitudinibus propositis inæqualibus, si detrahatur semper minor de maiore, neq; residuum unquam metiatur id quod ante se metiebatur: incommensurabiles erunt illæ magnitudines.

Propositio 3. problema.

Datis duabus magnitudinibus commensurabilibus maximam eorum cõmunem mensuram inuenire.

Propositio 4. problema.

Datis tribus magnitudinibus commensurabilibus, maximam earum communem mensuram inuenire.

Propositio 5. Theorema.

Magnitudines commensurabiles eam inter se habent proportionem, quam numerus ad numerum.

Propositio 6. Theorema.

Si duæ magnitudines eam habeant proportionem quam numerus ad numerum: illæ sunt cõmensurabiles.

Propositio 7. Theorema.

Magnitudines incõmensurabiles eam non habent inter se proportionem quam numerus ad numerum.

H 2 pro

Πρότασις η̄. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη πρὸς ἀλλήλα λόγον μὴ ἔχη ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, ἀσύμμετρα εἴσονται τὰ μεγέθη.

Πρότασις θ̄. Θεώρημα.

Τὰ ἀπὸ τῶν μήκῃ συμμέτρων ὀρθειῶν τετράγωνα, πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχει ὄν τετράγωνος ἀριθμὸς, πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, καὶ τὰ τετράγωνα, τὰ πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχοντα, ὄν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, καὶ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκῃ συμμέτρους, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν μήκῃ ἀσύμμετρων ὀρθειῶν τετράγωνα πρὸς ἀλλήλα, λόγον οὐκ ἔχει ὄν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. καὶ τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἀλλήλα λόγον μὴ ἔχοντα ὄν τετράγωνος ἀριθμὸς, πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, ἔδει τὰς πλευρὰς ἔξει μήκῃ ἀσύμμετρούς.

Πόρισμα.

Καὶ φανερὸν ἔστω ὅτι τῶν δεδειγμένων ὅτι αἱ μήκαι σύμμετροι πάντως καὶ διώαμαι. αἱ δὲ διώαμαι σύμμετροι, ἔσονται καὶ μήκαι, καὶ

Propositio 8. Theorema.

Si duæ magnitudines non habuerint eam proportionem, quam numerus ad numerum, incommensurabiles illæ erunt.

Propositio 9. Theorema.

Quadrata quæ describuntur à rectis lineis longitudine commensurabilibus, inter se proportionem habent quam numerus quadratus ad numerum quadratum. Et quadrata habentia proportionem inter se quam quadratus numerus ad quadratum numerum, habebunt etiam latera longitudine commensurabilia. Quadrata verò quæ describuntur à lineis rectis longitudine incommensurabilibus proportionem non habent inter se quam quadratus numerus ad numerum quadratum: & quadrata non habentia proportionem inter se quàm quadratus numerus ad quadratū neq; latera habebunt longitudine cōmensurabilia.

Corollarium.

Ex iam demonstratis manifestum est lineas longitudine commensurabiles, omnino potentia quoq; esse cōmensurabiles. Quæ verò

H iij poten-

καὶ, καὶ αἱ μήκει ἀσύμμετροι, ἔ πάντως καὶ δύ-
νάμει ἀσύμμετροι, αἱ δὲ δυνάμει ἀσύμμε-
τροι, πάντως καὶ μήκει.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾦ, τὸ δὲ
πρῶτον τῷ δευτέρῳ σύμμετρον ᾦ, καὶ τὸ
τρίτον τῷ τετάρτῳ σύμμετρον ἔσται. καὶ τὸ
πρῶτον τῷ δευτέρῳ ἀσύμμετρον ᾦ, καὶ τὸ
τρίτον τῷ τετάρτῳ ἀσύμμετρον ἔσται.

Πρότασις ια. πρόβλημα.

Τῇ προθεΐσει θεΐα προσθερεῖν δύο ἐυ-
θείας ἀσύμμετρος τῷ μὲν μήκει μόνον τῷ
δὲ καὶ δυνάμει.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Τὰ τῶν αὐτῶν μεγέθη σύμμετρα καὶ ἀλλή-
λοις ἔσσι σύμμετρα.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Ἐὰν ᾦ δύο μεγέθη, καὶ τὸ μὲν σύμμετρον
ᾦ τῷ αὐτῷ τὸ δὲ ἕτερον ἀσύμμετρον, ἀσύμ-
μετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Ἐὰν

rentia sunt commensurabiles non omnino longitudine quoque commensurabiles sunt: & quæ longitudine incommensurabiles sunt, non omnino potentia etiam incommensurabiles esse: quæ verò potentia incommensurabiles sunt omnino etiam longitudine quoque incommensurabiles esse.

Propositio 10. Theorema.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, prima verò secunda fuerit commensurabilis, tertia quoque quarta commensurabilis erit. Quod si prima secunda fuerit incommensurabilis, tertia quoque quarta erit incommensurabilis.

Propositio 11. problema.

Proposita linea recta (quæ nominata est $\epsilon\eta\delta$) inuenire duas lineas rectas incommensurabiles, hanc quidem longitudine tantum, illam verò non longitudine tantum, sed etiam potentia incommensurabilem.

Propositio 12. Theorema.

Magnitudines quæ eidem magnitudini sunt commensurabiles: inter se quoque commensurabiles sunt.

Propositio 13. Theorema.

Si fuerint duæ magnitudines, & altera eidem sit commensurabilis, altera verò incommensurabilis, illæ magnitudines incommensurabiles erunt:

Propositio 14. Theorema.

H 4

Si

Εὰν ἡ δύο μεγέθη σύμμετρα, τὸ δὲ ἕτερον αὐτῶν μεγέθη πρὶ ἀσύμμετρον ἢ, καὶ τὸ λοιπὸν τῶ αὐτῶ ἀσύμμετρον ἔσται.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ὀρθῶς ἀνάλογον ᾦσιν, δύνηται δὲ ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζον, τῶ ἀπὸ συμμέτρων ἑαυτῆ μήκει, καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μείζον διωθήσεται, τῶ ἀπὸ συμμέτρων ἑαυτῆ μήκει, καὶ ἐὰν ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζον διωθήσεται, τῶ ἀπὸ ἀσυμμέτρων ἑαυτῆ μήκει, καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μείζον διωθήσεται τῶ ἀπὸ ἀσυμμέτρων ἑαυτῆ μήκει.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη σύμμετρα σπληθῆ, καὶ τὸ ὅλον ἑκατέρῳ αὐτῶν, σύμμετρον ἔσται, καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶν σύμμετρον ἢ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη σύμμετρα ἔσται.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη ἀσύμμετρα σπληθῆ, καὶ τὸ ὅλον ἑκατέρῳ αὐτῶν ἀσύμμετρον ἔσται. καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶ ἀσύμμετρον ἢ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη ἀσύμμετρα ἔσται.

Πρότα.

Si fuerint duæ magnitudines commensurabiles, & altera illarum alteri cuiuspiam magnitudini sit incommensurabilis, etiam reliqua magnitudo eidem incommensurabilis erit.

Propositio 15. Theorema.

Si quatuor lineæ rectæ proportionales fuerint, posset autem prima plusquam secunda tanto quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine: tertia plus poterit quam quarta tanto quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine, & si prima plus poterit quam secunda tanto quantum est quadratum lineæ sibi incommensurabilis longitudine etiam tertia plus poterit quam quarta tanto quantum est quadratum lineæ sibi incommensurabilis longitudine.

Propositio 16. Theorema.

Si duæ magnitudines commensurabiles componantur, tota magnitudo composita singulis partibus commensurabilis erit. Quod si tota magnitudo composita alterutri parti commensurabilis fuerit: illæ duæ partes commensurabiles erunt.

Propositio 17. Theorema.

Si duæ magnitudines incommensurabiles componantur, ipsa tota magnitudo singulis partibus componentibus incommensurabilis erit. Quod si tota alteri parti fuerit incommensurabilis, illæ quoque primæ magnitudines inter se incommensurabiles erunt.

H v Propo.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Εὰν ὡσι δύο ὁθεΐαι ἀνισοί, τῶ δὲ τετάρτῳ μέρει τῶ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παραλληλόγραμμον παρὰ τῷ μείζονα παραβληθῆ ἔλλείπον εἶδη τετραγώνῳ καὶ εἰς σύμμετρα αὐτῷ διαρεῖ μήκει, ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον διωήσεται, τῶ ἀπὸ συμμέτερος ἐαυτῆς μήκει. καὶ εἰ ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον διωήσεται τῶ ἀπὸ συμμέτερος ἐαυτῆς μήκει, τῶ δὲ τετάρτῳ μέρει τῶ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παραλληλόγραμμον παρὰ τῷ μείζονα παραβληθῆ ἔλλείπον εἶδη τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτῷ διαρεῖ μήκει.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Εὰν ὡσι δύο ὁθεΐαι ἀνισοί, τῶ δὲ τετάρτῳ μέρει τῶ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τῷ μείζονα παραβληθῆ, ἔλλείπον εἶδη τετραγώνῳ, καὶ εἰς ἀσύμμετρα αὐτῷ διαρεῖ μήκει, ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος, μείζον διωήσεται, τῶ ἀπὸ ἀσύμμέτερος ἐαυτῆς, καὶ εἰ ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον διωήσεται, τῶ ἀπὸ ἀσύμμέτερος ἐαυτῆς, τῶ δὲ τετάρτῳ ἴσον ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος, ἴσον παρὰ τῷ μείζονα παραβληθῆ

Propositio 18. Theorema.

Si fuerint duæ rectæ lineæ inæquales, & quartæ parti quadrati quod describitur à minore æquale parallelogrammon applicetur secundum maiorem, ex qua maiore tantum excurrat extra latus parallelogrammi, quantum est alterum latus ipsius parallelogrammi. Si præterea parallelogrammon sui applicatione diuidat lineam illam in partes inter se commensurabiles longitudine: illa maior lineæ tanto plus potest quàm minor, quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine. Quod si maior plus possit quàm minor, tanto quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine: & præterea quartæ parti quadrati lineæ minoris æquale parallelogrammon applicetur secundum maiorem, ex qua maiore tantum excurrat extra latus parallelogrammi, quantum est alterum latus ipsius parallelogrammi parallelogrammum sui applicatione diuidit maiorem in partes inter se longitudinis commensurabiles.

Propositio 19. Theorema.

Si fuerint duæ lineæ rectæ inæquales, quartæ autem parti quadrati lineæ minoris æquale parallelogrammum secundum lineam maiorem applicetur, ex qua lineæ tantum excurrat extra latus parallelogrammi, quantum est alterum latus eiusdem parallelogrammi: si parallelogrammum præterea sui applicatione diuidat lineam in partes se longitudine incommensurabiles, maior illa lineæ tanto plus potest quàm minor: quantum est quadratum lineæ sibi maiori incommen-

Εληθῆ ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς ἀσύμμετρα αὐτῷ διαρῆι μήκη.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ ρητῶν μήκη συμμετρων κατὰ τινα τῶν προειρημένων τρόπων ὀθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ρητόν ἐστιν.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν ρητὸν παρὰ ρητῷ παραβληθῆ, πλάτῃ ποιεῖ ρητῷ καὶ σύμμετρον, τῆ παρῷ παράκρηται μήκει.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ ρητῶν διωάμῃ μόνον συμμετρων ὀθειῶν, περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἄλογόν ἐστι, καὶ ἡ διωαμένη αὐτὸ, ἄλογον ἐστὶ καλείσθω ἡ μέση.

Λήμμα.

Εὰν ὡσι δύο ὀθειῖαι, ἔσιν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τῷ δευτέρῳ, ἔτως τὸ ἀπὸ τῆ πρώτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν δύο ὀθειῶν.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ

commensurabilis longitudine: quod si maior linea tanto plus possit quam minor, quantum est quadratum lineæ commensurabilis sibi longitudine, & præterea quartæ parti quadrati lineæ minoris æquale parallelogrammum applicetur secundum maiorem, ex qua tantum excurrat extra latus parallelogrammi: quantum est alterum latus ipsius: parallelogrammum sui applicatione diuidit maiorem in partes inter se incommensurabiles longitudine.

Propositio 20. Theorema.

Rectangulum quod lineis rectis rationalibus longitudine commensurabilibus secundum vnum aliquem ex prædictis modum continetur rationale est.

Propositio 21. Theorema.

Si rationale secundum lineam rationalem applicetur, habebit alterum latus lineam rationalem & commensurabilem longitudine lineæ cui, rationale parallelogrammon applicatur.

Propositio 22. Theorema.

Rectangulum quod continetur duabus lineis rectis rationalibus potentia tantum commensurabilibus irrationalis est linea autem, quæ illud potest irrationalis & ipsa est vocetur vero medialis.

Lemma.

Si sint duæ lineæ rectæ erit vt prima ad secundam ita quadratum quod à prima describitur ad rectangulum quod duabus illis rectis continetur.

Propositio 23. Theorema.

Quadrata

Τὸ ἀπὸ μέσης παρὰ ῥητῶν παραβαλλόμενον πλάγος ποιεῖ ῥητῶν, καὶ ἀσύμμετρον, τῆ παρ' αὐτῆ παράκλιται μήκει.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μέση σύμμετρον, μέση ἐστίν.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ μέσων μήκει συμμέτρων ὀρθογώνιον ὀρθογώνιον, μέσον ἐστίν.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ μέσων διδάμει μόνον συμμέτρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἤτοι ῥητὸν, ἢ μέσον ἐστίν.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Μέσον μέσος ἐκ ὑπερέχει ῥητῶν.

Λήμμα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων ἐν λόγῳ ὁποιοῦν, καὶ ἄλλος τινός, δεῖν ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν ἀριθμὸν, ἕτως ἔστω πρὸς ἄλλον τινά.

Πρότασις κη. πρόβλημα.

Μέσος δεῖν διδάμει μόνον συμμέτρους, ῥητὸν περιεχέσθαι.

Πρότασις κθ. πρόβλημα.

Μέσος δεῖν διδάμει μόνον συμμέτρους μέσον περιεχέσθαι.

Quadratum lineæ medialis applicatum secundum lineam rationalem alterum latus habet lineam rationalem & incommensurabilem longitudine lineæ rectæ secundum quam applicatur.

Propositio 24. Theorema.

Recta quæ lineæ rectæ mediali commensurabilis est & ipsa medialis est.

Propositio 25. Theorema.

Rectangulum quod continetur lineis rectis mediis longitudine commensurabilibus mediale est.

Propositio 26. Theorema.

Rectangulum quod continetur lineis rectis mediis potentia tantum commensurabilibus vel est rationale vel mediale.

Propositio 27. Theorema.

Mediale non est maius mediali superficie rationali.

Lemma.

Duobus numeris datis in quacunque ratione & alio numero etiam dato efficere ut se habet numerus ad numerum, ita se habeat ille ad alium aliquem numerum.

Propositio 28. problema.

Mediales inuenire potentia tantum commensurabiles rationale comprehendentes.

Propositio 29. problema.

Mediales inuenire potentia tantum commensurabiles mediale continententes.

LEM-

Λήμμα.

Εὐρεῖν δύο τετραγώνους ἀριθμούς, ὡς τε τὸν συγκείμενον, ἐξ αὐτῶν εἶναι τετράγωνον.

Λήμμα.

Εὐρεῖν δύο τετραγώνους ἀριθμούς, ὡς τε τὸν ἐξ αὐτῶν συγκείμενον μὴ εἶναι τετράγωνον.

Λήμμα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων καὶ ὀρθῆς δέου ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν, πρὸς τὸν ἀριθμὸν: ἕτως τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς τετράγωνον, πρὸς τὸ ἀπὸ ἄλλης πινός.

Πρότασις λ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν δύο ῥητὰς διωάμει μόνον συμμετρῆς ὡς τε πλὴν μείζονα τῆς ἐλάττω καὶ μείζον διώασθαι τῷ ἀπὸ συμμετρῆς ἐαυτῆς μήκει.

Λήμμα.

Εὐρεῖν δύο ῥητὰς, διωάμει μόνον συμμετρῆς ὡς τε πλὴν μείζονα τῆς ἐλάττω καὶ μείζον διώασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῆς μήκει.

Λήμμα.

Εὰν ὡσι δύο ὀρθῆαι ἐν λόγῳ πινί, ἕσται ὡς ἡ ἐυθεῖα πρὸς πλὴν ὀρθῆαν: ἕτως τὸ ὑπὸ τῶν δύο πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης.

Πρότα.

Inuenire duos nūeros quadratos tales, vt qui ex ipsis compositus est sit quadratus.

Lemma.

Inuenire duos numeros quadratos tales, vt numerus ex ipsis compositus non sit quadratus.

Lemma.

Duobus numeris datis & linea recta data efficere, vt sicut numerus ad numerum, sic quadratum quod à linea describitur se habeat ad quadratum quod ab alia linea recta describitur.

Propositio 30. problema.

Duas rectas rationales potentia tantum commensurabiles inuenire: ita vt maior plus possit quam minor quadrato, quod describitur à linea recta longitudine sibi commensurabili.

Lemma.

Duas rationales potentia tantum cōmensurabiles inuenire, ita vt maior plus possit quam minor quadrato, quod à linea longitudine sibi incommensurabili describitur.

Lemma.

Si fuerint duæ lineæ rectæ in quadam ratione erit vt recta ad rectam: sic rectangulū quod duabus rectis continetur ad quadratū à minima descriptum.

I Propo.

Πρότασις λα. πρόβλημα.

Εὑρεῖν δύο μέσους δυνάμει μόνον συμμετρῆς ῥητὸν περιεχούσας: ὥστε τὴν μείζονα εἰλάσσειν Θ μείζον δυνάμει τῆ ἀπὸ συμμετρῆς ἐαυτῆς μήκει.

Λήμμα.

Εὰν ὡς τρεῖς ὀρθαῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην ἕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ ἐλαχίστης.

Πρότασις λβ. πρόβλημα.

Εὑρεῖν δύο μέσους δυνάμει μόνον συμμετρῆς, μέσον περιεχούσας, ὥστε τὴν μείζονα εἰλάσσειν Θ μείζον δυνάμει, τῆ ἀπὸ συμμετρῆς ἐαυτῆς.

Πρότασις λγ. πρόβλημα.

Εὑρεῖν δύο ὀρθαῖας δυνάμει ἀσυμμέτρῆς, ποῖσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητὸν, τὸ δὲ ὑπὸ αὐτῶν μέσον.

Πρότασις λδ. πρόβλημα.

Εὑρεῖν δύο ἑυθείας δυνάμει ἀσυμμέτρῆς, ποῖσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων

τετραγώνων

Propositio 31. problema.

Inuenire duas mediales potentia tantum
cōmensurabiles rationale continentes, ita vt
maior plus possit minore: quadrato quod de-
scribitur à recta lōgitudine sibi cōmensurabili

Lemma.

Si fuerint tres lineæ in quadam ratione:
erit vt prima ad tertiam sic rectangulū quod
prima & media continetur ad rectangulum
quod media & maiore continetur.

Propositio 32. Problema.

Duas mediales potentia tantum commen-
surabiles mediale continentes inuenire ita vt
maior plus possit quā minor quadrato, quod
à recta sibi commensurabili describitur.

Propositio 33. Problema.

Duas rectas potentia incommensurabiles
inuenire, quæ faciant compositum ex quadra-
tis quæ ab ipsis describuntur rationale: rectan-
gulum verò illis contentum mediale.

Propositio 34. problema.

Duas rectas potentia incommensurabi-
les inuenire: quæ faciant compositum ex qua-

I ij dra.

τετραγώνων μέσον τὸ δ' ὑπὸ αὐτῶν ῥητὸν.

Πρότασις λδ. πρῶτον βήμα.

Εὐρεῖν δύο εὐθείας διωάμει ἀσύμμετρος, ποίσεις τότε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, καὶ τὸ ὑπὸ αὐτῶν μέσον, καὶ ἐπὶ ἀσύμμετρον πᾶσι συγκείμενα ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων.

Πρότασις λε. θεώρημα.

Εὰν δύο ῥηταὶ διωάμει μόνον σύμμετροι σωτηθῶσιν, ἢ ὅλη ἀλογος ἐστίν, καλεῖσθω δ' ἐκ δύο ὀνομάτων.

Πρότασις λς. θεώρημα.

Εὰν δύο μέσων διωάμει μόνον σύμμετροι σωτηθῶσιν ῥητὸν περιέχουσι, ἢ ὅλη ἀλογος ἐστίν, καλεῖσθω δ' ἐκ δύο μέσων πρῶτη.

Πρότασις λη. θεώρημα.

Εὰν δύο μέσων διωάμει μόνον σύμμετροι σωτηθῶσιν μέσον περιέχουσι, ἢ ὅλη ἀλογος ἐστίν, καλεῖσθω δ' ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

Πρότασις λθ. θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθείαι διωάμει ἀσύμμετροι σωτηθῶσιν, ποίσει τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητὸν, τὸ δ' ὑπὸ αὐτῶν

τῶν

dratis ab ipsis descriptis mediale: rectangulū
verò ipsis rectis comprehensum rationale.

Propositio 35. Problema.

Duas rectas potentia incommensurabiles
inuenire, quæ faciant compositum ex quadra-
tis, quæ ab ipsis describuntur mediale: & quod
ipsis continetur rectangulum mediale præte-
rea incommensurabile composito ex quadra-
tis quæ ab ipsis describuntur.

Propositio 36. Theorema.

Si duæ rationales potentia tantum com-
mensurabiles componantur, tota linea recta
irrationalis est vocetur autem binomium.

Propositio 37. Theorema.

Si fuerint duæ mediales potentia tantum com-
mensurabiles compositæ continentis rationale tota irratio-
nalis erit, & vocetur bimediale, aut ex duabus me-
dialibus prima.

Propositio 38. Theorema.

Si duæ mediales potentia tantum commensurabi-
les componantur mediale continentis: tota irratio-
nalis erit. vocetur autem bimediale secundum.

Propositio 39. Theorema.

Si duæ rectæ potentia commensurabiles componan-
tur consicientes compositum ex quadratis ipsarum ra-
tionale

I ij

τῶν μέσον, ἢ ὅλη εὐθεΐα ἀλογός ἐστι, καλεῖσθαι
δὲ μείζων.

Πρότασις μ. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεΐαι διωάμη ἀσύμμετροι
σωτεθῶσι ποιῆσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
αὐτῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ἐπὶ
αὐτῶν ῥητὸν ἢ ὅλη εὐθεΐα ἀλογός ἐστι, καλεῖ-
σθαι δὲ ῥητὸν ἢ μέσον διωαμένη.

Πρότασις μα. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεΐαι διωάμη ἀσύμμετροι
σωτεθῶσι, ποιῆσαι τότε συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, καὶ τὸ ἐπὶ
αὐτῶν μέσον, καὶ ἐπ' ἀσύμμετρον τῶ συγκη-
μένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων, ἢ ὅλη
εὐθεΐα ἀλογός ἐστι, καλεῖσθαι δὲ δύο μέσοι
διωαμένη.

Πρότασις μβ. Θεώρημα.

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων, καθ' ἓν μόνον σημεῖον
διαρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μγ. Θεώρημα.

Ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη, καθ' ἓν μόνον ση-
μεῖον διαρεῖται, εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρό-

tionale & rectangulum quod illis continetur
mediale tota linea recta est irrationalis, vo-
cetur autem linea maior.

Propositio 40. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ potentia incommensurabiles
componantur conficientes compositum ex ipsarū qua-
dratis mediale: id verò quod sit ex ipsis rationale, tota
linea est irrationalis. Vocetur autem potens rationale
& mediale.

Propositio 41. Theorema.

Si duæ rectæ potentia incommensurabiles
componantur conficiētes compositum ex qua-
dratis ipsarum mediale: & quod continetur
ex ipsis mediale: atq; præterea incommensu-
rabilis composito ex quadratis illarum recta-
rum: tota linea est irrationalis, & vocetur ea
potens duo medialia.

Propositio 42. Theorema.

Binomium in vnico tantum puncto diui-
ditur in sua nomina, id est in lineas ex quibus
componitur.

Propositio 43. Theorema.

Bimediale prius in vnico tantum pun-
cto diuiditur in sua nomina.

Πρότασις μδ. Θεώρημα.

Ἡ ἐκ δύο μέσων δευτέρα, καθ' ἓν μόνον σημείον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις με. Θεώρημα.

Ἡ μείζων κατὰ τὸ αὐτὸ μόνον σημείον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μς. Θεώρημα.

Ἡ ῥητὴν ἢ μέσον διωαμένη, καθ' ἓν μόνον σημείον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μζ. Θεώρημα.

Ἡ δύο μέσα διωαμένη, καθ' ἓν μόνον σημείον διαιρεῖται, εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μη. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.

Πρότασις μθ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρα.

Πρότασις ν. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτην.

Πρότασις να. Θεώρημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην.

Πρότασις νβ. Θεώρημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτην.

Πρότα-

Propositio 44. Theorema.

Bimediale secundū in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 45. Theorema.

Linea maior in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 46. Theorema.

Linea recta potens rationale & mediale, in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 47. Theorema.

Linea potens duo medialia in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 48. Problema.

Inuenire binomium primum.

Propositio 49. Problema.

Inuenire binomium secundum.

Propositio 50. problema.

Inuenire binomium tertium.

Propositio 51. problema.

Inuenire binomium quartum.

Propositio 52. problema.

Inuenire binomium quintum.

I v Pro-

πρώταις νγ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτίω.

πρώταις νδ. θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ρητῆς καὶ ἑ
ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης, ἢ τὸ χωρίον διωα-
μένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ἐκ δύο ὀνομά-
των.

πρώταις νε. θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ρητῆς καὶ
τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας, ἢ τὸ χω-
ρίον διωαμένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ἐκ
δύο μέσων πρώτη.

πρώταις νς. θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ρητῆς καὶ
τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης, ἢ τὸ χωρίον
διωαμένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ἐκ δύο
μέσων δευτέρα.

πρώταις νζ. θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ρητῆς, καὶ
ἑ ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης, ἢ τὸ χωρίον
διωαμένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη μείζων.

πρώταις νη. θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ρητῆς καὶ ἑ
ἐκ δύο

Propositio 53. problema.

Inuenire binomium sextum.

Propositio 54. Theorema.

Si superficies aliqua contenta fuerit rationali & binomiali primo, linea quæ illam potest superficiem est irrationalis, quæ nominatur binomium.

Propositio 55. Theorema.

Si superficies aliqua continetur rationali & binomiali secundo, linea, quæ illam potest rationalis est, quæ nominatur bimediale primum.

Propositio 56. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio tertio, recta quæ illam potest irrationalis est, quæ vocatur bimediale secundum.

Propositio 57. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio quarto, recta quæ illam potest irrationalis est, & vocatur maior.

Propositio 58. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio

ἐκ δύο ὀνομάτων πᾶν πῆλιν, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη, ἄλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένη.

Πρότασις νθ. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ἐκείνης, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη, ἄλογός ἐστιν ἢ καλεσμένη δύο μέσων διωαμένη.

Πρότασις ξ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων παρὰ ῥητῆν παραβαλλόμενον, πλάτος, ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.

Πρότασις ξα. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων πρώτης παρὰ ῥητῆν παραβαλλόμενον πλάτος ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας.

Πρότασις ξβ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέρας παρὰ ῥητῆν παραβαλλόμενον πλάτος ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτην.

Πρότασις ξγ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς μείζονος παρὰ ῥητῆν παραβαλλόμενον πλάτος ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην.

nomio quinto, recta quæ illam potest irrationalis est, quæ vocatur potens rationale & mediale.

Propositio 59. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio sexto, recta quæ illam potest irrationalis est quæ vocatur potens duo medialia.

Propositio 60. Theorema.

Quadratum binomij applicatum lineæ rationali facit alterum latus binomium primū.

Propositio 61. Theorema.

Quadratum bimedialis primi applicatum rationali alterum latus facit binomium secundum.

Propositio 62. Theorema.

Quadratum bimedialis secundi rationali applicatum, facit alterum latus binomium tertium.

Propositio 63. Theorema.

Quadratum lineæ maioris applicatum rationali: facit alterum latus binomium quartum.

Pro-

Πρότασις ξδ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένης
παρὰ ῥητῶ παραβαλλόμενον, πλάτος ποιῆ
τῶ ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτην.

Πρότασις ξε. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς δύο μέσα διωαμένης παρὰ
ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάτ Θ , ποιῆ τῶ
ἐκ δύο ὀνομάτων ἕκτην.

Πρότασις ξς. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετρος,
καὶ αὐτῆ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ, καὶ τῆ τάξει
ἢ αὐτῆ.

Πρότασις ξζ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ἐκ δύο μέσων μήκει σύμμετρος Θ ,
ἐκ δύο μέσων ἐστὶ, καὶ τῆ τάξει ἢ αὐτῆ.

Πρότασις ξη. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μείζονι σύμμετρος, καὶ αὐτῆ μείζων
ἐστίν.

Πρότασις ξθ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένη σύμμε-
τρος Θ , καὶ αὐτῆ ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένη
ἐστίν.

πρό-

Propositio 64. Theorema.

Quadratum lineæ potentis rationale & mediale, applicatum rationali: facit alterum latus binomium quintum.

Propositio 65. Theorema.

Quadratum lineæ potentis duo medialia applicatum rationali facit alterum latus binomium sextum.

Propositio 66. Theorema.

Linea longitudine commensurabilis binomio: & ipsa binomium est, & eiusdem ordinis.

Propositio 67. Theorema.

Linea longitudine commensurabilis bimediali, & ipso bimediale est, & eiusdem ordinis.

Propositio 68. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ maiori, & ipsa maior est.

Propositio 69. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ potenti rationale & mediale & ipsa potens rationale et mediale est.

Propo-

πρότασις ο. Θεώρημα.

Ἡ τῆ δύο μέσαι διωαμένη σύμμετρος, δύο μέσαι διωαμένη ἐσίν.

πρότασις οα. Θεώρημα.

Ῥητῶ καὶ μέσῃ στυπημένῃ, τέσσαρες ἄλογοι γίνονται, ἢ ἐκ δύο ὀνομάτων, ἢ ἐκ δύο μέσων πρώτη, ἢ μείζων, ἢ καὶ ῤητὸν ἐ μέσον διωαμένη.

Πρότασις οβ. Θεώρημα.

Δύο μέσων ἀσύμμετρων ἀλλήλοις στυπημένων, αἱ λοιπαὶ δύο ἄλογοι γίνονται, ἢ τῶ ἢ ἐκ δύο μέσων δευτέρα, ἢ ἡ δύο μέσαι διωαμένη.

Δευτέρα τάξις ἐτέρων λόγων τῶν
κατὰ ἀφάρεσιν.

Ἀρχὴ τῶν κατὰ ἀφάρεσιν ἐξάδων.

Πρότασις ογ. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀπὸ ῤητῆς ῤητῆ ἀφαιρεθῆ, διωαμὴ μόνον σύμμετρος ἔσται τῆ ὅλη, ἢ λοιπῆ ἄλογος ἐσὶ, καλεῖσθω δὲ ἀποτομή.

πρότα-

Propositio 70. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ potenti duo medialia & ipsa potens est duo medialia.

Propositio 71. Theorema.

Si duæ superficies rationalis & medialis componantur, linea, quæ totam superficiem compositam potest, est una ex quatuor irrationalibus, vel ea quæ dicitur binomium, vel bimediale primum, vel linea maior, vel lineæ potens rationale & mediale.

Propositio 72. Theorema.

Si duæ superficies mediales incommensurabiles componantur, fient duæ reliquæ lineæ irrationales vel bimediale secundum, vel lineæ potens duo medialia.

Secundus ordo alterius orationis
quæ est de subtractione.

Principium senariorum per subtractionem.

Propositio 73. Theorema.

Si à rationali auferatur rationalis potentia tantum commensurabilis ipsi toti: tum reliqua irrationalis est, vocetur autem residuum.

K Pro-

Πρότασις οδ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῆ, δινώμει
μόνον σύμμετρος ἔσονται τῆ ὅλη, μετὰ δὲ τῆς
ὅλης ῥητὸν περιέχῃ, ἢ λοιπὴ ἄλογος ἔσῃ, κα
λεῖσθαι δὲ μέσης ἀποτομὴ πρῶτη.

πρότασις οε. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῆ δινώμει
μόνον σύμμετρος ἔσονται τῆ ὅλη, μετὰ δὲ τῆς ὅ
λης μέσον περιέχῃ, ἢ λοιπὴ ἄλογος ἔσῃ,
καλεῖσθαι δὲ μέσης ἀποτομὴ δευτέρα.

πρότασις ος. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ ὀρθείας ὀρθεία ἀφαιρεθῆ, δι
νώμει ἀσύμμετρος ἔσονται τῆ ὅλη, μετὰ δὲ τῆς
ὅλης πρῶτον τὸ μὲν ἀπὸ αὐτῶν ἅμα ῥητὸν,
τὸ δὲ ὑπὸ αὐτῶν μέσον, ἢ λοιπὴ ἄλογος ἔ
σῃ, καλεῖσθαι δὲ ἐλάσεων.

Πρότασις οζ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ ὀρθείας ὀρθεία ἀφαιρεθῆ δινώ
μει ἀσύμμετρος οὖσα τῆ ὅλη, μετὰ δὲ τῆς ὅλης
πρῶτον τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ αὐτῶν
τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ ὀρθὸν ὑπὸ αὐτῶν ῥη
του

Propositio 74. Theorema.

Si à linea mediali auferatur medialis potentia tantum commensurabilis ipsi toti, quæ verò ablata est cum tota contineat superficiem rationalem, residua irrationalis est, vocetur autem residuum mediale primum.

Propositio 75. Theorema.

Si de linea mediali detrahatur medialis potentia tantum commensurabilis toti: quæ vero detracta est cum tota contineat superficiem medialem reliqua irrationalis est, vocetur autem residuum mediale secundum.

Propositio 76. Theorema.

Si auferatur à linea recta, quædam alia potentia incömensurabilis toti, compositum autem ex quadratis totius lineæ et lineæ ablatæ sit rationale: & quod illis continetur sit mediale, reliqua linea irrationalis erit, vocetur autem linea minor.

Propositio 77. Theorema.

Si à linea recta auferatur recta potentia incommensurabilis toti lineæ, compositum autem ex quadratis totius & lineæ ablatæ sit mediale, quod verò illis continetur sit rationale reliqua linea irrationalis erit vo-

K z totu

τὸν ἢ λοιπὴν ἄλογον ἐστὶ, καλεῖσθαι δὲ μετὰ
ρήτῃ μέσον τὸ ὅλον ποιῆσαι.

Πρότασις οη. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀπὸ Διθείας Διθεῖα ἀΦαιρεθῆ, διωά-
μῃ ἀσύμμετρον ἔσται τῆ ὅλη, μὲν δὲ τῆς ὅλης
ποιῆσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶ ἀπὸ αὐτῶν
τετραγώνων μέσον, ἐπὶ δὲ τὰ ἀπὸ αὐτῶν τε-
τραγωνα ἀσύμμετρα τὰ δις ἕσται αὐτῶν, ἢ
λοιπὴν ἄλογος ἐστὶ, καλεῖσθαι δὲ ἢ μὲν μέσου,
μέσον τὸ ὅλον ποιῆσαι.

Πρότασις οβ. Θεώρημα.

Τῆ ἀποτομῆ, μία μόνον προσαρμόζει Δι-
θεῖα ρητῇ δυνάμει μόνον σύμμετρον ἔσται τῆ
ὅλη.

Πρότασις ω. Θεώρημα.

Τῆ μέση ἀποτομῆ πρώτη μόνον μία προ-
σαρμόζει Διθεῖα μέση, διωάμῃ μόνον σύμμε-
τρον ἔσται τῆ ὅλη, μὲν δὲ τῆς ὅλης ρητὸν πο-
ιῆσαι.

Πρότασις πα. Θεώρημα.

Τῆ μέση ἀποτομῆ δευτέρα μία μόνον
προσαρμόζει Διθεῖα μέση, διωάμῃ μόνον σύμ-
μετρον ἔσται τῆ ὅλη, μὲν δὲ τῆς ὅλης μέσον
ποιῆσαι.

ctetur autem linea faciens cum superficie rationali totam superficiem medialem.

Propositio 78. Theorema.

Si à linea recta auferatur recta potentia incōmensurabilis toti lineæ, compositum autem ex quadratis totius & lineæ detractæ sit mediale, quod verò illis continetur etiam sit mediale: præterea quadrata ipsarum sunt incommensurabilia ei quod illis continetur: reliqua linea irrationalis est, vocetur autem linea faciens cum superficie mediali totam superficiem medialem.

Propositio 79. Theorema.

Residuo vnica tantum linea recta coniungitur rationalis potentia tantum commensurabilis toti lineæ.

Propositio 80. Theorema.

Residuo mediali primo vnica tantum linea coniungitur medialis potentia tantum commensurabilis toti, ipsa cum tota, continens rationale.

Propositio 81. Theorema.

Residuo mediali secundo vnica tantum coniungitur medialis potentia tantum cōmensurabilis toti, ipsa cum tota cōtinens mediale.

Πρότασις πβ. Θεώρημα.

Τῆ ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζῃ θεία δύναμις ἀσύμμετρος ἔσται τῆ ὅλη ποιούσα μὲν τῆς ὅλης, τὸ μὲν ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητὸν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον.

Πρότασις πγ. Θεώρημα.

Τῆ μετὰ ῥητῶν μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα μία μόνον προσαρμόζῃ θεία, δύναμις ἀσύμμετρος ἔσται τῆ ὅλη: μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιῶσα τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ῥητὸν.

Πρότασις πδ. Θεώρημα.

Τῆ μετὰ μέσων μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα, μία μόνον προσαρμόζῃ θεία, δύναμις ἀσύμμετρος ἔσται τῆ ὅλη: μὲν δὲ τῆς ὅλης ποιῶσα τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον, καὶ ἐπὶ ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν, τὰ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν.

Πρότασις πε. πρόβλημα.

Ἐυρεῖν πῶς πρῶτῳ ἀποδομῶ.

Ἐρέ-

Propositio 82. Theorema.

Linea minori vnica tantum recta coniungitur potentia incommensurabilis toti faciens cum tota compositum ex quadratis ipsarū rationale: id verò quod illis cōtinetur mediale.

Propositio 83. Theorema.

Linea facienti cum superficie rationali totam superficiem medialem vnica tantū coniungitur linea recta potentia incōmensurabilis toti: faciens autem cum tota compositum ex quadratis ipsarum mediale id verò quod fit ex ipsis rationale.

Propositio 84. Theorema.

Linea cum mediali superficie facienti totam superficiem medialem vnica tantum coniungitur linea potentia toti incōmensurabilis, faciēs cum tota compositum ex quadratis ipsarū mediale: id verò quod fit ex ipsis etiam mediale, & præterea faciens compositum ex quadratis ipsarum incōmensurabile ei quod ex ipsis fit.

Propositio 85. problema.

Primum residuum inuenire.

K 4

Propo-

Πρότασις πγ. πρόβλημα.
Εύρεῖν τὴν δίδυτέραν ἀποτομὴν.

Πρότασις πδ. πρόβλημα.
Εύρεῖν τὴν τρίτην ἀποτομὴν.

Πρότασις πε. πρόβλημα.
Εύρεῖν τὴν τέταρτην ἀποτομὴν.

Πρότασις πθ. πρόβλημα.
Εύρεῖν τὴν πέμπτην ἀποτομὴν.

Πρότασις ς. πρόβλημα.
Εύρεῖν τὴν ἕκτην ἀποτομὴν.

Πρότασις ζα. θεώρημα.
Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς πρώτης ἢ τὸ χωρίον διωαμένη, ἀποτομὴ ἐστίν.

Πρότασις ζβ. θεώρημα.
Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς δίδυτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη μέσης ἀποτομῆς ἐστὶ πρώτη.

Πρότασις ζγ. θεώρημα.
Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς τρίτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη μέσης ἀποτομῆς ἐστὶ δίδυτη.

πρό-

Propositio 86. problema.

Secundum residuum inuenire.

Propositio 87. problema.

Tertium residuum inuenire.

Propositio 88. problema.

Quartum residuum inuenire.

Propositio 89. problema.

Quintum residuum inuenire.

Propositio 90. problema.

Sextum residuum inuenire.

Propositio 91. Theorema.

Si superficies contineatur linea rationali,
& residuo primo linea quæ illam superficiem
potest, est residuum.

Propositio 92. Theorema.

Si superficies contineatur linea rationali
& residuo secundo, linea quæ illam superficiem
potest, est residuum mediale primum.

Propositio 93. Theorema.

Si superficies continetur linea rationali,
& residuo tertio, linea quæ illam superficiem
potest, est residuum rationale secundum.

K v Pro-

Πρότασις ἕδ. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιεχῆται ὑπὸ ῥητῆς, καὶ ἀπομοῆς τετάρτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένῃ ἐλάσων ἐστὶ.

Πρότασις ἕε. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιεχῆται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀπομοῆς πέμπτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένῃ μὲ ῥητῆ μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα ἐστὶ.

Πρότασις ἕς. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιεχῆται ὑπὸ ῥητῆς, καὶ ἀπομοῆς ἑκτῆς, ἢ τὸ χωρίον διωαμένῃ μὲ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα ἐστὶ.

Πρότασις ἕζ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ἀπομοῆς παρὰ ῥητῶν παραβαλλόμενον πλάττει ποιῶσα ἀπομοῆς πρῶτης.

Πρότασις ἕη. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀπομοῆς πρῶτης, παρὰ ῥητῶν παραβαλλόμενον πλάττει ποιῶσα ἀπομοῆς δευτέρας.

Πρότασις ἕθ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀπομοῆς δευτέρας παρὰ ῥητῶν

Propositio 94. Theorema.

Si superficies continetur rationali & residuo quarto recta quæ illam potest superficiem est minor linea.

Propositio 95. Theorema.

Si superficies continetur rationali & residuo quinto, recta quæ illam superficiem potest, est ea quæ dicitur cum rationali faciens totam medialem.

Propositio 96. Theorema.

Si superficies continetur rationali, & residuo sexto, recta quæ illam potest est ea quæ dicitur faciens cum mediali totam medialem.

Propositio 97. Theorema.

Quadratum residui secundum lineam rationalem applicatum, facit alterum latus residuum primum.

Propositio 98. Theorema.

Quadratum residui medialis primi applicatum rationali facit alterum latus residuum secundum.

Propositio 99. Theorema.

Quadratum residui medialis secundi applica-

ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάττει ποιῆ δόπομιῶ τρίτῳ.

Πρότασις ρ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ελάσσονος πλάττει ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάττει ποιῆ ἀπομομιῶ τετάρτῳ.

Πρότασις ρα. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ ῥητῆ μέσον τὸ ὅλον ποιῆσις πλάττει ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάττει ποιῆ δόπομιῶ πέμπτῳ.

Πρότασις ρβ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιῆσις πλάττει ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάττει ποιῆ δόπομιῶ ἕκτῳ.

Πρότασις ργ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ δόπομιῶ μήκει σύμμετρος, δόπομιῶ μὴ ἐστὶν καὶ τῆ τάξεσσι αὐτῆ.

Πρότασις ρδ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μέση δόπομιῶ σύμμετρος, μέση ἀπομομιῶ ἐστὶν, καὶ τῆ τάξεσσι αὐτῆ.

Πρό-

applicatum rationali facit alterum latus residuum tertium.

Propositio 100. Theorema.

Quadratum lineæ minoris, applicatum rationali, facit alterum latus residuum quartum.

Propositio 101. Theorema.

Quadratum lineæ cum rationali superficie facientis totam medialem applicatum rationali facit alterum latus residuum quintum.

Propositio 102. Theorema.

Quadratum lineæ cum mediali superficie facientis totam medialem applicatum rationali facit alterum latus residuum sextum.

Propositio 103. Theorema.

Linea recta cōmensurabilis residuo longitudine, est & ipsa residuum & eiusdem ordinis.

Propositio 104. Theorema.

Linea commensurabilis residuo mediali, est & ipsa residuum mediale, & eiusdem ordinis.

Propo-

Πρότασις ρε. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ἐλάσσονι σύμμετρον \odot ἐλάσσων ἐστίν.

Πρότασις ρς. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μὲν ῥητῶν μέσον τὸ ὅλον ποιῶσιν σύμμετρον \odot , καὶ αὐτὴ μετὰ ῥητῶν μέσον τὸ ὅλον ποιῶσιν ἐστίν.

Πρότασις ρζ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μὲν μέσων μέσον τὸ ὅλον ποιῶσιν σύμμετρον \odot , καὶ αὐτὴ μετὰ μέσων μέσον τὸ ὅλον ποιῶσιν ἐστίν.

Πρότασις ρη. Θεώρημα.

Ἀπὸ ῥητῶν μέσων ἀφαιρεθέντων, ἢ τὸ λοιπὸν χωρίον διωαμένη, μία δύο ἀλέγων γίνεται, ἢ τοι ἀποτομὴ ἢ ἐλάττων.

Πρότασις ρθ. Θεώρημα.

Ἀπὸ μέσων ῥητῶν ἀφαιρεθέντων, ἄλλαι δύο ἀλογοὶ γίνονται, ἢ τοι μέσων ἀποτομὴ πρώτη, ἢ μετὰ ῥητῶν τὸ ὅλον ποιῶσιν.

πρότα.

Propositio 105. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ minori & ipsa linea minor est.

Propositio 106. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ cum rationali superficie facienti totam medialem, est & ipsa linea cum rationali superficie faciens totam medialem.

Propositio 107. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ cum mediali superficie facienti totam medialem commensurabilis est, & ipsa cum mediali superficie faciens totam medialem.

Propositio 108. Theorema.

Si auferatur de superficie rationali superficies medialis, linea quæ reliquam superficiem potest est alterutrum ex duabus irrationalibus aut residuum aut linea minor.

Propositio 109. Theorema.

Si auferatur à superficie mediali rationalis superficies, aliæ duæ irrationales fiunt aut residuum mediale primum, aut cum rationale superficie faciens totam medialem.

Pro-

Πρότασις ρι. Θεώρημα.

Από μέσθ, μέσθ ἀφαιραμένεσ ἀσυμμέτρησ
πῶ ὅλω, αἱ λοιπαὶ δύο ἄλογοι γίνονται, ἥτις
μέσθ διποιομῆ δὲ δύτερα, ἢ μὲν μέσθ μέσον το
ὅλον ποιῶσαι.

Πρότασις ρια. Θεώρημα.

Ἡ διποιομῆ ἐστὶν ἢ αὐτῇ τῇ ἐκ δύο ὀ-
νομάτων.

Πρότασις ριβ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ρητῆσ παρὰ πῶ ἐκ δύο ὀνομάτων
παραβαλλόμενον, πλάττει ποιῆ διποιομῆ
ἥσ τὰ ὀνόματα σύμμετρα ἐστὶ τοῖσ ἐκ δύο ὀνο-
μάτων ὀνόμασι, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ λόγῳ, ἔστι
ἢ γινομένη διποιομῆ, πῶ αὐτῶ ἔχει τάξιν,
τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

Πρότασις ριγ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ρητῆσ παρὰ διποιομῆσ παραβαλ-
λόμενον πλάττει ποιῆ, πῶ ἐκ δύο ὀνομά-
των, ἥσ τὰ ὀνόματα, σύμμετρα τῆσ διποιομῆσ
ὀνόμασι, καὶ ἐν τὰ αὐτὰ λόγῳ. ἐπὶ δὲ ἢ γινο-
μένη ἐκ δύο ὀνομάτων πῶ αὐτῶ τάξιν ἔ-
χει τῇ διποιομῆ.

πρότα-

Propositio 110. Theorema.

Si auferatur à mediali superficies medialis incommensurabilis toti: fiunt reliquæ duæ irracionales aut residuum mediale secundum aut cum mediali superficie faciens totam mediam.

Propositio 111. Theorema.

Linea quæ residuum dicitur non est eadē cum ea quæ binomium appellatur.

Propositio 112. Theorema.

Quadratum lineæ rationalis applicatum binomio, facit alterum latus residuum, cuius nomina sunt commensurabilia binomij nominibus, & ei eadem proportione: præterea id quod fit residuum eundem ordinem retinet quem binomium.

Propositio 113. Theorema.

Quadratum lineæ rationalis applicatum residuo: facit alterum latus binomium, cuius nomina sunt commensurabilia nominibus residui & in eadem proportione, præterea id quod fit binomium est eiusdem ordinis cuius & residuum.

L Propo-

Πρότασις ριδ. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ διπολομῆς, καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων, ἧς τὰ ὀνόματα σύμμετρα ἔσιν τοῖς τῆς διπολομῆς ὀνόμασι, καὶ ἐπιπέδῳ αὐτῷ λόγῳ ἢ τὸ χωρίον διωαμένη ρητῇ ἔσῃ.

Πρότασις ριε. Θεώρημα.

Απὸ μέσης ἄπειροι ἄλογοι γίνονται, καὶ ἕδεμια ἕδεμια τῶν προτέρων ἢ αὐτῇ.

Πρότασις ρις. Θεώρημα.

Προκείμενῳ ἡμῖν δεῖξαι, ὅτι ἅπλῃ τῶν τετραγώνων σχημάτων, ἀσύμμετρον ἔστιν ἢ ἀσύμμετρον τῇ πλάτῃ μήκει.

Τέλος τῆς δεκάτης συχίας.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΪΟΝ β',
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Στερεόν ἐστὶ τὸ μήκῳ, καὶ πλάτῳ, καὶ βάθῳ ἔχον.

Στερεῶν δὲ πέντε ἔστι φάνηται.

Εὐθεῖα

Propositio 114. Theorema.

Si superficies continetur residuo & binomio, cuius nomina sunt commensurabilia nominibus residui & in eadē proportionē, lineā quā illam superficiem potest esse rationalis.

Propositio 115. Theorema.

Ex lineā mediali nascuntur innumerabiles lineā irrationales, quarum nulla cum ante dictis sit eadem.

Propositio 116. Theorema.

Propositum nobis sit demonstrare in figuris quadratis diametrum esse longitudinē incommensurabilem ipsi lateri.

Finis Decimi Libri.

EVCLIDIS ELEMENTO-
RVM VNDECIMVS ET STEREO-
metriæ primus.

Definitiones.

Corpus solidum est quod habet longitudinem, latitudinem, & profunditatē.

Corporis solidi extremitas est superficies.

L ij Li-

Εὐθεία πρὸς ἴπιπεδον ὀρθὴ ἔστιν, ὅταν πρὸς
 πάσας τὰς ἀπιόμενας αὐτῆς εὐθείας, καὶ
 ἕσας ἐν ταῖς αὐτῆς ὑποκείμενῳ ἐπιπέδῳ, ὀρ-
 θὰς ποιῆ γωνίας.

Επιπέδον πρὸς ἴπιπεδον ὀρθον ἔστιν, ὅταν
 αἰτῆ κοινῆ τομῆ τῶν ἴπιπέδων πρὸς ὀρθὰς
 ἀγόμεναι εὐθείαι ἐν ἐνὶ τῶν ἴπιπέδων, τα-
 λοιπῶν ἴπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ᾖσιν.

Εὐθείας πρὸς ἴπιπεδον κλίσις ἔστιν, ὅταν ἀ-
 πὸ τῆ μετεώρου πέρατος \odot τῆς εὐθείας ἴπι
 τὸ ἴπιπεδον κάσεται \odot ἀχθῆ, καὶ ἀπὸ τῆ γε-
 νομένης σημείας, καὶ ἀπὸ τῆ ἐν ταῖς ἴπιπέδῳ
 πέρατος \odot τῆς εὐθείας, εὐθεῖα ἴπιζυχθῆ,
 ἢ περιεχομένη ὀξεία γωνία ὑπὸ τῆς ἀχ-
 θείσης καὶ τῆς ἐφεσώσης.

Επιπέδον πρὸς ἴπιπεδον κλίσις ἔστιν, ἢ
 περιεχομένη ὀξεία γωνία, ὑπὸ τῶν πρὸς ὀρ-
 θὰς τῆ κοινῆ τομῆ ἀγομένων, πρὸς ταῖς αὐτῆς
 σημείῳ ἐν ἐκατέρῳ τῶν ἴπιπέδων.

Επιπέδον πρὸς ἴπιπεδον ὁμοίως κεκλί-
 σθαι λέγεται, καὶ ἕτερον πρὸς ἕτερον, ὅταν αἰε-
 ρημέναι τῶν κλίσεων γωνία ἴσθαι ἀλλήλαις
 ᾖσι.

Παράλ-

Linea recta ad planum aliquod dicetur esse erecta, quando illa linea recta ad omnes quæ eam tangunt & in eodem subiecto plano existunt rectas, fecerit angulos rectos.

Planum ad alterum planum erit erectum quando lineæ rectæ ad angulos rectos ductæ in communi planorum intersectione in altero planorum, reliquo plano ad angulos rectos fuerint.

Lineæ rectæ ad planum inclinatio erit, quando à puncto sublimi ad ipsum planum ducta fuerit lineæ rectæ perpendicularis & à puncto facto, atq; extremitate vna lineæ rectæ in plano ducatur linea recta, angulus inquam ille acutus, quem continent linea recta ducta & recta linea perpendicularis.

Plani inclinatio ad planum erit angulus acutus, quem continent lineæ rectæ ad angulos rectos ductæ in communi sectione, ad vñ idemq; punctum in vtroq; plano.

Planum ad aliud planum similiter inclinatum esse dicitur, & aliud quoddam planum ad aliud planum: quando anguli inclinationum fuerint æquales inter se.

Παράλληλα ὀπίπεδα ἐστὶ τὰ ἀσύμπτω-
τα. Ὁμοια στερεὰ σχήματα ἐστὶ, τὰ ὑπὸ ὁμοί-
ων ὀπιπέδων περιεχόμενα, ἴσων τῷ πλῆθει.

Ἰσα ἢ καὶ ὁμοια στερεὰ σχήματα ἐστὶ, τὰ ὑπὸ
ὁμοίων ὀπιπέδων περιεχόμενα, ἴσων τῷ πλῆ-
θει καὶ τῷ μεγέθει.

Στερεὰ γωνία ἐστὶν, ἢ ὑπὸ πλειόνων ἢ δύο
γραμμῶν ἀπιομένων ἀλλήλων, καὶ μὴ ἐν τῇ
αὐτῇ ὀπιφανείᾳ ἕσῶν πρὸς πᾶσας τὰς
γραμμὰς κλίσις.

Στερεὰ γωνία ἐστὶν, ἢ ὑπὸ πλειόνων ἢ δύο
ὀπιπέδων γωνιῶν περιεχομένη, μὴ ἕσῶν
ἐν τῷ αὐτῷ ὀπιπέδῳ, πρὸς ἐνὶ σημείῳ συνι-
σταμένων.

Πυραμὶς ἐστὶ σχῆμα στερεὸν ὀπιπέδοις πε-
ριεχόμενον ἀπὸ ἐνὸς ὀπιπέδου πρὸς ἐνὶ ση-
μείῳ συνεσῶς.

Πρίσμα ἐστὶ σχῆμα στερεῶν, ὀπιπέδοις πε-
ριεχόμενον, ὧν δύο τὰ ἀπεναντίον, ἴσα τὲ καὶ
ὁμοια ἐστὶ, καὶ παράλληλα τὰ δὲ λοιπὰ, πα-
ραλληλόγραμμα.

Σφαιρὰ ἐστὶν, ὅταν ἡμικυκλίᾳ κέντρους ἢ
διὰ μέτρος, περιελεχθῆν τὸ ἡμικύκλιον, εἰς τὸ
αὐτὸ

Plana æquedistantia sunt, quæ nunquam concurrunt.

Figuræ solidæ similes sunt: quæ continentur planis similibus & numero æqualibus.

Æquales verò & similes figuræ solidæ sunt, quæ planis cõtinentur similibus, æqualibus numero, & magnitudine.

Angulus solidus est plurimum quam duarum linearum rectorum sese mutuo tangentium, & in vno plano minime existetium ad omnes lineas inclinatio. Aliter.

Angulus solidus est qui pluribus quàm duobus angulis planis cõtinetur, qui non in eodẽ sunt plano, & ad vnũ constituuntur punctum.

Pyramis est figura solida planis contenta, quæ constituitur ex vno plano ad vnum aliquod punctum.

Prisma est figura solida planis contenta, quorum duo opposita æqualia & similia atque æquedistantia sunt, reliqua verò parallelogramma.

Sphæra est figura solida, quæ fit quando manente semicirculi diametro ipse semicir-

L. 4. culus

αὐτὸ πάλιν ἀποκτείνῃ, ὅθεν ἤρξατο φέρε-
σθαι, τὸ περιληφθὲν σχῆμα.

Αξῶν δὲ τῆς σφαιρας ἐσὶν, ἡ μὲν οὖσα δι-
θεῖα, ὡς ἰὺ τὸ ἡμικύκλιον ἐρέφεται.

Κέντρον δὲ τῆς σφαιρας ἐστὶ τὸ αὐτὸ, ὃ καὶ
τῆ ἡμικυκλίας.

Διάμετροι δὲ τῆς σφαιρας ἐσὶν, διθεῖα
τίς διὰ τῶ κέντρον ἡγμένη, καὶ περαταμέ-
νη ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη, ὑπὸ τῆς ἐπιφα-
νείας τῆς σφαιρας.

Κῶν δὲ ἐσὶν, ὅταν ὀρθογωνίαις τριγῶνας με-
νίσσης πλήρως, τῶν ὡς ἰὺ τὴν ὀρθὴν γωνίαν,
ὡς ἐνεχθὲν τὸ τρίγωνον, εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν
ἀποκατεσθῆ, ὅπεν ἤρξατο φερέσθαι τὸ πε-
ριληφθὲν σχῆμα, καὶ ἡ μὲν οὖσα διθεῖα ἴση ἢ
τῇ λοιπῇ τῇ ὡς ἰὺ τὴν ὀρθὴν περὶ φερομένη
ὀρθογωνίᾳ ἐσται κῶν, εἰὰ ἢ ἐλάττω, ἀμ-
βλυγωνίᾳ, εἰὰ δὲ μείζων, ὀξυγωνίος.

Αξῶν δὲ ἔκκῶν ἐσὶν, ἡ μὲν οὖσα ὡς ἰὺ τὸ
τρίγωνον ἐρέφεται.

Βάσις δὲ οὐ κύκλι δὲ ὑπὸ τῆς περιφε-
ρομένης διθεῖας γραφόμεναι.

Κύλινδρος δὲ, ὅταν ὀρθογωνίαις παραλλη-
λογραμ-

culus circumducitur, donec in eundem restitatur locum vnde coeperat moueri.

Axis sphaerae est linea recta fixa manens circa quam semicirculus voluitur.

Centrum verò sphaerae est illud ipsum quod & semicirculi.

Diameter sphaerae est linea recta per centrum ducta, quae terminatur ex utraque parte sphaerae circumferentia.

Conus est figura solida quae fit quando manente alicuius trianguli rectanguli latere vno ex ijs quae angulum continent rectum ipse triangulus circumducitur & restituitur in locum vnde coeperat moueri, quod si igitur linea recta manens fuerit aequalis, reliquo lateri circumducto & angulum rectum continenti tum conus erit rectangulus, si verò minor, amblygonius, si denique maior oxygonius.

Axis coni est recta illa manens circa quam voluitur triangulus.

Basis eius circulus qui describitur per lineam rectam quae circumducitur.

Cylindrus est figura solida, quae fit quan-

L v do

λοζάμμος μινύσης μιᾶς πλ.δρᾶς τῶν πε-
 ρὶ τῆν ὀρθὴν περιεμένχθεν τὸ παραλληλό-
 γραμμον, εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἄποκατασταθῆ-
 ῖθεν ἤρξατο Φερέαδς, τὸ πείληφθεν σχῆμα.

Αξων δὲ ἕκκυλίνδρος εἰσὶν ἡ μίνισου Ὀθεία
 περὶ τὴν τὸ παραλληλόγραμμον ερέφεται.

Βάσις ἣ οἱ κύκλοι οἱ ὑπὸ τῶν ἀπεναντί-
 ον περιεγομένων δύο πλ.δρῶν γραφόμενοι.

Ομοιοὶ κῶνοι, καὶ κύλινδροι εἰσὶν ὧν οἱ τε ἄ-
 ξωνες, καὶ αἱ διαμέτροι τῶν βάσεων ἀνάλο-
 γον εἰσὶν.

Κύβος εἰς σχῆμα στερεὸν ὑπὸ ἕξ τετρα-
 γώνων ἴσων περιεχομένη.

Τετραέδρον εἰς σχῆμα ὑπὸ τετάρων τρι-
 γώνων ἴσων, καὶ ἴσων πλ.δρῶν περιεχομένη.

Οκτάεδρον εἰς σχῆμα στερεὸν ὑπὸ ὀκτῶ
 τριγώνων ἴσων, καὶ ἴσων πλ.δρῶν περιεχο-
 μένη.

Δωδεκάεδρον εἰς σχῆμα στερεὸν ὑπὸ δώ-
 δεκα πενταγώνων ἴσων καὶ ἴσων πλ.δρῶν, καὶ
 ἴσων γωνίων περιεχομένη.

do parallelogrammi alicuius reſtanguſi vno ex lateribus quæ angulum continent reſtum manente, ipſum parallelogrammon circunducitur, donec in eundem reſtituatur locum vnde cœperat moueri.

Axis cylindri eſt linea reſta quæ immobilis permanet, & circa quam ipſum vertitur parallelogrammon.

Baſis verò circuli illi qui deſcribuntur à duobus oppoſitis lateribus, quæ circumuoluntur.

Similes conii & cylindri ſunt, quorum & axes & diametri, baſiũ proportionales ſunt.

Cubus eſt figura ſolida ſex æqualibus quadratis contenta.

Tetraedron eſt figura ſolida quæ quatuor triangulis æqualibus & æqualium laterum exiſtentibus continetur.

Octaedron eſt figura ſolida quæ octo triangulis æqualibus, & æqualium laterum exiſtentibus continetur.

Dodecaedron eſt figura ſolida duodecim pentagonis æqualibus & æqualium laterum & angulorum æqualium continetur.

Εἰκοσάεδρον ἐστὶ γῆμα σφαιρὸν ὑπὸ εἰκο-
σιν τριγώνων ἴσων καὶ ἰσοπλευρῶν ἑκαε-
μυρον.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Εὐθείας γραμμῆς μέρϑ μῆνοι σφκ ἐστὶ
ἐν τῷ ὑποκείμενῷ ἑπιπέδῳ, μέρϑ δέ πῶ
τῷ μετεώρῳ.

Πρότασις β. Θεώρημα.

Εὰν δύο ὀρθαὶ τέμνωσιν ἀλλήλας, ἐνέ-
νι εἰσὶν ἑπιπέδῳ, καὶ πᾶν τρίγωνον ἐν ἐνέ-
τι ἐπιπέδῳ.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἑπίπεδα τέμνη ἀλλήλα, ἡ κοινὴ
κῶτῶν τμῆ ὀρθαὶ ἐστὶ.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθαὶ δύο ὀρθαὶς τεμνέσθαι ἀλλή-
λας πρὸς ὀρθὰς ἑπι τῆς κοινῆς τμῆς ἑπιση-
θῆ, ἔ τῷ δι' αὐτῶν ἑπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστῶ.

Πρότασις ε. Πρόβλημα.

Εὰν ὀρθαὶ τρισὶν ταῖς εὐθείαις ἀπιόμε-
ναις ἀλλήλων πρὸς ὀρθὰς ἑπι τῆς κοινῆς τμῆς
ἑπισηθῆ, αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἐν ἐνὶ εἰσὶν ἑπιπέ-
δῳ.

Πρό

Ecofaedron est figura solida quæ viginti
triangulis æqualibus & æqualium laterum
continetur.

Propositiones.

Propositio 1. Theorema.

Pars alicuius lineæ non erit in plano sub-
iecto & eiusdem alia pars in sublimi.

Propositio 2. Theorema.

Si duæ rectæ lineæ sese secant erunt illæ in
eodem plano, & omnis triangulus in vno est
plano.

Propositio 3. Theorema.

Si duo plana sese mutuo secant communi
illorum sectio est linea recta.

Propositio 4. Theorema.

Si recta linea duabus rectis sese mutuo se-
cantibus fuerit ad angulos rectos ducta, et ad
communem intersectionem constituta: erit eti-
am ei plano ad angulos rectos constituta, quod
per ipsos ducitur.

Propositio 5. Theorema.

Si recta linea tribus rectis sese mutuo tangentibus
ad angulos rectos in communi sectione fuerit consti-
tuta: illæ tres lineæ rectæ in vno eodemq; sunt plano.

Propo-

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν δύο ὀρθαῖαι ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ὡς, παράλληλοι ἔσονται αἱ ὀρθαῖαι.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν ὡς δύο ὀρθαῖαι παράλληλοι ληφθῆ
 δεῖ ἐφ' ἐκατέρως αὐτῶν τυχόντα σημεῖα·
 ἔπι τὰ σημεῖα ἔπιζυγυμένη ὀρθαῖα, ἐν τῷ
 αὐτῷ ἔπιπέδῳ ἐστὶ ταῖς παραλλήλοις.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν ὡς δύο εὐθεῖαι παράλληλοι, ἡ δὲ ἑ-
 τέρα αὐτῶν ἐπιπέδῳ πνὶ πρὸς ὀρθὰς ἦ, καὶ
 ἡ λοιποὴ τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Αἱ τῆ αὐτῆ εὐθεῖα παράλληλοι, καὶ μὴ ἔσται
 αὐτῆ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ: καὶ ἀλλήλαις εἰσι
 παράλληλοι.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεῖαι ἀπὸ μέρους ἀλλήλων, πρὸς
 εἰς δύο εὐθείας ἀπομένους ἀλλήλων ὡς, μὴ ἐν
 τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἴσας γωνίας περιέξωσι.

Πρό-

Propositio 6. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ in eodem plano ad angulos rectos fuerint constitutæ: illæ rectæ æquedistantes inter se erunt.

Propositio 7. Theorema.

Si fuerint duæ lineæ rectæ æquedistantes: sumantur autem in utraq; illarum quævis puncta: recta quæ duo ista puncta coniungit in eodem plano est cū lineis æquedistantibus.

Propositio 8. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ æquedistantes fuerint, & altera illarum, alicui plano ad angulos rectos fuerit: etiam reliqua eidem plano ad angulos rectos erit.

Propositio 9. Theorema.

Quæ eidem lineæ rectæ æquedistantes sunt, & non fuerint cum ipsa in eodem plano: etiã inter se æquedistantes erunt.

Propositio 10. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ sese mutuò tangentes fuerint positæ ad duas lineas sese mutuò tangentes non in eodem plano: æquales continebunt angulos.

Pro-

Πρότασις ια. πρόβλημα.

Απὸ τῆς δοθέντος σημείου μετῴρου ἑπιπέδου ἑπιπέδου, κάθετον εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Τῷ δοθέντι ἐπιπέδῳ, ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὸ δοθέντος σημείου, πρὸς ὀρθὰς εὐθείαν γραμμὴν ἀναστῆσαι.

Πρότασις ιγ. πρόβλημα.

Τῷ δοθέντι ἐπιπέδῳ, ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὸ σημείου, * δύο εὐθείαι πρὸς ὀρθὰς εὐκ' ἀναστῆσονται ἑπι τὰ αὐτὰ μέρη.

* *Aliter*, ἀπὸ τῆς αὐτῆς σημείου τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Πρὸς ἅ ἐπίπεδα ἢ αὐτῇ εὐθείᾳ ὀρθῇ ἐστὶ, παράλληλα ἐστὶ τὰ ἐπίπεδα.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθείαι ἀπὸ μέρους ἀλλήλων, περὶ δύο εὐθείας ἀπὸ μέρους ἀλλήλων ὡς, μὴ ἐπι τὰ αὐτὰ ἐπίπεδα ἔσται, παράλληλα ἐστὶ τὰ δι' αὐτῶν ἑπίπεδα.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἑπίπεδα παράλληλα ἔσται ἑπιπέδου

Propositio 11. problema.

A dato puncto in sublimi existente ad subiectum planum perpendiculararem lineam rectam ducere.

Propositio 12. Problema.

Dato plano à puncto quod in eo est lineam rectam ad angulos rectos ductam erigere.

Propositio 13. problema.

Dato plano à puncto quod in eo est * duæ rectæ lineæ ad angulos rectos nõ erigentur in easdem partes.

* Aliter ab eodem puncto eidem plano.

Propositio 14. Theorema.

Ad quæcunq; plana eadem linea recta, est recta seu ad angulos rectos ducta; ea plana inter se æquedistantia sunt.

Propositio 15. Theorema.

Si duæ rectæ sese mutuò tangentes, fuerint ad duas alias sese mutuò tangentes, non fuerint etiam in eodem plano, plana quæ per ipsa ducuntur sunt æquedistantia.

Propositio 16. Theorema.

Si duo plana æquedistantia aliud quoddã

M pla-

πέδω πρὸς τέμνηται, αἱ κριναὶ αὐτῶν τομαὶ
παράλληλοι εἰσι.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθείαι ὑπὸ παραλλήλων ἑπι-
πέδων τέμνωνται, εἰς τὰς αὐτὰς λόγους τμη-
θήσονται.

πρότασις ιη. Θεώρημα.

Εὰν εὐθεῖα ἐπιπέδῳ πνὶ πρὸς ὀρθὰς ἦ, καὶ
πάντα τὰ δι' αὐτῆς ἑπίπεδα πρὸς αὐτῷ ἐπι-
πέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἑπίπεδα τέμνωνται ἄλληλα ἐπι-
πέδῳ πνὶ πρὸς ὀρθὰς ἦ, καὶ ἡ κρινὴ αὐτῶν
τομῆ πρὸς αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εὰν σφραγὰ γωνία, ὑπὸ τριῶν γωνιῶν ἐπι-
πέδων περιέχηται δύο ὁποιαῦν τῆς λοιπῆς
μείζονες εἰσι πάντα μεταλαμβάνοντα.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Ἀπασα σφραγὰ γωνία ὑπὸ ἐλασσόνων ἢ
τεσσάρων ὀρθῶν γωνιῶν ἐπιπέδων περιέχεται.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

planum secet: communes eorum sectiones æquedistantes sunt.

Propositio 17. Theorema.

Si duas rectas secant duo plana æquedistantia in easdem illas secabunt rationes.

Propositio 18. Theorema.

Si recta quedam cuidam plano fuerit ad angulos rectos constituta: etiam omnia plana qua per ipsa ducuntur, eidem plano ad angulos rectos erunt.

Propositio 19. Theorema.

Si duo plana sese mutuò secantia cuidam plano fuerint ad angulos rectos constituta: etiam communis illorum sectio, eidem plano, ad angulos rectos erit constituta.

Propositio 20. Theorema.

Si angulus solidus tribus angulis planis continetur, duo ex illis quicunq; fuerint, maiores sunt reliquo, quocunq; sumantur modo.

Propositio 21. Theorema.

Omnis angulus solidus, continetur paucioribus quàm quatuor planis, ijsq; rectis angulis.

Propositio 22. problema.

M 2 Si

Εὰν ὡς τρεῖς γωνίαι ἴππέδοι ὧν αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσὶ πάνη μεταλαμβανόμενα, περιέχωσι δὲ αὐτὰς ἴσην εὐθείαν διωατὸν ἐστὶν ἐκ τῶν ἐπιζευγνυσῶν τὰς ἰσας εὐθείας τρίγωνον συστήσασθαι.

Πρότασις κγ. πρόβλημα.

Εκ τριῶν γωνιῶν ἐπιπέδων, ὧν αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσὶ πάνη μεταλαμβανόμενα σερεῖαν γωνίαν συστήσασθαι: δεῖ δὲ τὰς τρεῖς πεισάρων ὀρθῶν ἐλάσσονας εἶναι.

Πρότασις κδ. θεώρημα.

Εὰν σερεῶν ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων περιέχῃται, τὰ ἀπεναντίον αὐτῶν ἴππέδοι ἴσα τε καὶ παραλληλόγραμμα ἐστὶ.

Πρότασις κε. θεώρημα.

Εὰν σερεὸν παραλληλεπίπεδον ἐπιπέδων τμηθῆ παραλλήλων ὄντων τοῖς ἀπὸ ἐναντίον ἐπιπέδοις, ἔσται ὡς ἡ βάσις πρὸς τὴν ἑσῖν, ἔστω τὸ σερεὸν πρὸς τὸ σερεὸν.

Πρότασις κς. θεώρημα.

Πρὸς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ, καὶ τῇ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῇ δοθείσῃ σερεῖαν γωνία, ἴσως σερεῖαν γωνίαν συστήσασθαι.

Si fuerint tres anguli plani, quorum duo maiores sunt reliquo, quouis modo sumpti: eosq; contineant rectæ æquales: constitui potest triangulus ex rectis, quæ illas rectas æquales coniungunt.

Propositio 23. problema.

Ex tribus angulis planis, quorū duo maiores sunt reliquo, quocunq; sumantur modo, angulum solidum constituere, oportet verò illos tres, quatuor rectis minores esse.

Propositio 24. Theorema.

Si solidum aliquod continetur planis æquedistantibus: plana opposita huic solido æqualia & parallelogramma sunt.

Propositio 25. Theorema.

Si solidum parallelepipedon plano secetur quod æquedistat planis oppositis: erit ut basis ab basin, sic solidum ad solidum.

Propositio 26. Problema.

Ad datā rectam & ad datum in ea punctum dato angulo solido, æqualem angulum solidum constituere.

Propositio 27. Problema.

M 3 A

Πρότασις κζ. *θεώρημα.*

Απὸ τῆς δοθείσης εὐθείας, τῷ δοθέντι σφ. ρεῶ παραλληλεπίπεδῳ, ὁμοίον τε ἑομοίως κείμενον σφερόν παραλληλεπίπεδον ἀναγεῖναι.

Πρότασις κη. *θεώρημα.*

Εὰν σφερόν παραλληλεπίπεδον, ἐπιπέδῳ τμηθῆ, κατὰ τὰς διαγωνίους τῶν ἀπ' ἐκαστίου ἐπιπέδων, δίχα τμηθήσεται τὸ σφερόν ὑπὸ τῶν ἐπιπέδων.

Πρότασις κθ. *θεώρημα.*

Τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα σφερά παραλληλεπίπεδα, καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψώων αἰ ἐφεσῶσται ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἰσὶν ἐυκταῖ, ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶν.

Πρότασις λ. *θεώρημα.*

Τὰ ἴπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα σφερά παραλληλεπίπεδα, καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψώων αἰ ἐφεσῶσται ὅτι εἰσὶν ἴπὶ τῶν αὐτῶν εὐκτων, ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶν.

Πρότασις λα. *θεώρημα.*

Τὰ ἴπὶ ἴσων βάσεων ὄντα σφερά παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψώων, ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶν.

A data linea recta dato solido parallelepipedo simile & similiter positum solidum parallelepipedon describere.

Propositio 28. Theorema.

Si solidum parallelepipedon plano aliquo secetur, tum & illud ipsum solidum secabitur in duas æquales partes à plano per lineas diagonales eorum planorum quæ opposita sunt.

Propositio 29. Theorema.

Solida parallelepipeda quæ super eadem basi sunt constituta: & sub eadem altitudine, quorum lineæ erectæ vel cõstitutæ in eisdem sunt lineis rectis: illa inter se sunt æqualia.

Propositio 30. Theorema.

Solida parallelepipeda super eadem basi constituta, & sub eadem altitudine, quorum lineæ constitutæ, non sunt in eisdem lineis rectis, æqualia inter se sunt.

Propositio 31. Theorema.

Solida parallelepipeda super basibus æqualibus constituta, & sub eadem altitudine illa sunt æqualia inter se.

M 4 Pro-

Πρότασις λβ. Θεώρημα.

Τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψοῦσιν ὄντα σερεὰ παραλληλεπίπεδα πρὸς ἄλληλα εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις.

Πρότασις λγ. Θεώρημα.

Τὰ ὅμοια σερεὰ παραλληλεπίπεδα πρὸς ἄλληλα ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁμολόγων πλῆθῶν.

Πρότασις λδ. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων σερεῶν παραλληλεπίπεδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψοῦσι: Καὶ ὧν σερεῶν παραλληλεπίπεδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψοῦσιν, ἴσαι εἰσὶν ἑκείνα.

Πρότασις λε. Θεώρημα.

Εὰν ὡς δύο γωνίαὶ ἐπίπεδοι ἴσῃ, ἑπὶ δὲ τῶν κορυφῶν αὐτῶν μετέωροι εὐθεῖαι ἐπιχθῶσιν, ἴσας γωνίας περιέχουσαι, μὲν τῶν ἐξ ἀρχῆς εὐθειῶν ἐκάτεραν ἐκατέρᾳ, ἑπὶ δὲ τῶν μετεώρων ληφθῆναι τυχόντα σημεῖα, καὶ ἀπὸ αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα ἐν οἷς εἰσὶν αἱ ἐξ ἀρχῆς γωνίαὶ κάμψαι ἀχθῶσιν ἀπὸ δὲ τῶν γενομένων σημεῖων ὑπὸ τῶν καθέτων ἐπὶ τοῖς ἐπίπεδοις, ἐπιτῆς ἐξ ἀρχῆς γωνίας ἐπιχθῶ-

Propositio 32. Theorema.

Solida parallelepipedæ sub eadem altitudine constituta: sese habent vt ipsæ bases.

Propositio 33. Theorema.

Similia solida parallelepipedæ sese habent in ratione homologorum laterum triplicata.

Propositio 34. Theorema.

Æqualium solidorum parallelepipedorū reciproca sunt bases altitudinibus. Et quorum solidorum parallelepipedorum reciproca sunt bases altitudinibus illa æqualia inter se sunt.

Propositio 35. Theorema.

Si fuerint duo anguli plani æquales, & in illorum verticibus sublimes constituentur lineæ rectæ, continentes cum lineis ab initio propositis angulos æquales alterum alteri: & in lineis sublimioribus sumantur quævis puncta, à quibus ad plana, in quibus sunt anguli ab initio positi, ducantur perpendiculares: deniq; à iam factis punctis per ipsas perpendiculares in planis ad angulos, ab initio propositos ductæ fuerint lineæ rectæ: illæ cum

M v lineis

χθῶσιν ἑυθεῖαι, ἴσας γωνίας περιέξουσιν
τῶν μετεώρων.

Πρότασις λς. Θεώρημα.

Εὰν τρεῖς ἑυθεῖαι ἀνάλογον ᾧσι, τὸ ἐκ
τῶν τριῶν σφαιρῶν παραλληλεπίπεδον ἴσιν
ἔσιν τὰ ἀπὸ τῆς μέσης σφαιρῶ παραλληλεπι-
πέδῳ ἰσοπλευρῶ μὲν ἰσογωνίῳ δὲ τῷ περι-
επιμένῳ.

Πρότασις λζ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ἑυθεῖαι ἀνάλογον ᾧσι, καὶ
τὰ ἀπ' αὐτῶν παραλληλεπίπεδα, ὁμοία τε
καὶ ὁμοίως ἀναγραφοῦντα ἀνάλογον ἔσται, καὶ
εἰ καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν σφαιρὰ παραλληλεπίπε-
δα ὁμοία τε, καὶ ὁμοίως ἀναγραφοῦντα ἀνά-
λογον ἦ, ἔσονται αἱ ἑυθεῖαι ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις λη. Θεώρημα.

Εὰν ἄρα ἐπίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὀρθὸν ἦ,
καὶ ἀπὸ τινος σημείου τῶν ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέ-
δων ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐπίπεδον κάθηται ἀχθῆ,
ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς πεσεῖται τῶν ἐπιπέδων
ἡ ἀγομένη κάθηται.

Πρότασις λθ. Θεώρημα.

Εὰν σφαιρῶ παραλληλεπίπεδα τῶν ἀπὸ
ἐναν-

lineis sublimioribus æquales angulos continent.

Propositio 36. Theorema.

Si tres lineæ rectæ fuerint proportionales solidum parallelepipedon quod ex illis tribus rectis fit, est æquale solido parallelepipedo æquilatèro quod describitur à linea mediâ & æquales angulos habenti cum præcedente.

Propositio 37. Theorema.

Si quatuor rectæ proportionales fuerint, etiam parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia erunt. & si solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia fuerint, etiam ipsæ lineæ rectæ proportionales erunt.

Propositio 38. Theorema.

Si planum aliquod ad aliud planum fuerit erectum, & à puncto aliquo quod in altero planorum est ad alterum planum ducatur perpendicularis: illa cadet in communem planorum sectionem.

Propositio 39. Theorema.

Si solidi parallelepipedi latera planorum
oppositi-

ἐναλίον ἐπιπέδων αἰ πλάται δίχα τμηθή-
σι, Διὰ δὲ τῶν τομῶν ἐπίπεδα ἐκβληθῆ, ἢ
κρινὴ τομῆ τῶν ἐπιπέδων, καὶ ἢ τῶν σφαιρῶν πα-
ραλληλεπιπέδων Διὰ μέτρων \odot δίχα τέμνε-
σιν ἀλλήλας.

Πρότασις μ. Θεώρημα.

Εὰν ἢ δύο πρίσματα ἰσοῦνται, καὶ τὸ μὲν
ἔχῃ βάσιν παραλληλόγραμμον, τὸ δὲ τρίγωνον
διπλάσιον δὲ ἢ τὸ παραλληλόγραμμον
τῶν τριγώνων, ἴσα ἔσται τὰ πρίσματα.

Τέλος \odot τῶν ἰσχυρῶν.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β.

καὶ σφαιρῶν β.

Πρότασις α. Θεώρημα.

ΤΑ ἐν τοῖς κύκλοις ὅμοια πολύγωνα
πρὸς ἀλλήλα ἐσὶν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν Διὰ
μέτρων τετράγωνα.

πρότασις β. Θεώρημα.

Οἱ κύκλοι πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς τὰ ἀπὸ
τῶν Διὰ μέτρων τετράγωνα.

Πρότα-

oppositorum fuerint secta in duas partes æquales: & per ipsas sectiones ducantur plana: communis planorum sectio, & diameter solidi parallelepipedi sese mutuò secant in duas partes æquales.

Propositio 40. Theorema.

Si fuerint duo prismata eiusdem altitudinis, quorum alterum basin habeat parallelogrammon: alterum verò triangulum atq; parallelogrammon sit trianguli duplum: illa duo prismata æqualia sunt.

Finis Libri Vndecimi.

EVCLIDIS LIBER DVODE-
CIMVS ELEMENTORVM ET
Stereometriæ primus.

Propositio 1. Theorema.

Polygona similia quæ in circulis sunt ad sese mutuò habent, vt quadrata quæ à diametris describuntur.

Propositio 2. Theorema.

Circuli ita sese mutuò habent, vt quadrata quæ à diametris describuntur.

πρότασις γ. θεώρημα.

Πᾶσα πυραμὶς τρίγωνον ἔχουσα βάσιν, διαρῆται εἰς δύο πυραμίδας ἴσας τε καὶ ὁμοίας ἀλλήλαις τρίγωνος βάσεως ἔχουσας, καὶ ὁμοίως τῆ ὅλη, καὶ εἰς δύο πρίσματα ἴσα, καὶ τὰ δύο πρίσματα μείζονα εἰσὶν ἢ τὸ ἥμισυ τῆ ὅλης πυραμίδος.

Πρότασις δ. θεώρημα.

Εὰν ὡς δύο πυραμίδες ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψὸς τρίγωνος ἔχουσα βάσεως: διαρῆθῃ δὲ ἐκατέρα αὐτῶν εἰς δύο πυραμίδας ἴσας ἀλλήλαις, καὶ ὁμοίως τῆ ὅλη, καὶ εἰς δύο πρίσματα ἴσα, καὶ τῶν γενομένων πυραμίδων ἐκατέρα τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ τοῦτο αἰεὶ γίνηται, εἰσὶν ὡς ἡ τῆς μιᾶς πυραμίδος βάσις, πρὸς πλὴν τῆς ἐτέρας πυραμίδος βάσιν: ἔτι καὶ τὰ ἐν τῇ μιᾷ πυραμίδι πρίσματα πάντα, πρὸς τὰ ἐν τῇ ἐτέρα πυραμίδι πρίσματα πάντα ἴσοσκληθῆ.

Πρότασις ε. θεώρημα.

Αἰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψὸς ἔσονται πυραμίδες καὶ τρίγωνος ἔχουσα βάσεως, πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν, ὡς αἱ βάσεις.

Πρότασις ς. θεώρημα.

Propositio 3. Theorema.

Omnis pyramis quæ basin habet triangularem diuiditur in duas pyramides æquales, & similes inter se habentes bases triangulares, & similiter toti: atq; duo prismata æqualia, & duo illa prismata maiora sunt quàm dimidium totius pyramidis.

Propositio 4. Theorema.

Si fuerint duæ pyramides eiusdem altitudinis, habentes bases triangulares, vtraq; diuidetur in duas pyramides æquales inter se, & similes toti atq; duo prismata æqualia, & ex iam factis pyramidibus vtraq; eodem modo diuidatur, & illud semper fiat: erit vt vnius pyramidis basis ad alterius pyramidis basin, sic omnia prismata quæ in vna pyramide sunt ad omnia prismata æqualia numero alterius pyramidis.

Propositio 5. Theorema.

Pyramides quæ eiusdem sunt altitudinis & bases habent triangulares, ita se habent vt bases.

Propositio 6. Theorema.

Pyra.

Αἱ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος πυραμίδες,
καὶ πολυγώνες ἔχουσι βάσιν πρὸς ἀλλήλας
εἶσιν ὡς αἱ βάσεις.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Πᾶν πρίσμα τριγώνον ἔχον βάσιν, δια-
ρεῖται εἰς τρεῖς πυραμίδας ἴσας ἀλλήλαις
τριγώνες βάσεις ἔχουσαι.

Πρότασις η̄. πρόβλημα.

Αἱ ὅμοιαι πυραμίδες καὶ τριγώνες ἔχου-
σι βάσιν, ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσι τῶν ὁ-
μολόγων πλῆθῶν.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων πυραμίδων, καὶ τριγώνες βάσεις
ἔχουσῶν ἀντιπεπόνθασιν, αἱ βάσεις τοῖς ὕψε-
σι: Ἐῶν πυραμίδων τριγώνες βάσεις ἔχου-
σῶν ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὕψεσι,
ἴσῃ εἶσιν ἐκείναι.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Πᾶς κῶν κύλινδρος τρίτον μέρος ἐστὶ
τοῦ πλὴν αὐτῷ βάσιν ἔχοντος αὐτοῦ, καὶ ὕ-
ψος ἴσον.

Πρότασις ιᾱ. Θεώρημα.

Οἱ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντες κῶνοι καὶ
κύλινδροι, πρὸς ἀλλήλας εἶσιν, ὡς αἱ βάσεις.

Pyramides quæ eiusdē sunt altitudinis et polygonas habēt bases, ita se habēt vt bases.

Propositio 7. Theorema.

Omne prisma triangularem habens basin diuiditur in tres pyramides inter se æquales, habentes bases triangulares.

Propositio 8. Theorema.

Pyramides similes & triangulares bases habentes, proportionem laterum homologorum habent triplicatam.

Propositio 9. Theorema.

Pyramidum æqualium, & triangulares bases habentium, reciprocæ sunt bases altitudinibus, & quorum pyramidum triangulares bases habentium reciprocæ sunt bases ipsarum altitudinibus, illæ sunt æquales.

Propositio 10. Theorema.

Omnis conus, tertia cylindri pars est eius, nempe cum quo eandem basin habet & altitudinem æqualem.

Propositio 11. Theorema.

Coni & Cylindri qui sub eadem sunt altitudine, sese mutuò habent, vt ipsæ bases.

N Pro-

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Οἱ ὅμοιοι κῶνοι, καὶ κύλινδροι ἐν τριπλα-
σίονι λόγῳ εἰσὶν τῶν ἐν ταῖς βάσεσι Διαμέ-
τρων. Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν κύλινδρον ἐπιπέδῳ τμηθῆ παρα-
λλήλῳ, ὄντι τοῖς ἀπ' ἐναντίον ἐπιπέδοις, ἕσται
ὡς ὁ κύλινδρος πρὸς τὸν κύλινδρον ὁ ἄξων
πρὸς τὸν ἄξονα.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Οἱ ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντες κῶνοι καὶ κύλι-
δροι, πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς τὰ ὕψη.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων κῶνων καὶ κυλίνδρων, ἀντιπεπόν-
θασιν αἱ βάσεις τοῖς ὕψεσι, καὶ ὧν κῶνων, καὶ
κυλίνδρων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὕ-
ψεσιν ἴσοι εἰσὶν ἑκείνοι.

Πρότασις ις. Πρόβλημα.

Δύο κύκλων πρὸς τὸ αὐτὸ κέντρον ὄντων
εἰς τὸν μείζονα κύκλον πολύγωνον ἰσοπλευ-
ρόν τε ἑσάρτιόπλευρον ἐγγράψαι, μὴ φαῖον
τῷ ἐλάσσονι κύκλῳ

Πρότασις ιζ. Πρόβλημα.

Δύο σφαιρῶν πρὸς τὸ αὐτὸ κέντρον ἑσῶν
εἰς τὴν

Propositio 12. Theorema.

Similes conī, & cylindri triplicatam habent diametrorū quæ in basibus sunt rationē.

Propositio 13. Theorema.

Si cylindrus plano fuerit sectus æquedistanti planis oppositis, erit vt cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem.

Propositio 14. Theorema.

Coni & Cylindri habentes bases æquales sese mutuò habent vt altitudines.

Propositio 15. Theorema.

Æqualium conorum & cylindrorum reciproca sunt bases altitudinibus, & quorum conorum atq; cylindrorum reciproca sunt bases altitudinibus illi æquales sunt.

Propositio 16. problema.

Datis duobus circulis qui æque eodem centro descripti sunt, in maiorem circulum polygonon æquilaterum & parium laterum inscribere, quod minorem circulum nõ tangat.

Propositio 17. problema.

Datis duabus sphaeris ex vno eodemq; centro descriptis in sphaeram maiorem inscribere

N 2 poly-

εἰς τὴν μείζονα σφαῖραν σφαιρὸν πολύγωνον ἐγγράψαι, μὴ ψαῦον τῆς ἐλάσσονος σφαίρας κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Αἱ σφαῖραι πρὸς ἀλλήλας ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ἰδίων διαμέτρων.

Τέλος τῆς β' βιβλιοθήκης.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ιγ, καὶ σφαιρῶν τρίτον.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Εὰν εὐθεία γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, τὸ μείζον τμήμα περὶ τὸν ἡμισείαν τῆς ὅλης περὶ τὸν τριπλασίον διώταται τῆς ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ὅλης.

πρότασις β. πρόβλημα.

Εὰν εὐθεία γραμμὴ τμήματος ἐαυτῆς πενταπλασίον διώταται τῆς διπλασίας τῆς εἰρημένης τμήματος, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τενομένης, τὸ μείζον τμήμα τὸ λοιπὸν μέρος ἐστὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς εὐθείας.

Πρότα-

polygonon quod superficiem minoris sphaerae non tangat.

Propositio 18. Theorema.

Sphaerae suorum diametrorum rationem habent triplicatam.

Finis Duodecimi Libri.

EVCLIDIS LIBER DECIMVS TERTIVS ET STEREOMETRIA tertius.

Propositio 1. Theorema.

Si recta linea secta fuerit extrema & media ratione, maius segmentum dimidiam assumens totius partem quintuplo plus potest quam quadratum quod a dimidio totius segmento describitur.

Propositio 2. Theorema.

Si recta linea quintuplo plus potest sui ipsius segmenti quam duplum iam dicti segmenti diuisi extrema & media ratione: maius segmentum erit reliqua pars ab initio propositae lineae rectae.

N 3 Pro-

πρώταις γ. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεία γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ, τὸ ἐλαστον τμήμα προσλαβὼν πλὴ ἡμισείαν τῷ μείζονος τμήματ^ο πεντεπλάσιον διώηται τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἔμειζον^ο τετραγώνῃ.

πρώταις δ. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεία γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης, καὶ τῷ ἐλάττω^ο τμήματ^ο τὰ συναμφοτέρα τετραγωνα, τριπλάσια ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῷ μείζον^ο τμήματ^ο τετραγώνῃ.

Πρώταις ε. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεία γραμμὴ, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ, ἔστω περὶ τῆς ἰσῆς τῷ μείζονι τμήματι, ὅλη ἡ ὀρθεία, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἢ ἐξ ἀρχῆς ὀρθεία.

πρώταις ς. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεία ῥητῆ, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ, ἐκάτερον τῶν τμημάτων, ἄλογ^ο ἐστὶν ἢ καλουμένη ἀποτομή.

πρώταις ζ. Θεώρημα.

Εὰν

Propositio 3. Theorema.

Si recta linea extrema & media ratione secetur, minus segmentum verò assumat dimidium maioris segmenti quintuplo plus potest quam quadratum quod à maioris segmenti dimidio describitur.

Propositio 4. Theorema.

Si recta linea extrema & media ratione fuerit secta, quadratum à tota descriptum, et à minore segmento illa duo quadrata tripla sunt quadrati à maiore segmento descripti.

Propositio 5. Theorema.

Si recta linea extrema & media ratione secetur, eiq; apponatur recta maiori segmento æqualis: tota illa recta extrema & media ratione secta erit, & segmentum maius est linea recta ab initio proposita.

Propositio 6. Theorema.

Si recta rationalis extrema & media ratione secetur, utraq; segmentum irrationale est, quod vocatur residuum.

Propositio 7. Theorema.

N 4

Si

SCD LYON
Mathématiques

Εὰν τετραγώνῃ ἰσοπλευροῦ αἱ τρεῖς γωνίαι ἦτοι αἱ κατὰ τὸ ἐξῆς, ἢ αἱ μὴ κατὰ τὸ ἐξῆς ἴσαι ὦσιν, ἰσογώνιον ἔσται τὸ πεντάγωνον.

Πρότασις ἦ. Θεώρημα.

Εὰν πεντάγωνῃ ἰσοπλευρῆς καὶ ἰσογωνίου τὰς κατὰ τὸ ἐξῆς δύο γωνίας ὑποτείνωσιν εὐθεῖαι, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνουσιν ἀλλήλας, καὶ τὰ μείζονα αὐτῶν τμήματα ἴσα ἔσιν, τῇ τῷ πεντάγωνῃ πλευρᾷ.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν ἡ τῷ ἑξαγώνου πλευρᾷ, καὶ ἡ τοῦ δεκαγώνου, εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφόμενων συνεθῶσιν, ἢ ὅλη εὐθεῖα, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμήμα ἔσιν ἡ τῷ ἑξαγώνου πλευρᾷ.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν εἰς κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρον ἐγγραφῆ, ἢ ἑξάγωνον πεντάγωνον διώσται, πῶς τε ἑξαγώνου, καὶ πῶς δεκαγώνου, τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφόμενων.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Εὰν εἰς κύκλον ῥητῶν ἔχοντα πῶς διάμετρον πεντάγωνον ἰσόπλευρον ἐγγραφῆ, ἢ ἑξά-

πεν-

Si alicuius pentagoni tres anguli siue contigui sint, siue non contigui: fuerint inter se æquales, tum illud pentagonon æqualium erit angulorum.

Propositio 8. Theorema.

Si pentagoni alicuius quod latera habet æqualia, & angulos æquales, angulos duos contiguos subtendant rectæ: illæ extrema & media ratione sese secant, & maiora illorum segmenta, sunt æqualia lateri ipsius pentagoni.

Propositio 9. Theorema.

Si hexagoni & decagoni in eundem circuli inscriptorum latera componantur: tota linea recta erit extrema & media ratione secta & maius segmentum est latus hexagoni.

Propositio 10. Theorema.

Si in circulum pentagonon æquilaterum inscribatur, tum pentagoni latus potest latus hexagoni & decagoni quæ in eundem inscripta sunt circulum.

Propositio 11. Theorema.

Si in circulum qui diametron habet rationalem inscribatur pentagonon æquilaterum

N v tum

πενταγώνου πλῆρὰ ἄλογον ἔστιν ἡ καλυ-
μένη ἔλασων.

Πρότασις ιβ. θεώρημα.

Εὰν εἰς κύκλον τρίγωνον ἰσόπλευρον ἐγ-
γραφή, ἢ τὸ τρίγωνον πλῆρὰ δυνάμει τρι-
πλασίων ἐστὶ τῆς ἐκ τῶν κέντρων τῶν κύκλου.

Πρότασις ιγ. πρόβλημα.

Πυραμίδα συστήσασθαι, καὶ σφαῖρα περι-
λαβεῖν τῇ δοθείσῃ: καὶ δεῖξαι ὅτι ἡ τῆς σφαι-
ρας διάμετρος ἴση δυνάμει ἡμισφαιρῆς ἐστὶ τῆς
πλευρᾶς τῆς πυραμίδος.

Πρότασις ιδ. πρόβλημα.

Οκτάεδρον συστήσασθαι, καὶ σφαῖρα περι-
λαβεῖν, ἢ καὶ πλὴν πυραμίδα, καὶ δεῖξαι ὅτι ἡ
τῆς σφαιρας διάμετρος ἴση δυνάμει διπλα-
σίου ἐστὶ τῆς πλευρᾶς τῶν οκταέδρου.

Πρότασις ιε. πρόβλημα.

Κύβον συστήσασθαι καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν ἢ
καὶ τὰ πρότερα, καὶ δεῖξαι ὅτι ἡ τῆς σφαι-
ρας διάμετρος ἴση δυνάμει τριπλῆς ἐστὶ τῆς
τῶν κύβου πλευρᾶς.

Πρότασις ις. πρόβλημα.

Εικοσάεδρον συστήσασθαι, καὶ σφαῖρα περι-
λαβεῖν.

tum pentagoni latus irrationale est, vocatur minor.

Propositio 12. Theorema.

Si in circulum inscribatur triangulus æquilaterus tum trianguli latus potentia triplum est lineæ ex centro circuli ductæ.

Propositio 13. problema.

Pyramidem constituere & spheræ datæ includere, atq; demonstrare quod diameter spheræ potentia sesquialtera est lateris ipsius pyramidis.

Propositio 14. problema.

Octaedron constituere & spheræ includere in qua & pyramidem, atq; demonstrare quod diameter spheræ potentia dupla sit lateris octaedri.

Propositio 15. problema.

Cubum constituere & spheræ ei includere cui & præcedentia, ac demonstrare quod diameter spheræ potentia sit tripla lateris cubici.

Propositio 16. problema.

Eicosaedron constituere & spheræ includere

λαβεῖν, ἢ καὶ τὰ προσφερόμενα σχήματα, καὶ
 δεῖξαι ὅτι ἡ τῶν εἰκοσαέδρου πλῆρὰ ἀλογ
 εἶσιν ἢ καλεσμένη ἑλατίων.

Πρότασις ιζ. πρόβλημα.

Δωδεκάεδρον συστήσασθαι ἐσφαιρα πε-
 ριλαβεῖν ἢ καὶ τὰ προσφερόμενα σχήματα, καὶ
 δεῖξαι ὅτι ἡ τῶν δωδεκαέδρου πλῆρὰ ἀλο-
 γ εἶσιν ἢ καλεσμένη διπολομή.

Πρότασις ιη. πρόβλημα.

Τὰς πλῆρὰς τῶν πέντε σχημάτων, ἐκ-
 θέσθαι καὶ συγκρίναι πρὸς ἀλλήλας.

Τέλος τῶν στοιχείων.



dere, cui & præcedentes inclusimus, ac demonstrare quod latus Eicosaedri irrationale sit, quod vocatur minus.

Propositio 17. problema.

Dodecaedron constituere & sphaera circumdare qua & antecedentes figuras ac demonstrare quod dodecaedri latus irrationale sit quod vocatur residuum.

Propositio 18. problema.

Latera quinq; horum corporum regularium proponere, & inter se conferre.

Finis Libri Decimitertij.



ERRATA.

In titulo libri secundi γεωμικῶς lege γεωμηκῶς. In præfatione libri secundi a. 3. linea 14. cognitionem lege cognationem. In præfatione libri secundi facie altera paginæ a. 4. con-genda lege congerenda. Sunt & alia hinc inde errata, quæ certè non poterant omnia obseruari, siquidem non mihi tantum, qui successiuis horis, & quibus ab alijs vacuus videbar mihi esse negotijs, hæc conscripsi: tantum spacij temporis concessum non fuit, vt omnia corrigerẽ ad amussimq; iudicij Geometrici examinarem: sed & ipse Typographus suis ñs q; diuersis distractus negotijs, quæ in Typographia forsân sunt neglecta, in integrum restituere non potuit. Rogamus igitur æquum lectorem, vt *προσοπέριαι* venia detur, præsertim cum offeramus operam nostram, quod in *διδάξαι* *Φρονιίδεσι* longè edituri simus correctiora: nec dubitamus hanc nostram
excusa.

excusationem locū apud eos habituram, qui & nos norunt, & temporis angustiam qua hæc in lucem edi curauimus, respicere volunt. Accedit etiā hoc quòd peregrè profectus fuerim, cum extrema manus his libris imponeretur, vt quæ forsan necessariam requirerent emendationem, à me illam habere non potuerint.

FINIS.

